

جوڭگو تىببى قامۇسى تارماق تومى

# ئۇيغۇر تىبابەت قامۇسى

ئىككىنچى جلد

شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى


جۇڭگو تىببىي قامۇسى تارماق تومى

# ئۇيغۇر تىبابەت قامۇسى

«جۇڭگو تىببىي قامۇسى» تارماق تومى ئۇيغۇر  
تىبابەت قامۇسى ئىشخانىسى باشچىلىقىدا تۈزۈلدى  
شىنجاڭ ئۇيغۇر تىبابەت تەتقىقات ئىشخانىسى  
تەرىپىدىن نەشرگە تەييارلاندى



شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى



1990

نۇرۇمچى



## «جۇڭگو تىببىي قامۇسى» تە ھەرر ھە يىتى

مۇدىر ھە يىتە : چيەن شىنجۇڭ

مۇئاۋىن مۇدىر ھە يىتە تلەر : خۇاڭ جىياسى، لى جۇڭيۇ، گوزىخېڭ، ۋۇجېيڭ، توتۇڭجىن.

شى مېيشىن، جاۋشۇۋو

باش كاتىپ : چىن خە يىڭ

مۇئاۋىن باش كاتىپلار : سى دىيە نىياڭ، فېڭ گۇاڭ، جۇكېۋىن، دەي زىيىڭ

ھە يىتە تلەر : (فاسلە خەت سىزىڭ ئاز كۆپلۈكى بويىچە ئېلىندى) دىڭ جىڭ، تودېڭسرىن،

ماڧىيخەي، ۋاڭ يى (ئايال)، ۋاڭ يۈچۈن، ۋاڭ شىجىن، ۋاڭ يۇڭيى، ۋاڭ يۇڭگوي، ۋاڭ گۇاڭچىڭ،

ۋاڭ شۈشيەن، ۋاڭ جۇۋو، ۋاڭ گۇە نىياڭ، ۋاڭ شۈتەي، ۋاڭ شۈجىن (ئايال)، ۋاڭ يېڭچىڭ، ۋاڭ دېجىەن،

ۋاڭ خەنجاڭ، ماۋ شىشۋو (ئايال)، ماۋ شۈبەي، دېڭ جىادوڭ، شى ماۋنيەن، شى مېيشىن، لۇخۇيلىن،

لۇجىڭشۈەن، يى گۇڭشاۋ (ئايال)، يۈكۇڭ، شى يۈچۈن، بەي چىڭيۈن، كۇاڭ خېلىڭ، فېڭ گۇاڭ

(ئايال)، لەن شىچۈن، سى تولىڭ، يى شى، لوي بىڭكوي، جۈمەنيۇ، جۇچاۋ، جۇرېناۋ، جۇكېۋىن،

جۇيۇخۇي، جۇخۇڭيىڭ، جۇجىڭ، جۇڭچىڭ، رېن يىڭچىۋو، لىۋشىجى، لىۋيۇجىڭ،

لىۋشۇڭو، مى بەيراڭ، سۇن جۇڭلياڭ، سۇن رۇيزۇڭ، سۇ دېلوڭ، دۇنيەنزۇ، باڭ يىيا، باڭ گولىياڭ،

ياڭ شۇچىڭ، ياڭ مېڭدېڭ، ياڭ ساۋچىن، لى كۇڭ، لى يۇڭچۈن، لى باۋشى، لى جىڭيۇي، لى جىنچۇ،

لى جياۋتى، لى سۇڭيۇ، ۋۇجۇلى، ۋۇجۇڭ، ۋۇجىيىڭ، ۋۇيىڭكەي، ۋۇجىڭچىەن، ۋۇشاۋچىڭ،

ۋۇشيەنجۇڭ، ۋۇيىڭو، ۋۇخېڭسېڭ، ۋۇۋبىرەن، يۇخى، سۇڭ جىڭدەن، جىزفۇيەن، جاڭ شىياڭ،

جاڭ شېشيەن، جاڭ لىفەن، جاڭ شياۋچىەن، جاڭ چاڭيىڭ، جاڭ زېسېڭ، جاڭ شۇيۇڭ، جاڭ دىسېڭ،

جاڭ يۈنچاڭ، لۇرۇشەن، چېن شىن، چېن جۇڭيۇي، چىن مېڭجىن، چىن گوجىن،

چېن خە يىڭ، چىن خاۋجۇ، لىن چاۋجۇ (ئايال)، لىن كېچۈن، لىن ياڭو، يۇجىڧىي، شىياڭ تىەنيۇ،

لويۈنكەي، لوجىڭچىڭ، جى جۇڭيۇ، ئىسھاقىجان مەھمۇد، جۇجىڭخۇاڭ، جۇمىڭجۈن (ئايال)،

جېڭ لىفەن، مېڭ جىماۋ، جاۋبىڭنەن، جاۋشۇۋو، رۇڭ دۇشەن، خۇچۈەنكوي، خۇشىڭ، جۇڭ شۇلى،

جۇڭ خۇيىلەن، خۇزۇڭلىيەن، يۈكېجۇڭ، سى دىيە نىياڭ، جىياڭ چۈنخۇا، خۇڭ زىيۈن، شىياڭجى،

گۇشۇجى، گۇسۇيۈ، چىەن دې، چىەن شىنجۇڭ، شۇڧىڭيەن، لىڭ خۇيياڭ، گۇدى، گونەيچۈن،

گوزىخېڭ، گوبىڭكۇەن، گوجۈنەنجىڭ، گوجىنچىۋو، گوجىڭيۈەن، تاڭ يۇجى، توتۇڭجىن،

جۇڧوتاڭ، تاۋخۇەنلو، خۇاڭ لىياڭ (ئايال)، خۇاڭ ۋىندۇڭ، خۇاڭ ياۋ، خۇاڭ جىياسى، خۇاڭ جىڭشياڭ،

خۇڭ شېنىۋو، ساۋجۇڭلىياڭ، گەي باۋخۇاڭ، لىياڭ جۇچۈن، دۇڭ جۇن، دۇڭ چىڭلاڭ، جاڭ يۇتو،

خەن گۇاڭ، چېڭ جىڧەن، فۇڧىڭيۇڭ، تۇڭ ئىرچاڭ، زېڭ شىيەنجىۋو، شى رۇڭ، شى شاۋۋىن،

جىۇڧازۇ، سەي رۇڭ، سەي چىياۋ، سەي خۇڭداۋ، دەي زىيىڭ.





## 《中国医学百科全书》编辑委员会

**主任委员** 钱信忠  
**副主任委员** 黄家驷 季钟朴 郭子恒 吴阶平 涂通今 石美鑫 赵锡武  
**秘书长** 陈海峰  
**副秘书长** 施奠邦 冯光 朱克文 戴自英  
**委员** (以姓氏笔划为序)

丁季峰	王登次仁	马飞海	王懿(女)	王玉川	王世真	王用楫
王永贵	王光清	王叔咸	王季午	王冠良	王雪苔	王淑贞(女)
王鹏程	王德鉴	王翰章	毛文书(女)	毛守白	邓家栋	石茂年
石美鑫	卢惠霖	卢静轩	叶恭绍(女)	由昆	史玉泉	白清云
邝贺龄	冯光(女)	兰锡纯	司徒亮	毕涉	吕柄奎	曲绵域
朱潮	朱壬葆	朱克文	朱育惠	朱洪荫	朱既明	朱霖青
任应秋	刘世杰	刘育京	刘毓谷	米伯让	孙忠亮	孙瑞宗
苏德隆	杜念祖	杨医亚	杨国亮	杨树勤	杨铭鼎	杨藻宸
李昆	李永春	李宝实	李经纬	李振志	李肇特	李聪甫
吴之理	吴执中	吴阶平	吴英恺	吴征鉴	吴绍青	吴咸中
吴貽谷	吴桓兴	吴蔚然	余灏	宋今丹	迟复元	张祥
张世显	张立藩	张孝骞	张昌颖	张泽生	张学庸	张涤生
张源昌	陆如山	陈信	陈中伟	陈明进	陈国楨	陈海峰
陈灏珠	林幼稚(女)	林克椿	林雅谷	郁知非	尚天裕	罗元恺
罗致诚	季钟朴	易沙克江	周金黄	周敏君(女)	郑麟藩	孟继懋
赵柄南	赵锡武	荣独山	胡传揆	胡熙明	钟学礼	钟惠澜
候宗濂	俞克忠	施奠邦	姜春华	洪子云	夏镇夷	顾学箕
顾绥岳	钱德	徐信忠	徐丰彦	凌惠扬	郭迪	郭乃春
郭子恒	郭秉宽	郭泉清	郭振球	郭景元	唐由之	涂通今
诸福棠	陶桓乐	黄量(女)	黄文东	黄耀桑	黄家驷	黄禛祥
黄绳武	曹钟梁	盖宝璜	梁植权	董郡	董承琅	蒋豫图
韩光	程之范	傅丰永	童尔昌	曾宪九	谢荣	谢少文
裘法祖	蔡荣	蔡翹	蔡宏道	戴自英		





«جۇڭگو تىببىي قامۇسى» تارماق تومى ئۇيغۇر تىبابەت  
قامۇسى تەھرىر ھەيئىتى

باش مۇھەررىر	ئىسھاقجان مەھمۇد
(ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە نازارىتى)	
مۇئاۋىن باش مۇھەررىرلەر	سۈن جىيە نىدې
(شىنجاڭ ئۇيغۇر تىبابەت تەتقىقات ئىنشانىسى)	ئابدۇلھەق رەخمىتۇللا
(شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى)	باۋدۇن جامالىدىن
(خوتەن ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تىبابەت شىپاخانىسى)	
ھەيئەتلەر	ئەھمەد ھاجى
(خوتەن ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تىبابەت شىپاخانىسى)	<b>زۇنۇن قارى</b>
(قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تىبابەت شىپاخانىسى)	ئابدۇلھېمىد يۈسۈپ
(شىنجاڭ ئۇيغۇر تىبابەت تېخنىكومى)	ھەسەن دامۇللا
(كۆچار ناھىيىلىك ئۇيغۇر تىبابەت تېخنىكومى شىپاخانىسى)	
ئىلمىي كاتىپ	ئابدۇرەھىم قادىر ئاسىپ
(شىنجاڭ ئۇيغۇر تىبابەت تەتقىقات ئىنشانىسى)	

قەشقەر ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تىبابەت تېخنىكومى شىپاخانىسىدىن  
«زۇنۇن قارى»، ئابدۇقادىر مۇھەممەت، مۇھەممەت  
ئېلى مەھمۇد، ئابدۇلھېمىد ھاشىم، ئىبراھىم بارات.

2- جىلد يازغۇچىلىرى:

ئابدۇرېھىم قادىر ئاسىپ  
ئىسھاقجان مەھمۇد

نەشرگە تەييارلىغۇچى:  
مەسئۇل مۇھەررىرى:





# 《中国医学百科全书》

## 维吾尔医学分卷编委会

- 主 编：**易沙克江·马合穆德 (新疆维吾尔自治区卫生厅)
- 副 主 编：**孙 建 德 (新疆维吾尔医研究室)  
阿不拉克·热木杜拉 (新疆人民出版社)  
巴吾东·加马力丁 (新疆和田地区维吾尔医医院)
- 编 委：**艾合买提·阿吉 (新疆和田地区维吾尔医医院)  
祖农·卡日 (新疆喀什地区维吾尔医医院)  
阿不力米提·玉苏甫 (和田新疆维吾尔医专科学校)  
艾山·大毛拉 (新疆库车县维吾尔医医院)

**学术秘书：**阿不都热衣木·哈德尔 (新疆维吾尔医研究室)

**第二册编著：**新疆喀什地区维吾尔医医院：祖农·卡日，  
阿不都卡的尔·买买提，买买提力·马合木德，  
阿不力米提·阿西木，依布拉音·巴拉提

**编辑：**阿不都热衣木·哈德尔

**责任编辑：**易沙克江·马合穆德



## كىرىش سۆز

«جۇڭگو تىببىي قامۇسى» ناماق تومى «تۇيغۇر تىبابەت قامۇسى» نىڭ 2- جىلدى تۇيغۇر تىبابىتى خادىملىرى ۋە كەڭ خەلق ئاممىسى «تۇيغۇر تىبابەت قامۇسى» 1- جىلدىدىن كېيىن نەشىردىن چىقىشىنى تەقەززالىق بىلەن كۈتۈپ كېلىۋاتقان يەنە بىر ئەسەر. ئۇنىڭ نەشىردىن چىقىشى تۇيغۇر تىبابەتچىلىك ئىلمى تەرەققىياتىدىكى چوڭ بىر ئىش. شۇنداقلا، مەملىكىتىمىز تىببىي ئىشلىرىغا قوشۇلغان مۇھىم بىر چوڭ تۆھپە.

مەزكۇر جىلد «تۇيغۇر تىبابەت قامۇسى» نىڭ «بەش ئەزا كېسەللىكلىرى ئىلمى» قىسمى بولغاچقا، ئەنئەنىۋى ئۆسۈپ بويىچە 2- جىلد قىلىپ نەشر قىلىندى.

قامۇسنىڭ مەزكۇر جىلدى سەھىيە مىنىستىرلىكىنىڭ بىر تۇتاش ئورۇنلاشتۇرۇشى، ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە نازارىتىنىڭ بىۋاسىتە رەھبەرلىكى ۋە غەمخورلىقىدا قەشقەر ۋىلايەتلىك تۇيغۇر تىبابەت شىپاخانىسىدىكى زۇنۇن قارى، ئابدۇقادىر مۇھەممەت، مۇھەممەت ئېلى مەھمۇد، ئابدۇلھېمىد ھاشىم، ئىبراھىم بارات قاتارلىق يولداشلار تۈزىگەن، نەچچە يىللاردىن بۇيان «تۇيغۇر تىبابەت قامۇسى» ئىلمىي كاتىبى يولداش ئابدۇرەھىم قادىر قايتا-قايتا تەھرىرلەپ، رەتلەپ بەزى مەزمۇنلارنى تولۇقلاپ ۋە تولۇقلاشقاندىن كېيىن نەشىرگە تەييارلىغان، «جۇڭگو تىببىي قامۇسى» نىڭ تەھرىر ھەيئەت ئەزاسى، «تۇيغۇر تىبابەت قامۇسى» نىڭ باش مۇھەررىرى كۆرۈپ چىققاندىن كېيىن نەشىرگە بېرىلگەن كەسپىي خاراكتېرلىك قورال كىتاب. ئۇنىڭدا كۆز، قۇلاق، بۇرۇن، ئېغىز (چىش، تىل، گال) كېسەللىكلىرىنىڭ سەۋەبى، ئالامىتى، داۋاسى ۋە بەزى مۇرەككەپ دورىلىرى، پەرھىزى، ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرى تۈزىگە خاس مىللىي ئالاھىدىلىك بويىچە خېلى تولۇق، مۇكەممەل بايان قىلىنغان. شۇڭا ئۇ، تۇيغۇر تىبابەت ئالىي تېخنىكومىنى پۈتتۈرگەن ياكى شۇ سەۋىيىگە تەڭ بولغان تۇيغۇر تىبابىتى خادىملىرىغا باب كېلىپلا قالماي، بەلكى تۇيغۇر تىبابىتى ھەۋەسكارلىرى ئۈچۈنمۇ مۇھىم ئەسەردۇر. جىلد ئاخىرىغا يولداش ئابدۇرەھىم قادىر توپلىغان نەرىيە، فارىسچە، تۇيغۇرچە، خەنزۇچە ئاتالغۇلار سېلىشتۇرمىسى قوشۇمچە قىلىنغان بولۇپ، بەلگىلىك تۈگىتىش، پايدىلىنىش قىممىتىگە ئىگە.



مەزكۇر جىلدىنى تۈزۈشتە «قامۇس» يېزىشتىكى تولۇق، يېڭى، مۇكەممەل بولۇش تەلپىنى ئورۇنداش ئۈچۈن، مەزكۇر جىلد يازغۇچىلىرىدىن بىرى بولغان مۇدر ۋراج ئابدۇقادىر مۇھەممەت ئەينى يىللاردا بەزى مەزمۇنلار ئۈستىدە مەخسۇس تولۇقلاش ئېلىپ بارغان ئىدى. كېيىن يەنە، ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇر تىبابەت شىپاخانىسىدىكى پېشقەدەم تېۋىپلاردىن مەنتوختى ھاجى، ئابدۇمىجد ھاجى ۋە ھەبىيۇللا ئېللار بەزى مەزمۇنلارنى يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا تولۇقلىدى. شىنجاڭ ئۇيغۇر تىبابەت تەتقىقات ئىشخانىسىدىكى يولداش ئەخمەتجان ئىسمائىل بەزى چۈشۈپ قالغان مەزمۇنلارنى قەدىمكى ئەسەرلەردىن تەرجىمە قىلىپ تولۇقلىدى. نەشىردىن چىقىرىش جەريانىدا، ئاققا كۆچۈرۈش ۋە كوررېكتورلۇق خىزمەتلىرىنى شىنجاڭ ئۇيغۇر تىبابەت تەتقىقات ئىشخانىسىدىكى يولداش ئېھسان ئىمىنجان، ئەخمەتجان ئىسمائىل قاتارلىق ياش ئۇيغۇر تىبابىتى خادىملىرى تىرىشىپ ئىشلىدى.

شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى «ئۇيغۇر تىبابەت قامۇسى» نىڭ نەشىردىن چىقىشىنى زور كۈچ بىلەن قوللاپ كەلدى. بۇنىڭ ئۈچۈن كۆپ رەھمەت ئېيتىمىز. «ئۇيغۇر تىبابەت قامۇسى» نىڭ 2- جىلدىغا مۇناسىۋەتلىك تەرەپلەر كۆپ، خىزمەت مىقدارى چوڭ، ئادەم كۈچىمىز ئاز بولغاچقا نەشىردىن چىقىشى كېچىكتى؛ مەزمۇن ۋە سۈپەت جەھەتتىكى تەلەپ يۇقىرى، ئۇنىڭ ئۈستىگە سەۋىيىمىز چەكلىك، «قامۇس» تۈزۈش تەجرىبىلىرىمىز كەم بولغاچقا يېتىشىزلىك ھەتتا بەزى خاتالىقلار بولۇشى مۇمكىن. كەڭ كىتابخانىلارنىڭ ئەپۇ قىلىشى ۋە قىممەتلىك تەنقىدىي پىكىرلەر بېرىشىنى تۈمد قىلىمىز.

«ئۇيغۇر تىبابەت قامۇسى» ئىشخانىسى

1990 - يىل 9 - ئاي







## مۇندەرىجە

- 1..... تۇيغۇر تىبابىتى بەش ئەزا كېسەللىكلىرى ئىلمى
- 6..... بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنى ئېنىقلاشتىكى مۇھىم نۇقتىلار
- 6..... بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنىڭ سەۋەبلىرى
- 7..... بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنىڭ سىرتقى سەۋەبلىرى
- 7..... بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنىڭ ئىچكى سەۋەبلىرى
- 10..... بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنىڭ دائىم كۆرۈلىدىغان ئالامەتلىرىنى ئىلغاش
- 11..... بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتىكى مۇھىم نۇقتىلار
- 12..... بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنىڭ ئىچكى داۋاسى
- 13..... بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنىڭ سىرتقى داۋاسى
- 15..... بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنىڭ جەراھىيىسى
- 18..... بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش
- 19..... بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنى پەرۋىش قىلىش
- 22..... كۆز كېسەللىكلىرى
- 22..... كۆزنىڭ تۈزۈلۈشى
- 23..... كۆز قوشۇمچە ئەزالىرى (مۇتەئەللىقاتى چەشم)
- 26..... كۆز يۇمىلىقى (مۇقلە)
- 27..... كۆز يۇمىلىقى سىرتى
- 29..... كۆز يۇمىلىقى ئىچى
- 31..... كۆز كېسەللىكلىرىنىڭ تۈرى
- 33..... كۆز كېسەللىكلىرىنىڭ تەشخىسى
- 35..... كۆزگە پايدىلىق ئامىللار
- 37..... كۆزگە زىيانلىق ئامىللار
- 39..... كۆز كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتىكى ئومۇمىي قانۇنلار





- 47..... كۆز دورىلىرى
- 50..... كۆز دورىلىرىنى تەييارلاشتا بىلىشكە تېگىشلىك ئىشلار
- 52..... كۆز دورىلىرىنى ئىشلىتىشتە دىققەت قىلىدىغان ئىشلار
- 57..... كۆز ئاغرىش (ۋە جۆلەينى)
- 67..... قاپاق ۋە كىرىپك كېسەللىكلىرى
- 68..... كۆزگە قوم ئىقىلغاندەك بولۇش (كۆمۈنە تۆلجە فەنى)
- 69..... قاپاقلار يەللىك ئىششىقى (تەھەببۇجۇلئە جفانى، ئىتتىفاخۇلئە جفانى)
- 70..... قاپاق قىچىشىش خاراكتىرلىك ئىششىقى (شەرا)
- 71..... قاپاق ساڭگىلاش (ئىستىرخاتۆلجە فەنى)
- 73..... چىمچىقلىق (ئىختىلاخۇلجە فەنى)
- 74..... قاپاق كېپەكلىشىش (سەئفە تۆلجە فەنى)
- 76..... قاپاق ۋەرىمى (ۋەرە مۇلجە فەنى)
- 78..... قاپاق ئۇششاق جاراھىتى (نەملە تۆلجە فەنى)
- 79..... قاپاققا تۈگۈنچەك پەيدا بولۇش (ئوقدە تۆلجە فەنى)
- 80..... قاپاق سۆڭىلى (سالىيۇلجە فەنى)
- 81..... قاپاق ياغسىمان ئۆسىمىسى (شەرناق)
- 83..... قاپاقلار يۇمشاق ئۆسۈكچىسى (تۆۋسە تۆلجە جفانى)
- 84..... قاپاق ئۆسىمىسى (سەئە تۆلجە فەنى)
- 85..... قاپاق گىرۋەكلىرى ئىششىقى (سۇلاق)
- 87..... يىڭناسقۇ (شەئىرە)
- 89..... قاپاق قىچىشىش (ھىككە تۆلجە فەنى)
- 90..... قاپاق ئۆرۈلۈش (شەترە)
- 91..... قاپاق ئىچى دانچىسىمان ئىششىقى (بەردە)
- 93..... قاپاق ئىچى قاتتىق قاپارتىچۇقى (كەدۇدۇمۇل)
- 94..... قاپاق ئىچى قىزىرىپ قېلىنىشىش (سەلابە تۆلجە فەنى)
- 95..... تەتۈر كىرىپك (شەئىمۇنقەلب)
- 97..... كىرىپك چۈشۈش (ئىتتىشارۇلئە ھىدايى)
- 98..... كىرىپك ئاقىرىش (بەيازۇلئە ھىدايى)
- 99..... كىرىپك چاپلىشىش (ئىلتىساقۇكە ھىدايى)
- 101..... كۆز بۇرچىكى كېسەللىكلىرى





- 101..... كۆز ياشاڭغۇراش (سە يلا تۆلدە مە ئى، جە ريانى ئە شك)
- 103..... كۆز ئىچى بۇرچىكى بە ز تۆسمسى (غۇددە ئى گوشە ئى چە شم)
- 105..... كۆز ئىچىكى بۇرچىكى بىر ئىگلىق ئاقمىسى (ناسۇرۇلئە بىنى)
- 107..... كۆزگە قاناتچە گۆش تۆسۈش (زۇفرە، گىل چە شمى)
- 109..... كۆز ئېقى كېسە للىكلىرى
- 110..... كۆز ئەستەر پەردىسى قېچىشىش (ھىككە ئى مۇلتە ھە مە ئى ئە بىنىيە)
- 111..... كۆز ئەستەر پەردىسى يە للىك ئىششىقى (ئىتتىفاخى مۇلتە ھە مە ئى ئە بىنىيە)
- 112..... كۆز ئەستەر پەردە ياللوغى (ئىلتىھابى مۇلتە ھە مە ئى ئە بىنىيە)
- 115..... كۆز قىزىرىپ ئاغرىش (رە مە د)
- 122..... كۆز قوتۇرى (جە رە بۆلئە بىنى)
- 125..... كۆز ئېقىغا رە گدار چېكىت پەيدا بولۇش (تە رە فە)
- 126..... كۆز ئەستەر پەردىسىگە نېپىز گۆش پەيدا بولۇش (تۆۋسە ئى مۇلتە ھە مە ئى ئە بىنىيە)
- 127..... كۆز ئېقىغا مۇدۇر پەيدا بولۇش (ۋە دقە)
- 129..... كۆز قارىسى كېسە للىكلىرى
- 130..... كۆزگە پەردە چۈشۈش (سە بە ل)
- 131..... كۆزگە ئاق چۈشۈش (سە فىدى چە شم، بە يازۇلئە بىنى)
- 133..... كۆز بىر ئىگلىق جاراهىتى (قۇرۇھۆلئە بىنى)
- 134..... كۆز قارىسىنىڭ قۇرغاقلىشىشى (خۇشۇنە تى قە رنىيە)
- 136..... كۆز قارىسىنىڭ بېرىلىشى (شىقاقى قە رنىيە)
- 139..... كۆز قارىسىنىڭ يىگىلەپ كېتىشى (سە لىخى قە رنىيە)
- 141..... كۆز قارىچۇقى كېسە للىكلىرى
- 142..... كۆز ئاجىزلىق (زە ئفۇلبە سە رى)
- 145..... كۆز كۆرمە سىلىك (بۇتلا تۆلبە سە رى)
- 147..... ئالغايلىق (ھە ۋە ل)
- 150..... ناماز شام قارىغۇسى (شە ب كورى، ئە شائ)
- 152..... كۆندۈزى كۆرمە سىلىك (رۇز كۆرى)
- 155..... كۆزنىڭ يورۇقلۇقتىن قېچىشى (خە فە ش، بوغزۇلئە بىنى)
- 156..... كۆزنىڭ تۇر يىغالماسلىقى (ئىتتىشارۇلبە سە رى)
- 157..... ئۈزۈم سىمان پەردىنىڭ چىقىپ قېلىشى (مۇرسە رە ج)
- 159..... كۆز قارىچۇقىنىڭ كېڭىيىشى (ئىتتىسائۇلمۇجە ۋۋە فى)





- 161..... كۆز قارىچۇقىنىڭ تارىخى (زەبىقى سوقبەنى ئىنەبىيە)
- 163 ..... كۆزگە سۇ چۈشۈش (تۈزۈلۈمات)
- 166 ..... قوشۇمچە: قەدەھ (قدح) تۈسۈلى
- 170..... كۆزگە كۆمۈت، پاشىغا ئوخشاش نەرسىلەر تۇچقاندىكى كۆرۈنۈش (خىيالات)
- 171..... قوشۇمچە: كۆزگە رەڭگارەڭ نەرسىلەر كۆرۈنۈش
- 173..... كۆزنىڭ باشقا كېسەللىكلىرى
- 174..... قاپاق كۆكۈرۈش (زۇرقەت، خۇزرە تۈلجە فەنى)
- 175..... كۈچلۈك نۇر تەسىرىدىن كۆز تورلىشىش (قۇمۇر)
- 176..... كۆزگە غەربىي نەرسىلەر كىرىپ كېتىش (قەزا)
- 178..... كۆزگە زەربە تېگىش (زەربە تۈلەينى، زەربە ئى چەشم)
- 179..... كۆز يۇمىلىقى پولىتسىپ چىقىش (تۇتۇلۇش)
- 181..... كۆز يۇمىلىقى يېڭىلەپ ئولتۇرۇشۇپ كېتىش (ھۇزالۇتەينى، لاغەرى چەشم)
- 183..... كۆك كۆزۈك (زۇرقە تۈلەينى، گۈربە ئى چەشم، زەرقائ)
- 185..... كۆز كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىدىغان بىر قىسىم دورىلار
- 185..... كۆز ئەستە پەردە ياللىغىنى داۋالايدىغان دورىلار
- 186..... كۆزگە رەڭدار چېكىت چۈشۈش كېسەلىگە ئىشلىتىدىغان دورىلار
- 186..... كۆز بۇرجىكىدىن تۈسكەن تىرناقسىمان گۆشنى داۋالايدىغان دورىلار
- 187..... كۆزگە چۈشكەن ئاققا ئىشلىتىدىغان دورىلار
- 189..... كۆز كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىدىغان بىر قىسىم مۇرەككەپ دورىلار
- 202..... قۇلاق كېسەللىكلىرى
- 202..... قۇلاقنىڭ تۈزۈلۈشى
- 203..... سىرتقى قۇلاق
- 205..... ئوتتۇرا قۇلاق
- 208..... ئىچكى قۇلاق
- 210..... قۇلاققا پايدىلىق ۋە پايدىسىز ئامىللار
- 211..... قۇلاق كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتىكى ئومۇمىي قائىدىلەر
- 215..... قۇلاق ئاغرىش (ۋە جىئۇلۇزنى، دەردى گۆش)
- 222..... قۇلاق غۇڭگۈلداش (تەننىن ۋە دەۋۋەي)
- 227..... قۇلاق ئېغىرلىق ۋە گاسلىق (تەرەش، ۋە قەر-بۇتلاتۇسەمنى)
- 232..... قۇلاق قىچىشىش (ھىككە تۈلۇزنى، خارىشى گۆش)





- 234.....قۇلاق ۋە رەملرى (ئەۋرامۇلتۇزنى، ئاماسھايى گۆش)
- 236.....قۇلاق بىرىگلىق چاقىسى (قورۇلھۇلتۇزنى، بوسۇرى گۆش)
- 238.....قۇلاق ئاقمىسى (ناسۇرۇلتۇزنى)
- 240.....قۇلاق قاناش (ئىتىفجارۇلتۇزنى)
- 242.....قۇلاقنىڭ ئاۋازىدىن قېچىشى (ھەربۇلتۇزنى، نەزاكەتى گۆش)
- 243.....قۇلاققا سۇ كىرىپ كېتىش (دوخولى ماڭ فىلتۇزنى، دەرتامەدەنى ئاب دەر گۆش)
- 244.....قۇلاققا ھاشارات كىرىپ كېتىش (دوخولى ھەۋام فىلتۇزنى، دەرتامەدەنى ھەشر گۆش)
- 245.....قۇلاق زەخمىلىنىش (زەربەتۇلتۇزنى، زەربەتى گۆش)
- 247.....قۇلاق كەينى يېرىلىش (تەرقىدەنى بېيخى گۆش، شىقاقى ئەسلۇلتۇزنى)
- 248.....قۇلاق كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلدىغان بىر قىسىم دورىلار
- 248.....قۇلاق يالغۇغىغا پايدا قىلىدىغان دورىلار
- 254.....بۇرۇن كېسەللىكلىرى
- 254.....بۇرۇننىڭ تۈزۈلۈشى
- 259.....توغما پۇراش سېزىم ئاجىزلىقى (مەۋلۇدۇلخەشەمى)
- 260.....ئىككىلەمچى پۇراش سېزىم ئاجىزلىقى (ئەرەزۇلخەشەمى)
- 265.....پۇراش قۇۋۋىتى بۇزۇلۇش (فەسادۇششەمى)
- 268.....بۇرۇن قۇرۇش (جەفاقۇلئەنفى)
- 270.....بۇرۇن قېچىشىش (ھىككەتۇلئەنفى، خارىشى بېيى)
- 272.....بۇرۇن ئېچىشىش (ھىرقەتۇلئەنفى)
- 274.....كۆپ چۈشكۈرۈش (ئوتاس)
- 276.....بۇرۇن سېسىق پۇراش (بەخىرۇلئەنفى)
- 278.....بۇرۇن كۆپۈشۈش (ئىتىفاخۇلئەنفى)
- 278.....بۇرۇن قورۇلۇش (ئىتىقبازۇلئەنفى)
- 279.....بۇرۇن ۋە رەملرى (ئىلتىھا بۇلئەنفى، ئەۋرامۇلئەنفى، ئاماسھايى بېيى)
- 282.....بۇرۇن قاناش (رۇئاف)
- 285.....بۇرۇن ئىچى تۇششاق مۇدۈرى (بوسۇرۇلئەنفى)
- 287.....بۇرۇن جاراهىتى (قۇرۇھۇلئەنفى)
- 291.....بۇرۇن بەۋاسىرى (بەۋاسىرۇلئەنفى، بەۋاسىرى بېيى)
- 292.....بۇرۇن يولغا توسالغۇ پەيدا بولۇش (سۇددەتۇلخەبىشۇمى)
- 295.....بۇرۇن راكى (سەرتانۇلئەنفى، سەرتانى بېيى)





- بۇرۇندا غەيرىي نەرسىلەر تۇرۇپ قېلىش (ئىھتىياسۇششە ئى فىلە نفى، بە نىدشۇدە نى  
 296..... چىزى دەرىيىنى)  
 297..... بۇرۇن ئېزىلىش (رە ززۇلئە نفى)  
 299..... بۇرۇن كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدىغان بىر قىسىم مۇرەككەپ دورىلار  
 301..... پۇراش سېزىمىنى ئاشۇرىدىغان دورىلار  
 301..... بۇرۇن ۋە رەملىرىنى ياندۇرىدىغان دورىلار  
 301..... بۇرۇن ئىچى چاقا-جاراھاتلىرىگە مەنپەئەت قىلىدىغان دورىلار  
 303..... ئېغىز بوشلۇقى كېسەللىكلىرى  
 304..... ئېغىز بوشلۇقىدىكى ئەزالارنىڭ تۈزۈلۈشى  
 كالىپۇك قۇرۇش، يېرىلىش ۋە قاسراقلىشىش (جۇفاقۇششە فە تى، تە شە ققە قۇششە فە تى،  
 310..... تە قە شۇرۇششە فە تى)  
 312..... كالىپۇك ئاقىرىش (سە فىدى لە ب، بە يازۇششە فە تى)  
 313..... كالىپۇك تارتىشىش (ئىختىلاجۇششە فە تى)  
 316..... كالىپۇك ۋە رەملىرى (ئاماسھايى لە ب، ئىلتىھابۇششە فە تى)  
 318..... كالىپۇك دوردىشىش (تە قە لئۇسۇششە فە تى)  
 320..... كالىپۇك تۇششاق مۇدۇرى ۋە يىرىگىلىق چاقىسى (بۇسۇرۇششە فە تى ۋە قۇرۇھۇششە فە تى)  
 321..... كالىپۇكقا ئارتۇقچە گۆش تۇسۇش (بە ۋاسىرى لە ب، بە ۋاسىرۇششە فە تى)  
 323..... ئېغىز پۇراش (بە خرولفە مى)  
 325..... شۇلگە ي ئېقىش (كە سرە تۇللۇئابى)  
 326..... ئېغىز ۋە رىمى (ۋە رە مۇلفە مى، قۇلاش)  
 329..... ئېغىزغا مۇدۇر چىقىش (بۇسۇرۇلفە مى)  
 330..... ئېغىز ئىچى سويۇلۇش (تە قە ششۇرۇلفە مى)  
 331..... ئېغىز گۆشخۇر چاقىسى (ئاكلە تۇلفە مى)  
 333..... تىل ئاغرىش (ۋە جئوللىسانى)  
 335..... تىل قۇرۇش (جە فافۇللىسانى)  
 336..... تىل يېرىلىش (شفاقۇللىسانى)  
 338..... تىل قىچشىش (ھككە تۇللىسانى)  
 339..... تىل كۆيۈشۈپ ئېچىشىش (ھىرقە تۇللىسانى)  
 341..... تىل يۇغىناپ كېتىش (ئەزە مۇللىسانى)  
 344..... تەم تېتىشىنىڭ بۇزۇلۇشى ۋە يوقىلىشى (فە سادۇرزە ۋە بولتۇرزە ۋى)





- 346..... تىل ئېغىرلىقى (سېلىۋىلىسانى)
- 351..... كېكە چىلىك (لەككە تولىسانى)
- 352..... تىل ۋە رىسمى (ۋەرە مۇللىسانى، ئىلتىھابۇللىسانى، ئاماسى زەبان)
- 354..... تىل ئاستى پاقسىمان تۆسىمىسى (زىفدە تولىسانى)
- 357..... چىشىنىڭ ساقلىقىنى ساقلاش تەدبىرلىرى
- 358..... چىش كېسەللىكلىرىنى داۋالاشنىڭ ئومۇمىي پىرىنسىپى ۋە بەزى دورىلىرى
- 359..... چىش ئاغرىش (دەردى دەندان، ۋە جىۋىكە سىنانى)
- 364..... چىش قاماش (زەرە سۈكە سىنانى)
- 365..... چىش مىدىرلاپ قېلىش (جۈنىيىدەنى دەندان)
- چىش كاۋاكلىشىش، ئۇۋۇلۇش ۋە كامارلىشىش (تەئەككۈلۈكە سىنانى، تەفەتتە تۈلكە سىنانى،
- 369..... تەسەققۇبۈكە سىنانى)
- 371..... چىش رەڭگى ئۆزگىرىش (تەغەيۈرى رەڭگى دەندان)
- 372..... چىش تۈۈنگە گە جىسمان قېتىشىملار پەيدا بولۇش (قۇلاھۈكە سىنانى، قەلەھ، ھەفەن)
- 373..... ئوخلىغاندا چىشنى غۇچۇرلىتىش (سەرىيۈكە سىنانى فىننەۋم)
- 375..... چىش سۈيى يوقىلىش (زەھابى ماتۈكە سىنانى)
- 376..... چىش تۈۋى قاناش (لەسەنى دامىيە)
- 378..... چىش مۈلۈكلىرى ياللۇغى (ۋەرە مۈللىسەنى)
- 379..... چىش مۈلۈكى بىرىڭلىق چاقىسى ۋە ئاقىمىسى (قۇرۇھۈللىسەنى، ناسۇرۇللىسەنى)
- 380..... تاڭگلاي قىچىشىش (ھىككە تۈلەھ نەكى)
- 382..... تاڭگلاي مۇدۇر چاقىسى (بۇسۇرۇلەھ نەكى)
- 383..... تاڭگلاي ياللۇغى (ۋەرە مۈلەھ نەكى)
- 385..... تاڭگلاينىڭ سۇلۇق ئىششىقى ۋە تېشىلىشى (ئابىلەنى كام ۋە سۇراخى ئان)
- 387..... كىچىك تىل ئىششىقى (ئىلتىھابۇللىھاتى)
- 389..... كىچىك تىل بوشتىشىپ قېلىش (ئىستىرخاتۇللىھاتى)
- 391..... گال تۇششاق مۇدۇرى (بوسۇرۇلەھلىقى)
- 392..... گال ئىششىقى (ئىلتىھابۇلەھلىقى)
- 394..... گال بادامسىمان بەزلەر ئىششىقى (ئىلتىھابۇلەھ ۋە تەينى)
- 396..... بوغما (خوناق)
- 399..... ئاۋاز تۇخۇلداپ چىقىش (خەنان)
- 400..... ئاۋاز پۈتۈش (بونلا تۈسسەۋتى)





- 403 ..... گالغا يېمەكلىكلەر تورۇپ قېلىش
- 405..... غەيرىي نەزىسلەر يۇتۇۋېلىش
- 407 ..... گال بوغۇلۇپ قېلىشقا چارە قېلىش
- 409..... ئېغىز بوشلۇقى كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلدىغان بىر قىسىم دورىلار
- 409..... كالىپۇك كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلدىغان بىر قىسىم دورىلار
- 410..... ئېغىز شىللىق پەردىسىگە ئىشلىتىلدىغان بىر قىسىم دورىلار
- 411..... چىش ۋە چىش مۈلۈكلىرىگە ئىشلىتىلدىغان بىر قىسىم دورىلار
- 414..... مېدىرلىغان چىشنى چىگىتقۇچى دورىلار
- 415..... گال كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلدىغان بىر قىسىم دورىلار
- 417..... گال بادامسىمان بەزلىرى ئىشلىتىشقا ئىشلىتىلدىغان دورىلار
- 418..... ئاۋاز پۈتۈپ قېلىشقا ئىشلىتىلدىغان دورىلار
- 419..... ئەرەبچە، فارسچە، ئويغۇرچە، خەنزۇچە ئاتالغۇلار سېلىشتۇرمىسى







## ئۇيغۇر تىبابىتى

### بەش ئەزا كېسەللىكلىرى ئىلمى

ئۇيغۇر تىبابىتى بەش ئەزا كېسەللىكلىرى ئىلمى-ئۇيغۇر تىبابەتچىلىك ئىلمىنىڭ مۇھىم بىر تەركىبىي قىسمى. ئۇ، ئەمگەكچان ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئۇزاق تارىختىن بۇيان بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، داۋالاش جەريانىدا توپلىغان تەجرىبىلىرىنىڭ ئىلمىي يەكۈنى ۋە ئەقىل پاراستىنىڭ جەۋھىرى. ئۇ، ئۆزىنىڭ راۋاجلىنىش جەريانىدا قېرىنداش مىللەتلەر تىبابىتى ۋە قوشنا ئەللەر تىبابىتىگە خېلى چوڭ تەسىرلەر كۆرسىتىپلا قالماي، بەلكى ئۇلاردىن مۇئەييەن تەسىرلەرنى قوبۇل قىلىپ تاكامۇللاشقان. ھەمدە، خېلى بۇرۇنلا شەكىللەندۈرگەن ئۆزىگە خاس سىستېمىلاشقان نەزەرىيىۋى ئاساسى ۋە مول داۋالاش تەجرىبىلىرى ئارقىلىق، قەدىمدىن تارتىپ تاكى ھازىرغىچە ئۇيغۇر خەلقى ۋە ھەر مىللەت خەلىقلىرىنىڭ بەش ئەزا كېسەللىكلىرىگە قارشى تۇرۇش، كۆپىيىپ گۈللىنىشىدە غايەت زور تۆھپىلەر قوشقان.

ئۇيغۇر تېۋىپلىرىنىڭ بەش ئەزا كېسەللىكلىرىگە بولغان تەتقىقاتى ناھايىتى ئۇزۇن تارىخقا ئىگە. پەقەت دەسلەپكى قەدەمدە ئىگىلىگەن ھۈججەتلىك تارىخىي ماتېرىياللارنى نەزەردە تۇتۇپ يىراق ئۆتمۈشتىن ئېغىز ئاچساق، تۇرپاندىن تېپىلغان، بۇنىڭدىن 1400 يىل ئىلگىرىكى دەۋرلەرگە مەنسۇپ بولغان ئارخېئولوگىيىلىك تارىخىي يازما ماتېرىياللارغا ئاساسلانغاندا، ئۇيغۇر تېۋىپلىرى ھەرقايسى كېسەللىكلەر ئىلمىنى 12 چوڭ تۈرگە ئايرىپ كۆز كېسەللىكلىرى، قۇلاق، بۇرۇن، چىش كېسەللىكلىرى ۋە بوغۇز كېسەللىكلىرىنى شۇ تۈرلەر قاتارىغا كىرگۈزگەن. تۇرپاندىكى قەدىمىي قەبرىستانلىقلاردىن ئۇيغۇر تېۋىپلىرىنىڭ مىلادى 600-يىللاردىن بۇرۇنلا كۆزنى قوم-بورانلاردىن ساقلاش ئۈچۈن ئىشلەتكەن مىستىن ياسالغان تور كۆزەينەك قېزىۋېلىنغان. 9-ئەسىردىكى ئۇلۇغ ئۇيغۇر ئالىمى فارابىنىڭ ناھايىتى ئىلمىي كۆز قاراشلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلغان تىببىي ئەسەرلىرى ئىچىدە بەش ئەزاغا ئائىت «ئاڭلاش ۋە كۆرۈش ھەققىدە»





دېگەن ئەسىرىمۇ بار ئىدى. 10-ئەسىردىكى داڭلىق ئۇيغۇر تىببىي ئالىمى ئىمادۇددىن قەشقەرىنىڭ شاگىرتى، ئەللامە دەپ ئاتالغان مۇھەممەد بىننى رەشىد بىننى ئەلى قەشقەرى ئۆزىنىڭ يەنى قەشقەر ئۇيغۇرلىرىنىڭ تىببىي ئىلمىدە قازانغان ماھارىتىنى.... كۆز ئاجزلىشىش (زەئفۇلبەسەرى) نى ئارپا بادىيان، رۇمبادىيان، قاراسەي ئورۇقلىرى بىلەن داۋالاپ ساقايتىدىغان خاسىيەتلىرىنى ئەسىردىشى ئىرانلىق تىببىي ئالىم مۇھەممەد ئىبنى زىكرىياغا تونۇشتۇرغان. تۇلۇغ ئۇيغۇر ئالىمى مەھمۇت قەشقەرى 11-ئەسىردە يازغان ئالەمشۇمۇل پارلاق ئەسىرى «تۈركىي تىللار دىۋانى» دا بەش ئەزا كېسەللىكلەرگە ئائىت نۇرغۇن ئاتالغۇلار ۋە دورىلارنىڭ نامىنى تىلغا ئالغان، مەسىلەن: 1-تومدا، ئەنۇج—كۆزگە ئۆسكەن گۆش پەردە، قامچىغۇ—كالبۇكقا،... چىققان قاپارتقۇ...، ساغىنەغۇ—قۇرۇق قاپاق، ئۆز—پاڭ، گاس قاتارلىق كېسەل ناملىرى؛ ئاۋىلقۇ—قىزىل مېۋە بېرىدىغان بىر خىل دەرەخ،... پوستى بىلەن كۆز ئاغرىقى داۋالنىدۇ،... چاخشۇ—كۆز ئاغرىقىغا داۋا بولىدىغان بىر خىل ئوت، قاتارلىق دورا ناملىرى يېزىلغان. دەرۋەقە، خەلقئارادا ئۆزىنىڭ شۆھرىتى بىلەن نۇر چېچىپ تۇرغان «تۈركىي تىللار دىۋانى» يالغۇز تىل ئىلمى ھەققىدىكى لۇغەت بولۇپلا قالماستىن، بەلكى تارىخ، جۇغراپىيە، پەلسەپە، ئاسترونومىيە، يېزا ئىگىلىك، تىبابەتچىلىك ئىلمى ساھەلىرى ھەققىدە قىممەتلىك مەلۇماتلار توپلانغان قامۇس خاراكتېرلىك بۈيۈك ئەسەردۇر. يېقىنقى زامانغا نەزەر سالساق، يەكەنلىك مەشھۇر كۆز كېسەللىكلىرى مۇتەخەسسسى سۈيۈرگە ھاجى بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتا داڭ چىقارغان ئىجتىھاتلىق تېۋىپ ئىدى...

يۇقىرىقىلار ئۇيغۇر تىبابىتى بەش ئەزا كېسەللىكلىرى ئىلمىنىڭ قەدىمكى زامانلاردىن تارتىپلا ئۆزىگە خاس ساقلىق-ساقلاش تەدبىرلىرى، ئۆزىگە خاس كېسەللىك ناملىرى ۋە دورا ناملىرى بولۇپلا قالماي، بەلكى ئۆزىگە بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنى تۈرلەرگە ئايرىپ سىستېمىلاشقانلىقى، خېلى يۇقىرى سەۋىيىگە كۆتىرىلگەنلىكى ھۆججەتلىك ۋە ناھايىتى جانلىق ھالدا نامايەن قىلىپ بېرىدۇ.

ئۇيغۇر تىبابىتى بەش ئەزا كېسەللىكلىرى ئىلمى—كۆز، قۇلاق، بۇرۇن، ئېغىز (كالبۇك، تىل، چىش)، گال قاتارلىق ئەزالارنىڭ نورمال خىزمىتى ۋە نورمالسىز ھالەتلىرى ھەمدە ئۇلاردا كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، داۋالاشنى تەتقىق قىلىدىغان پەن. ئۇ بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنى كۆز كېسەللىكلىرى (قاپاق، كىرىپك كېسەللىكلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ)، قۇلاق كېسەللىكلىرى، بۇرۇن كېسەللىكلىرى، ئېغىز كېسەللىكلىرى (كالبۇك، تىل، چىش كېسەللىكلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ)، گال كېسەللىكلىرىگە ئايرىدۇ. بەش ئەزانىڭ تۈزۈلۈشى ھەققىدە ئۇيغۇر تېۋىپلىرى قەدىمكى زامانلاردىن تارتىپلا خېلى چوڭقۇر تەتقىقاتلار ئېلىپ بارغان بولۇپ، ئۇلارنىڭ ئاناتومىيىسىنى





ئايرىم-ئايرىم تونۇشتۇرىدۇ. بولۇپمۇ كۆزنىڭ قوشۇمچە ئەزالىرى، بەردىلىرى ۋە سۇيۇقلۇق-لىرى ھەققىدە ھازىرقى زامان مېدىتسىنىسىدىن قېلىشمايدىغان خېلى تەپسىلىي تەرىپلىرى بار. ھەمدە شۇ ئاساستا كۆز كېسەللىكلىرىنى قاپاق، كرىپىك كېسەللىكلىرى، كۆز ئېقى كېسەللىكلىرى، كۆز قارىسى كېسەللىكلىرى، كۆز قارىچۇقى كېسەللىكلىرىگە بۆلۈپ، ئېغىز كېسەللىكلىرىنى كالىپۇك كېسەللىكلىرى، چىش كېسەللىكلىرى، تىل كېسەللىكلىرى، گال كېسەللىكلىرى ۋە ھەتتا كىچىك تىل كېسەللىكلىرىگىچە ئايرىپ، ئايرىم-ئايرىم ھالدا تۇلارنى داۋالاشنىڭ ئۇسۇل-چارىلىرىنى سۆزلەيدۇ.

بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنى تونۇش (تەشخىس قىلىش) جەھەتتە مزاج، خىلىت ۋە قۇۋۋەت تەلىماتى قاتارلىقلار ئاساسىدا، ئادەم بەدىنىنىڭ بىر پۈتۈنلۈكى ھەمدە ئۇنىڭ تاشقى مۇھىت بىلەن بولغان بىرلىك ۋە زىددىيىتى ئاساسىدىكى تونۇشلىرىنىڭ يېتەكچىلىكىدە بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنىڭ تاشقى، ئىچكى ئامىل ۋە سەۋەبلىرىنى ئېنىقلايدۇ، ئالامەتلىرىنى ئىلغايىدۇ. يەرلىك ئورۇندىكى ئالامەتلەرگە ئېتىبار بېرىپلا قالماي، بەلكى ئومۇمىي بەدەندىكى ئالامەتلەرنىمۇ بىرلەشتۈرۈپ، ھەر خىل ۋاسىتىلىق ۋە ۋاسىتىسىز تەكشۈرۈشلەر ئارقىلىق تۇلارنى تەشخىس قىلىشقا ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىدۇ. تەكشۈرۈش ئۇسۇللىرى جەھەتتە قاراپ تەكشۈرۈش، تىگىشاپ تەكشۈرۈش، سوراپ تەكشۈرۈش، پۇراپ تەكشۈرۈش، سىلاپ تەكشۈرۈش، تومۇر تۇتۇپ تەكشۈرۈش ھەمدە ھەر خىل چىقىرىندىلار (چوڭ-كىچىك تەرەت، قۇسۇق، خەپرۇك، چاپاق، قۇلاق ۋە بۇرۇندىن ئاققان سۇيۇقلۇق-يېرىك قاتارلىقلار) نى تەكشۈرۈش بىلەن بىرىنچى قول ماتېرىياللارغا ئېرىشىپ، تۇلارنى ئەتراپلىق مۇھاكىمە قىلىش، سېلىشتۈرۈش ئارقىلىق ئاساسىي كېسەل ۋە قوشۇمچە كېسەللەرنى ئېنىقلاپ توغرا تەشخىس قويۇش، توغرا داۋالاش پىرىنسىپى ۋە داۋالاش تۇسۇللىرىنى بېكىتىشكە ئاساس تۇرغۇزۇدۇ.

داۋالاش جەھەتتە بەدەننىڭ بىر پۈتۈنلۈكىنى يەنى مزاج ۋە خىلىت ئۆزگىرىشلىرىنى نەزەردە ئېلىپ ئىچكى جەھەتتىن داۋالاش بىلەن يەرلىك ئورۇننى كۆزدە تۇتۇپ تاشقى جەھەتتىن داۋالاش (جەھراھىيە يەنى ئوپېراتسىيە قىلىشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) نى بىرلەشتۈرۈپ ئېلىپ بارىدۇ. ئىچكى جەھەتتە داۋالاشتا ئالدى بىلەن كېسەللىك ماددىسى (غالب كەلگەن خىلىت) نى مۇناسىپ مۇنزىج دورىلار بىلەن پىشۇرۇپ، مۇسەھل دورىلار بىلەن تازىلايدۇ. ئاندىن كېيىن ئاساسىي داۋالىغۇچى دورىلارنى ئىشلىتىدۇ. دورا تۈرلىرى جەھەتتە شەرىپەت، مەتبۇخ، مەئجۇن، لوئاب، ئەرەق، رۇببى، مۇرەببا، ھەببى، قۇرس، سۇفۇف قاتارلىقلارنى ئىشلىتىدۇ. تاشقى جەھەتتە داۋالاشتا يەرلىك ئورۇننى تازىلاش ۋە تېگىش، ئىسسىق تۈتكۈزۈش (كىماد قىلىش)، دورا پۇرۇتۇش (شەمۇم





قىلىش) يەنى سۇيۇق دورىلارنى پۇرۇتۇش (لەخلەخە قىلىش)، ئالقان دورىلارنى بۇرۇنغا تارتىش (سەتوت قىلىش)، ھورلاندۇرۇپ تەرلىتىش (ئىنكىباب قىلىش)، نەم دورىلارنى بەدەنگە قۇيۇش (تەمرىخ قىلىش)، ياغلارنى سۈركەش (تەدھىن قىلىش)، پىلتە قىلىش، دورا چېپىش (زىماد قىلىش)، دورا تېتىقنى سۈرۈش (تىلا قىلىش)، ئىسلاش (بەخۇر قىلىش)، ياغلاش، بۇرۇن ۋە تىل ئاستىدىن سۇ ئاققۇزۇش، دورا پۈركۈش (نەقۇخ قىلىش)، دورا تامغۇزۇش (قەتر قىلىش)، غەر-غەرە قىلىش، دورا سېپىش، داغلاش، لوڭقا قويۇش، قان ئېلىش ۋە دەستىكارلىق ئوسۇلى قاتارلىقلارنى زۆرۈرىيەتكە قاراپ قوللىنىدۇ. دورا تۈرلىرى جەھەتتە تېمىتتا (قەتور)، ياغ (رەۋغەن)، مەلھەم (مەرھەم)، چېپىلما (زىماد)، ئالقان (سۇقۇف)لار يەنى كوھل (كۆزگە ئىشلىتىلدىغان ئالقان دورا)، سونۇن (چىشقا ئىشلىتىلدىغان ئالقان دورا)، زەرۈر (جاراھەتلەرگە ئىشلىتىلدىغان سېپىلما ئالقان دورا)، نۇفۇخ (پۈركىلىدىغان ئالقان دورا)، لۇئاب (شەرە)، شىياف (شامچە)، تىلا (دورا تېتىقى) قاتارلىقلارنى ئىشلىتىدۇ.

ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكىدە ئۇيغۇر تېۋىپلىرى قەدىمدىن تارتىپلا بەش ئەزا كېسەللىكلەرنى دورىلار بىلەن داۋالاپلا قالماي، بەلكى بەش ئەزا كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرىنى بىلگەن، ھەتتا دەستىكارلىق (يەنى ئوپىراتسىيە قىلىش) ئوسۇللىرى بىلەن داۋالاشتا يۇقىرى سەۋىيىگە يەتكەن. مەسىلەن، كۆزنى ئاسراش جەھەتتە تۇرپاننىڭ قەدىمكى زامانلىرىغا تەئەللۇق بولغان قەبرىلەردىن قېزىۋېلىنغان مىستىن ياسالغان تور كۆزەينەك ئۇيغۇر تېۋىپلىرىنىڭ كۆزنى ئاسراش، كۆز كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا قوللانغان ئىلمىي تەدبىرلىرىنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى ناھايىتى جانلىق ھالدا چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ. دەستىكارلىق جەھەتتە ئىنسىنا تىببىي تەلىماتلىرى شىنجاڭغا تارقىلىپ تېۋىپلىرىمىز تەرىپىدىن بەلگىلىك دەرىجىدە قوبۇل قىلىنىشتىن خېلى ئىلگىرىلا ئۇيغۇر تېۋىپلىرىنىڭ شىنجاڭدىلا ئەمەس، ھەتتا ئىچكى ئۆلكىلەردىمۇ دەستىكارلىق ئوسۇللار بىلەن بەش ئەزا كېسەللىكلەرنى بولۇپمۇ كۆز كېسەللىكلەرنى داۋالاپ ساقايتقانلىقى توغرىسىدىكى تارىخىي خاتىرىلەر بار. مەسىلەن، ياپونىيلىك ئالىم يازغان مۇناسىۋەتلىك ماتېرىيالغا ئاساسلانغاندا، بۇنىڭدىن 1300 يىل ئىلگىرى جۇڭگودىن ياپونىيىگە بېرىپ كۆڭرى تەلىماتلىرىنى تارقىتىۋاتقىچى بولغان بىر مەشھۇر راھىپ دېڭىزدا بوران، شىددەتلىك دولقۇن تۈپەيلىدىن مەغلۇپ بولۇپ ھەمدە كۆزىگە سۇ چۈشۈش (نۇزۇلۇمات) كېسەللىكىگە گىرىپتار بولغانلىقىدىن ۋە تەنگە قايتىپ كەلگەندە، يەرلىك مەشھۇر تېۋىپلار داۋالاشتا ئامالسىز قالغان كۆزگە سۇ چۈشۈش كېسەللىكىنى ياڭجۇ شەھىرىدە تېۋىپلىق قىلىۋاتقان ئۇيغۇر تېۋىپى داۋالاپ ساقايتقان.





بۇنىڭدىن ئۇيغۇر تېۋىپلىرىنىڭ خېلى قەدىمكى دەۋرلەردىمۇ بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنى بولۇپمۇ كۆزدەك ئىنچىكە ئەزالارنىڭ نازۇك دەستكارلىق ئۇسۇللىرىنى ئىگىلىگەنلىكىنى نامايەن قىلىپ بېرىدۇ. بۇنىڭدىن ئەينى زاماندىكى ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكى گۈللەنگەن شىنجاڭدا تېخىمۇ نۇرغۇنلىغان ماھىر ھۆكۈما ۋە جەرراھلارنىڭ بارلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلىش تەس ئەمەس. ھالبۇكى، ئۇيغۇر تېۋىپلىرى ئىچىدە تاكى ھازىرغىچە مەزكۇر قەدىمكى ئۇسۇلنى قوللىنىپ كۆزگە سۇ چۈشۈش كېسىلىنى داۋالايدىغان تېۋىپلار بار.

ئۇيغۇر تىبابىتى بەش ئەزا كېسەللىكلىرى ئىلمى ئۇيغۇر تىبابەتچىلىك ئىلىمىگە ئوخشاشلا ھەرقايسى دەۋرلەردىكى ئەكسىيەتچى ھۆكۈمرانلارنىڭ كەمسىتىشى ۋە چەكلىشىگە ئۇچراپ يوقىلىپ كېتىش گىردابىغا بېرىپ قالغان. لېكىن، ئۇ بىر پەن بولغاچقا يوق بولۇپ كەتمىدى، بەلكى تارىختا ۋە يېقىنقى زامانلاردا يېتىشىپ چىققان ھۆكۈمالار ۋە تېۋىپلار تەرىپىدىن داۋاملىق يۇقىرى سەۋىيىگە كۆتىرىلىپ ئۇيغۇر تىبابەتچىلىك ئىلىمىنى تېخىمۇ يېيىتى، ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ساقلىق-ساقلاش ئىشلىرىگە ئۆچمەس تۆھپىلەرنى قوشتى.

ئازادلىقتىن كېيىن بولۇپمۇ يېقىنقى ئون يىلدىن بۇيان جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ مىللىي سىياسىتى ۋە جۇڭخىي، مىللىي تىبابەتچىلىك سىياسىتى پارلاق نۇرى ئاستىدا ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ پارلاق مىللىي مەدەنىيەت مىراسلىرى قاتارىدا قۇتقۇزۇپ قېلىنىپ قېزىش، رەتلەش، جارى قىلدۇرۇش، يۇقىرى كۆتىرىش ۋە زور دەرىجىدە تەرەققىي قىلىپ يۈكسىلىش ئىمكانىيىتىگە ئېرىشتى. رەسمىي نەشرىدىن چىقىرىلغان «قانۇنچە»، «ئۇيغۇر تىبابەتچىلىك ئىلمى ساۋاتلىرى»، «ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكى قوللانمىسى» قاتارلىق ئۇيغۇر تىبابىتى كىتابلىرىنىڭ بەش ئەزا كېسەللىكلىرى ھەققىدىكى قىسىملىرى بولۇپمۇ ئۇيغۇر تىبابىتى ئالىي تېخنىكوم دەرسلىكى «ئۇيغۇر تىبابىتى بەش ئەزا كېسەللىكلىرى ئىلمى» ئۇيغۇر تىبابىتى بەش ئەزا كېسەللىكلىرى ئىلمى مىراسلىرىنى قېزىش، رەتلەش، ئوقۇ-ئوقۇتۇش، كېسەللەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش-داۋالاش، تەتقىقات ۋە يۇقىرى كۆتىرىش ئىشلىرىدا ناھايىتى چوڭ رول ئوينىدى. «ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكى» ژۇرنىلى ۋە باشقا مۇناسىۋەتلىك ماتېرىيال-لاردىمۇ مەخسۇس بەش ئەزا كېسەللىكلىرىگە ئائىت ئىلمىي ماقالىلار ئېلان قىلىنىشقا باشلىدى.

بۇنىڭدىن كېيىن، بەش ئەزا كېسەللىكلىرى ئىلمى ئۇيغۇر تىبابەتچىلىك ئىلمىنىڭ تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ، كەڭ ئۇيغۇر تىبابىتى خادىملىرىنىڭ تىرىشىپ تەتقىق





قىلىشى ئارقىسىدا يەنە يېڭى نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرگۈسى، ھەمدە تارىخىي ئەنئەنىسىنى جارى قىلدۇرۇپ ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ساقلىق-ساقلاش ئىشلىرىدا داۋاملىق تېخىمۇ چوڭ تۆھپىلەرنى قوشقۇسى.

## بەش ئەزا كېسەللىكلەرنى ئېنىقلاشتىكى مۇھىم نۇقتىلار

بەش ئەزا كېسەللىكلىرى ئومۇملاشتۇرۇپ ئېيتقاندا سىرتقى سەۋەبلەرنىڭ تەسىرىدىن، يەنى، سىرتقى زەربە، چاڭ-توزان، غەيرىي جىسىملار كىرىپ كېتىش، جىراسىملار كىرىپ كېتىپ ئوقۇنەتلىنىش، ھاۋا كىلىماتىكى ئىسسىق، سوغۇق، ھۆل، قۇرۇقلارنىڭ يامان تەسىرى ۋە ئىچكى سەۋەبلەر يەنى ئومۇمىي بەدەن ياكى مەلۇم بىر ئەزا مىزاجىنىڭ ماددا (خىلىت) سىز ياكى ماددا (خىلىت) لىق غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشلىرى (قۇرۇق ئىسسىق، ھۆل ئىسسىق، قۇرۇق سوغۇق، ھۆل سوغۇقلارنىڭ غالىب كېلىشى ياكى ئاجىزلىشى) دىن، ھەمدە يېمەك-ئىچمەك، يېتىپ-قوپۇشنىڭ نورمالسىزلىنىشى، قېرىلىق، مىراس قىلىش (ئېرسىيەت) قاتارلىق سەۋەبلەردىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇ ئىككى سەۋەب ئوتتۇرىسىدا بىر-بىرىنى ئىنقىسەم قىلىش (ئولغايتىش) ۋە دەپتى قىلىش (تىزگىنلەش) مۇناسىۋىتى بولىدۇ.

## بەش ئەزا كېسەللىكلەرنىڭ سەۋەبلىرى

بەش ئەزا كېسەللىكلەرنى ئۇلارنىڭ پەيدا بولۇشى، ئوخشاش بولمىغان ئالامەتلىرى، تەرەققىي قىلىشى ۋە ئۇلارنىڭ مۇرەككەپلىشىشى قاتارلىقلارغا ئاساسەن ئومۇميۈزلۈك تەتقىق ئانالىز قىلىپ، تۈرلەرگە ئايرىپ، ئاغرىق كىشىنىڭ مىزاجىدىكى ئۆزگىرىشلەر ۋە باشقا كېسەللىك ئەھۋالى، ئوزۇقلىنىش ئەھۋالى، سىرتقى زەربە تېگىش، ئاغرىق كىشىنىڭ كەسپى قاتارلىق ھەر تەرەپلىمە ئەھۋاللىرىنى ئىگىلەپ، ئۇلارنى يىغىنچاقلاپ تەھلىل قىلىپ توغرا قىياس قىلغاندىلا ئاندىن قايسى بىر خىل ياكى بىر قانچە خىل سەۋەبىنىڭ



كېسەللىك كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى سەۋەب ئىكەنلىكىنى بېكىتكىلى بولىدۇ.

بەش ئەزا كېسەللىكلەرنىڭ سىرتقى سەۋەبلىرى

ساددا كىلىماتلىق ئامىللار

ئىسسىق، سوغۇق، ھۆل، قۇرغاق، بوران-سالىق، ئوت ئىسسىق قاتارلىقلار بولۇپ، ئەمەلىي نىبابەتچىلىكتە ئىسسىقلىق، ھۆللۈك، قۇرۇقلۇقلاردىن بولىدىغانلىرى كۆپرەك ئوچرايدۇ. سوغۇقتىن بولىدىغانلىرى ئاز ئوچرايدۇ. شۇنداقلا، ئەمەلىيەت جەريانىدا بۇلار كۆپىنچە ئارىلىشىپ كېلىدۇ. مەسىلەن، كۆز قىزىرىپ ئاغرىش، كۆپ چاپاقلشش، قۇلاقتىن قويۇق يىرنىڭ ئېقىش، بۇرۇن قۇرۇش ياكى قويۇق پوتلا (ماڭقا) كېلىش، گال قىزىرىپ، ئىشىشىپ ئاغرىش قاتارلىقلار كۆپىنچە ئىسسىقتىن بولۇپمۇ ھۆل ئىسسىقتىن بولىدۇ.

سىرتقى زەخىم ۋە غەيرىي نەرسىلەر

كۆز يۇمىلىقىغا بىر نەرسە سانجىلىپ تېشىلىپ كېتىش، كۆز كىمىلىك زەخىملىنىش، كۆز كۈچلۈك تۈردىن زەخىملىنىپ ياللىغىلىنىش، سىرتقى زەخىمدىن قۇلاق پەردىسى يىرتىلىش، سىرتقى زەخىمدىن بۇرۇن قاناش قاتارلىقلار. غەيرىي نەرسىلەر تەسىرىدىن كېلىپ چىققان كۆز ئەستەرى پەردە ۋە مۇڭگۈز پەردىلىرىدىكى غەيرىي جىسىملار، قۇلاق يولىدىكى غەيرىي جىسىملار، بۇرۇندىكى غەيرىي جىسىملار، گالدىكى غەيرىي جىسىملار قاتارلىقلار.

بەش ئەزا كېسەللىكلەرنىڭ ئىچكى سەۋەبلىرى

روھىي ئامىللار

خۇشاللىنىش، غەزەپلىنىش، غەم ئەندىشە قىلىش، ھەسرەتلىنىش، قورقۇش،



قايغۇرۇش قاتارلىق روھىي ھالەتلەر نورمال ئەھۋال ئاستىدا تەبىئىي ھالەت بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. لېكىن بۇ روھىي ھالەتلەر ھەددىدىن زىيادە بولۇپ كېتىپ تۈز ئېتىقادىدىن چىقىپ كەتسە، ھەر خىل بەش ئەزا كېسەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ۋە كېسەللىك ئەھۋالىنى ئېغىرلاشتۇرۇپ قويدۇ. مەسىلەن: قاتتىق جىددىيەلەشكەندە كۆزگە ھەر خىل نەرسىلەر كۆرۈنۈش، قاتتىق غەزەپلەنگەندە گالغا قاتتىق نەرسە تۇرۇپ قالغاندەك بولۇش قاتارلىقلار.

### يېمەك-ئىچمەك ۋە ھېرىپ-چارچاش ئامىللىرى

يېمەك-ئىچمەكنىڭ يېتەرسىزلىكى، مەسىلەن: ئانا سۈتى يېتىشمەسلىكى، ئوزۇقلىنىشنىڭ ناچارلىقى قاتارلىقلار ئاشقازان، جىگەر، قان، قۇۋۋەتلەرنىڭ ئاجىزلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش ئارقىلىق نامازشام قارىغۇسى، مۇڭگۈز پەردىنىڭ يۇمشاپ كېتىش كېسەللىكى قاتارلىقلارنى پەيدا قىلىدۇ. ھەددىدىن ئارتۇق تويۇنۇپ يەپ ئىچىش، مايلىق كۈچلۈك تاماقلارنى كۆپ ئىستېمال قىلىش ھەزىم خىزمىتىنى ئېغىرلاشتۇرۇپلا قالماي، بۇزۇق يەللەر (بۇخارات) نى پەيدا قىلىپ، يىڭناسقۇ، قۇلاق ۋە بۇرۇنغا كىچىك جاراھەتلەر چىقىش، ئېغىز چۆرىسىگە ئۇششاق يارىلار چىقىش، گال قىزىپ ئاغرىش قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ھەددىدىن زىيادە ھېرىپ-چارچاش، كۆپ جىنسىي ئالاقە، ئۈزۈم يۇقىرى ئاۋازدا توۋلاش قاتارلىقلار قاپاقلارنىڭ ماغدۇرسىزلىنىپ ساڭگىلاپ قېلىشى، قۇلاق غوڭغۇلداش، ئاۋاز پۈتۈپ قېلىشلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

### توغما ۋە قېرىلىق ئامىللىرى

ئەمەلىي تىبابەتتە توغما خاراكتېرلىك رەڭ قارىغۇسى كېسەللىكى، بالىلاردىكى توغما خاراكتېرلىك كۆزگە سۇ چۈشۈش كېسەللىكى ۋە ئاڭلاش ئەزالىرىنىڭ توغما كەمتۈك ۋە غەيرىلىكى، بۇرۇن ئوتتۇرا بوشلۇقىنىڭ ئەگرىلىكى قاتارلىقلار بالىلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. قېرىلىققا مۇناسىۋەتلىك كېسەللىكلەر يەنى قېرىلىقتىن بولغان گاسلىق، قېرىلىقتىن بولغان كۆزگە سۇ چۈشۈش، كۆز تورلىشىش قاتارلىقلار ياشانغانلاردا كۆپرەك كۆرۈلىدۇ.





## بەش ئەزا كېسەللىكلەرنىڭ خىلىتار بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى

تۇيغۇر تىبابەتچىلىكى ساقلىق ۋە كېسەللىك ھەققىدە كۆپىنچە ئادەم بەدىنى بىر پۈتۈن گەۋدە بويىچە قاراش لازىملىقىنى ھەمدە خىلىتلارنىڭ بىر پۈتۈن گەۋدە بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلەيدۇ. چۈنكى، ئادەم بەدىنى خىلىت، ئىچكى ئەزا، قان، قان تومۇر، گۆش، سىڭىر، سۆڭەك، تېرە، تۈك قاتارلىقلار ھەمدە كۆز، بۇرۇن، قۇلاق، ئېغىز، ئالدى-ئارقا چىقىرىش تۈشۈكلىرىدىن تەشكىل تاپقان. ئۇلار بىر-بىرىگە ماسلىشىدۇ ھەمدە بىر-بىرىنى تىزگىنلەيدۇ. قان ۋە ھەر خىل قۇۋۋەتلەر، ئەسەبلەر نورمال پائالىيىتى ئارقىلىق پۈتۈن بەدەننىڭ بىرلىكىنى شەكىللەندۈرىدۇ.

ئەگەر، ئىچكى ئەزالار بولۇپمۇ خىلىتلارنىڭ خىزمىتى نورمال بولمىسا خىلىتلارنىڭ بىرى غالىب، بىرى ئاجىز كېلىدىغان ئەھۋاللارنى پەيدا قىلىپ بەش ئەزا بەلگىلىك ئۆزگىرىشلەرنى ھەتتا ھەر خىل بەش ئەزا كېسەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇلار تۆۋەندىكىچە قىسقا بايان قىلىندۇ.

### 1. سەپرا خىلىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى:

سەپرا خىلىتىنىڭ كەيپىياتى قۇرۇق ئىسسىق بولغاچقا، ئۇ غالىب كېلىپ بەش ئەزاغا تەسىر كۆرسەتسە، كۆز قىزىرىش، بۇرۇن قىزىرىش، گال قىزىرىپ ئىشىشىپ ئاغرىش، ئاۋاز پۈتۈشتەك ئەھۋاللارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

### 2. قان خىلىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى:

قان خىلىتىنىڭ كەيپىياتى ھۆل ئىسسىق بولغاچقا، ئۇ غالىب كېلىپ بەش ئەزاغا تەسىر كۆرسەتسە، كۆز قىزىرىپ قانغا تولدۇ. كۆزدىن ئىسسىق ياش ئاقىدۇ. كۆز سېرىق چاپا قىلىشىدۇ. قۇلاق سېرىق يىرنىڭ ئاقىدۇ. بۇرۇندىن سېرىق پوتلا كۆپ كېلىدۇ.

### 3. سەۋدا خىلىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى:

سەۋدا خىلىتىنىڭ كەيپىياتى قۇرۇق سوغۇق بولغاچقا، ئۇ غالىب كېلىپ بەش ئەزاغا تەسىر كۆرسەتسە، كۆز قۇرۇپ قىچىشىدۇ. كۆز چاناقلىرى كۆكرىدۇ، چىڭقىلىدۇ. بۇرۇن قۇرغاقلىشىدۇ.

### 4. بەلغەم خىلىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى:

بەلغەم خىلىتىنىڭ كەيپىياتى ھۆل سوغۇق بولغاچقا، ئۇ غالىب كېلىپ بەش ئەزاغا تەسىر كۆرسەتسە، كۆزدىن كۆپ ياش ئاقىدۇ. بۇرۇندىن كۆپ سۇ كېلىدۇ. قاپاق ساڭگىلاش، ئىشىشىش، قۇلاق پۈتۈشتەك ئەھۋاللار كۆرۈلىدۇ.

نورمالسىز خىلىتلارنىڭ بەش ئەزاغا تەسىر قىلىپ كېسەللىكلەرنى پەيدا قىلىشى



ئەمەلىي تىبابەتچىلىكتە بەككە بىر خىل خىلت تۈپەيلىدىن بولۇپلا قالماي، بەلكى باشقا خىلتلار بىلەن ئارىلاشقان ھالدىمۇ بولىدۇ.

## بەش ئەزا كېسەللىكلەرنىڭ دائىم كۆرۈلىدىغان ئالامەتلىرىنى ئىلغاش

ئەمەلىي تىبابەتتە كېسەللىك ئېنىقلاشتا. ئالدى بىلەن كېسەل كىشىدىن تەپسىلىي سوراڭ، زۆرۈر بولغان تەكشۈرۈشلەرنى ئېلىپ بېرىش، كېسەللىكنىڭ پۈتۈن ئەھۋالى بىلەن تونۇشۇش لازىم. ئۇلارنى يىغىنچاقلاش، ئانالىز قىلىش ئارقىلىق ئۇلارنىڭ ئىسسىقلىق، سوغۇقلىق، ھۆللۈك، قۇرۇقلۇق ياكى قايسى خىلدىن بولغانلىقىنى توغرا ئېنىقلاپ بېكىتكەندىن كېيىن مۇناسىپ داۋالاش تۈسۈللىرىنى قوللىنىش كېرەك.

تۆۋەندە بەش ئەزا كېسەللىكلەردىكى دائىم كۆرۈلىدىغان كېسەللىك ئالامەتلىرىنى ئىلغاش نۇقتىلىرى قىسقىچە ئايرىم-ئايرىم بايان قىلىندۇ.

1. كۆز: كۆزدىكى كېسەللىك ئالامەتلىرى گەرچە كۆپ بولسىمۇ، كېسەللىك ئورنىغا قاراپ كۆز سىرتىدىكى كېسەللىكلەر ۋە كۆز ئىچىدىكى كېسەللىكلەر دەپ ئىككى چوڭ تۈرگە ئايرىلىدۇ. ئادەتتە، يۇقىرى ۋە تۆۋەنكى قاپاق، ئىچكى-تاشقى كۆز بۇرچەكلىرى، كۆز يۇمىلىقىنىڭ ئەستەر پەردىسى. مۇڭگۈز پەردە ۋە ئۈزۈمسىمان پەردە قاتارلىق ئورۇنلاردا كېسەللىك پەيدا بولسا. كۆز سىرتى كېسەللىكلەرگە تەئەللۇق بولىدۇ. ئادەتتە، يەرلىك ئورۇندىكى ئالامەتلىرى روشەن بولىدۇ. كۆپىنچە زىيادە ئىسسىق، قۇرۇق ئىللەتلەردىن كېلىپ چىقىدۇ.

كۆز گۆھىرى، كۆز شىشىسىمان سۈيۈقلۈكى، كۆز تومۇر پەردىسى، كۆرۈش تورسىمان پەردىسى، كۆرۈش ئەسەب (نېرۋا) لىرى قاتارلىقلاردا كېسەللىك پەيدا بولسا، كۆز ئىچىكى كېسەللىكلەرگە تەئەللۇق بولىدۇ. كۆپىنچە قۇۋۋە تىسىزلىك. ئاجىزلىقلاردىن بولىدۇ. لېكىن ھەر دائىم شۇنداق بولىدۇ دەپ قاراشقىمۇ بولمايدۇ. بەزىدە كۆز سىرتىدىكى كېسەللىكلەرنىڭمۇ قۇۋۋە تىسىزلىك. ئاجىزلىقلاردىن كېلىپ چىقىدىغانلىرى بولىدۇ.

كۆز كېسەللىكلىرى كېسەللەنگەن كۆزنىڭ ئاغرىش دەرىجىسى، ياش ئېقىشى، كۆرۈش سىزىمى قاتارلىقلارغا ئاساسەن ئايرىلىدۇ. مەسلەن، كۆز يۇمىلىقى





قاتتىق ئاغرىسا ياكى كۆزنىڭ قىزىشى ئېغىر ھەم ئۆشۈمۈت بولسا، كۆپىنچە ئۆتكۈر خاراكتېرلىك بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئەگەر قىزىش سۇس، ئاغرىش يېنىك بولۇپ ۋاقتى ئۇزۇنغا سوزۇلسا، سوزۇلما خاراكتېرلىك بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئادەتتە كۆز ئاغرىپ كۆزنى بېسىپ تۇرسا خۇشياقمسا، كۆپىنچە كۈچلۈك ئىللەتتىن؛ بېسىپ تۇرسا خۇشياقسا، قوۋۋەتسىزلىك، ئاجىزلىقتىن بولىدۇ. كۆز قىزىش ئېغىر بولۇپ قۇرۇپ، ئېچىشىپ ئاغرىسا، قۇرۇق ئىسسىقتىن بولىدۇ.

2. قۇلاق: قۇلاق سىرتقى يوللىرىغا جاراھەت چىقىپ ئىشىشىپ، قۇلاق ئىچى چىڭقىلىپ ئاغرىپ يېرىك ئاقسا، كۆپىنچە قان، ھۆل ئىسسىقتىن؛ ئەگەر قۇلاق غوڭغۇلداپ، باش ئايلانغاندەك بولسا، كۆپىنچە سەپرا، قۇرۇق ئىسسىقتىن؛ ئەگەر ياشانغانلاردا قۇلاق ئوبدان ئاڭلىمىسا ياكى پۈتۈنلەي ئاڭلىمىسا، يەرلىك قىسىملارنى تەكشۈرگەندە باشقا غەيرىي كېسەللىك ئەھۋاللىرى كۆرۈلمىسە، كۆپىنچە باھ قۇۋۋىتىنىڭ زەئىپلىكى، بەدەننىڭ ئاجىزلىقى، قان-قۇۋۋەتلىرىنىڭ ئاجىزلىقىدىن بولىدۇ.

3. گال: ئاغرىقىنىڭ گېلى قىزىرىپ، قىزىپ سوغۇقتىن قورقسا ھەم كۆپ يۆتىلىپ بەلغەم (خەپرۈك) كۆپ كەلسە، زۇكام ئىللىتىنىڭ گالغا يامان تەسىر قىلغانلىقىنى بىلىدۇرىدۇ. گال قاتتىق ئاغرىپ، قىزىرىپ ئىشىشىسا ھەتتا بىر نەرسە يۇتقىلى قويىمىسا ھەمدە سۈيدۈك، چوڭ تەرەت راۋان بولمىسا، سەپرادىن؛ گالدا دائىم بىر نەرسە باردەك ھېس قىلسا يەنى گالدا خەپرۈك باردەك ھېس قىلىپ، خەپرۈك كۆپىيىپ گال يېقىمىسىزلاىنسا، كۆپىنچە بەلغەمدىن؛ گال قىزىرىپ قانغا تولۇپ ئاغرىسا، قاندىن؛ گالدا مۇنەك نەرسە تۇرۇپ قالغاندەك ھېس قىلىپ گال بوغۇلسا، يۇتاي دېسە يۇتالماي ياكى تۈكۈرۈپ چىقىرىۋېتەلمىسە، كۆپىنچە سەۋدادىن بولىدۇ. گال دائىم قىچىشىسا، يەلدىن؛ ئاۋاز پۈتۈپ ئۇزۇن مۇددەت ساقايمىسا ھەم بەدەم ئورۇق ۋە ئاجىز بولسا، كۆپىنچە قۇۋۋەتسىزلىكتىن بولىدۇ.

## بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتىكى مۇھىم نۇقتىلار

بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنىڭ ئەمەلىي تىبابەتتىكى ئىپادىلىرى خىلمۇ خىل، ئۆزگىرىشى مۇرەككەپ بولىدۇ. شۇڭا، ئۇنىڭ كېسەللىك ئالامەتلىرىنى توغرا ئىلغاش، ئاساسىي زىددىيەتنى توغرا ئېيىپ مۇۋاپىق داۋالاش كېرەك.





بەش ئەزا كېسەللىكلەرنى داۋالاش ئىچكى ۋە سىرتقى تەرەپتىن داۋالاش دەپ ئىككى چوڭ تۈرگە ئايرىلىدۇ. سىرتقى داۋالاش تەركىبىگە شەخەك (ھىجامەت) قويۇش، قان ئېلىش، دەستكارلىق ئۆسۈلى قاتارلىق چارە-ئۆسۈللەرمۇ كىرىدۇ.

## بەش ئەزا كېسەللىكلەرنىڭ ئىچكى داۋاسى

بەش ئەزا كېسەللىكلەرنىڭ مىزاج ۋە خىلىتلار بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى نەزەرىيىسىگە ئاساسلانغاندا، ئىچكى تەرەپتىن داۋالاش مۇھىمراق ئورۇندا تۇرىدۇ. لېكىن بەزى ۋاقىتلاردا سىرتقى تەرەپتىن داۋالاش ياكى دەستكارلىق ئۆسۈللىرى بىلەن يەرلىك ئورۇندىكى كېسەللىك ئۆزگىرىشلىرىنى بىۋاسىتە داۋالاشلارمۇ بەلگىلىك دەرىجىدە خېلى مۇھىم ئورۇننى ئىگىلەيدۇ. ئادەتتە، دائىم قوللىنىلىدىغان بىر قانچە خىل ئۆسۈل ئايرىم-ئايرىم ھالدا تۆۋەندىكىچە بايان قىلىندۇ.

بەش ئەزا كېسەللىكلەرنى ئىچكى ئەزا كېسەللىكلەرگە ئوخشاش مىزاج، خىلىت ۋە يەرلىك ئورۇنلارنىڭ ئۆزگىرىشلىرىدىن ئىبارەت 3 چوڭ سەۋەبتىن كېلىپ چىقىدۇ. داۋالاشتىمۇ قايسى سەۋەبتىن ئىكەنلىكىگە قاراپ داۋالاش ئېلىپ بېرىلىدۇ. مىزاج سەۋەبىدىن بولسا، مىزاجنى تەكشۈشكە لايىق دورا بېرىلسىلا كۆپىنچە ھاللاردا ساقىيىپ كېتىدۇ. مەسىلەن، ئىسسىقلىق بولسا، سوغۇقلىق دورىلار؛ سوغۇقلىق بولسا، ئىسسىقلىق دورىلار؛ ھۆلۈكتىن بولسا، قۇرۇقلىق دورىلار؛ قۇرۇقلىقتىن بولسا، ھۆللەشتۈرگۈچى دورىلار بېرىلىدۇ.

بەدەن خىلىتلىرىنىڭ تەكشۈرۈلۈشىدا خىلىت ئۆزگىرىشى مۇھىم سەۋەب ھېسابلانغاچقا، ئالدى بىلەن بەدەندە غالب كەلگەن ماددىنى سۈرۈپ چىقىرىپ، خىلىتنى تەكشۈرۈش ئالدىنقى نىشان قىلىنىدۇ. شۇڭا، ئالدى بىلەن مەزكۇر خىلىتنى پۇشۇرغۇچى (مۇنزىج) دورىلارنى بېرىپ تۇنى پۇشۇرغاندىن كېيىن، شۇ خىلىتقا خىس سۈرۈپ چىقىرىدىغان (مۇسەھل) دورىلار ئارقىلىق ئۇلارنى سۈرۈپ چىقىرىش كېرەك.

1. زىيادە سەپرا خىلىتنى تازىلىغۇچى دورىلار: سەندەل، يۇمىغاقسۈت، ئۆسۈڭ ئورۇقى، كافۇر، ئىسبەغۇل لۇئائىن، يېھى ئورۇقى، سېمىز ئوت ئورۇقى، كاسىن ئورۇقى، ئارپا-بادىيان، تەرخەمەك ئورۇقى قاتارلىقلار.





2. بەلغەم ماددىسىنى پۇشۇرۇش ئۈچۈن كۆپىنچە ئىيارەجى فەيقەرا ئىشلىتىلىدۇ. بەلغەم خىلىنى تەكشەش ئۈچۈن ئارپا بادىيان، رۇمبادىيان، زىرە، دارچىن، ئەفتمۇن، زەنجىبىل قاتارلىقلار؛ تەييار ياسالمىلاردىن مەئجۇنى ماددە تۆلھايات قاتارلىقلار ئىشلىتىلىدۇ.

3. قان كۆپىيىپ قويۇلغاندا شەرىپتى سەندەل، ئەپئۇلا سۈيى، مەتبۇخى شاھتەررە قاتارلىقلار بېرىلىدۇ.

4. سەۋدا خىلىنى تەكشەش ئۈچۈن گاۋزەبان، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، ئەنجۈر، قۇرۇق ئۈزۈم قاتارلىقلار؛ تەييار ياسالمىلاردىن شەرىپتى گاۋزەبان قاتارلىقلار ئىشلىتىلىدۇ. ئومۇمەن قىلىپ ئىيتقاندا نورمالسىز سەپرا، بەلغەم، سەۋدا خىلىنى پۇشۇرۇپ، تازىلاشلارنىڭ ھەممىسىگە مەتبۇخى ئەفتمۇن ئىشلىتىشكە بولىدۇ. كېسەل ماددىسى (غەيرىي نورمال خىلىت) نى پۇشۇرۇپ، تازىلاپ بولغاندىن كېيىن ھەر بىر ئەزانىڭ كېسەللىكىگە خاس بولغان مەخسۇس دورىلار ئىشلىتىلىدۇ.

ئومۇمىي جەھەتتە ئىيتقاندا ئىسسىقتىن بولغان كېسەللىكلەرگە سوغۇق دورىلار، سوغۇقتىن بولغان كېسەللىكلەرگە ئىسسىق دورىلار قوللىنىلىدۇ. كۈنكەبەت جەھەتتە ئىيتقاندا سەپرا خىلىتىدىن بولغان كېسەللىكلەرگە ھۆل سوغۇق دورىلار، قان خىلىتىدىن بولغان كېسەللىكلەرگە قۇرۇق سوغۇق دورىلار، بەلغەم خىلىتىدىن بولغان كېسەللىكلەرگە قۇرۇق ئىسسىق دورىلار، سەۋدادىن بولغان كېسەللىكلەرگە ھۆل ئىسسىق دورىلار قوللىنىلىدۇ.

## بەش ئەزا كېسەللىكلەرنىڭ سىرتقى داۋاسى

بەش ئەزا كېسەللىكلەرنى سىرتقى جەھەتتە داۋالاش دورىلارنى يەرلىك ئورۇنغا بىۋاسىتە ئىشلىتىشكە ۋە ھەر خىل ئۆسۈل-چارىلەر بىلەن يەرلىك ئورۇننى داۋالاشقا قارىتىلغان. ئۇنىڭ تەركىبىگە سۈرمە تارتىش، دورا تېمىتىش، مەلھەم سۈرتۈش، دورا پۈركۈش، دورا سۈيى بىلەن چايقاش، شامچە كىرگۈزۈش، ئىسسىق-سوغۇق تۈتكۈزۈش، ھىجامەت (لوڭقا) قويۇش، قان ئېلىش ھەتتا لازىم بولغاندا ھەر خىل دەستكارلىق (ئوپىرانسىيە) قىلىش ئۇسۇللىرىمۇ كىرىدۇ. تۆۋەندە ھەر بىر ئەزانى داۋالاش ھەققىدە قىسقىچە توختىلىپ تۇتىمىز.



## كۆزنى داۋالاش

1. سۈرمە تارتىش: كۆزگە مەنپەئەتلىك ھەر خىل دورىلارنى ئۆپىدەك يانچىپ، كۆزگە سۈرمە قىلىپ تارتىدۇ.
2. دورا تېمىتىش: مەخسۇس دورىلاردىن تەشكىل تاپقان ئۆسۈملۈك قاينىتىلمىسى ياكى ئەرەقى كۆزگە تېمىتىلىدۇ.
3. دورا چېپىش: كۆزگە ئىسسىق ئۆتكۈزۈش ۋە سوغۇق ئۆتكۈزۈشتىن سىرت، مەخسۇس دورىلاردىن تەركىب تاپقان ئۆسۈملۈك ھەسەل قاتارلىقلار بىلەن مەلھەم قىلىپ كۆزگە چاپىدۇ.
4. چېكىش: مەخسۇس دەستكارلىق سايمانلىرى ئارقىلىق ئاق چۈشكەن كۆزدىكى بۇلۇتسىمان پەردە پىشقاندا چېكىپ داۋالىنىدۇ.

## قۇلاقنى داۋالاش

1. سىرتقى قۇلاق يولىنى تازىلاش: سوۋۇتۇلغان قايناقسۇ بىلەن قۇلاق ئىچىگە سۇ كىرگۈزۈۋەتمەسلىك ئاساسىدا سىرتقى قۇلاق يۇيۇلىدۇ ياكى پاكىزە پاختا بىلەن قۇلاق يولىدىكى يىرنىڭ قاتارلىقلار تازىلىنىدۇ.
2. تالقان (سۇقۇف)، دورا سۇيۇقلۇقى، مەلھەملەر بىلەن داۋالاش: قۇلاق ئىچىگە جاراھەت چىققان ياكى قۇلاقنى يىرنىڭ ئاققاندا قۇلاق ئىچىگە تالقان دورىلار پۈركىلىدۇ. دورا سۇيۇقلۇقى تېمىتىلىدۇ. مەلھەملەر بىلەن كېسەللەنگەن جاي مايلىنىدۇ.

## بۇرۇننى داۋالاش

1. دورا تېمىتىش: ھەر خىل دورىلاردىن ئىشلەنگەن سۇيۇقلۇق، مايلىق دورىلار بۇرۇنغا تېمىتىلىدۇ.
2. تالقان (سۇقۇف)، مەلھەملەر بىلەن داۋالاش: بۇرۇننىڭ ھەر خىل يىرنىڭلىق چاقىلىرىدا تالقان (سۇقۇف) دورىلار ۋە مەلھەم دورىلار ئىشلىتىلىدۇ. بۇرۇن بەۋاسىرىدا كۆپرەك مەلھەم ئىشلىتىلىدۇ.
3. بۇرۇننى چايقاش: دورىلىق سۇيۇقلۇقلار بىلەن بۇرۇن چايقىلىدۇ.



## گالنى داۋالاش

1. گالنى چايقاش: ھەر خىل دورىلارنى سۇدا قاينىتىپ، تۇنگۇغا يېرىم ھەسسە قاينىتىلغان سۇ ئارىلاشتۇرۇپ، گالنى كۈندە نەچچە قېتىم چايقايدۇ.
2. گالغا دورا پۈركۈش: بەزى گال كېسەللىكلىرىدە دورىلارنى تۈندەك قىلىپ گالغا پۈركۈيدۇ.

## بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنىڭ جەرراھىيىسى

ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكىدە ئۇيغۇر تېۋىپلىرى قەدىمكى زامانلاردىن تارتىپلا بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنى ئىچكى، تاشقى جەھەتتىن دورىلار بىلەن داۋالاپلا قالماي، بەلكى كۆز، قۇلاق، بۇرۇن، گال ۋە ئېغىز ساھەسىنىڭ ھەر خىل كېسەللىكلىرىنى كېسەللىك ئورنى، كېسەللىك دەرىجىسى ۋە كېسەللىك ئاقىۋىتى قاتارلىقلارغا ئاساسەن ھەر خىل دەستىكارلىق (جەرراھلىق-ئوپېراتسىيە قىلىش) ئۇسۇللىرىنى قوللىنىپ داۋالىغان. مەسىلەن، تۇغما خاراكىتىرلىك قاپاق تېشىغا تۈرۈلۈپ قېلىش (شەتەرە) ۋە قاپاق ساڭگىلاش (ئىستىرخائۇلجەفەنى)، ئېغىز ئالمىغان يىڭناسقۇ (شەتيرە)، كونىراپ كەتكەن قاپاق ئىچى قىزىرىپ قېلىنىشى (سەلابە تۈلجەفەنى)، كۆز ياشاڭغۇراش (سەيلانى ئەشك) كېسىلىدە ياش يوللىرى نورمالسىزلىنىش، كۆز بۇرجىكىدىن بەز تۆسۈپ چىقىش (غۇددە ئى گوشتى چەشمى) كېسىلى كونىراش ۋە ئېغىرلىشىش، ياش خالتا يىرىڭلىق ئاقمىسى (ناسۇرۇلئەينى) كېسىلىدە ياش يولى تارىيىش، كۆزگە قاناتچە گۆش تۆسۈش (زۇفرە)، كۆز ئەستەر پەردىسىگە نېپىز قىزىل گۆش تۆنۈش (توۋسە ئى مۇلتە-ھەمە ئى ئەينىيە)، كۆزگە پەردە چۈشۈش (سەبەل)، كۆزگە ئاق چۈشۈش (بە يازۇلئەينى)، 4-دەرىجىلىك كۆز قوتۇرى (جەرە بۇلئەينى)، كۆزگە سۇ چۈشۈش (نوزۇلۇمائ) قاتارلىق كۆز كېسەللىكلىرىنى دەستىكارلىق ئەمەلىيىتىنىڭ شەرت-شارائىتلىرىنى ھازىرلىغان ۋە مەشغۇلىيەتلىرىگە قاتتىق ئەمەل قىلغان ھالدا تۈزەش، يىرىڭ ئاققۇزۇش، ياش يوللىرىنى كېڭەيتىش، قىرىش، يېرىش، كېسىپ ئېلىۋېتىش ۋە مەخسۇس ئەسۋاب بىلەن شۇمۇرۇش قاتارلىق دەستىكار ئۇسۇللىرىنى قوللىنىدۇ. قۇلاققا غەيرىي نەرسىلەر كىرىپ كېتىش، قۇلاق يولىدا قان-يىرىڭلار قېتىشىپ تومسۇلۇپ قېلىش قاتارلىق قۇلاق





كېسەللىكلەردە مۇجىن بىلەن توسالغۇلارنى تازىلايدۇ. قۇلاق قاناش دورا بىلەن ياخشىلانمىسا دەستكارى ئۆسۈل قوللىنىدۇ. ئىككىلەمچى خاراكتېرلىك بۇرۇن سىزىمى ئاجىزلىشىش ياكى پۈتۈنلەي يوقىلىش (خەيشۇم)، بورۇن بوۋاسىرى (بەۋاسىرۇلئەنفى) قاتارلىق بۇرۇن كېسەللىكلىرى دورا بىلەن ياخشىلانمىسا دەستكارى ئۆسۈل قوللىنىدۇ. بۇرۇن راكى (سەرتانى ئەنف) كېسىلىدە ئۆسۈمنى داغلايدۇ. كالىپۇكفا ئارتۇقچە گۆش ئۆسۈش (بەۋاسىرۇلئەنفەتى) كېسىلىدە ئۆسكەن گۆش قارايدىغان بولسا نەشتە بىلەن ئىلىدۇ ياكى كونارغان ۋە ئېغىرلاشقان بولسا ئۆسكەن گۆشنى كېسىپ ئېلىۋېتىدۇ. چىشلار كاۋاكلىشىپ كېتىش، ئۇۋۇلپ كېتىش ۋە كامار بولۇپ قېلىش (تەئەككۇلۇئەسنانى، تەپەتئۇلئەسنانى ۋە تەسەققۇبۇلئەسنان) كېسەللىكلەردە دورا بىلەن ياخشىلىنىش ئىمكانىيىتى بولمىسا، ئەھۋالغا قاراپ قىرىش، داغلاش، زاماسكىلاش ۋە يۇلۇش ئۆسۈللىرىنى قوللىنىدۇ. تىل ئېغىرلىقى، كېكەشلىك (ساقۇللىسانى، لۇسغۇللىسانى) كېسىلىدە ئەگەر تىل ئاستىدىكى ئىلىنچىق قىسقا بولسا دەستكارلىق ئۆسۈل بىلەن كېسىلىدۇ. تىل تېگىدە قۇمچاقسىمان ئۆسۈكچە گۆش پەيدا بولۇش (زىفدە ئوللىسانى) كېسىلىدە ئۆسۈكچە گۆش دورا بىلەن ياخشىلانمىسا دەستكارلىق ئۆسۈلدا كېسىپ ئېلىۋېتىدۇ. بادامسىمان بەز ياللىغى (ئىلتىھابۇللەۋزەتەينى) كېسىلى تەكرار قوزغىلىدىغان بولسا، دەستكارلىق ئۆسۈل بىلەن كېسىپ ئېلىۋېتىدۇ، قاتارلىقلار.

ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكىدە ئۇيغۇر تېۋىپلىرىنىڭ دەستكارلىق ئۆسۈللىرى بىلەن كېسەللىكلەرنى داۋالاش تارىخى ناھايىتى ئۇزۇن بولۇپ قەدىمكى تىببىي كىتابلاردا تونى «ئىلمى جەرراھىيە»، بۇ ئۆسۈلنى قوللىنىپ كېسەل داۋالغۇچى تېۋىپنى «جەرراھ» دەپ ئاتىغان. بەش ئەزا كېسەللىكلەرنى بولۇپمۇ نازۇك ئەزا بولغان كۆزنىڭ كېسەللىكلىرىنى جەرراھلىق ئۆسۈللىرى بىلەن داۋالاشنىڭ تارىخىمۇ خېلى ئۇزۇن. تولۇقسىز مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، پەقەت كۆز كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدىغان دەستكارلىق ئەسۋابلىرىلا 47 خىلغا يەتكەن بولۇپ، ئۇلار ناھايىتى قىممەتلىك مېتاللاردىن ئىنتايىن نەپىس قىلىپ ئىشلەنگەن. بۇنىڭدىن باشقا، مەشھۇر ئالىم ۋە تىبابەتشناس ئىبنى سىناننىڭ تىببىي تەلىماتلىرى ئىسناجۇغا يېتىپ كېلىپ تېۋىپلىرىمىز تەرىپىدىن بەلگىلىك دەرىجىدە قوبۇل قىلىنىشتىن خېلى بالدۇرلا ئۇيغۇر تېۋىپلىرى ئىسناجۇدىلا ئەمەس، ھەتتا ئوتتۇرا تۈزلەڭ رايونلىرىدىمۇ كۆز كېسەللىكلىرىنى دەستكارلىق ئۆسۈللىرى بىلەن داۋالاپ ساقايتقانلىقى ھەققىدىكى ئىشەنچلىك تارىخىي پاكىتلار چەت ئەل ئالىملىرىنىڭ ئەسەرلىرىدىمۇ بايان قىلىنغان. مەسىلەن، يۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتۈلگەندەك ياپونىيلىك ئالىم چىن شۇنچىڭ ئەپەندى يازغان «يېكە يولغا زىيارەت»







دېگەن كىتابتا: ياپونىيىگە بېرىپ كۆزى تەلىماتلىرىنى ياپون خەلقىگە تارقىتىشقا باشلىغان مەشھۇر راھىپ ئوستاز جىيەن چىگىنىڭ يەلكەنلىك كېمە بىلەن دېڭىزغا سەپەرگە چىقىپ، بوران ۋە شىددەتلىك دولقۇن تۈپەيلىدىن بىر قانچە قېتىم مەغلۇپ بولۇپ ۋە كۆزىگە سۇ چۈشۈپ (نوزۇلۇماڭ) ۋە تەنگە قايتىشقا مەجبۇر بولغانلىقى، يەرلىك تېۋىپلار كېسىلىنى داۋالاشقا ئامالسىز قالغاندا ياڭجۇ شەھىرىدە تېۋىپلىق قىلىۋاتقان ئويغۇر تېۋىپنىڭ جەرراھلىق ئوسۇلى بىلەن داۋالاپ ساقايتقانلىقى، ھەمدە مەزكۇر راھىپ ئوسپاننىڭ ئاخىرى ياپونىيىگە بېرىپ ئۆز مەقسىتىنى ئەمەلگە ئاشۇرغانلىقى بايان قىلىنغان. ۋاقىت ئېتىبارىدىن قارىغاندا بۇ ئىشقا تەخمىنەن 1300 يىلدىن كۆپرەك بولغان. شۇ چاغدا ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىكى رايونلاردا تېۋىپلىق قىلىۋاتقان بىر ئويغۇر تېۋىپنىڭ ئەنە شۇنداق نازۇك دەستكارلىق ئەمەلىيىتى ئارقىلىق مۇھىم بىر ئەربابنىڭ كۆزىنى ئېچىپ شۆھرەت قازانغانلىقى ھەمدە ھازىرقى زامان چەت ئەل ئالىملىرىنىڭ ئەسەرلىرىدە تىللاردا داستان قىلىنىپ قايتا ئالاھىدە تەرىپلەنگەنلىكىدىن ئەينى زامانلاردا ئويغۇر تىبابەتچىلىكى گۈللەنگەن ئەسلىي زېمىن شىنجاڭدا يەنىمۇ ماھىر ھۆكۈمالار ۋە جەرراھلارنىڭ ناھايىتى كۆپلىكىنى تەسەۋۋۇر قىلىش تەس ئەمەس. دەرۋەقە، قەدىمكى تىببىي كىتابلاردا مەخسۇس كۆزگە سۇ چۈشۈش (نوزۇلۇماڭ) كېسىلىنى دەستكارلىق ئەمەلىيىتى بىلەن داۋالايدىغان ئوسۇل «ئەمەلىي قەدەم ياكى قەدەم ئوسۇلى»، بۇ ئوسۇلنى قوللىنىپ كېسەل داۋالىغۇچى تېۋىپ «قەدداھ» دەپ ئاتالغان. ھالبۇكى، ئويغۇر تېۋىپلىرى ئارىسىدا تاكى ھازىرغىچە مەزكۇر قەدىمكى ئوسۇلنى قوللىنىپ كۆزگە سۇ چۈشۈش كېسىلىنى داۋالايدىغان قەدداھ تېۋىپلار بار.

گەرچە، ھازىرقى زامان مېدىتسىنا ئىلمىنىڭ تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ مۇتلەق كۆپ ساندىكى بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنىڭ ئوپېراتسىيىلىرى غەرب تىبابىتى دوختۇرخانىلىرىدا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بولسىمۇ، ئويغۇر تىبابىتىنىڭ بەش ئەزا كېسەللىكلىرى جەرراھىيىسىنى ھازىرقى زامان ئويغۇر تىبابىتى ئەسەرلىرىدە قايتا ئەسكەرتىپ ئۆتۈش تارىخىي مەنبە جەھەتتىكى ساۋادىمىزنى كېڭەيتىشكە زور دەرىجىدە ياردەم بولۇپلا قالماي، بەلكى بەزى چەت-ياقا رايونلاردا شەرت-شارائىت ھازىرلىغان ھالدا جەرراھىيە ئەمەلىيىتىگە قاتتىق ئەمەل قىلىپ بەزى بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنى ئاددىي دەستكارلىق ئوسۇللىرىدىن پايدىلىنىپ بىر تەرەپ قىلىشتا بەلگىلىك ئەھمىيەتكە ئىگە.

ئىشنىمىزكى، ئويغۇر تىبابەتچىلىكىنىڭ ئوچقاندەك تەرەققىياتى ۋە ئويغۇر تىبابىتى ئالىي تېخنىكومىدەك مۇنتىزىم بىلىم يۇرتلىرىنىڭ مۇكەممەللىشىشىگە ئەگىشىپ،



قەدىمكى بەش ئەزا كېسەللىكلىرى جەرراھىيىسى قايتىدىن يېڭىچە تەرەققىياتلارغا ئېرىشكۈسى ۋە يېڭى ئويغۇر تىبابىتى جەرراھلىرى مەيدانغا كەلگۈسى.

## بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش

يېمەك-ئىچمەك، تۇرالغۇ جاي

كوللېكتىپ ۋە شەخسى يېمەك-ئىچمەك تازىلىقىغا رىئايە قىلىش، يېمەك-ئىچمەك مۇۋاپىق ۋە رېتىملىق بولۇش، بەك ئاچچىق، بەك تۈزلۈك ۋە يەللىك تاماقلارنى ئاز ئىستېمال قىلىش، تاماكا چەكمەسلىك، ھاراق ئىستېمال قىلماسلىق، يېنىك، ئاسان سىڭىدىغان تاماقلارنى ئىستېمال قىلىش كېرەك. شۇندىلا، ئاشقازان يەللىرىنىڭ كۆپىيىپ، يۇقىرىغا ئۆرلەپ، بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنى پەيدا قىلىشىدىن ساقلانغىلى بولىدۇ.

تۇرالغۇ-جاي، يېتىپ-قوپۇش مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇلۇشى ۋە رېتىملىق بولۇشى لازىم. كۆزنىڭ تازىلىقىغا رىئايە قىلىش، كۆزنىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتىنى نامۇۋاپىق ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش مەسلىھەت، قاراڭغۇ، گۈڭۈم ۋاقتلاردا كىتاب كۆرمەسلىك ۋە خەت يازماسلىق، يېتىپ كىتاب كۆرمەسلىك، نازۇك ئىشلارنى قىلماسلىق، كۆز، بۇرۇن، كالغا قاتتىق غىدىقلاش تەسىرى بار بۇي ھىدلار ۋە ئىس، چاڭ-توزانلاردىن ساقلىنىشقا دىققەت قىلىش لازىم.

روھى ئامىللار

كىشىلەرنىڭ روھى ھالىتى كېسەللىكلەر بىلەن ناھايىتى چوڭ مۇناسىۋىتى بار. ئەگەر ئۈمىدسىزلىنىپ داۋالاشقا ئاكتىپ پوزىتسىيە تۇتمىسا، كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشى ۋە يامانلىشىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. روھى يۈك ھەددىدىن زىيادە بولۇپ كەتسە، يەنى ھەددىدىن زىيادە غەم-قايغۇ قىلىپ روھى كەپپاتى ياخشى بولمىسا، ئەسەبلەر خىزمىتىدە ئاجىزلىشىش ياكى تورمۇزلىنىش ھالىتى كېلىپ چىقىدۇ. شۇنىڭغا ئەگىشىپلا پۈتۈن بەدەندىكى ئەزالارنىڭ خىزمىتىدىمۇ ئاجىزلىشىش ياكى قالايمىقانلىشىش كۆرۈلىدۇ.



خىلىتلاردا ئۆزگىرىش پەيدا بولۇپ، سىرتقى يامان ئىللەتلەر ئاسانلا كېسەللىك پەيدا قىلىدۇ.

### تازىلىققا دىققەت قىلىش

تازىلىق ئىشلىرىنى ياخشى ئېلىپ بېرىش، ئاكتىپلىق بىلەن سەھىيە تەشۋىقات تەرىپىتە خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇش كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا ناھايىتى مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. شەخسىي تازىلىق جەھەتتە قول بىلەن كۆزنى تۇۋۇلماسلىق، تاماقتىن بۇرۇن، تەرەتتىن كېيىن قول يۇيۇشنى ئادەت قىلىش كېرەك. كۆللىكتىن ئورۇنلاردىكى يۈز، قول يۇيىدىغان داس قاتارلىق سايمانلارنى قايناتقاندىن ياكى زەھەرسىزلەندۈرگەندىن كېيىن ئىشلىتىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، باشقىلارنىڭ لۇڭگە ياغلىقلىرىدا كۆزنى سۈرتىمەسلىك ھەمدە ئېغىز بوشلۇقى تازىلىقىغا دىققەت قىلىش، دائىم ئېغىز چايقاش، چىش يۇيۇشقا ئادەتلىنىش، قۇلاق ۋە بۇرۇننى قالايمىقان كۆللماسلىق كېرەك.

### بەدەن چېنىقتۇرۇش

ھەر كۈنى ئەستايىدىللىق بىلەن تەنتەربىيە قىلىش ۋە ھەر تۈرلۈك بەدەن چېنىقتۇرۇش پائالىيەتلىرى ئارقىلىق بەدەننىڭ كېسەللىكلەرگە بولغان قارشىلىق كۈچىنى ئاشۇرۇش كېرەك. ئەگەر كۆز ھارغىنلىق ھېس قىلسا، كۆزنى ئاسراش گىمناستىكىسى ئويناش ئارقىلىق كۆزنى ئارام ئالدىرۇش كېرەك.

## بەش ئەزا كېسەللىكلىرىنى پەرۋىش قىلىش

پەرۋىش قىلىش داۋالاش خىزمىتىدىكى مۇھىم ھالقىلارنىڭ بىرى. ئۆزىڭ ياخشى-يامان ئىشلىنىشى شېئالىق ئۈنۈمى، داۋالاش مۇددىتى قاتارلىقلار بىلەن چوڭ مۇناسىۋىتى بار.

### كۆزنى پەرۋىش قىلىش

يۇقۇملۇق كۆز كېسەللىكلىرىدە ئەگەر بىر كۆز كېسەللىنىپ پەرۋىش قىلىشقا ئېتىبار بېرىلمىسە، يەنە بىر كۆزگە ئاسانلا يۇقىدۇ. شۇڭا، كېسەللەنگەن كۆزدىن





چاپاق، ياش چىققاندا ۋاقتى-ۋاقتىدا پاكىز پاختىنى سوۋۇتىلغان قايناقسۇ ياكى تۇز سۈيى بىلەن نەمدەپ سۈرتۈپ تازىلاش كېرەك. كېسەل كىشى ئىشلەتكەن قولىغاغلىقنى دائىم ئالماشتۇرۇپ تۇرۇشى ھەمدە قايناقسۇغا بېسىپ، سوپۇن بىلەن يۇيغاندىن كېيىن ئىشلىتىشى، يۈز سۈرتىدىغان لۇڭگە قاتارلىقلارنى باشقىلاردىن ئايرىپ ئىشلىتىشى كېرەك. ئەگەر، بىر تەرەپتىكى كۆزدىن كۆپلەپ ياش ئاقسا، ئەڭ ياخشىسى شۇ تەرەپكە يېتىپ ساق كۆزگە ئېقىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش لازىم. ئىككىلا كۆز بىرلا ۋاقتتا كېسەللىنىپ پۈتۈن بەدەن بىئارام بولسا، يېتىپ دەم ئېلىش لازىم. كۆزنى دەستكارلىق ئۇسۇللىرى بىلەن داۋالانغاندىن كېيىن يېتىپ ئارام ئېلىشقا تېخىمۇ دىققەت قىلىش، ئالاھىدە كۈتۈلۈش لازىم. ئەگەر، كېسەلنىڭ مەجەز-خاراكتېرى ئىتتىك، ئاسان ئاچچىقلىنىدىغان، تېرىككەك ياكى غەم-غۇسسۇدار بولسا، تىببىي خادىملار كۆپرەك نەسەت قىلىپ تىنچلاندىرۇش، كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ يامانلىشىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش لازىم.

#### قۇلاق، بۇرۇننى پەرۋىش قىلىش

قۇلاق، بۇرۇننىڭ يەرلىك ئورۇن تازىلىقىغا دىققەت قىلىش لازىم. مەسىلەن، قۇلاق يولىدىن يىرنىڭ ياكى قان كەلسە، بۇرۇندىن پوتلا ياكى قان ئاقسا، قۇلاق يولى ۋە بۇرۇن بوشلۇقىنى يۇيۇپ، تازىلاپ پاكىز تۇتۇش، يۇقۇملىنىشتىن ساقلىنىش لازىم.

#### ئېغىز بوشلىقىنى پەرۋىش قىلىش

ئېغىز تازىلىقىغا ناھايىتى دىققەت قىلىش، ھەر كۈنى چىشىنى چوتكىلاپ يۇيۇش ياكى ئازراق تۇز قوشۇلغان سۇ بىلەن دائىم ئېغىز چايقاپ تۇرۇش لازىم. ئېغىز بوشلۇقىدا قىزىرىپ ئىشىش، ئاقىرىپ ئاق پەردە ھاسىل بولۇش ھەمدە قان-يىرنىڭ تۈكۈرۈش، قۇسۇشتەك ئەھۋاللارنىڭ بار-يوقلۇقىغا دىققەت قىلىش لازىم. ئېغىز كېسەللىرىنىڭ نەپەسلىنىشىدە قىيىنچىلىق بار-يوقلۇقىغا دىققەت قىلىش كېرەك. مەسىلەن: جىددىي كېسەللىكلەردە بەلغەم، خەپرۈك كۆپىيىپ نەپەس يوللىرىنى توسۇپ نەپەسلىنىشىنى قىيىنلاشتۇرسا، باشنى يېنىچە قىلىپ ياتقۇزۇش، خەپرۈكنىڭ گالغا تىقىلىپ قېلىشى ياكى نەپەس يولىغا كىرىپ كېتىپ خەتەرلىك ئەھۋاللارنىڭ كېلىپ چىقىشىدىن ساقلىنىش لازىم. گال كېسەللىكلىرى كۆپىنچە





يەلدىن بولۇپمۇ ئىسسىق يەلدىن، سەپرادىن كېلىپ چىقىدۇ. شۇڭا سەپرانى كۈچەيتىدىغان نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىش كېرەك. مەسىلەن: لازا، ھاراق، تاماكا قاتارلىقلارنى كۆپلەپ ئىستېمال قىلىشتىن ساقلىنىش لازىم. گال كېسەللىكلىرى سوغۇقتىن، ئاجىزلىقتىن بولغاندا يېتىپ-قوپۇشقا، يېمەك-ئىچمەككە، دەم ئېلىشقا دىققەت قىلىش كېرەك.





## كۆز كېسەللىكلىرى

كۆز پارسىچە چەشم، ئەرەبچە ئەين دەپ ئاتىلىدۇ. كۆز ئادەم بەدىنىدىكى مۇرەككەپ ئەزالار ئىچىدە مۇھىم ۋە نازۇك ئەزا بولۇپ، سىرتقى دۇنيانى تونۇشتىكى تاشقى بەش سەزگۈ (ھەۋاسى خەمسە زاھىرى) ئەزانىڭ بىرى. ئۇنىڭ ۋەزىپىسى كۆزگە كۆرۈنىدىغان شەيئەلەرنىڭ تەسۋىرلىرىنى ئۆز ئەينى بويىچە كۆرۈپ مېڭىگە نورمال ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرىشتىن ئىبارەت. ئۇ، بۇ ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ئۆزىگە خاس كۆرۈش كۈچى (قۇۋۋەتى باسرى) گە تايىنىشتىن سىرت ئۆزىدىكى پەردىلەر، سۇيۇقلۇقلار ۋە كۆرۈش ئەسەبلىرى (ئەسەبى مۇجەۋۋەفە) قاتارلىقلارغا تايىنىدۇ. ئۇ سىرتقى كۆرۈنۈش جەھەتتە كۆز ئېقى، كۆز قارىسى، كۆز قارىچۇقى قاتارلىقلار ئارقىلىق شەكىللەندۈرگەن يۇمىلاق ھالىتىنى قاپاق ۋە كىرىپكەلەر ئارقىلىق مۇھاپىزەت قىلىپ تۇرىدۇ. شۇڭا تىبابەتچىلىكىمىز كۆز كېسەللىكلىرىنى ئادەتتە قاپاق ۋە كىرىپكە كېسەللىكلىرى، كۆز بۇرچىكى كېسەللىكلىرى، كۆز ئېقى كېسەللىكلىرى، كۆز قارىسى كېسەللىكلىرى، كۆز قارىچۇقى كېسەللىكلىرى، سىرتقى زەخمىلىنىشتەك باشقا كۆز كېسەللىكلىرىگە ئايرىدۇ ھەمدە كېسەللىك سەۋەبى، ئالامىتى، داۋاسى (ئىچكى ۋە تاشقى داۋاسى، دەستكارلىق ئۇسۇللىرى)، پەرھىزى، ئوزۇقلىنىشى قاتارلىقلارنى ئۆزىگە خاس مىللىي ئالاھىدىلىكى بويىچە تەپسىلىي بايان قىلىدۇ.

كۆز كېسەللىكلىرى بىلەن تونۇشۇش ئۈچۈن ئالدى بىلەن كۆزنىڭ تۈزۈلۈشىنى پىششىق بىلىشكە توغرا كېلىدۇ.

## كۆزنىڭ تۈزۈلۈشى

كۆز ئىنچىكە ۋە ئىنتايىن مۇرەككەپ ئەزا بولغاچقا ئۇنىڭدا يۈز بېرىدىغان






كېسەللىكلەرمۇ ناھايىتى مۇرەككەپ ۋە ھەر خىل بولىدۇ. شۇڭا، ئۇلارنى توغرا تونۇپ ئىچكى ياكى تاشقى جەھەتتە مۇۋاپىق دورا ۋە ئوسۇل-چارىلارنى قوللىنىپ توغرا داۋالاشتا ئالدى بىلەن ئۇنىڭ تۈزۈلۈشىنى پىششىق ئىگىلەش ناھايىتى زور ئەھمىيەتكە ئىگە.

كۆز—كۆزنىڭ قوشۇمچە ئەزالىرى ۋە كۆز يۇمىلىقىدىن ئىبارەت ئىككى قىسىمدىن تۈزۈلگەن.

### كۆز قوشۇمچە ئەزالىرى \*

كۆزنىڭ قوشۇمچە ئەزالىرى (مۇتەئەللىقاتى چەشم) 1. ئىككى قاش، 2. قاپاق، 3. كىرىپىك، 4. قاپاق ئەستەر پەردىسى، 5. ياش ئەزالىرىدىن تەركىب تاپىدۇ. (2-1-رەسىم)



1-رەسىم. كۆز قوشۇمچە ئەزالىرى

1. قاش

قاش (ھاجىب، ھاجىبەين) كۆز ئۆيى (كۆز چانقى) نىڭ ئۈستۈنكى قىرغىقىدىكى بايسىمان دۆڭگىچىنىڭ تېرە يۈزىگە ئۈنگەن تۈكلەردىن ھاسىل بولغان بولۇپ، ئۇ ئاساسلىق، پېشانىدىن ئاققان تەرلەرنىڭ كۆزگە كىرىپ كېتىشىنى توسۇش رولىغا

«ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكىدە ئەزالار ۋە كېسەللىكلەر سىرتىدىن ئىچىگە، يۇقىرىدىن تۆۋەنگە توتۇشتۇرۇلغاچقا، ئەسلى ئوسۇبى ساقلاپ قېلىنىپ يەنىلا ئالدى بىلەن «كۆز قوشۇمچە ئەزالىرى» توتۇشتۇرۇلدى.

— مۇھەررىردىن



نىگە ۋە شۇنىڭدەك كىشلەرنىڭ ھۈسنىگە زىننەت قوشىدۇ.

## 2. قاپاق

قاپاق (جەفن، ئەجفان) كۆز يۇمىلىقىنىڭ تۆدۈل ئۈستى ۋە ئاستى تەرىپىگە جايلاشقان بولۇپ، كۆز يۇمىلىقىنىڭ ئالدىنقى قىسمىنى مۇھاپىزەت قىلىدۇ. ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى قاپاق دەپ ئىككىگە بۆلۈنگەن بولۇپ، يېپىلىپ-ئېچىلىپ ھەرىكەتلىنىپ تۇرىدۇ. ئۈستۈنكى قاپاق ئاستىنقى قاپاققا قارىغاندا كەڭرەك ۋە ھەرىكەتچان بولىدۇ. قاپاق ئۆچلىرى ئۆزئارا تۇتۇشۇپ كۆزنىڭ ئىككى بۇرجىكىنى ھاسىل قىلىدۇ. ئىچكى تەرەپتىكىسى چوڭراق بولۇپ، كۆز ئىچكى بۇرجىكى؛ تاشقى تەرەپتىكىسى كىچىكرەك بولۇپ، كۆز تاشقى بۇرجىكى دەپ ئاتىلىدۇ. تاشقى بۇرجەك كۆز يۇمىلىقى بىلەن بەكرەك جىپىسلاشقان بولىدۇ. ئىچكى بۇرجەك كۆز يۇمىلىقىدىن سەل-پەل ئايرىلىپ تۇرغان بولۇپ، ئۇنىڭدىن بۇرتۇپ چىققان گۆش-ياش دۆڭچىسى، دەپ ئاتىلىدۇ. قاپاقلارنىڭ قىرى قاپاق گىرۋىكى دەپ ئاتىلىدۇ. ئۈستۈنكى ۋە ئاستىنقى قاپاق گىرۋەكلىرىنىڭ كۆز ئىچكى بۇرجىكىگە يېقىن جايىدىكى ئىككى تۆشۈك-ياش نۇقتىسى دەپ ئاتىلىدۇ. يۇقىرى ۋە تۆۋەنكى ياش كانالچىلىرى مۇشۇ نۇقتىلاردىن باشلىنىدۇ. قاپاق گىرۋىكىنىڭ ئالدىنقى قىرىدا سىرتقا قاراپ رەتلىك تۆسكەن كىرىپكەلەر، قىرىنىڭ ئىچكى تەرىپىدە قاپاق قىرىغا قاراپ ئېغىزلانغان كۆمۈرچەك بەزلەر بولىدۇ. بەزلەردىن چىققان سۇيۇقلۇقلار قاپاق قىرىنى سىلىقلاپ تۇرىدۇ. قاپاقنىڭ تۈزۈلۈشى سىرتىدىن ئىچىگە قاراپ تېرە، تېرە ئاستى ئەزالىرى، گۆش، كۆمۈرچەك ۋە ئەستەر پەردىلەردىن تەركىب تاپىدۇ. تېرە قىسمى ناھايىتى نېپىز كېلىدۇ. كۆمۈرچىكى ئىنچىگە تالالاردىن تۈزۈلگەن بولىدۇ. قاپاقتىكى گۆش ئاساسەن يۇقىرىقى قاپاقنىڭ يۇمۇلۇپ ئېچىلىشىنى باشقۇرىدۇ.

## 3. كىرىپكە

كىرىپكە (ھودب، ئەھداب) قاپاق گىرۋەكلىرىدىن ئۈنۈپ چىققان، ئىككى ياكى ئۈچتىن قاتارلاشقان تۈكلەردىن ھاسىل بولغان بولۇپ، ئۈستۈنكى كىرىپكە ئاستىنقى كىرىپكەلەرگە قارىغاندا كۆپ ۋە ئۇزۇنراق، سەل-پەل ئۈستى تەرەپكە ئىگىلىگەن بولىدۇ. ئاستىنقى كىرىپكە ئاستى تەرەپكە ئىگىلىگەن نەزەك كېلىدۇ.





كۈرىكلەر كۆزنى چاڭ-توزان ۋە ھەر خىل غەيرىي نەرسىلەردىن مۇھاپىزەت قىلىدۇ شۇنىڭدەك تۈزىنىش قارىلىقى بىلەن تۇرلارنى مۇئەننەلەشتۈرۈش رولى بار.


#### 4. قاپاق ئەستەر پەردىسى

ئەستەر پەردە (تەبەقە ئى مۇلتە ھەمە) كۆز يۇمىلىقىنىڭ سىرتقى سەتھى (يۈزى) بىلەن قاپاق ئىچكى سەتھىنىڭ ئىككىسىدىلا بولغاچقا قاپاق ئەستەر پەردىسى (مۇلتە ھەمە ئى جە فىئىيە) ۋە كۆز ئەستەر پەردىسى (مۇلتە ھەمە ئى ئەينىيە) دەپ ئىككىگە بۆلۈنىدۇ. بۇ يەردە مۇناسىپ ھالدا قاپاق ئەستەر پەردىسى سۆزلىنىدۇ.

قاپاق ئەستەر پەردىسى سۈزۈك بەلغەمىسىمان پەردە بولۇپ، سەل قېلىنراق ھەم قان تومۇرلارغا باي كېلىدۇ. يۈزىدە تۇششاق دۆڭچە تۇقتىلار بولىدۇ. ئۇ قاپاقنىڭ ئىچكى سەتھىنى ئەستەرلەپ بولغاندىن كېيىن، كۆز يۇمىلىقى قاتتىق پەردىسى (تەبەقە ئى سۇلبىيە) نىڭ ئالدىنقى قىسمى ۋە مۇڭگۈز پەردىسى (تەبەقە ئى قەرنىيە) نىڭ مەلۇم قىسمى بىلەن ئۇچرىشىپ تۇرىدۇ.

#### 5. ياش ئەزالىرى

ياش ئەزالىرى ياش بېزى ۋە ياش يوللىرىدىن ئىبارەت ئىككى قىسىمغا بۆلۈنىدۇ.



#### 2-رەسىم. كۆز قوشۇمچە ئەزالىرى

1) ياش بېزى (غۇددە تود دەمئى): ئۇ، كۆز تۈپىنىڭ تاشقى يۇقىرىقى تەرىپىدە بولىدۇ. ئۇنىڭ سىرتقى سەتھى گۈمبەزسىمان بولۇپ، كۆز تۈپى سۈڭىكىنىڭ پەردىسىگە چېتىشقان بولىدۇ. ئاستىنقى ئويمان سەتھى كۆز تۈپىنى گۆشلىرى بىلەن تۇتىشىدۇ. ياش





بېزىدا تەخمىنەن يەتتەدەك نەيچە بار بولۇپ، ئۇلار ئەستە پەردىنىڭ ئاستى قىسمىدىن ئۆتۈپ ئۈستى قىسمىدا ئاخىرلىشىدۇ. ياش بېزىدىن ئىشلىنىپ چىققان سۇيۇقلۇقلار سىرغىپ چىقىپ كۆز يۇمىلىقىنى نەمدەپ، سەگىتىپ تۇرىدۇ. غەيرىي نەرسىلەرنى ئېقىتىپ چىقىرىدۇ، جەراسىملارنى ئۆلتۈرىدۇ.

(2) ياش يوللىرى: ياش يوللىرى ياش كانالچىلىرى، ياش خالتىسى ۋە بۇرۇن ياش كانالچىسىدىن تەركىب تاپىدۇ.

(1) ياش كانالچىسى (مەجرە دەمى): ياش كانالچىلىرى يۇقىرى ۋە تۆۋەنكى ياش نۇقتىسىدىن باشلىنىدۇ. يەنى، يۇقىرىقى ياش كانالچىسى ئۈستۈنكى تەرەپتىن، تۆۋەنكى ياش كانالچىسى ئاستى تەرەپتىن مېڭىپ ياش خالتىسىغا تۇتىشىدۇ.


(2) ياش خالتىسى (كېسە تۆدەمى): ياش خالتىسى بۇرۇن ياش كانالچىسىنىڭ يۇقىرىقى قىسمىدىكى خالتىسىمان بوشلۇق بولۇپ، ياش سۆڭىكى كانالچىسى تەرىپىگە جايلاشقان. ئۇنىڭ شەكلى سوزۇق توخۇمىسىمان بولۇپ، ئۈستى يۇمىلاق، ئاستى سوزۇنچاقراق كېلىدۇ.

(3) بۇرۇن ياش كانالچىسى (مەجرە ئۆلئە نەفى): بۇرۇن ياش كانالچىسىنىڭ ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن بىر ئىلىك بولۇپ، ياش خالتىسىنىڭ ئاستىقى كانارىسىدىن باشلىنىپ بۇرۇن ئاستىقى كاۋاكچىسىدا ئېچىلىدۇ. ئېغزىدا بىر قاپقاق بار بولۇپ، ياشنىڭ كەينىگە قايتىپ كېتىشىنى توسايدۇ. مەزكۇر كانالچىنىڭ ئىچكى تەرىپى پوتلاسىمان پەردە بىلەن ئەستەلەنگەن بولىدۇ.


## كۆز يۇمىلىقى

كۆز يۇمىلىقى (مۇقلە) ئالما شەكلىدە بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن بىر ئىلىك، توغرىسى بىر ئىلىكتىن كەمرەك (رادىئوسى ھازىرقى ئۆلچەمدە ئىككى يېرىم سانتىمېتر ئەتراپىدا) كېلىدۇ. ئۇ، كۆز تۈپىدىكى ياغلارغا جايلاشقان بولۇپ، ئۈستى-ئاستى ۋە ئوڭ-سول تەرەپتىكى مۇناسىۋەتلىك گۆشلەر بىلەن تارتىلىپ تۇرغاچقا ھەر تەرەپكە ئەركىن ھەرىكەتلىنىپ تۇرىدۇ. كۆز يۇمىلىقى ئۆزىنىڭ سىرتى ۋە ئىچىدىكى تەركىباتلىرى يەنى، سىرتقى قىسمىدىكى 3 پەردە، ئىچكى قىسمىدىكى 3 سۇيۇقلۇقتىن تۈزۈلىدۇ. (3-رەسىم)





(قەدىمكى كىتابلاردىكى كۆزنىڭ تۈزۈلۈش سىخىمىسى)



(ھازىرقى كىتابلاردىكى كۆزنىڭ تۈزۈلۈش سىخىمىسى)

3-رەسىم. كۆز يۇمىلىقىنىڭ تۈزۈلۈشى

### كۆز يۇمىلىقى سىرتى

كۆز يۇمىلىقىنىڭ سىرتىقى قىسمى چوڭ جەھەتتە 3 پەردىگە بۆلۈنىدۇ. 1. قاتتىق





پەردە (تەبەقە ئى سۇلبىيە)، 2. بالا ھەمراھسىمان پەردە (تەبەقە ئى مەشىمىيە)، 3. تورسىمان پەردە (تەبەقە ئى شەبەكىيە). لېكىن ئالدىنقى 2 خىل پەردىنىڭ ئۆدۈلدىكى قىسىملىرىنى تەپسىلىي ئايرىپ يەنى، قاتتىق پەردىنىڭ ئالدىدىكى  $1/6$  قىسمىنى مۇڭگۈز پەردە (تەبەقە ئى قەرنىيە)، بالا ھەمراھسىمان پەردىنىڭ ئالدىدىكى  $1/6$  قىسمىنى ئۈزۈمسىمان پەردە (تەبەقە ئى ئىنەبىيە) دەپ ئاتىغاچقا 5 خىل پەردە بار دەپ قارىلىدۇ. بەزى ھۆكۈمالار كۆز يۇمىلغى ئىستەر پەردىسى (مۈلتەھەمە ئى ئىنەبىيە) ۋە قىرۇسىمان سۇيۇقلۇق قىيى (غىلافى روتوبە تى جەلدىيە) نى يەنى ئومۇمچۈك تورسىمان پەردە (تەبەقە ئى ئەنكەبۇتىيە) نىمۇ كۆز يۇمىلغى پەردىلىرى قاتارىدا ساناپ 7 خىل پەردە بار دەپ قارايدۇ. تۆۋەندە چوڭ جەھەتتىكى 3 پەردە ۋە ئونىڭ تەركىبىي قىسمى بولغان 2 پەردە، جەمئىي 5 پەردە سۆزلىنىدۇ.

### 1. قاتتىق پەردە (تەبەقە ئى سۇلبىيە)

قاتتىق پەردە ئىنچىكە تالالاردىن تۈزۈلگەن رەڭگى ئاق، مەزمۇت پەردە بولۇپ، كۆز يۇمىلغىنىڭ ئۈستى، ئاستى ۋە كەينىدىن ئىبارەت  $5/6$  قىسمىنى تەشكىل قىلىدۇ ھەمدە، ئالدىدىكى  $1/6$  قىسمىنى تەشكىل تاپقان مۇڭگۈز پەردە بىلەن بىرلىكتە كۆز يۇمىلغىنىڭ قىيىنى ھاسىل قىلىدۇ. ئونىڭ ئەڭ ئارقا تەرىپىدىكى توشۇكىن كۆرۈش ئەسەبى (ئەسەبى مۇجەۋۋە) ۋە كۆز تومۇرلىرى ئۆتىدۇ. مۇڭگۈز پەردە پارىراق، نۇر ئۆتكۈزۈچان بولۇپ، ئالدى سەتھى دۆڭرەك كېلىدۇ. كەينى قاتتىق پەردە بىلەن تۇتىشىدۇ. مەزكۇر پەردىدە قان تومۇرلار بولمايدۇ، ئەمما ئەسەبلەرگە باي بولغاچقا سەزگۈررەك كېلىدۇ.

### 2. بالا ھەمراھسىمان پەردە (تەبەقە ئى مەشىمىيە)

بالا ھەمراھسىمان پەردە قان تومۇرلارغا باي بولغاچقا، قان تومۇرلۇق پەردە دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇ، قاتتىق پەردە بىلەن تورسىمان پەردىنىڭ ئارىلىقىدا بولۇپ، رەڭگى قارامتۇل كېلىدۇ (شۇرق تۈپەيلىدىن ھەر خىل رەڭدىمۇ بولىدۇ). مەزكۇر پەردىنىڭ ئالدىنقى  $1/6$  قىسمى ئۈزۈمسىمان پەردە (تەبەقە ئى ئىنەبىيە) دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ، يۇمىلاق، سوزۇنچاق نۇر چاچقان شەكىلدىكى قاتلاقلار يەنى رەڭدار قویرۇقلاردىن تەركىب تاپقان بولۇپ، ئوتتۇرىسىدىكى توشۇك كۆز قارىچۇقى دەپ ئاتىلىدۇ. كۆز قارىچۇقى قویرۇقلارنىڭ رولى ئارقىلىق كېڭىيىپ تارىيىدۇ. مەزكۇر پەردىنىڭ ئاخىرى رەڭدار مۇڭگۈزلۈك چاندىرلار بىلەن ئاخىرلىشىپ بالا





ھەمراھسىمان پەردە بىلەن تۇتىشىدۇ. بۇ چاندىرلار كىرىكىسىمان چاندىر ياكى تۈسۈكچە (زەۋاتىدى ھۇدىيە) دەپ ئاتىلىدۇ. دېمەك، بالا ھەمراھسىمان پەردىدە قان تومۇرلار، بىرىكتۈرگۈچى توقۇلمىلار ۋە رەڭدار مۇڭگۈزلۈك تۈسۈكچىلەر بولىدۇ. مەزكۇر پەردىنىڭ ئىچكى تەرىپى قارا رەڭلىك بولغاچقا، يورۇقلۇقنى تۈزگە تارتىپ كۆرۈشنىڭ نورماللىقىنى تەمىن ئېتىدۇ.

### 3-تورسىمان پەردە (تەبەقە ئىشەككە)

تورسىمان پەردە كۆزنىڭ ئىچكى پەردىسى بولۇپ، ئىچكى سەتھى شىشىسىمان سۇيۇقلۇق (روتوبەتتى زۇجاجىيە) بىلەن سىرتقى سەتھى بالا ھەمراھسىمان پەردە (تەبەقە ئىشەككە) مەشىمىيە) بىلەن تۇتىشىدۇ. ئۇ، نېپز، پارقراق بولۇپ، تېڭى تەكتىدىن ئېتىقاندا كۆرۈش ئەسەبىنىڭ كېڭەيگەن قىسمى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ھەر قانداق نەرسىنىڭ شولىسى مۇشۇ پەردىدە ئەكس ئېتىدۇ. بۇ پەردە 3 ئۈلۈش بولىدۇ، بىرىنچى ئۈلۈشى كۆرۈش ئەسەبىدىن باشلىنىپ، ئۇنىڭ ئالدىنقى قىسمىدا ئاخىرلىشىدۇ. ئىككىنچى ئۈلۈشى كىرىكىسىمان تۈسۈكچىنىڭ قۇيرۇقى تەرىپىدىن ئورۇن ئالىدۇ. ئۈچىنچى ئۈلۈشى تۈزۈمسىمان پەردىنىڭ قۇيرۇق تەرىپىدە بولىدۇ. بۇلارنىڭ ئىچىدە بىرىنچى ئۈلۈش قىسمىلا كۆرۈش خىزمىتىگە قاتنىشىدۇ.

مەزكۇر پەردە ئادەم ھايات ۋاقتىدا ئۇرلۇق پارقراق، سۈزۈك كېلىدۇ. ئادەم ئۆلگەندىن كېيىن دۇغلىشىپ قالىدۇ.

مەزكۇر پەردىنىڭ كۆرۈش ئەسەبى كىرگەن سەتھىدە بىر تۇخۇمىسىمان ئويمانلىق بار بولۇپ، ئۇ، كۆز توقچىقى (قۇرسۇلبەسەرى) دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ جايغا يورۇقلۇق تەسىرى كەلمەيدۇ. ئەمما ئۇنىڭ دەل ئوتتۇرىسىدا بىر سېرىق داغ بار بولۇپ، ئۇ، سېرىق تۇقتا (نۇقتە ئىشەككە) دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ تۇقتا يورۇقلۇقنى ئەڭ كۆپ قوبۇل قىلىدىغان ۋە سېزىدىغان بولغاچقا، كۆرۈش كۈچى ناھايىتى تۆتكۈر كېلىدۇ.

كۆرۈش پەردىسى تورسىمان پەردە ۋە باشقا كۆز قىسىملىرىنىڭ ۋاسىتىسى ئارقىلىق نۇرلۇق شولىلارنى قوبۇل قىلىپ، مېڭىگە قەدەر يەتكۈزۈپ بېرىدۇ. مېڭە كۆرۈش قۇۋۋىتى (قۇۋۋە ئىشەككە) ئارقىلىق قوبۇل قىلىدۇ.

### كۆز يۇمىلىقى ئىچى

كۆز يۇمىلىقى ئىچىدە 3 خىل سۇيۇقلۇق بار. ئۇلار، تۇخۇم ئېقىسىمان سۇيۇقلۇق





(روتوبەتى بەيزىيە)، قروسمان سۇيۇقلۇق (روتوبەتى جەلدىيە)، شىشىسمان سۇيۇقلۇق (روتوبەتى زۇجاجىيە) لەردىن ئىبارەت. ئۇلار كۆز يۇملىقىنىڭ ئىچىدىكى بوشلۇقلارنى تولدۇرۇپ، ئۇنىڭ شەكلىنى ساقلايدۇ. مەزكۇر سۇيۇقلۇقلار رەڭسىز بولغاچقا، يورۇقلۇقلارنىڭ نورمال تۇتىشىگە كاپالەتلىك قىلىدۇ.

### 1. توخۇم ئېقىسمان سۇيۇقلۇق (روتوبەتى بەيزىيە)

مەزكۇر سۇيۇقلۇق توخۇم ئېقىغا ئوخشايدىغان بولۇپ، ئەسلى ئۇ بىر خىل بەلغەم سۇيۇقلۇقىدىن ئىبارەت. ئۇ مۇڭگۈز پەردىنىڭ ئاستىدا، قروسمان سۇيۇقلۇق قېيى (غىلافى روتوبەتى جەلدىيە) نىڭ يەنى كۆز گۆھرىنىڭ ئالدىدىكى بوشلۇقتا تۇرىدۇ. بۇ بوشلۇق ئالدى ھوجرا (ھوجرە ئى مۇقەددەمە) دەپ ئاتىلىدۇ. ئۈزۈمىسمان پەردە مەزكۇر سۇيۇقلۇقنىڭ بىر قىسمىنى توساپ تۇرغاچقا، ئۇنى مۇڭگۈز پەردە بىلەن ئۈزۈمىسمان پەردە ئارىلىقىدا تۇرىدۇ دېيىشكەمۇ بولىدۇ. ئۈزۈمىسمان پەردە بىلەن قروسمان سۇيۇقلۇق قېيى ئارىلىقىدىكى كىچىكرەك بوشلۇق ئارقا ھوجرا (ھوجرە ئى مۇئەخخەرە) دەپ ئاتىلىدۇ. ئالدى ۋە ئارقا ھوجرىلار ئۈزۈمىسمان پەردە ئوتتۇرىسىدىكى تۆشۈك يەنى، كۆز قارىچۇقى ئارقىلىق ئۆزئارا تۇتىشىپ تۇرىدۇ. شۇڭا، ئېنىقراق قىلىپ ئېيتقاندا، توخۇم ئېقىسمان سۇيۇقلۇق ئالدى ۋە ئارقى ھوجرىلارنى تولدۇرۇپ تۇرىدۇ.

### 2. قروسمان سۇيۇقلۇق (روتوبەتى جەلدىيە)

مەزكۇر سۇيۇقلۇق قروسمان سۇيۇقلۇق قېيى يەنى كۆز گۆھرىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى سۈزۈك كرىستال تەنچە بولۇپ، قېيىنىڭ ئىككى يۈزى دۆڭ، ياپىلاق، پارىقراق، تۇر تۆتكۈزۈچان، ئەۋرىشىمچانلىقى يۇقىرى كېلىدۇ. ئۈزۈمىسمان پەردە بىلەن شىشىسمان سۇيۇقلۇقنىڭ ئارىلىقىدا تۇرىدۇ. ئىككى چېتى كرىپىكسىمان چاندىر بىلەن تارتىلىپ، بالا ھەمراھسىمان پەردە بىلەن تۇتىشىدۇ. كۆز گۆھرى كرىپىكسىمان چاندىرنىڭ بوشاش ۋە يىغىش رولى ئارقىلىق دۆڭلىك دەرىجىسىنى تەڭشەپ يىراق ۋە يېقىندىكى نەرسىلەرنى نورمال كۆرۈشكە ماسلىشىدۇ.

### 3. شىشىسمان سۇيۇقلۇق (روتوبەتى زۇجاجىيە)

مەزكۇر سۇيۇقلۇق ئېرىتىلگەن ئەينەك سۇيۇقلۇقىغا ئوخشاش سۈزۈك ماددا بولۇپ، كۆز يۇملىقىنىڭ 4/5 قىسمىنى يەنى كۆز گۆھرىنىڭ كەينى ۋە تورسىمان پەردىنىڭ ئالدىدىكى بوشلۇقنى تولدۇرۇپ تۇرىدۇ.





## كۆز كېسەللىكلەرنىڭ تورى

كۆز كېسەللىكلىرى (ئەمرازۇلكەينى) بىلەن تونۇشۇش ئۈچۈن ئالدى بىلەن كۆزنىڭ مىزاجى ۋە ئۇنىڭ كېسەللىك تورلىرىنى بىلىش كېرەك.

كۆزنىڭ مىزاجى ھۆل ئىسسىق. كۆز كېسەللىكلەردە خىلىت (ماددا) لىق ۋە خىلىت (ماددا) سىز كېسەللىكلەر، مەرەزى تەركىب (ئەزا شەكلى ياكى تەركىبى ئۆزگەرگەن كېسەللىكلەر) ۋە مەرەزى مۇشتەرەك (تۈزۈلۈشى ياكى ئاناتومىيىسىگە ئائىت كېسەللىكلەر ۋە باشقا ئەزالار شىركىچىلىكىدىن بولغان كېسەللىكلەر) لەرنىڭ ھەممىسى يۈز بېرىدۇ. ئۇلار، بەزىدە بىرلەمچى كېسەللىك (مەرەزى ئەسلىي) ياكى ئىككىلەمچى كېسەللىك (مەرەزى شىركىي) يەنى باشقا ئەزالار شىركىچىلىكى ھالەتتە يۈز بېرىدۇ. كۆز بىلەن مۇناسىۋىتى چوڭ ۋە ئۇنىڭ بىلەن شىركىچىلىكى بار ئەزالار مېڭە، باش ۋە مېڭىنىڭ ئىچكى، تاشقى پەردىلىرى؛ ئۇنىڭدىن قالسا ئاشقازان ۋە باشقا ئەزالاردۇر. كۆزنىڭ مېڭە سىرتقى پەردىسى شىركىچىلىكىدىن بولغان كېسەللىكلەرنىڭ خەتىرى ئانچە چوڭ ئەمەس.

كۆز كېسەللىكلەرنىڭ بەزىسى يۇقۇملۇق بولىدۇ. مەسىلەن: يۇقۇملۇق كۆز ئاغرىقى (رەمەد) قاتارلىقلار. يەنە بەزىلىرى ئىرسىيەت خاراكتېرلىك بولىدۇ. مەسىلەن: كۆزگە پەردە ئۆسۈش (سەبەل) كېسەللىكى قاتارلىقلار.

كۆز كېسەللىكلىرى ئىسسىق جايلاردا كۆپرەك، سوغۇق جايلاردا ئازراق ئوچرايدۇ. شۇنىڭدەك ماددىلارنىڭ ياز پەسلىدە كۆز تەرەپكە ئۆرلەيدىغانلىقى، ئەتىياز پەسلىدە سىرغىپ ئېقىپ كۆزگە كېلىدىغانلىقى، كۆز پەسلىدە بۇزۇلۇپ كۆزگە تەسىر قىلىدىغانلىقى ئۈچۈن قىش پەسلىدىن باشقا پەسلىدە كۆز كېسەللىكلىرى كۆپلەپ ئوچرايدۇ.

كۆز كېسەللىكلەرنىڭ بىر قىسمى ئەستە پەردە (تەبەقەئى مۇلتەھەمە) دە يۈز بېرىدۇ. مەسىلەن: كۆزنىڭ يۇقۇملۇق ئاغرىقى (رەمەد) يەنى تەبەقەئى مۇلتەھەمەدە ئىسسىقتىن يۈز بېرىدىغان ياللۇغ)، كۆزگە چىكىت پەيدا بولۇش كېسىلى (تەرقە)، كۆزگە قاتتىق مۇدۇر پەيدا بولۇش كېسىلى (ۋەدقە) قاتارلىقلار. بەزىلىرى مەخسۇس مۇڭگۈز پەردە (تەبەقەئى قەرنىيە) دە يۈز بېرىدۇ، مەسىلەن: كۆزگە ئاق چۈشۈش كېسىلى ۋە كۆز يىرىڭلىق جاراھىتى كېسىلى قاتارلىقلار. يەنە بەزىلىرى





مەخسۇس كۆز قارىچۇقىدا يۈز بېرىدۇ، مەسلەن: كۆز قارىچۇقىنىڭ كېڭىيىش كېسىلى، كۆز قارىچۇقىنىڭ تارىيىش كېسىلى، كۆزگە سۇ چۈشۈش (تۈزۈلۈمات) قاتار-لىقلار. بەزىلىرى مەخسۇس كۆزدىكى روھلارغا چۈشىدۇ، مەسلەن: كۆزگە پاشا، كۆمۈتگە ئوخشاش نەرسىلەر كۆرۈنۈش كېسىلى (خىيالات)، قارىغۇلۇق، كۆز ئاجىزلىشىش كېسىلى قاتارلىقلار. بەزىلىرى مەخسۇس كۆزنىڭ سۇيۇقلۇقلىرىدا يۈز بېرىدۇ، مەسلەن: كۆز سۇيۇقلۇقلىرىنىڭ تۈيۈپ قېلىشى ۋە تۇلارنىڭ ئارتۇقچە قېتىشىپ قېلىشى قاتارلىقلار.

ئەستە پەردە (تەبەقە ئى مۇلتەھەمە) گە مەنسۇپ ۋە تۈنىڭغا قوشۇلۇپ كېلىدىغان ھەتتا تۈنىڭدىن باشقا كۆز ئەزالىرىدا يۈز بېرىدىغان كېسەللىكلەرنىڭ بىر قىسمى ئەستە پەردە (تەبەقە ئى مۇلتەھەمە) ھەم كۆز جىيەكلىرىدە يۈز بېرىدۇ، مەسلەن: كۆز ئەستە پەردىسى (تەبەقە ئى مۇلتەھەمە) نىڭ كۆپۈپ قېلىشى ۋە تۈنىڭغا قوشۇلۇپ كەلگەن كۆز جىيەكلىرى قاتتىقلىشىش كېسەللىكلىرىدە كۆز قىچىشىش كېسىلى ۋە كۆزگە يۇمشاق گۆش ئۆسۈش كېسەللىكلىرى يۈز بېرىدۇ. كۆز كېسەللىكلىرىنىڭ بەزىلىرى ھەم ئەستە پەردە (تەبەقە ئى مۇلتەھەمە) گە ۋە ھەم مۇڭگۈز پەردە (تەبەقە ئى قەرنىيە) گە چۈشىدۇ، مەسلەن: سەبەل (تەبەقە ئى مۇلتەھەمە) گە پەردە پەيدا بولۇش كېسىلى ۋە كۆزگە تىرناقچە گۆش ئۆسۈش (زۇفرە) كېسەللىكلىرى قاتارلىقلار. بەزىلىرى ئەستە پەردە (تەبەقە ئى مۇلتەھەمە) گە ۋە كۆز بۇرچىكىدىكى بەزلەردە يۈز بېرىدۇ، مەسلەن: كۆز ياشاڭغۇراش (دەمە، سەيلانى ئەشك) كېسىلى قاتارلىقلار. بەزىلىرى ئەستە پەردە (تەبەقە ئى مۇلتەھەمە)، كۆز جىيەكلىرى ھەم مۇڭگۈز پەردە (تەبەقە ئى قەرنىيە) لەرنىڭ ھەممىسىدىلا يۈز بېرىدۇ، مەسلەن: ئۆسۈكچە گۆش ۋە يىرىڭلىق چاقا قاتارلىقلار. بەزى كۆز كېسەللىكلىرىنىڭ بىر قىسمى كۆزنىڭ بارلىق قىسىملىرىدا يۈز بېرىدۇ، مەسلەن: پۈتۈنلۈكنىڭ بۇزۇلۇشى (تەفەررۇقۇلتىتسالى) خاراكتېرلىك كۆز كېسەللىكلىرى قاتارلىقلار.

كۆز كېسەللىكلىرىنىڭ بەزىلىرى ئاشكارا بولىدۇ، مەسلەن: كۆز ياللۇغى قاتارلىقلار. يەنە بەزىلىرى ئىچكى تەرەپتە بولۇپ تۈنى تونۇشمۇ ئاسانغا چۈشمەيدۇ، مەسلەن: كۆز سۇيۇقلۇقلىرىغا چۈشكەن دائىرىلىك دۇغ قاتارلىقلار. يەنە بەزىلىرى گەرچە ئىچكى تەرەپتە بولسىمۇ تونۇش ئاسانغا توختايدۇ. مەسلەن: كۆرۈشكە مەستۇل روھلار (روھى باسرە) قويۇقلۇق دەرىجىسىنىڭ ئېشىشى ۋە سۇيۇلۇشى قاتارلىقلار ۋە يەنە بىر قىسىم كۆز كېسەللىكلىرى ئىچكى تەرەپتە بولۇپ، ئاساسى ئاجىز بولغان تەخمىن پەرەز بىلەن تونۇلىدۇ، مەسلەن: كۆزنىڭ ئىچكى پەردىلىرى ياكى نۇرغا مەنسۇپ ئەسەبلىرىنىڭ مزاجى بۇزۇلۇش قاتارلىقلار. باشقا سەۋەبلەردىن پەيدا بولغان دۇغ سىزىقچىلار قاتارلىقلار. بۇلارنى داۋالاپ ئۈنۈم قازىنىش ناھايىتى قىيىنغا توختايدۇ. بۇنداق بولۇشىدىكى سەۋەب شۇكى





كۆزنىڭ ئىنچىكە ئەزالىقى ھەمدە تۈنىڭدا روھ ۋە قۇۋۋەتلەرنىڭ كۆپ بولغانلىقىدىندۇر.

## كۆز كېسەللىكلىرىنىڭ تەشخىسى


كۆز كېسەللىكلىرىنى تەشخىس قىلىش بىرقەدەر مۇرەككەپتۇر. شۇڭا، كۆز كېسەللىكلىرىنى تونۇشتا تۈنىڭ ئەسلىي كېسەللىك (بىرلەمچى كېسەللىك) ياكى باشقا ئەزالار سەۋەبىدىن بولغان كېسەللىك (ئىككىنچى كېسەللىك) ئىكەنلىكى، كۆز كېسەللىكلىرىنىڭ پەردە (تەبەقە) لەردە ياكى كۆزنىڭ سۇيۇقلۇقلىرىدا ياكى ئىچى كاۋاك نېرۋا (ئەسەبى مۇجەۋۋەفە) دا ئىكەنلىكىنى ھەقىقىي ئېنىقلاپ تەشخىسنى توغرا مۇقىملاشتۇرغاندىن كېيىن ئاندىن داۋالاشقا كىرىشىش كېرەك.

كۆز كېسەللىكلىرىنى تونۇشتا تۆۋەندىكىلەرگە ئەھمىيەت بېرىش لازىم: 1. كۆز ھەرىكىتىنىڭ ئېغىر-يەڭگىللىكى، 2. كۆزنىڭ قولغا تۇرۇنۇش ئالاھىدىلىكى، 3. كۆز ھەرىكىتىنىڭ تېز-ئاستىلىقى، 4. كۆز تومۇرلىرىنىڭ ئەھۋالى، 5. كۆزنىڭ رەڭگى، 6. كۆزنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى، 7. كۆزنىڭ مەخسۇس خىزمىتى يەنى كۆرۈش پائالىيىتىنىڭ ياخشى-يامانلىقى، 8. كۆزدىن ئاققان سۇيۇقلۇقلارنىڭ سۈپەت جەھەتتىكى پەرقى، 9. كۆزنىڭ تۈرلۈك تەسىرلەرنى قوبۇل قىلىش ئەھۋالى يەنى تەسىرنى قوبۇل قىلىشنىڭ تېز-ئاستىلىقى قاتارلىقلار. ئەگەر، ئاغرىق كۆز كېسەللىكىدىن شىكايەت قىلىپ كەلسە تەشخىس قىلىشتا ئالدى بىلەن بۇ كېسەللىكنىڭ خىلىتى (ماددا) لىق ياكى خىلىتى (ماددا) سىز ئىكەنلىكىنى ئايرىش كېرەك، مەسىلەن: ئاغرىقتىن كۆزنى يەڭگىل ياكى ئېغىر ھېس قىلىدىغانلىقى، كۆزىدىن چاپاق چىقىدىغان ياكى چىقمايدىغانلىقىنى سوراش كېرەك. ئەگەر، ئاغرىق كۆزنىڭ يەڭگىل ئىكەنلىكىنى ۋە چاپاق چىقمايدىغانلىقىنى ئېيتسا، كېسەللىكنىڭ ماددىسىز (سازەج) ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر، كۆز قىزىق (ئىسسىق) بىلىنسە ھەمدە كۆز ھەرىكىتى يېنىك ۋە تېز بولۇپ تومۇرى نوم ۋە كەڭ سوقسا، يىراقتىكى نەرسىلەرنى كۆرۈشكە ئاجىزلىق قىلسا، سوغۇقلۇق نەرسىلەردىن مەنپەئەتلىنىپ ئىسسىقلىق نەرسىلەر زىيان قىلسا، مەزكۇر كۆز كېسەللىكىنىڭ ماددىسىز ئىسسىق (ھار سازەج) دىن بولغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر، كۆز سوغۇق بىلىنسە، ھەمدە كۆز ھەرىكىتى ئېغىر بولۇپ، تومۇرى ئىنچىكە سوقسا، ئىسسىقلىقتىن مەنپەئەتلىنىپ سوغۇقلۇق نەرسىلەر زىيان قىلسا، مەزكۇر كېسەللىكىنىڭ ماددىسىز سوغۇق (بارىد سازەج) دىن بولغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر، كۆز قاتتىق بىلىنسە ھەمدە ھەرىكىتى يەڭگىل بولۇپ، تومۇرلىرى بوش سوقسا يەنى تومۇرى ئىچىدە قان ئازدەك بىلىنسە، كۆز قۇرغاقلىشىپ، ھۆللۈك



نەرسىلەردىن مەنپەئەتلىنىپ، قۇرۇقلۇق نەرسىلەر زىيان قىلسا، مەزكۇر كۆز كېسەللىكىنىڭ ماددىسىز قۇرۇق (يابىس سازه ج) دىن بولغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر، كۆز يۇمشاق بولۇپ ھەرىكىتى ئېغىر بولسا، كۆزى چوڭ بولۇپ يېقىندىكى نەرسىلەرگە قارىغاندا يىراقتىكى نەرسىلەرنى سېزىۋېلىشى ياخشىراق بولسا، چاپاق كۆپ چىقسا شۇنداقلا قۇرۇقلۇق نەرسىلەردىن مەنپەئەتلىنىپ، ھۆلۈك نەرسىلەر زىيان قىلسا، مەزكۇر كېسەللىكىنىڭ ماددىسىز ھۆلۈك (رەت ب سازه ج) دىن بولغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر، ئاغرىق دەسلەپتلا كۆزنى ئېغىر ھېس قىلىدىغانلىقى ۋە چاپاقلىشىپ ئاغرىدىغانلىقىدىن شىكايەت قىلسا كېسەللىكىنىڭ ماددىلىق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. بىماردا بۇ ئىككى ئالامەتتىن سىرت كۆزى ئىسسىق بىلىنىش، قىزىرىش، كۆزدىن ياش چىقىش، نومۇرلىرى كۆپۈشۈش، ئىككى چېكىسىدە سانجىق پەيدا بولۇش ياكى لوقۇلداشتەك ئالامەتلەر كۆرۈلسە ھەمدە كۆز جىيەكلىرى بىر-بىرىگە چاپلىشىپ قالغاندەك بىلىنسە، مەزكۇر كېسەللىكىنىڭ قاندىن بولغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر، كۆز ئىسسىق بىلىنگەندىن تاشقىرى رەڭگى سېرىققا مايىل قىزىل بولسا، ياش ئاز ئاقسا ھەمدە ياش ئىسسىق ۋە ئۆتكۈر بىلىنسە، كۆز قانلىق بىلەن بىرگە قىزىشىپ بىئاراملىنىشىمۇ تەڭ كۆرۈلسە ئەمما كۆز جىيەكلىرىنىڭ بىر-بىرىگە چاپلىشىۋېلىشى ئانچە ئېغىر بولمىسا، مەزكۇر كېسەللىكىنىڭ سەپرادىن بولغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر كۆز سوغۇق بىلىنسە، رەڭگى ئاققا مايىل سۇس قىزىل بولۇپ ئېغىرلىق سېزىمى كۈچلۈك بولسا ھەمدە جىيەكلىرىنىڭ بىر-بىرىگە چاپلىشىۋېلىشى ئېغىرراق بولۇپ چاپاق كۆپ چىقسا، ياشاڭغۇراش ھەم تاتراڭغۇلۇقلار تەڭ كۆرۈلسە، مەزكۇر كېسەللىكىنىڭ بەلغەمدىن بولغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. كۆزدىكى ئېغىرلىق، كۆز رەڭگىنىڭ تۇتۇقلۇقى بىلەن بىللە تەڭ كۆرۈلسە ئەمما جىيەكلىرىنىڭ چاپلىشىۋېلىشى بەك ئېغىر بولمىسا ھەمدە باشقا ھۆلۈككە ئائىت بەلگىلەر كۆرۈلمىسە، مەزكۇر كېسەللىكىنىڭ سەۋادىن بولغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.

يۇقىرىقىلار ئارقىلىق كۆز كېسەللىكلىرىنىڭ ماددىلىق، ماددىسىز ۋە قايسى ماددىدىن ئىكەنلىكىنى ئايرىغاندىن كېيىن، كېسەللىكىنىڭ بىرلەمچى ياكى ئىككىلەمچى كېسەللىكىنى ئايرىشقا كۆڭۈل بۆلۈش كېرەك. ئەگەر، كۆز كېسەللىكلىرى بىلەن بىر-بىرگە مېڭىگە ئائىت بەزى ئالامەتلەر، مەسىلەن: باش ئاغرىش ۋە باش ئېغىرلىشىشقا ئوخشاش باشقا ئالامەتلەرمۇ تەڭ كۆرۈلسە، كېسەللىكىنىڭ ئىككىلەمچى كېسەللىك (مەرەزى شىركىي) ئىكەنلىكىنى يەنى مەزكۇر كۆز كېسەللىكىنىڭ مېڭە بىلەن ئورتاقچىلىقى بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر، ئورتاقچىلىق باش ياپما سۆڭەك ئىچكى پەردىسىنىڭ ۋاستىچىلىقىدىن بولغان بولسا، بىماردا دەسلەپتلا ئاغرىش، يېقىمسىزلىنىش ۋە كۆز





ئىچىگە تارتىلغاندەك بىلىنىشتەك ئالامەتلەر كۆرۈلۈش بىلەن بىرگە بىمارغا كۆزى ئولتۇرۇشۇپ كېتىۋاتقاندا كېلىنىدۇ. كۆز جىيەكلىرىنىڭ كۆپۈشۈپ قېلىشى يەڭگىلەرەك بولىدۇ. ئەگەر، يۇقىرىقى ئالامەتلەرگە كۆپ چۈشكۈرۈش، بۇرۇن غىدىقلىنىش ۋە قىچىشىش، كۆز تامغاقلرى قىچىشىش قاتارلىقلار قوشۇلۇپ كەلسە، كېسەللىك ماددىسىنىڭ ئىسسىقتىن ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر، كۆزدىن ئاققان سۇيۇقلۇق قويۇق ھەم سوغۇق بولسا، كېسەللىك ماددىسىنىڭ سوغۇقتىن ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ خىل ئورتاقلىق ماددىسىز سۈيى مىزاجلىق كېسەللىك تۈزگىرىشلىرىدە ناھايىتى كەم ئۇچرايدۇ.

ئەگەر، كېسەللىك باش ياپما سۆڭىكىنىڭ سىرتقى پەردىسى بىلەن ئالاقىدار بولسا ۋە شۇ پەردىدىن كۆز تەرەپكە ماددا سىرغىغان بولسا، كۆزنىڭ ئىچىگە تارتىلىشى پېشانىدىن باشلانغاندەك بىلىنىدۇ. ھەمدە باشنىڭ سىرتقى تومۇرلىرى لوقۇلدايدۇ. كۆز جىيەكلىگە يېقىن جايلاردا كۆپۈشۈش ۋە ئەكس تەسىر پەيدا بولۇشتەك ئەھۋاللار ئېغىرراق بولىدۇ. يۈز كۆزلىرى قىزىرىدۇ، باش ۋە پېشانىسى قىزىق بىلىنىدۇ. باش تومۇرلىرى كۆپىيىپ چىققانلىقى مەلۇم بولىدۇ.

ئەگەر، كۆزدىكى تۈزگىرىشلەر قورساقنىڭ ئاچ-توقلۇقى بولۇپمۇ قۇسۇش، ھۆ بولۇش مەيدە بىئارام بولۇش، ئىشتەيسىزلىكتىن ئىبارەت ھەزىم بۇزۇلۇش جەھەتتىكى ئەھۋاللار بىلەن كۆپرەك مۇناسىۋەتلىك بولسا، كېسەللىكنىڭ ئاشقازان شىركىچلىكىدىن يۈز بەرگەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر، ماددىنىڭ غالىبلىقى پۈتۈن بەدەندە كۆرۈلسە، ئادەتلەنگەن ئىستىفراغ ئۈزۈلۈپ قېلىپ بەدەنلىرى ئېغىرلىشىپ قالغانلىقى مەلۇم بولسا، كېسەللىكنىڭ پۈتۈن بەدەن بىلەن ئالاقىدار ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر، بەدەن رەڭگى بۇزۇلۇش ۋە تاتىراڭغۇلىشىش، ھۆلىشىش ئەھۋاللىرى بىرگە كۆرۈلسە، كېسەللىكنىڭ ھەزىم ئەزالىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

### كۆزگە پايدىلىق ئامىللار

كۆزنىڭ ساقلىقىنى ساقلايدىغان ھەر خىل ئامىللار يەنى چارە-تەدبىر، يېمەك-ئىچمەك ۋە دورىلاردىن خەۋەردار بولۇش كۆز كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. ئۇلار تۆۋەندىكىچە:

كۆزنىڭ تازىلىقىغا دىققەت قىلىش، كۆزنى قول بىلەن ئۇۋۇلماسلىق، پاكىزە بولمىغان قول ياغلىق ۋە لۇڭگىلەر بىلەن سۈرتىمەسلىك لازىم. باش، كۆزنى ئېقىتقان سۇدا





يۇيۇش ئەڭ مۇۋاپىق. ئەگەر داستا يۇيۇشقا توغرا كەلسە تۆزنىڭ مەخسۇس دەپسى بولۇش، ھەر قېتىمدا يېڭى، پاكىز سۇ ئىشلىتىش كېرەك. تازىلىق سايمانلىرى (لۆڭگە، داس، قول ياغلىق قاتارلىقلار)نى ئورتاق ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش لازىم.

كىتاب ئوقىغان، خەت يازغاندا نۇر تولۇق بولۇش، راۋۇرۇس ئولتۇرۇش، خەت بىلەن كۆزنىڭ ئارىلىقى 30 سانتىمېتر ئەتراپىدا بولۇش، يېتىۋېلىپ، مېڭىۋېتىپ ۋە ماشىنىدا كېتىۋېتىپ كىتاب ئوقۇماسلىق كېرەك. مەلۇم ۋاقىت كىتاب كۆرگەن ياكى خەت يازغاندىن كېيىن يىراقلارغا ۋە مەنزىرىلىك جايلارغا قاراپ كۆزنى بىر پەس ئارام ئالدىرۇش، كۆزنى يۇمۇۋېلىپ قول بىلەن كۆز ئەتراپى ۋە يۈزنى بىر پەس سىلاش، تۇۋۇلاش كېرەك.

سۈزۈك، پاكىز تاتلىق سۇغا چۆمۈلۈش ھەمدە شۇ سۇ ئىچىدە كۆزنى ئېچىش كۆزگە مەنپەئەتلىك. ياشلار سوغۇق سۇغا، ياشانغانلار ئىسسىق سۇغا چۆمۈلگىنى مۇۋاپىق. ئاسان سىڭىدىغان، ياخشى قان پەيدا قىلىدىغان لەتىپ تاماقلارنى مۇۋاپىق تۆلچەمدە نورمال ھالدا ئىستېمال قىلىش، مەسىلەن: ئاق چامغۇر قاتارلىق كۆكتاتلارنى كۆپ يېيىش لازىم. نورمال ھالدا قۇرۇقلۇق يەتكۈزۈدىغان يەنى ئارتۇقچە ھۆلۈكلەرنى قۇرۇتىدىغان دورىلارنى ئىستېمال قىلىپ تۇرۇش كېرەك. جۇلا بېرىپ پارقىتىش، پارلاندىرۇپ تارقىتىش تەسىرىگە ئىگە ھەر قانداق دورىلارنى ئىستېمال قىلىپ بېرىش، كۆزنى روشەنلەشتۈرگۈچى ۋە كۈچلەندۈرگۈچى ھەر خىل دورىلارنى ئىشلىتىش، مەسىلەن: مەرزەنجوشنىڭ سۈيىگە چىلاپ سايدا قۇرۇتۇلغان سۈرمە، سەڭگى بەسىرى (بىر خىل تاش) قاتارلىقلارنى كۆزگە تارتىش، بادىيان سۈيى ياكى بادىيان سۈيىدە ئېزىلگەن (سۈرۈلگەن) سۈرمىلەرنى كۆزگە سۈرۈش؛ يېڭى بادىيان سۈيى (كۆك بادىياننىڭ سىقىلغان سۈيى)، غورا ئۈزۈمنىڭ سۈيى قاتارلىقلارنى ئىستېمال قىلىپ بېرىش كۆزگە ناھايىتى پايدىلىق. بۇرۇدى رۇممان (ئانار بىلەن تەييارلانغان دورا) نىڭ ئۈنۈمى ياخشى. يەنە شۇنىڭدەك كەپتەرنىڭ بېشىنى كۆيدۈرۈپ تۇنىڭ كۈلىنى سۈرمە قىلىپ تارتىش ۋە ئەنزەرۇت، زەمچە، زەئفەر، ئىپارنى ئىشلىتىشنىڭ كۆزنى كۈچلەندۈرۈشكە پايدىسى بولۇپلا قالماي، بەلكى كۆزنىڭ سالامەتلىكىنى ئاسراش، ھەر تۈرلۈك نەزلە سۇيۇقلۇقلىرىنىڭ قويۇلۇشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا خېلى ياخشى رولى بار.

تىللا سۈرمىچى بىلەن ئەقىنى ھەر ئايدا 2 قېتىم سۈرمە قىلىپ كۆزگە تارتسا بارلىق كۆز ئاغرىقى ۋە كۆز كېسەللىكلىرىگە شىپا بولىدۇ. يىلمان ئىسسىق سۈنى باشقا قۇيۇش، باشنى بىنەپشە، قاپاق ۋە بادام ياغلىرى بىلەن ياغلاش، كوھلى روشنائى، كوھلۇجە ۋاھىرىلارنى سۈرمە قىلىپ كۆزگە تارتىش كۆزنى كۈچلەندۈرىدۇ. خۇلاننى ھەپتە بىر قېتىم كۆزىگە سۈرمە قىلىپ تارتسا كۆزنىڭ زىيادە خىلىتلىرى ۋە ھۆلۈكىنى تارقىتىپ كۆزنىڭ





سالامەتلىكىنى ئاسرايدۇ. مەرقىششا، بىخ مارجان، يۇيۇلغان شادىنەج ۋە كۆيدۈرۈپ، يۇيۇلغان دېڭىز سەرتانى (قىسقىچ پاقا)، سۈنبۇل ھىندى، سازەج ھىندى قاتارلىقلارنى سۈرمە قىلىپ كۆزگە تارتسا كۆزنى ئاسرايدۇ. بىر ھەپتە بادىيان چىلانغان يامغۇر سۈيىنى ھەر قانداق كۆز كېسەللىكىدە كۆزگە تېمىتسا، كۆزنىڭ قۇۋۋىتىنى ئاشۇرىدۇ. ئەسسىد (بىر خىل سۈرمە تېشى) نى ھەر كەچتە سۈرمە قىلىپ كۆزگە تارتسا ياكى مەرۋايىت، مارجان، ئىقلىمىيائى زەھەب (ئالتۇن دېتى)، زەئفەر، ھوزۇز (روسۇت)، شېكەر، كۆيدۈرۈلگەن پىلە، مامىران چىنى، مۇدەببەر قىلىنغان مىس ۋە سەبىلەرنى سۈرمە قىلىپ كۆزگە تارتسىمۇ كۆزگە كۆپ مەنپەئەتلىك. قىش كۈنلىرىدە ئىپارنى، ياز كۈنلىرىدە ئەنەرنى پۇراشنىڭ كۆزنى ئاسراشتا خېلى چوڭ رولى بار. زۇمرەت، سەڭگى سەبەج (بىر خىل تاش) ۋە كۆكتات قاتارلىق يېشىل نەرسىلەرگە قاراش، تىللا سۈرمىچى (پىلتىكۈچى) نى دائىم كۆزىگە تارتىش كۆزگە كۆپ پايدا قىلىدۇ. دارچىنى، كۈندۈر، سەلىخە (قېلىن دارچىن) ۋە قەلەمفۇرلارنى سۈرمە قىلىپ كۆزگە تارتىش ۋە ئىستېمال قىلىشمۇ كۆزنى كۈچلەندۈرۈش ۋە ئاسراش رولىغا ئىگە. ھەر خىل ئىترىفېللار ۋە مۇناسىۋەتلىك مەئجۇنلەرنى ئىستېمال قىلىش، چىرايلىق نەرسە ۋە سۈرەتلەرگە قاراش، نورمالنى ھالدىكى ئىستىفراغ (چىقىرىپ تۇرۇش) لارنى داۋام قىلدۇرۇپ تۇرۇش، مېڭىنى تەنقىبە قىلىش (تازىلاش) ۋە ئۇنى كۈچلەندۈرۈش، بۇخار ۋە گىگازلارنىڭ ئۆزلىشىنى چەكلەش قاتارلىق دورا ۋە چارە-تەدبىرلەرنىڭ ھەممىسى كۆزگە پايدىلىق. بادام مېغىزىنى ناۋات بىلەن ئىستېمال قىلىشمۇ كۆزگە پايدىلىق. ھەر خىل مېغىزلار ۋە بادىيان، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، شېكەرلەردىن تەييارلانغان تالقان (سۇقۇف) لارنى ئىچىش، ھەلىلە ۋە ئامىيلە مۇرابباىلارنى داۋاملىق ئىستېمال قىلىش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى كۆزنىڭ سالامەتلىكىنى ئاسرايدۇ. ئېتىرىس غىبلى سەغرىنىڭمۇ بۇ جەھەتتىكى ئۈنۈمى خېلى يۇقىرى. يەنە شۇنىڭدەك قەۋزىيەت بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، چوڭ تەرەتنىڭ دائىم يۇمشاق كېلىشىگە كاپالەتلىك قىلىش قاتارلىقلار كۆزنىڭ ساغلاملىقىنى ساقلاشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.

## كۆزگە زىيانلىق ئامىللار

كۆزگە زىيانلىق شارائىت، كىلىمات، ھەرىكەت ۋە يېمەك-ئىچمەك، دورىلاردىن خەۋەردار بولۇپ ئۇلاردىن ساقلىنىش ھەر خىل كۆز كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا مۇھىم



ئەھمىيەتكە ئىگە. ئۇلار تۆۋەندىكىچە:

كۆزنىڭ تازىلىقىغا ئەھمىيەت بەرمەسلىك، قول بىلەن كۆزنى قالايمىقان ئوۋۇلاش، پاكىز بولمىغان قول ياغلىق ۋە لۇڭگىلەر بىلەن كۆزنى سۈرتۈش، باش ۋە كۆزنى سۈيىنى يېڭىلىمىغان داستا يۇيۇش بولۇپمۇ لۇڭگە، قول ياغلىق، داس قاتارلىق تازىلىق سايمانلىرىنى ئورتاق ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش لازىم. قاراڭغۇ ياكى ئۆرى تولۇق بولمىغان شارائىتتا كىتاب ئوقۇماسلىق، خەت يازماسلىق، خەتكە كۆزنى ھەددىدىن ئارتۇق يېقىن قىلىۋالماسلىق، يېتىپ، مېڭۇپ، ماشىنىدا كېتىۋېتىپ كىتاب ئوقۇش ۋە ئارام ئالماي ئۇدا كىتاب ئوقۇش ۋە خەت يېزىشتىن ساقلىنىش لازىم.

بۇلغانغان پاسكىنا، ئاچچىق سۇلاردا چۆمۈلمەسلىك، چاڭ-توزان، ئىس-تۈتەك جايلاردا تۇرماسلىق، كۆزنى زىيادە ئىسسىق ۋە سوغۇق ھاۋا، بوران-چاپقۇندىن ساقلاش، تۆتكۈر، كۈچلۈك تۇر ۋە چاقناۋاتقان نەرسىلەرگە قاراش، ھاۋا ئوچۇق كۈنلەردە قارغا كۆپ قاراش، كۆزنىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتىگە قاتتىق تەسىر قىلىدىغان بەك كىچىك خەت ۋە ئىنچىكە نەرسىلەرگە ئۇزۇنغىچە قاراش، مۇنچىدا ئۇزۇن ۋاقىت تۇرۇش، قاتتىق غەم-غۇسسە قىلىش قاتارلىقلاردىن ساقلىنىش كېرەك.

تۈزنى كۆپ مىقداردا ئۇزۇن مۇددەت ئىستېمال قىلىش، ھاراق قاتارلىق مەس قىلغۇچى نەرسىلەرنى كۆپ ئىستېمال قىلىش، تاماققا بەك تويۇنغاندا سىڭمەي تۇرۇپ ئوخلاش، ھەر خىل يەللىك ۋە تەستە ھەزىم بولىدىغان ھەمدە كۆزگە يامان تەسىرى بار يېمەك-ئىچمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلىشتىن ساقلىنىش ياكى ئاز ئىستېمال قىلىش كېرەك. مەسىلەن، يەللىك سوغۇق نەرسىلەردىن سۈت، دادۇر، لوۋيا قاتارلىقلار؛ يەللىك ئىسسىق نەرسىلەردىن سامساق، لازا، پىياز قاتارلىقلار؛ كۆزنى غۇۋالاشتۇرغۇچى ۋە كۆزگە زىيان قىلغۇچى نەرسىلەردىن چەلەڭ، ھەيۈلمۈلۈك، چەيزە، جۈسەي، قىچا، جۇۋنە، سىياھدان قاتارلىقلار؛ بۇلاردىن سىرت ئاچچىقسۇ، چۈچۈمەل ئالما، بادۇرۇج، سېرىق چېچەك، خۇرما، كالا گۆشى، سۈرلەنگەن گۆش، قورۇغان گۆش، زەيتۇن قاتارلىقلارنىڭمۇ كۆزگە بەلگىلىك دەرىجىدە ناچار تەسىرى بار. كۆز ئاغرىغاندا ئۆسۈڭ، سىركە، زەرىنخ، ئەپيۇن قاتارلىق نەرسىلەرنى ئىشلەتسە كۆزگە زىيان قىلىدۇ. كۆزنىڭ ئەسلى مىزاجى ھۆل بولغاچقا زىيادە ھۆللەشتۈرگۈچى، سوۋۇتقۇچى، بوشاتقۇچى دورىلار ياكى نەرسىلەرنى كۆپ ئىستېمال قىلسا كۆزنىڭ مىزاجىنى بۇزىدۇ. ھەزىم خىزمىتى بۇزۇلۇش، يېمەك-ئىچمەك رېتىمىسىزلىنىش قاتارلىق سەۋەبلەردىن ئاشقازاندىن ئۆرلىگەن كۈچلۈك بۇخارلار كۆزگە ئوخشاشلا زىيانلىق.

باش ساھەسىنى كۆپلەپ ھورلاندۇرۇپ داۋالاش، دائىم قان ئېلىش، ھەددىدىن ئارتۇق ھىجامەت قويۇش، كۈچلۈك مۇسەپل دورىلارنى بېرىش، زۆرۈر بولمىغان قەينى كۆپ قىلىش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى كۆزگە زىيانلىق.



## كۆز كېسەللىكلەرنى داۋالاشتىكى ئومۇمىي قائىدىلەر

كۆز كېسەللىكلەرنىڭ خىللىرى ناھايىتى كۆپ. لېكىن ئالدىنقى قىسىمدا سۆزلەپ ئۆتكەندەك يىغىپ ئېيتقاندا ئۇلارنى 4 چوڭ تۈرگە ئايرىش مۇمكىن. مەسلەن، 1. كۆز مزاجىنىڭ بۇزۇلۇشى (سۈنئىي مزاج) غا تەئەللۇق كېسەللىكلەر، بۇنىڭغا كۆز مزاجىنىڭ مەيلى ماددىسىز ياكى ماددىلىق سەۋەبلەردىن بۇزۇلغان كېسەللىكلەر كىرىدۇ. 2. كۆزنىڭ تەركىبىگە مەنسۇپ كېسەللىكلەر (مەرەزى تەركىب)، مەسلەن: ئالغايلىق، پولىتابىلىق (كۆز پولىتسىيە چىقىش) قاتارلىقلار. 3. كۆز پۈتۈنلۈكىنىڭ بۇزۇلغانلىقى (تەفەرىرۇ قۇلغىتتىسالى) غا مەنسۇپ كېسەللىكلەر، مەسلەن: ھەر تۈرلۈك كۆز زەخمىلىرى ۋە جاراھەتلىرى قاتارلىقلار. 4. كۆزنىڭ ئىششىقلىرىغا مەنسۇپ كېسەللىكلەر.

بۇ تۈردىكى كېسەللىكلەرنى داۋالاشتا قارىمۇ-قارشى داۋالاش ئۇسۇلى ئاساسىي تۇتقا قىلىنىدۇ. يەنى مزاج خاراكتېرلىكلەرنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن كۆزنىڭ مزاجىنى تەكشۈش ۋە يۈتكەش، كېسەللىك ماددىلىرىنى چىقىرىش (ئىستىفراغ قىلىش) يەنى كېسەللىككە سەۋەبچى بولغان كېرەكسىز ماددىلارنى مۇناسىپ يوللار بىلەن تازىلاش لازىم. بۇنىڭدا ئىششىقلارغا چارە-تەدبىر قىلىش، كېسەللىك يۈز بەرگەن ئەزانىڭ شەكلىنى تۈزەشمۇ تەڭ ئېلىپ بېرىلىدۇ.

كۆز كېسەللىكلەرنى داۋالاشتا ئەمەل قىلىشقا تېگىشلىك پىرىنسىپ شۇكى: مېڭىنىڭ مزاجىنى ئىسلاھ قىلىش، تەنقىيە قىلىپ ئۇنىڭدىن كېرەكسىز ماددىلارنى تازىلاش، مېڭە ياكى باشقا ئەزالاردىن كۆزگە قۇيۇلدىغان ماددىلارنى قان ئېلىش، تىلىپ لوڭقا قويۇش، ئىچىنى سۈردۈرۈش، تاماقتىڭ مىقدارىنى ئازايتىپ سۈپىتىنى ياخشىلاش يەنى تېز سىڭىدىغان (لەتئىف) تاماقلار بىلەن ئاز مىقداردا ئوزۇقلاندۇرۇش، ياخشى قان پەيدا قىلىدىغان تاماقلارنى ئىستېمال قىلدۇرۇش، بۇخارات پەيدا قىلىدىغان يېمەك-ئىچمەكلەردىن پەرھىز قىلدۇرۇش، تەس سىڭىدىغان (غەلىب) تاماقلارنى قەتئىي يولۇقتۇرماستىن، سىرتىدىن ھەر خىل زىماد، تىللارنى قوللىنىپ كۆزنىڭ قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش ۋە ئىككىلەمچى پەيدا بولغان مزاجىنى ئۆزگەرتىش قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.





كۆز كېسەللىكلىرىگە باش ئاغرىقى قوشۇلۇپ كەلسە، ئالدى بىلەن باش ئاغرىقىنى داۋالاش بىلەن بىرگە كۆزنىڭ ئەھۋالىغىمۇ ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىش لازىم. ئادەتتە، كۆزدە يۈز بېرىدىغان سۈئي مزاج كېسەللىكلەر نەق يۈز بەرگەن ياكى يۈز بېرىش ئالدىدا تۇرغان بولىدۇ. كېيىنكىسىنى داۋالاش پەيدا بولۇش سەۋەبلىرىنى يوقىتىش ۋە تىزگىنلەش، ئۇنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىن ئىبارەت. مەسلەن، ماددا غالىب كەلگەندە ئۇنى ئىستىفراغ قىلىپ چىقىرىش، خىلىتلار قوزغىلىپ قالماستىنلاشقاندا ئۇنىڭ قىزىقلىقىنى پەسەيتىش قاتارلىقلار. ئالدىنقىسىنى داۋالاشتا ئەگەر، سۈئي مزاجلىق ھالەت پۈتۈنلەي ھاسىل بولۇپ رەسمىي يۈز بەرگەن بولسا، ئۇ ھالدا مۇتلەق ھالدا شۇ مزاجنىڭ قارشىسىغا داۋالاش كېرەك. ئەگەر، ئۇ دەرىجىدە بولماي، بەلكى دەسلەپكى باسقۇچلىرىدا كېتىۋاتقان بولسا، داۋالاشتا تۆۋەندىكى ئىككى تەرەپنى نەزەردە تۇتۇش بىرى، ئالدىنى ئېلىش چارىلىرىنى قوللىنىش؛ يەنە بىرى، قارىمۇ-قارشى داۋالاش كېرەك. ئالدىنى ئېلىشنى قوللىنىشتىكى مەقسەت يېڭىدىن پەيدا بولۇش ئالدىدا تۇرغان تەرەققىياتنىڭ ئالدىنى ئېلىپ سۈئي مزاجلىق ھالەتنى ئولغايتماستىن ئىبارەت. قارىمۇ-قارشى داۋالاشتىكى مەقسەت باشلانغۇچ باسقۇچتىكى سۈئي مزاجنى داۋالاشتىن ئىبارەت. كۆزنىڭ ھەرقانداق سۈئي مزاجلىق كېسەللىرى ماددىسىز (سازەج) ياكى ماددىي سەۋەبلەردىن بولىدۇ. ماددىسىز بولغانلىرىدا ئادەتتىكى تەڭشىگۈچى (مۇئەددىلات) ۋە مزاجنى ئۆزگەرتكۈچى دورىلار ھەم سىرتىدىن يەرلىك ئورۇنغا چاپىدىغان دورىلارنى قوللىنىشلا كۇپايە قىلىدۇ. مزاج ئۆزگەرتكۈچى (مۇبەددىلات) دورىلارنى شۇ مزاجنىڭ قارىمۇ-قارشى ئەھۋالىغا ماسلاشتۇرۇپ ئىشلىتىش لازىم. يېمەك-ئىچمەك ۋە باشقىلارمۇ سەۋەبىنىڭ كۈچلۈك ياكى ئاجىزلىقىغا قاراپ بېكىتىلىدۇ. ئەمما، كۆزنىڭ ماددىلىق سۈئي مزاج كېسەللىرىدە پۈتۈن بەدەندىن ياكى مېڭىدىن ياكى كۆزنىڭ ئۆزىدىن كېسەللىك ماددىسىنى يوقىتىشقا تىرىشىش كېرەك. ماددىي كۆزنىڭ ئۆزىدىن تازىلاشتا باشقا ئەزالاردىن كۆزگە ماددا قۇيۇلمىغان ياكى قۇيۇلۇش ئېھتىمالى بولمىغان بولۇشى كېرەك. بۇنىڭدا بەزىدە يالغۇز ئىستىفراغ قىلىشلا كۇپايە قىلىدۇ. يەنە بەزىدە تەئدىل قىلىشقا يەنى مزاج تەڭشەشكە ئېھتىياج چۈشۈشى مۇمكىن. بەدەندىن كېسەللىك ماددىلىرىنى ئىستىفراغ قىلىش قان ئېلىش، تىلپ لوڭقا قويۇش، ئىچىنى سۈردۈرۈش، قۇستۇرۇش، سۈيۈك ۋە ھەيزنى راۋانلاشتۇرۇش، تەرلىتىش قاتارلىق ئۇسۇللار بىلەن ئېلىپ بېرىلىدۇ. لېكىن،








تەرلىتىش ۋە ھەيدەش ئازراق قوللىنىلىدۇ.

قان ئېلىشتا تۆۋەندىكىلەرگە رىئايە قىلىش لازىم. قان ئالغاندا كەم قانلىق بولماسلىقى كېرەك. ھەمدە بۇنىڭدا يەنە ئىككى ئىشتىن قاتتىق ئېھتىيات قىلىش لازىم. بىرى، قاندىكى ھۆللۈكنىڭ كەملىكىدىن ئىسسىق ماددىلار غەلبە قىلىپ قوزغالغاندا؛ يەنە بىرى، ئىسسىقلىقنىڭ كەملىكىدىن سوغۇق ماددىلار خام قالغان يەنى تولۇق پىشىپ يېتىلمىگەندە قان ئېلىشتىن قاتتىق ساقلىنىش لازىم. تازىلاش (تەنقىيە قىلىش) تا بەزىدە بۇرۇن قاناش، ھەيز ۋە نەفاس قانلىرى راۋانلىشىش، قىل قاتومۇرلار قاناش قاتارلىقلار قان ئېلىشنىڭ ئورنىنى باسدۇ. بۇرۇن قانغاندا كۆزگە يېقىن جايلىرىدىكى ماددىلار چىقىپ كېتىدۇ. بۇرۇن قانتىش ئۆسۈلنى قوللانغاندا كۆزگە قارشى تەرەپتىن يەنى داۋالماقچى بولغان كۆزنىڭ قارشى تەرىپىدىكى بۇرۇننى قاناتسا، مەنپەتى ئانچە بولمايدۇ. ئەمما، ھەيز ۋە نەفاسنىڭ قانلىرى، مەقشەت تومۇرلىرىنىڭ قانلىرى مۇنداق ئەمەس. ساقىن تومۇرىدىن قان ئالغاندىكى مەنپەئەت ھەيز قېنىنىڭ راۋانلىشىشىدىن كېلىپ چىققان مەنپەئەت بىلەن يېقىن دەرىجىدە تۇرىدۇ. باسىلىق تومۇردىن قان ئېلىنسا، كۆز تەرەپتىكى ماددىلارنى نورمال ھالدا پەسكە تارتىش، تۆۋەن تەرەپكە يۈزلەندۈرۈش؛ باشتىن قان ئېلىنسا، بەدەننىڭ يۇقىرى ساھەسىدىكى قانلارنى ئىستىفراغ قىلىش رولىنى ئوينايدۇ. كۆزنىڭ بۇرچىكىدىكى تومۇرلاردىن قان ئېلىنسا، كۆز تولىشىش كېسىلى ۋە سوزۇلما خاراكتېرلىك كۆز ياللۇغىغا مەنپەئەت قىلىدۇ. شۇنداقلا باش ئاغرىقى، شەقىقە (باشنىڭ يېرىمى ئاغرىش) قاتارلىقلار- غىمۇ پايدا قىلىدۇ. پىشانە تومۇردىن قان ئېلىنسا، باشنىڭ ئېغىرلىقى ۋە كۆز ئىمتىلاسى (كۆز كۆپۈشۈپ ماددىلار قېيىپ قېلىشى) غا شىپا بولىدۇ. كۆز كېسەللىكلەرنى داۋالاش مەقسىتىدە قان ئالغاندا ئالدى بىلەن قىفالىق تومۇرىدىن، ئۇنىڭدىن كېيىن باشنىڭ ئەتراپىدىكى تومۇرلاردىن قان ئېلىش كېرەك. باشنىڭ ئالدى قىسمىدىكى تومۇرلاردىن قان ئېلىنسا، ماددىلارنى باشقا ئورۇنغا يۆتكەش؛ باشنىڭ ئارقا قىسمىدىكى تومۇرلاردىن قان ئېلىنسا، ماددىلارنى مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلارغا تارتىپ كېلىش رولىنى ئوينايدۇ. ئەگەر، كېسەللىك كۆزنىڭ ئۆزىدە بولۇپ، ئاغرىقنىڭ بەدەن قۇۋۋىتى يېتىشمە ھەر ئىككى تەرەپتىكى قىفالىق تومۇرىدىن قان ئېلىنسا ناھايىتى ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ. ئەگەر، قىفالىق تومۇرنى تاپالمىسا، ھەبلۇزىراڭ تومۇرىدىن قان ئېلىنسىمۇ بولىدۇ. ئەگەر، ئۇنىمۇ تاپالمىسا ئۆكھەل تومۇرىدىن قان ئېلىش كېرەك. ئەگەر، ئۇنىمۇ تاپالمىسا باسىلىق تومۇرىدىن قان ئالسىمۇ بولىدۇ. لېكىن، تومۇر ئىچىدە قان كۆپ بولۇشى ۋە بىمارنىڭ تەن قۇۋۋىتىنىڭ بەرداشلىق بېرەلىشىنى ئالدىنقى شەرت قىلىش لازىم. ھۆكۈملىرىمىز، كېسەللىك سوزۇلما خاراكتېرگە ئايلىنىپ كەتكەندە پىشانە تومۇرى ۋە كۆز ئىچىكى بۇرچەكلىرىدىكى





تومۇردىن قان ئېلىشنى تەۋسىيە قىلىدۇ.

لوڭقا قويۇپ تەنقىيە قىلىشتا گەجگە ساھەسىنى ئېلىپ لوڭقا قويسلا مەقسەتكە يەتكىلى بولىدۇ. ئىككى پاقالچاق ساھەسىنى تىلپ لوڭقا قويسا، ماددىلارنى تۆۋەنگە تارتىش تەسىرى كۈچلۈك بولۇپلا قالماي، بەلكى دەسلەپكى باسقۇچتىكى كۆز كېسەللىكلەرگە خېلى ئۈنۈمى بار. ئومۇرتقا ساھەسىگە لوڭقا قويلسا، ماددىنى باشنىڭ قوربۇقى تەرىپىگە تارتىش رولىغا ئىگە. ئۇنىڭ كۆزگە پايدىسى ناھايىتى چوڭ. لېكىن، بۇنىڭدا پۈتۈن بەدەننىڭ ئىمتىلاش بولماسلىقى شەرت. چۈنكى، پۈتۈن بەدەندە ئىمتىلاش (توشۇقلۇق) لىق ھالەت بولغاندا، ماددىلارنىڭ باش تەرەپكە تۈرلەش خەۋپى كۆپرەك بولىدۇ. ئىچىنى سۈردۈرۈپ تەنقىيە قىلىش بەزىدە دورا ئىچكۈزۈش، بەزىدە كېلىزما قىلىش ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدۇ. بۇ خىل ئۇسۇل ئارقىلىق ماددىلارنى تۆۋەنگە ھەيدەشنىڭ ئۈنۈمى مېڭە تەرەپتىن ماددىلارنى قوزغىتىش ۋە ئۇنى كۆز تەرەپكە سرغىشىغا قارىغاندا يۇقىرىراق بولىدۇ. شۇڭا، بەزى ھۆكۈمالىرىمىز كېلىزما قىلىش كۆزنىڭ بارلىق ماددىلىق كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ، دەپ قارايدۇ. كۆز كېسەللىكلەرگە ناھايىتى مۇۋاپىق كېلىدىغان سۈرگۈچى (مۇسەھل) دورىلارنىڭ بىرى سېرىق ھەلىلەدۇر. چۈنكى، ئۇ يامان خىلىستلارنى ئىستىفراغ قىلىپ چىقىرىپلا قالماي، بەلكى ئۇ يەنە ئاشقازاننى كۈچلەندۈرۈش، ماددىلارنىڭ يۇقىرىغا تۈرلىشىنى توسۇش رولىغا ئىگە. لېكىن، ئۇنىڭ تەبىئىيىتى قۇرۇق سوغۇق بولغاچقا، ئۆزىنىڭ يىرىكلىكى تۈپەيلىدىن ئىسسىق ماددىلارغا زىيان قىلىدۇ. شۇڭا، ئۇنىڭغا بىرئاز يۇمشاقلىق پەيدا قىلغۇچى دورىلاردىن بىنە فىشىنى قوشۇپ ئىشلىتىش لازىم. بىنە فىشە ئىچىنى سۈردۈرۈشتە يۇمشىتىش سىلىقلاشتۇرۇشتىن ئىبارەت ئالاھىدىلىككە ئىگە. شۇنداقلا ئۇنىڭ ئىچىنى سۈردۈرۈش رولى سىقىپ چىقىرىش ئارقىلىق بولىدۇ. ئەگەر، ھەلىلىنىڭ تەسىرى ئىلگىرى بولۇپ، بىنە فىشىنىڭ سىلىقلاشتۇرۇش خىزمىتىنى بۇزۇپ تەسىرىنى توسۇپ قويسا، بىنە فىشىنىڭ تۈز رولىنى بالدۇرراق تۇتۇشى ئۈچۈن ئۇنىڭ مىقدارىنى كۆپەيتىش كېرەك. ئەگەر، ئىككىلا دورا تۈز رولىنى تۈتەشتە ئاستىلىق قىلسا، ئازراق سەقمۇنيا (مەھمودە) قوشۇپ ئۇلارنىڭ رولىنى كۈچلەندۈرۈش كېرەك. لېكىن سەقمۇنيا ئۆتكۈر بولغانلىقتىن ئۇنى كەترا، رۇبۇسۇس قاتارلىقلار بىلەن ئىسلاھ قىلىش كېرەك. كۆز ۋە مېڭىنىڭ ماددىلىرى گەرچە ئىسسىق بولسىمۇ، لېكىن يەنىلا بەزىدە ئارىلاشما بەلغەمدىن خالى بولالمايدىغانلىقى ئۈچۈن، توربۇتنى ئىشلىتىشىمۇ مۇۋاپىق كېلىدۇ. ئەمما، توربۇتنىڭ كۈچى ئاجىز بولغاچقا ھازارەت ئېشىپ كەتمىگەن ئەھۋال ئاستىدا ئۇنى زەنجىپىل ئارقىلىق كۈچلەندۈرۈش كېرەك. ئەگەر، موخرىج دورىلارنىڭ زىيان قىلىش ئېھتىمالى بولسا، مۇقەل ئەزەق ناھايىتى مۇۋاپىق كېلىدۇ.





ئەگەر، ماددىلار قويۇق بولسا، ئىيارە جى فەيقەرانى قوشۇپ ئىشلىتىش كېرەك. چۈنكى ئۇ، ماددىلارنى يۇقىرى تەرەپتىن تۈۋەنگە چۈشۈرۈش رولىغا ئىگە. ئەگەر، ماددىلار بەك قويۇق بولسا، ھەببى ئىيارە جى ناھايىتى ياخشى تەسىر قىلىدۇ. بەزىدە ماددىلار بەك قويۇق بولسا، دورا يۆتكەپ ئىشلىتىش مەقسىتىدە ئارىلاپ يەنە ئىيارە جى لوغازىيا ياكى ھەببى قوقىيالارنى نۆۋەتلەشتۈرۈپ ئىشلىتىشكەمۇ بولىدۇ. ئەگەر، ماددىلار بەك سۇيۇق بولسا، ئاچچىق ۋە تاتلىق ئانارلارنىڭ سۇلىرىنى سىقىپ ھەلىيلە ۋە شېكەر بىلەن قوشۇپ بەرسە ناھايىتى ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ. يەنە بەزىدە توربۇت، مەھمۇدە (سەقمۇنىيا) قوشسىمۇ بولىدۇ. يەنە شۇنىڭدەك ئەينولا، چىلان، گىلاس (ئالۇبالى) ۋە تۈرۈكلەرنىڭ ھەر قايسىدىن 20 تال، سانا، گۈل بىنەفشە، سېرىق ھەلىيلە ۋە ئاقەلىلى تۇرۇقىنىڭ ھەر قايسىسىنى 10 گرامدىن ئېلىپ چىلاپ تاتلىقنى چىقىرىپ شېكەر بىلەن ئىستېمال قىلدۇرۇش كېرەك. يۇقىرىقى نۇسخىغا 30 گرام خىيارى شەنبەر قوشسا دورىنىڭ كۈچىنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ. تۇڭا يەنە ئازراق بادام يېغى قوشۇپ قويسىمۇ بولىدۇ. يەنە بەزىدە مەتبۇخى فەۋاككەھ (مېۋە-چېۋىلەر قاينىتىلمىسى) بېرىشكەمۇ توغرا كېلىدۇ. بەزىدە، تۈرۈكنىڭ ئورنىغا سەرپىستان ئىشلىتىلىدۇ، يەنە بەزىدە رەۋەندىن 15 گرام، سەقمۇنىيادىن 1 گرام قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ. ماددا سەۋداغا يۈزلەنگەن بولسا، يۇقىرىقى مەتبۇخنىڭ تەركىبىگە ئەقىمۇندىن 10 گرام، بىستىپايە جىدىن 10 گرام قوشۇلىدۇ. ھەمدە تۇڭا يەنە بىر بېرىم گرام ھەجەرى ئەرمەنى قوشۇش ئارقىلىق دورا كۈچى ئاشۇرۇلىدۇ. سوغۇتۇش ۋە تەبىئەتنى يۇمشىتىش مەقسىتىدە چىلانما (نوقۇ) لاردىن تۇقۇنى مۇقەۋۋىنى ئىشلەتكەندىن كېيىن ھەلىيلە ئېلىۋېتىلىدۇ. ئەھۋالغا قاراپ گۈل بىنەفشە، سانا ياكى سانانىڭ يالغۇز تۈزىلا ئېلىپ تاشلىنىدۇ. ھەمدە تەبىئەتنى يۇمشاتقۇچى سوغۇق تەبىئەتلىك شەرىپە تەلەردىن شەرىپتى گىلاس، بىنەفشە شەرىپتى ياكى نىلۇفەر شەرىپتى قوشۇپ ئىستېمال قىلدۇرۇلىدۇ. يەنە بەزىدە، ئىچىنى بوشاشتۇرغۇچى ۋە سۈرگۈچى پىلىكچە (شامچە) ۋە كېلىزىملارنى ئىشلىتىشكەمۇ توغرا كېلىدۇ. پىلىكچە نۇسخىسى: مۇۋاپىق مىقداردىكى شېكەر ئازراق تۈز ۋە توغرىغۇ بىلەن قىيام قىلىپ شامچە قىلىنىدۇ. بۇنىڭدىنمۇ كۈچلۈكرەك يەنە بىر نۇسخە: سانا، گۈل بىنەفشەنىڭ ھەر بىرىدىن 1 گرام ئېلىپ، ئازراق سەقمۇنىيا قوشۇپ تەييارلىنىدۇ. يەڭگىلەرەك كېلىزما نۇسخىسى: ئارپا سۈيى (ماتۇششەئىس) 100 گرام، قىزىلچا سۈيى (چوغەندەن) 30 گرام، خىيارى شەنبەر 30 گرام، كۈنجۈت يېغى ۋە شېكەرلەرنىڭ ھەر بىرىدىن 45 گرام ئېلىپ قائىدە بويىچە تەييارلاپ كېلىزما تەييارلىنىدۇ. قوستۇرۇش گەرچە ماددىلارنى تەنقىيە قىلىپ تازىلاشقا پايدىلىق بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ زىيانلىق تەرىپى كۆپ، چۈنكى ئۇ ماددىلارنى قوزغىتىپ قويدۇ. ھەيدەش يەنى



سۈيۈك ياكى ھەيزنى راۋان قىلىش ۋە تەرلىتىش ئۆسۈللىرى كۆپىنچە ھاللاردا قاننىڭ سۈيۈك بۇتۇن بەدەنگە تارقىلىپ كۆزگە غالىب كەلگەندە قوللىنىلىدۇ.

مېڭىدىن كېسەللىك ماددىلىرىنى ئىستىفراغ قىلىش: مېڭىدىن ماددىلارنى تەنقىيە قىلىش مۇسھىل دورىلار ئارقىلىق ئومۇمىي بەدەننى تەنقىيە قىلىپ بولغاندىن كېيىن ھەببى ھەلىلىگە ئوخشاش دورىلارنى ئىستېمال قىلدۇرۇش؛ كېسەللىك ماددىسى ئىسسىق دەپ قارالغاندا ئىككى چېكىسىگە زۈلۈك قۇرۇتى قويۇش، ماددىسى سوغۇق ياكى مۇرەككەپ دەپ قارالغاندا ھەببى ئىبارەت، ھەببى شەبىيار ۋە ھەرخىل تېپتىكى ئىتريفىلارنى ئىستېمال قىلدۇرۇش ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدۇ. يەنە شۇنىڭدەك، سىرتقى جەھەتتە بۇرۇنغا سەئوت ۋە ئەتۇس (چۈشكۈرتكۈچى) دورىلارنى ئىشلىتىش ئارقىلىقمۇ ئېلىپ بېرىلىدۇ.

كۆزنى ئىستىفراغ قىلىش: كۆزنىڭ تۈزىدىكى كېسەللىك ماددىلىرىنى تازىلاش ماددىنى كۆز تەرەپتىن قايتۇرۇش ياكى تارتىپ كېلىش ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدۇ. ماددىنى قايتۇرۇش ياكى توسۇشتا ئەگەر، بەدەن توشۇق (ئىستىلا) لىق ھالەتتە بەدەننى پۈتۈن بەدەنگە ماددىلار توشۇپ قېيىپ قالغان بولسا، دەسلەپتە ئومۇمىي بەدەندىن قايتۇرۇلۇدۇ، بۇنىڭدا بەدەندە قايسى خىلىنىڭ غالىبلىقى نەزەردە تۇتىلىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن، مېڭىگە خاس تەنقىيە دورىلىرى ئارقىلىق مېڭە تەنقىيە قىلىنىدۇ. ئاخىرىدا مەخسۇس داۋالماقچى بولغان ئەزا كۆز تەنقىيە قىلىنىدۇ. كۆزنى تەنقىيە قىلىش ئۇنىڭدىكى كېسەللىك ماددىسىنى يۆتكەش ۋە ئۇنى باشقا تەرەپكە يۈزلەندۈرۈش، بۇرۇن يولى ياكى قاشلاردىكى تومۇرلار، مەسىلەن: ماقەين تومۇرلىرىغا ئوخشاش تومۇرلاردىن چىقىرىش ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدۇ. كۆز تەرەپتىن ماددىلارنى تارتىش ياش ئاققۇزغۇچى ۋە پارلاندۇرۇپ تارقاقچى دورىلار ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدۇ. ھۆكۈمالىرىمىزنىڭ ئېيتىشىچە كۆزنىڭ ماددىلىق كېسەللىكلىرىدە كېسەللىك مەيلى ئەسلىي (بىرلەمچى) ياكى شىركىي (ئىككىلەمچى) بولسۇن، ئەتۇس (چۈشكۈرتكۈچى) ۋە ياش ئاققۇزغۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش، شۇنداقلا كۆزنىڭ بۇرچىكى ۋە پېشانىدىكى تومۇرلاردىن قان ئېلىش، بولۇپمۇ ئومۇمىي بەدەن ۋە مېڭىنى تەنقىيە قىلىپ بولغاندىن كېيىن قان ئېلىش ماددىنى كۆزدىن باشقا تەرەپكە تارتىش كۆزنى تەنقىيە قىلىش ۋە كۆزنىڭ ماددىلىق كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتىكى چوڭ تۇنقىدۇر. كۆزنىڭ ماددىلىق كېسەللىكلىرىدە كېسەللىك ماددىسىنى كۆز تەرەپتىن باشقا ئەزالارغا يۆتكەشكە توغرا كەلسە ھەمدە ماددا كۆزگە قۇيۇلۇش ئالدىدا تۇرغان بولسا، ماددىنى يۆتكەشكە مۇۋاپىق كېلىدىغان ئەڭ ياخشى ئەزا بۇرۇندۇر. شۇڭا، بۇنىڭدا ھەرخىل ئەتۇس ۋە نەشۇق دورىلار بۇرۇنغا تارتىلىدۇ. يېمەك-ئىچمەكلىكەر كەمرەك ئىستېمال قىلدۇرۇلىدۇ، تەستە سىڭىدىغان غەلىز تاماقلار ۋە يەل، بۇخارات پەيدا قىلىدىغان تاماقلاردىن پەرھىز



قىلدۇرۇلدى. مانا بۇ، كۆز ماددىلىرىنى ئىستىفراغ قىلىدىغان ئۆسۈملۈكلەرنىڭ بىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئەگەر، ماددا باشقا ئەزادىن كۆز تەرەپكە قويۇلسا، شۇ ئەزانىمۇ تەنقىبە قىلىش ۋە ئۆزىگىمۇ چارە-تەدبىر قىلىش لازىم. ئەگەر، كۆزنىڭ ماددىسى قويۇق ۋە سۇيۇق ياكى يەل خاراكىتىلىك بولسا، ئالدى بىلەن مۇناسىۋەتلىك مۇسەھل دورىلىرى ئارقىلىق ئومۇمىي بەدەن تەنقىبە قىلىنغاندىن كېيىن ھەببى ئىبارەت ياكى ھەببى قوقىلار بىلەن مېگە مەخسۇس تەنقىبە قىلىنىدۇ. ئۆزىدىن كېيىن قالدۇق ماددىلار يۇقىرىدىن تۆۋەنگە تارتىلىدۇ ھەمدە كۆز شۇمىشە سۈيى ۋە يېڭى سۈتلەر بىلەن يۇيۇلىدۇ. ماددىلارنى تەنقىبە قىلىپ كۆزنى تازىلاپ بولغاندىن كېيىن مۇۋاپىق دورىلار كۆزگە تارتىلىدۇ ۋە ئاغرىق مۇنچىغا چۈشۈرۈلىدۇ. ئەگەر، كېسەللىك ماددىسى قانغا ياكى سەپراغا ئارىلاشقان سۇيۇق ماددا بولسا، قان ئېلىپ بولغاندىن كېيىن مۇسەھل دورىلىرى بېرىلىدۇ. ئۆزىدىن كېيىن باش تەرەپتىن ماددىلارنى تارتىپ كېلىشكە چارە قىلىنىدۇ. ئاخىرىدا كۆزنى رەسمىي داۋالاشقا تۇتۇش قىلىنىدۇ. دېمەك، كۆز كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتا تەنقىبە قىلماي تۇرۇپ داۋالاش ئېلىپ بېرىشقا يەنى مەخسۇس كۆز كېسەللىكلىرىنىڭ دورىسىنى ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. سىرتىدىن ئىشلىتىدىغان دورىلارمۇ ھەم شۇنداق. سىرتىدىن ئىشلىتىدىغان دورا تارقاقچى دورا بولسا ئىشلىتىشكە تېخىمۇ بولمايدۇ. بىراق، يەڭگىل ۋە ئاسان چارىلار بولسا زۆرۈر تېپىلغاندا قوللانسا بولىدۇ. يەل خاراكىتىلىك كۆز كېسەللىكلىرىدە مۇنچىغا چۈشۈرۈش، تارقاقچى ۋە پارلاندىرغۇچى نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلدۇرۇش ناھايىتى پايدىلىقتۇر.

ئەگەر، كېسەللىك ماددىسى قاندىن بولغان بولسا قان ئېلىنىشلا كۆپايە قىلىدۇ، باشقىچە تەنقىبە قىلىش ھاجەتسىز. بەزىدە ھەرقانچە قان ئالسىمۇ قاننىڭ بەك قويۇقلۇقى ۋە كۆز تومۇرلىرىنىڭ بەك توشۇقلۇقى تۈپەيلىدىن تومۇرلاردىكى توشۇق (ئىمتلات) لىق ھالەت پەسەيمەيدۇ. مۇنداق چاغدا مۇنچىغا چۈشۈرۈش، مۇنچىدىن چىقىپلا لەتىف ۋە سىڭىشلىك تاماق ئىستېمال قىلىش ناھايىتى مەنپەئەت قىلىدۇ. شۇنداقلا، ئىبارەتچى فەيقرە ۋە ھەببى قوقىلارنى ئىستېمال قىلدۇرۇش ناھايىتى پايدىلىق. شىياقى ئەھمەرلەينى ئىچىش، تارقاقچى زىمادىلارنى ئىشلىتىشكە چارىلارمۇ قويۇق قاننى سۇيۇلدۇرىدۇ. مۇنچىدىن چىقىپلا ئازىراق شاراپ ئىچىشىمۇ پايدا قىلىدۇ. تەنقىبە قىلىش (تازىلاش) ۋە باشقا توغرا چارە-تەدبىرلەرمۇ نەتىجە بەرمىسە، كۆزدە يامان سۈپەتلىك مزاج بۇزۇلۇش (سۈنئىي مزاج رەددى) نىڭ بارلىقى ياكى كۆزدە يوشۇرۇن يامان سۈپەتلىك ماددىلارنىڭ بارلىقى ھەمدە ئۇلارنىڭ كۆزنىڭ ئوزۇقلۇقىنى بۇزۇۋاتقانلىقىدىن گۇمانلىنىش لازىم ياكى مېڭىنىڭ ئاجىزلىغانلىقىنى پەرەز قىلىش كېرەك. دېمەك، مېگە ئاجىزلىغاندا نەزلە سۇيۇقلۇقلىرى





مېڭە تەرەپتىن كۆزگە قاراپ ماڭغان بولىدۇ. بۇ، كۆزنى تەنقىيە قىلىشقا زىيانلىق. بەزىدە، كۆزدە ھېچقانداق ئىشلىق ئالامىتى ئاشكارە بولماي تۇرۇپلا كۆز تەرەپكە ماددىلارنىڭ داۋاملىق قويۇلغانلىقى تۈپەيلىدىن داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولمايدۇ. ئەگەر، بۇ ماددا مېڭە ياپمىسىنىڭ سىرتقى پەردىسىدىن كەلگەن بولسا، باش ۋە چېكە ھەمدە بەدەندىكى تومۇرلاردىن قان ئېلىش، چېكە ساھەسىگە داغ قويۇش كېرەك. پېشانىگە كۈمۈش لوڭقا ۋە زۈلۈك قۇرۇتى قويۇشمۇ پايدا قىلىدۇ. پېشانىگە كۈچلەندۈرگۈچى ۋە ماددىلارنى قايتۇرغۇچى زىمادىلارنى چېپىشمۇ پايدىلىق. ماددىلارنى كەينىگە قايتۇرۇشتا ئىسسىقلىقتىن بولغانلىرىغا قوغۇن پوستى، سوغۇقتىن بولغانلىرىغا قەلئە دېيىس ئىشلىتىلىدۇ. ئەگەر، كېسەللىك ماددىسى باش ياپمىسىنىڭ ئىچكى تەرىپىدىن كەلگەن بولسا، قان ئېلىش ۋە ئىچىنى سۈردۈرۈش ئارقىلىق مېڭە تەنقىيە قىلىنىدۇ ھەمدە ئۈنۈمدىن باشقا يەنە مۇناسىپ دەپ قارالغان چارە-تەدبىرلەرنى قوللىنىش ئارقىلىق تازىلاش ئېلىپ بېرىلىدۇ. ئۈنۈمدىن باشقا «سەبەل» كېسەللىكىدە بايان قىلىنىدىغان چارە-تەدبىرلەرنى قوللانسا بولىدۇ.

كۆزنىڭ ماددىلىق كېسەللىكلىرى ئادەتتە، 1. كۆزنىڭ مزاجى ئاجىزلاپ كەتكەنلىكى ھەتتا مېڭىدىن كەلگەن ماددىلارنى دەقىقى قىلالماي، بەلكى قويۇل قىلىش دەرىجىسىگە چۈشۈپ قالغانلىقى، 2. كۆز مزاجىنىڭ مېڭە، ئاشقازان ۋە باشقا ئىچكى ئەزالار مزاجىغا قارىغاندا ئاجىزلاپ كەتكەنلىكىدىن ئۈنۈم ئىچكى ئەزالاردىن ئۆرلىگەن بۇخارلارنى ۋە مېڭە دەقىقى قىلغان كېرەكسىز ماددىلارنى قويۇل قىلغانلىقى، 3. بەدەندە ناچار خىلىتلارنىڭ كۆپەيگەنلىكى، 4. كۆزدىكى قۇۋايى غازىيەنىڭ ئاجىزلىغانلىقىدىن ئۆزىگە كەلگەن ئوزۇقلۇقلارنى ياخشى ھەزىم قىلالماي ئۆزىدە ئارتۇقچە ماددىلارنىڭ توپلاپ قويغانلىقى، 5. خىلىتلارنىڭ كۆز تەرەپكە كېلىدىغان يوللىرى كېڭىيىپ كەتكەنلىكىدىن ماددىلارنىڭ كۆپلەپ كۆزگە قاراپ ئاققانلىقى، 6. كۆزدىكى كېرەكسىز ماددىلار ئېقىپ چىقىدىغان يوللارنىڭ تارىيىپ كەتكەنلىكىدىن تاشلاندىۇقلارنىڭ كۆزدە تۇرۇپ قالغانلىقى، 7. كۆزنىڭ ئورنى مېڭىنىڭ ئاستىغا جايلاشقانلىقى تۈپەيلىدىن ئۆزلەشمىگەن تاشلاندىۇقلارنىڭ ئۈزلۈكسىز كۆزگە قويۇلغانلىقى قاتارلىقلاردىن كېلىپ چىققاچقا، كۆز تېۋىپى كۆز كېسەللىكلىرىنىڭ مۇشۇ سەۋەبلەرنىڭ قايسى بىرىدىن بولغانلىقىغا دىققەت قىلىشى، تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ ئالدى بىلەن كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى سەۋەبىنى تۇرمۇزلىشى ۋە ئۇنى چەكلەشكە ماھىر بولۇشى لازىم.

كۆزنىڭ تۈزۈلۈشىگە ئائىت كېسەللىكلەرنى داۋالاش كۆزنىڭ شەكلىنى تۈزەش، كۆزنىڭ زاپچاسلىرىدىكى ھەر خىل ئاپەتلەرگە چارە-تەدبىر قىلىش قاتارلىقلارنى ئۆز





ئىچىگە ئالىدۇ. ئۇ بۇلار يۇقىرىدا ئېيتىپ ئۆتۈلگەندەك قان ئېلىش ۋە ئىستىفراغ قىلىش ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلغاندىن سىرت ھەر خىل ئۆسۈل-چارە ئامىللار ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدۇ. كۆزنىڭ پۈتۈنلۈكى بۇزۇلغان (تەفەررۇقولىستىتسالى) كېسەللىكلەرگە چارە-تەدبىر قىلىشتا قۇرۇتۇش خۇسۇسىيىتى تۆۋەن ھەمدە غىدىقلاش تەسىرى بولمىغان دورىلار ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن، سۈرمە، زەئەفەر، توتيا، ئوپا (سەفىداب)، شادەنەج، سەبرى قاتارلىقلار. چۈنكى كۆزنىڭ مزاجى بىلەن ئوخشاش بولغان ھەر قانداق دورا كۆزگە زىيان قىلىدۇ. يەنى كۆزنىڭ مزاجى ھۆل بولسا، قىلىدىغان دورىمىز ھۆل بولسا زىيان قىلىدۇ، ئەلۋەتتە. لېكىن يۇقىرىقى دورىلاردا كۆزنىڭ مزاجىغا ئازراق بولسىمۇ قارىمۇ-قارشى كېلىدىغان تەبىئەت بولغاچقا كۆزگە يەنىلا پايدا قىلىدۇ. يۇقىرىدا ئېيتىپ ئۆتكەندەك كۆزنىڭ مزاجى ئومۇمەن ھۆل ئىسسىق دورا، شۇڭا كۆپىنچە ھاللاردا كۆزگە ھۆلۈك يەتكۈزۈۋالغان دورىلارنىڭ ھەممىسى كۆزگە زىيان قىلىدۇ. شۇڭا، كۆزگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار قانداق دورا بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر ئۆزىگە سۇيۇقلۇق كەمرەك بولۇشى ھەمدە كۆزنى غىدىقلىمايدىغان ۋە چاقمايدىغان بولۇشى لازىم. شۇنداقلا ئۇ كۆزنى كۆچلەندۈرۈش رولىنى ئوينىيالايدۇ. ھەر قانداق بىر ئەزا كۈچلۈك بولىدىكەن ئۇ كېسەللىكنىڭ ھۇجۇمغا ئاقابىل تۇرالايدۇ. ھەمدە باشقا تەرەپتىن كەلگەن كېسەللىك ۋە يات ماددىلارنى ئۆز كۈچى ئارقىلىق دەفىئى قىلىپ، ئۆز-ئۆزىنى قوغدىيالايدۇ. شۇڭا كۆز كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتا كۆزنىڭ مزاجىغا زىيان قىلىدىغان دورىلارنى ئىشلىتىشتىن قاتتىق ساقلىنىش لازىم. مانا بۇ كۆز كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتا رىئايە قىلىشقا تېگىشلىك چوڭ تۇتقىدۇر.

## كۆز دورىلىرى

كۆز دورىلىرىنىڭ بىر قىسمى كۆزنىڭ مزاجىنى ئۆزگەرتكۈچى دورىلاردۇر. كۆزنى سوۋۇتقۇچى دورىلار: ئىت ئۈزۈمىنىڭ سۈيى، كاسىن سۈيى، ئۆسۈڭ سۈيى، قىزىلگۈل سۈيى، ئىسبە غۇل لۇئايى ۋە توخۇ توخۇمىنىڭ ئېقى قاتارلىقلاردۇر. كۆزنى قىزىتقۇچى دورىلار: ئىپار، قارامۇچ، ئىگىر، مامرانچىنى قاتارلىقلاردۇر. كۆزدىكى ئارتۇقچە سۇيۇقلۇقلارنى قۇرۇتقۇچى دورىلار: توتيا، سۈرمە، ئىقلىما قاتارلىقلاردۇر. كۆزنى قورۇغۇچى قابىز دورىلار: شىياڧى مامبىشا، سەبرى، فېلىزە ھەرەج، قىزىلگۈل، زەئەفەر قاتارلىقلاردۇر. كۆزنى





يۇمشاتقۇچى، موبەيسىن دورىلار: سۈت، سوقۇلغان بادام مېغىزى، توخۇ توخۇمىنىڭ ئېقى، بېھى ۋە ئاقەلىلى تۇرۇقىنىڭ لۇئابلىرى چۈجە ۋە باچكىنىڭ قېنى قاتارلىقلاردۇر. كۆزدىكى ماددىلارنى شورغۇچى (مۇنزىج) دورىلار: ھەر خىل يىلتىز دورىلار، شۇمىشا سۈيى، زەئەفەر، مەيفۇختەج قاتارلىقلاردۇر (نان چىلانغان مەيفۇختەجنىڭ تەسىرى كۈچلۈكرەك). كۆزدىكى ماددىلارنى پارالاندۇرۇپ تارقاققۇچى دورىلار: ئەزەرۇت ۋە بادىيان سۈيى قاتارلىقلاردۇر. كۆزنىڭ سېزىمىنى يوقاتقۇچى دورىلار: بىلادوننا (لۇققاھ)، لوفقاھنىڭ سىقىلغان سۈيى، خەشخاش ۋە ئەپيۇن قاتارلىقلاردۇر. دېمەك، كۆزنىڭ دورىلىرىنى 7 تۈرگە يىغىنچاقلاشقا بولىدۇ.

1. قورغۇچى (قابىز) دورىلار: بۇ يەنە 2 خىلغا بۆلۈنىدۇ. بۇنىڭ بىرى، قابىزلىقى مۆتىدىلراق بولۇپ، ئۇلار قىزىلگۈل ۋە ئونىڭ ئوسارسى (سىقۇپلىغان سۈيى) ۋە تېكە ساقىلى ئونىڭ سىقىلمىسى، مامىشا، سۇنبۇل، زەئەفەر، سازەج ھىندى قاتارلىقلاردۇر. بۇ خىلدىكى قابىز دورىلار كۆزنىڭ بارلىق ئەزالىرى ساق ۋە كۈچلۈك، كۆرۈش قۇۋۋىتىمۇ تۈتكۈر بولغان ئەھۋال ئاستىدا پەقەت كۆزدىكى ياشنى توختىتىش مەقسىتىدەلا ئىشلىتىلىدۇ.

2. پۇشۇرغۇچى دورىلار: يەنى ماددىلارنى پۇشۇرۇپ تەنقىيە قىلىپ چىقىرىش سالاھىيىتىگە كەلتۈرگۈچى دورىلار ۋە پارالاندۇرۇپ تارقاققۇچى دورىلاردۇر. ئۇلار شۇمىشا سۈيى، ھوزۇزھىندى (روسۇت ھىندى)، مىلتىق دورىسى، ئەزەرۇت، ئىككىمىلىك، قۇندۇز قەھرى، كۈندۈز، زەئەفەر ۋە مورمەككى قاتارلىقلاردۇر. مورمەككىنىڭ قۇرۇتۇش، سۇيۇقلۇقلارنى شۇمۇرۇش تەسىرى ھەممىدىن كۈچلۈكرەك. زەئەفەر قابىز ۋە تۇتۇش رولىغا ئىگە بولۇش بىلەن بىرگە پۇشۇرغۇچى (مۇنزىج) ۋە يۇمشاتقۇچى (مولەيسىن) تەسىرىگە ئىگە. كۈندۈز پۇشۇرغۇچى ھەم قىزىتقۇچىدۇر. يۇقىرىدىكى دورىلار كۆزنىڭ ئىششىقلىرى، مۇدۇر چاقىلىرى ۋە يارىلىرىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلسە ئۇلاردىكى قويۇق سۇيۇقلۇقلارنى پارالاندۇرۇپ تارقىتىش، يىرىڭلارنى يوقىتىش، تەبەقەئى قەرنىيەنىڭ كەينىدە يىغىلىپ قالغان يىرىڭ ۋە سۇيۇقلۇقلارنى يوقىتىش ۋە تارقىتىش رولىنى ئوينايدۇ.

3. سېزىمىنى يوقاتقۇچى ۋە مەس قىلغۇچى دورىلار: لوفقاھ (شەۋكران)، ئەپيۇن، خەشخاش قاتارلىقلاردۇر. بۇ خىل دورىلارنى كۆزگە ئىشلىتىشتە ناھايىتى ئېھتىيات قىلىش كېرەك. ئاغرىق بەك قاتتىق كۈچەيگەن، ھارارەت ۋە كۆيۈشۈش يۇقىرى دەرىجىگە چىققانغا ئوخشاش كۈچلۈك ئېھتىياج چۈشكەن ئەھۋال ئاستىدەلا ئاندىن ئۇلارنى ئىشلىتىش كېرەك.

4. ئېچىلىپ قالغان يوللارغا توسالغۇ پەيدا قىلىپ ئېتىدىغان ۋە چاپلاشتۇرۇپ تۇتاشتۇرىدىغان دورىلار: بۇ دورىلارمۇ 2 خىلغا بۆلۈنىدۇ. بىرى، قۇرۇق ۋە چۆرۈك بولۇپ ئىقىلمىيا، سەقىداپ (تۇپا)، يۇيۇلغان تۇتىيا، كۆيدۈرۈلگەن قەلەي، گۈلى شاموس ۋە نىشاستە قاتارلىقلاردۇر. بۇ خىلدىكى دورىلار ئارتۇقچە سۇيۇقلۇقلارنى ئازايتىدۇ،







كۆز ياشاڭغۇراش كېسىلىنى داۋالايدۇ. بولۇپمۇ كۆزنىڭ يارا ۋە يىرىڭلىق چاقىلىرىغا ناھايىتى مۇۋاپىق كېلىدۇ. لېكىن، بۇ دورىلارنى ئىشلىتىشتە ئالدى بىلەن تازىلاش ئېلىپ بېرىلغان بولۇشى شەرت. زۆرۈر تېپىلسا تەبەقەئى قەرنىيەنىڭ يارىلىرىدا ئىستىقراغ قىلىشتىن ئىلگىرى ئىشلىتىشكەمۇ بولىدۇ. يەنە بىرى يۇمشاق، چاپلاشقاق ۋە ھۆللۈك تەرەپتىكى دورىلار بولۇپ، بۇ دورىلارنى ئىشلىتىشتە تۆۋەندىكى 4 تەرەپ نەزەردە تۇتىلىدۇ: (1) مەزكۇر دورىلارنىڭ ئېچىشتۇرۇش ۋە كۆيدۈرۈش تەسىرى بولمىغانلىقى، (2) كۆزگە ئىشلىتىلدىغان ئاساسىي دورىلارنى كۆزدە تۇزۇنراق تۇرغۇزۇشتا رولىنىڭ چوڭلۇقى (مەسىلەن: چاپلاشقاق دورىلاردىن كەترا، سەمغى ئەرەبى، نىشاستە قاتارلىقلار مۇناسىۋەتلىك كۆز دورىلىرىغا قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ)، (3) كۆزگە ئىشلەتمەكچى بولغان تاش ۋە توپراق جىنىسلىق دورىلار كەلتۈرۈپ چىقارغان. بولۇپمۇ كۆز كېسەل مەزگىللەردە پەيدا بولىدىغان يامان تەسىرنى دەقى قىلالايدىغانلىقى (بۇنىڭدا ئاساسەن يۇمشاق دورىلار قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ)، (4) ئىسسىق ۋە ئۆتكۈر ماددىلاردىن پەيدا بولىدىغان يىرىكىلىك ۋە غىدىغلىنىشنى يوقىتالايدىغانلىقى بۇنىڭدا يۇمشاق ۋە ئوچۇچان (لەتىف) دورىلار قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: ئاياللارنىڭ سۈتى، توخۇ تۇخۇمنىڭ ئېقى قاتارلىقلار).

5. يول ۋە كانالچىلارنى ئاچىدىغان دورىلار: بۇلارمۇ 2 خىلغا بۆلۈنىدۇ. بىرى، ئىگىر، دارچىن. فەرفىيۇن، ھىڭ ۋە سەكبىنەج قاتارلىقلار بولۇپ، ئۇلار مۇزىج (پۇشۇرغۇچى) ۋە مۇھەللىل (پارلاندۇرۇپ تارقاقچى) دورىلارنىڭ تەسىرى تەبەقەئى قەرنىيەنىڭ ئارقا تەرىپىگە يېتىپ بارمىغان ئەھۋال ئاستىدا ئىشلىتىلىدۇ. چۈنكى، بۇ خىلدىكى دورىلارنى ئاساسىي دورىلارغا ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلەتكەندە مەنپەز (يول) لەرنى ئېچىپ دورىلارنى تېگىشلىك جايلارغا باشلاپ بارىدۇ. يەنە بىرى، بەك ئىسسىق ۋە يىرىكىلىك پەيدا قىلغۇچى دورىلار بولۇپ، ئۇلار كۆزگە سۇ چۈشۈش (نۇزۇلۇلما) كېسەللىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش رولىغا ئىگە.

6. يەپ يوقاتقۇچى دورىلار: بۇلارمۇ 2 خىل بولىدۇ. بىرى، يارنىڭ قاقچ ۋە كىرلىرىنى يۇقاتقۇچى ۋە تازىلىغۇچى دورىلاردۇر. مەسىلەن: ئىقلىمىيائى كۈندۈر ۋە سەبىرى قاتارلىقلار. يەنە بىرى كۆزدىكى پەردە (سەبەل)، قۇتۇر ۋە تىرناقچە ئۆسۈكچىلەرنى يۇقاتقۇچى ۋە تازىلىغۇچى دورىلاردۇر. مەسىلەن: ئۆشۈدۈر، قەلقەتار، مىس دېتى ۋە كۆيدۈرۈلگەن مىس قاتارلىقلار.

7. ئوقۇنەت پەيدا قىلغۇچى، چىرتكۈچى دورىلار ۋە كۆيدۈرگۈچى، يىرىكلەش-تۈرگۈچى دورىلار، مەسىلەن: زەرنىخ، زەنگار قاتارلىقلار. بۇ خىلدىكى دورىلار كۆزگە چۈشكەن قاتتىق بەز، سوزۇلما خاراكتېرلىك قوتۇر ۋە قاقچىلارنى يوقىتىپ تازىلايدۇ.



## كۆز دورىلىرىنى تەييارلاشتا بىلىشكە تېگىشلىك ئىشلار

1. كۆزگە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار ئۇيغۇر تىبابىتىدىكى باشقا دورىلارغا ئوخشاشلا مەدەنىيات، ئۆسۈملۈكلەر، ھايۋاناتلاردىن ئېلىنىدۇ ۋە ئۇلاردىن تۈزىگە خاس ھەر خىل شەكىلدىكى دورىلار ياسىلىدۇ، مەسىلەن: سۈرمە، سېپىلما ۋە شىياققا ئوخشاشلار. لېكىن، ئۇلار ھەر خىل زىيانلىق كەپپىياتلاردىن خالى بولۇشى شەرت. بۇ ياسالمىلار قىيامى (قويۇق-سۇيۇقلۇقى)، كەپپىياتى ۋە باشقا جەھەتلەردىكى ئوخشاشماسلىقىغا مۇناسىپ ھالدا ئۇلارنىڭ ئىشلىتىش يوللىرىمۇ ئوخشاشمايدۇ. مەدەنىيات دورىلار كۆز جىيەكلىرىنىڭ ئۈزلۈكسىز ھەرىكەتلىنىپ تۇرۇشى سەۋەبلىك ھەمدە ئۆزىنىڭ يىرىكىلىكى تۈپەيلىدىن كۆپىنچە ھاللاردا كۆز يۇمىلىقىغا يامان تەسىر كۆرسىتىدۇ. شۇڭا، بۇ دورىلارنى ئىنتايىن يۇمشاق سۇقۇپ، ئادەتتىن تاشقىرى دەرىجىدە سالاپە قىلىش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇلارنى تۈپەندەك سوقۇپ، قېلىن ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈش ياكى سۇ بىلەن سۈزۈلدۈرۈش چارىلىرى قوللىنىلىدۇ، مەسىلەن: توتيا، شادەنەج، مەرەششا ۋە ئەسىمد قاتارلىقلار. يەنە بەزىلىرىنى ھەتتا كۆيدۈرگەندىلا ئاندىن بۇ مەقسەتكە يەتكىلى بولىدۇ. بۇنداقلىقى يەنى كۆيدۈرمىسە بولمايدىغانلىقى دورا كەپپىياتىنىڭ بەك ناچار ۋە زەھەرلىكى ۋە ياكى ئۇنى سوقۇپ يۇمشاق ھالەتكە كەلتۈرگىلى بولمايدىغانلىقىدىندۇر. بۇ خىلدىكى دورىلارنى كۆيدۈرۈشتىكى ئەڭ ياخشى ئۇسۇل شۇكى: دورىنى يېڭى كۆزنىڭ ئىچىگە سېلىپ ئۈستىدىن گىلى ھىكمەت قىلىپ تونۇر ياكى ئوچاق قوقسىغا ئويدان كۆمۈپ، ياخشى سوقۇلۇش سالاھىيىتىگە كەلگەنگە قەدەر قويۇشتىن ئىبارەت. مەسىلەن، ئىقلىمىيا، زاك، فلە، سەفىداب ۋە شۇنىڭغا ئوخشاشلار. يەنە بەزى دورىلارنى كۆيدۈرۈپ ۋە ياخشى سوققاندىن كېيىنمۇ يەنە يۇيۇپ كۆپ قېتىم چايقاشقا توغرا كېلىدۇ. مەسىلەن، سەفىداب (دورلىق ئۇيا) غا ئوخشاشلار. بۇنىڭدىكى مەقسەت: بۇ دورىلاردىكى كۆزگە زىيان قىلىدىغان ئاچچىقلىقنى يوقىتىش، ئوتقا قويۇلغاندىن كېيىن ھاسىل بولغان ھارارىتىنى پەسەيتىشتىن ئىبارەت. كۆيدۈرۈلگەن مىسقا ئوخشاش بەزى كۆزگە زىيانلىق كەپپىياتى بار دورىلارمۇ يۇيۇلىدۇ. بەزى دورىلارنى سۇ بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ سالاپە قىلسا ھۆلۈككە ئۇچراپ ياخشى بولۇپ قالىدۇ، مەسىلەن: تاش جىنىسلىق ۋە كۆپ خىلدىكى مەدەن دورىلار. لېكىن، بۇ دورىلارنىڭ بىر قىسمىنى مۇنداق قىلىشقا ئېھتىياج چۈشمەيدۇ،

مەسلەن: نىشاستە ۋە سەبرى قاتارلىقلار.

يىلىم دورىلارنى سوققاندا قىزىقلىق ھاسىل بولۇپ ئونىڭ قۇۋۋىتىنى پارلاندۇرۇپ، ئاجىزلاشتۇرۇپ قويدۇ. شۇڭا ئۇلارنى قۇرۇق سوقماي، بەلكى نەمدەپ سوقۇش ياكى نەمدەپ سالايە قىلىش لازىم. يەنە بەزى دورىلارنى كۆڭۈلدىكىدەك يۇمشاق سوقۇش ئۈچۈن، سۇ ياكى باشقا مۇناسىۋەتلىك سۇيۇقلۇقلارغا چىلاپ قويۇشلا كۆپايە قىلىدۇ، مەسلەن: كەترا ۋە سەمغى ئەرەبى قاتارلىقلار. ئۇلارنى ئالدى بىلەن سۇغا چىلاپ ئېرىتكەندىن كېيىن قېلىن رەختتىن ئۆتكۈزۈپ سۈزۈپ ئالسىلا بولىدۇ. بەزى دورىلارنى مۇنداق قىلىش بىلەنمۇ مەقسەتكە يەتكىلى بولمايدۇ، بەلكى سۇغا چىلغاندىن كېيىن قايتىدىن سوقۇشقا ۋە سالايە قىلىشقا توغرا كېلىدۇ، مەسلەن: ئۆشەق، سەكبەنج قاتارلىقلار.

كۆز دورىلىرىنى غورا، بادىيان، ھەلىيلە، سومماق، مەرزەنجۇش ۋە يامغۇر سۇلىرىغا بىر قانچە قېتىم چىلاپ، سۈزۈپ، قۇرۇتقاندىن كېيىن سوقسا ياكى سالايە قىلسا دورا كۈچىنى تېخىنىمۇ ئاشۇرغىلى بولىدۇ. كۆز دورىلىرىغا ئىپار قوشۇلسا دورىلارنىڭ قۇۋۋىتىنى ئاشۇرغىلى، دورىلارنىڭ كۆز چوڭقۇر قاتلاملىرى ۋە كۆز پەردىلىرىگە تەسىر قىلىش دەرىجىسىنى كۈچەيتكىلى بولىدۇ. دورىلارنى سالايە قىلغاندا دورىلارنى ئۇسۇلدىكى ئۆلچەم بويىچە ئايرىم-ئايرىم ئۆلچەپ ئېلىپ، ئاستا سالايە قىلىش ۋە چاڭ-توزان، كۈن تۈرى قاتارلىقلاردىن ساقلاش لازىم.

شىياف دورىلارنى تەييارلاشتا دورىلارنىڭ چېچىلىپ، تۈزۈپ كەتمەسلىكى ۋە شىيافلىق ھالىتىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن، ئونىڭغا مەلۇم دەرىجىدە شىرنىلىك ۋە شىلىملىق دورىلارنى قوشۇش لازىم. لېكىن، بۇ خىل شىلىملىغۇچى دورىلار خۇسۇسىيەت جەھەتتە كېسەللىك بىلەن مۇناسىۋەتسىز بولماستىن، بەلكى شۇ داۋالماقچى بولغان كېسەللىككە مەنپەئەت قىلىدىغان دورىلاردىن بولۇشى كېرەك. مەسلەن، نىشاستە ۋە سەمغى ئەرەبىلەر يۇقۇملۇق كۆز ئاغرىقى (رەمەد) غا ئىشلىتىلىدىغان شىيافلارغا، ئەزەرۇت ۋە سەكبەنجلەر كۆزگە ئاق چۈشۈش كېسەللىكىگە ئىشلىتىلىدىغان شىيافلارغا قوشۇلىدۇ. كۆز دورىلىرى ئىچىدە ھەرخىل شىياف، سېپىلما (زەرۋر) لەرنى تەييارلاشتىكى ئەڭ ياخشى ۋاقىت ئەتىياز ھېسابلىنىدۇ. چۈنكى قىشتا سوغۇق سەۋەبىدىن دورىلار قېتىشىپ، ئىسسىقتا دورىلارنىڭ قۇۋۋەتلىرى پارلىنىپ كۈچى ئاجىزلاپ كېتىدۇ. ئەتىياز پەسلىدە مۇنداق ئەھۋاللاردىن ساقلىنغىلى بولىدۇ. شىياف دورىلار بولۇپمۇ باش ئەتىيازدا ياسالسا، ئۇلارنىڭ قۇۋۋەتلىرى ئۇلار قۇرۇپ بولغىچە پارلىنىپ تارقاپ كەتمەيدۇ. شۇڭا، ئادەتتە بۇ دورىلارنى سايدا قۇرۇتۇش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. ئەمما زەرۋر (سېپىلما) ۋە سۇدا مۇدەپپەر



قىلىنىدىغان دورىلارنى ئەتىياز پەسلىنىڭ ئاخىرىقى مەزگىللىرىگىچى كېچىكتۈرۈشكە بولىدۇ. سۈرمە (كوھل) ۋە شىياڧ دورىلار ئايرىم-ئايرىم قاچىلاردا ساقلىنىشى لازىم. شۇندىلا تۇلارنىڭ كۈچى ئاجىزلاپ ياكى بۇزۇلۇپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. مەسلەن، ئىپارنىڭ ئىسسىقلىقى سوغۇق تەبىئەتلىك كافور بىلەن بىر جايدا تۇرسا تۆۋەنلەيدۇ. شۇنىڭغا ئوخشاشلا كافورنىڭ سوغۇقلۇقى ئىپار بىلەن بىر تۇرسا ئازىيىدۇ.

### كۆز دورىلىرىنى ئىشلىتىشتە دىققەت قىلىدىغان ئىشلار

1. كۆزگە ئىشلەتمەكچى بولغان دورىلارنىڭ ئەڭ مۇۋاپىقلىرىنى تاللاشقا دىققەت قىلىش كېرەك. چۈنكى، كۆز نازۇك ھەمدە ئۇنىڭدا روھ سەزگۈ قۇۋۋەتلەر كۆپ بولغاچقا، ئاق فارغىغا ئوخشاش يەنى كۆز تەبىئىتىگە تۈپتىن قارىمۇ-قارشى كېلىدىغان كۈچلۈك دورىلارنى ئىشلەتمەسلىك كېرەك. تۆتكۈر تەملىك، ئېغىز قورۇيدىغان ۋە بەك چۈچۈمەل كەيپىياتى بەك يۇقىرى دورىلارنى شۇنىڭدەك قۇۋۋىتى بەك كۈچلۈك دورىلارنىمۇ ئىشلەتمەسلىك لازىم. چۈنكى، سوۋۇتۇش قۇۋۋىتى بەك ئارتۇق دورىلار كۆزنىڭ قۇۋۋىتىنى تۈگىلىتىپ پاسسىپ ھالەتكە چۈشۈرۈپ قويدۇ. ئىسسىقلىقى بەك يۇقىرى دورىلار كۆز قۇۋۋەتلىرىنى پارالاندۇرۇپ تارقىتىۋېتىدۇ.

2. كۆزگە ئىشلەتمەكچى بولغان دورىلارنىڭ كەيپىيات دەرىجىسىنى تاللاشقا ئېتىبار بېرىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن ئالدى بىلەن كېسەللىكنىڭ تۈرىنى توغرا ئىگىلەشكە ۋە ئۇنى تونۇشقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. ئەگەر، كېسەللىك ئىسسىقتىن بولسا سوغۇقلۇق دورىلار بىلەن، سوغۇقتىن بولسا ئىسسىقلىق دورىلار بىلەن داۋالاش كېرەك. دېمەك، قارىمۇ-قارشى داۋالاش تۈسۈلىنى قوللىنىش لازىم.

3. دورىلارنىڭ مىقدارىنى بەلگىلەشكە دىققەت قىلىش كېرەك. بۇنىڭدا ئىشلەتمەكچى بولغان دورا تۈسخىسى ئىچىدە قايسى دورا ئاساسلىق ۋە مەنپەئەتلى يۇقىرى دەپ تونۇلسا شۇ دورىنىڭ مىقدارىنى ئاشۇرۇش، باشقىلىرىنىڭ مىقدارىنى مۇناسىپ ھالدا ئەھۋالغا قاراپ كۆپەيتىپ ئىشلەتسە بولىدۇ. شۇنىڭدەك، تۈسخا ئىچىدە قايسى بىر دورىنىڭ قۇۋۋىتى ئاجىزراق بولسا شۇ دورىنىڭ مىقدارىنى كۆپەيتىپ ئىشلىتىش قۇۋۋىتى بەك كىرەك ئارتۇق دورىنىڭ مىقدارىنى ئاشۇرۇپ ئىشلەتكەنگە قارىغاندا بىخەتەررەكتۇر. كۆز جىيەكلىرى كېسەللىكلىرىدە سۈرمە خاراكتېرلىك دورىلارنى كۆپەيتىش كۆز





گۆھىرىگە ئائىت دورىلارنى كۆپەيتىشكە نىگە قارىغاندا ياخشىراق. چۈنكى، كۆز گىرۋەكلىرىنىڭ توقۇلمىلىرى قېلىن ۋە ھارارەت جەھەتتە بىر قەدەر تۆۋەنرەك بولغانلىقى ئۈچۈندۇر.

4. كۆزگە ئىشلەتمەكچى بولغان دورىلارنىڭ ئىسسىق سوغۇقلۇق دەرىجىسىنى تاللاشقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. ئالدىدا سۆزلىگەنلەرنى ئىجرا قىلىش ئاغرىقنىڭ جىنسى، يېشى، ئولتۇراقلىق جايى، خىزمەت كەسپى، بەدەن تۇرقى، ئادىتى، كۆزنىڭ تەبىئىتى، كېسەللىك پەيدا بولۇش پەسلى، كېسەللىك دەرىجىسى قاتارلىقلار بىلەن ئوبدان تونۇشۇشقا باغلىق. كۆزنىڭ تەبىئىتى 4 تەرەپنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: (1) مزاجى، (2) يارىتىلىشى ۋە ئەسلىدىكى تۈزۈلۈشى، (3) ئورۇنلىشىشى، (4) قۇۋۋىتى. (1) كۆزنىڭ مزاجى: بۇنىڭدا ئالدى بىلەن ئۇنىڭ ساقلىق ۋە كېسەللىك ھالەتتىكى مزاجى بىلەن تونۇشۇش كېرەك. شۇندىلا ئۇنىڭ ئۆزىگە خاس مەخسۇس مزاجىدىن قانچىلىك دەرىجىدە چىقىپ كەتكەنلىكىنى مۆلچەرلىگىلى، دورىلارنىڭ مىقدارىنى بەلگىلىگىلى ۋە كۆزنى ئەسلى مزاجىغا ياندۇرۇشقا كېتىدىغان قۇۋۋەت دەرىجىسىنى تۆلچىگىلى بولىدۇ. (2) كۆزنىڭ تۈزۈلۈشى: كۆز گۆھىرىدە بىرنەچچە بوشلۇق بار. ئۇلار: (1) كۆزنىڭ تۈزىدىكى بوشلۇق، (2) كۆزنىڭ كەينىدىكى بوشلۇق، (3) بۇرۇننىڭ ئىچى تەرىپىدىكى بوشلۇقلاردىن ئىبارەت. بۇ بوشلۇقلار كۆزنىڭ تەبىئىي چىقىرىش يولى (مەنپەز) لىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. كۆز گۆھىرىدىكى تاشلاندىق ماددىلار مۇشۇ يوللار ئارقىلىق ناھايىتى ئاسانلا دەفىنى بولىدۇ. شۇڭا، كۆزگە قۇۋۋىتى ئانچە بەك كۈچلۈك بولمىغان ئاز مىقداردىكى دورىلارنى ئىشلىتىشلا كۆپايە قىلىدۇ. (3) كۆزنىڭ ئورۇنلىشىشى: بۇ، كۆزنىڭ جايلاشقان ئورنى ۋە ئۇنىڭ بىلەن ئالاقىسى (شىرىكچىلىكى) بولغان ئەزالارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. كۆز ئاشقازان ۋە جىگەردىن كۆپ يىراقتا بولغاچقا، دورىلارنىڭ تەسىرى بۇ ئورۇنلاردىن كۆزگە ئاسانلىقچە يېتىپ كېلەلمەيدۇ ياكى يېتىپ بارغاندىمۇ دورىنىڭ قۇۋۋىتى ناھايىتى ئاجىزلىغاندا يېتىپ بارىدۇ. شۇ ۋەجىدىن قۇۋۋەت دەرىجىسى ناھايىتى يۇقىرى بولمىغان دورىلار كۆز كېسەللىكلىرىگە كۆرۈنەرلىك تەسىر كۆرسەتمەيدۇ. شۇڭا كۆزگە سىرتتىن يەرلىك ئورۇنغا دورا ئىشلىتىشنىڭ ئەھمىيىتى خېلى زور. بۇنىڭدا دورىلار كۆزگە ئاسانلا يېتىپ بېرىپ ئۆز تەسىرىنى كۆرسەتمەيدۇ. ئەمما، شۇنى بىلىش كېرەككى دورا قۇۋۋىتى كېسەللىك دەرىجىسىدىن ئارتۇق بولۇپ كەتمەسلىكى كېرەك.

كۆزنىڭ باشقا ئەزالار بىلەن بولغان ئالاقىسى (شىرىكچىلىكى) دە كۆزنىڭ مېڭە بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ناھايىتى قويۇق. چۈنكى كۆز ئادەمنىڭ باش ساھەسىگە جايلاشقان بولۇپلا قالماي، بەلكى مېڭىنىڭ ئىچكى تەرىپىدىن ماددىلارنىڭ ئۆتۈش يولى ئەسەبى تۈر (نۇرغا





مەنسۇپ نېرۋا) دىن ئىبارەت بوشلۇققا ئېچىلىدۇ. شۇڭا، ماددىلارنىڭ مېڭە تەرەپتىن كۆزگە تۇتۇشنى توسقۇچى دورىلار توسۇش ۋە تورمۇزلاش جەھەتتىكى كۈچلۈك دورىلار بولۇشى كېرەك. لېكىن، كۈچلۈكلىك دەرىجىسى كۆزنىڭ پەردىلىرىنى قېلىنلاشتۇرۇپ، سۇيۇقلۇقلىرىنى قويۇقلاشتۇرۇپ قويدىغان دەرىجىدە بولماسلىقى كېرەك. ئۇنداق بولمىغاندا، كۆز پەردىلىرى ئارىلىقلىرىدا ماددىلارنىڭ تۇرۇپ قېلىشى، تاشلاندىۇقلارنىڭ كۆپىشى ھەتتا كۆز ئاغرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. (4) كۆزنىڭ قۇۋۋىتى: كۆز قۇۋۋەتلىرىنىڭ تۈرى كۆپ بولغىنىدەك تۇنۇڭدىكى روھلارمۇ كۆپ. شۇڭا، ھارارەتنى پەسەيتىش تەسىرى بەك يۇقىرى بولغان دورىلارنى كۆز كېسەللىكلىرىدە ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. بۇ، روھنىڭ مزاجىنى قاتۇرۇپ تۇنى پاسسىپ ھالەتكە چۈشۈرۈپ قويماسلىق ۋە روھنى پارالاندۇرۇۋېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈندۇر. كېسەللىك دەرىجىسى ئېغىر بولغاندا كۈچلۈك دورىلارنى تاللاپ كۆپرەك مىقداردا ئىشلىتىشكە توغرا كېلىدۇ. كېسەللىك دەرىجىسى يەڭگىلەرەك بولغاندا ئاز مىقداردىكى قۇۋۋىتى ئاجىزراق دورىلارنى ئىشلىتىشلا كۆپايە قىلىدۇ.

5. كۆزگە دورا ئىشلىتىشتە مۇۋاپىق ۋاقىتنى تاللاش كېرەك. بۇنىڭدا بەزىدە يىل پەسىللىرى ئېتىبارغا ئېلىنىدۇ. يەنى، پارقىرىتىپ جۇلا بېرىش تەسىرى يۇقىرى، كۈچلۈك پارالاندۇرۇپ تارقانقۇچى دورىلارنى ئىشلىتىشتە ياز پەسلى ئەمەس، بەلكى قىش پەسلى تاللىنىدۇ. سوغۇقلۇق دەرىجىسى يۇقىرى، ماددىلارنى تورمۇزلىشى كۈچلۈك دورىلارنى ئىشلىتىشتە ياز پەسلى ۋە ئىسسىق كۈنلەر تاللىنىدۇ. ئىستىفراغ قىلىدىغان ۋە ئىچىنى سۈرىدىغان تازىلاش دورىلىرىنى ئىشلىتىشتە قىش ۋە ياز پەسلىرى ئەمەس، بەلكى ئەتىياز ۋە كۆز پەسلىرى تاللىنىدۇ. ئەتىيازدا قان ئېلىش، لوڭقا قويۇش ۋە باشقا ئۇسۇللار ئارقىلىق، كۆزدە مۇسەھل دورىلار ئارقىلىق ئىستىفراغ قىلىش لازىم. بەزىدە دورا ئىشلىتىش ۋاقىتىنى تاللاش پەسىللەر بويىچە ئەمەس، بەلكى كېسەل ئەھۋالى ئېتىبارغا ئېلىنىدۇ. مەسىلەن، كۆز ئىششىقلىرىنىڭ دەسلەپكى باسقۇچلىرىدا تورمۇزلىغۇچى، قايتۇرغۇچى دورىلار (ئەدۋىيە ئىرادىئە)؛ ئاخىرقى باسقۇچلىرىدا پارالاندۇرۇپ تارقانقۇچى دورىلار (ئەدۋىيە ئىرادىئە) ئىشلىتىلىدۇ. بۇ ئىككى باسقۇچنىڭ ئارىلىقىدا بۇ ئىككى تۈردىكى دورىلارنى نۆۋەتلەشتۈرۈپ ئىشلىتىش يەنى دەسلەپتە راۋادىئات دورىلارنى كۈچلۈك تەييارلاپ ئىشلىتىش، تۇنۇڭدىن كېيىن موھەللىلات (پارالاندۇرۇپ تارقانقۇچى) دورىلارنى كۈچلۈك تەييارلاپ ئىشلىتىش، ئاخىرقى باسقۇچتا تەڭ دەرىجىدە ئىشلىتىش





كېرەك. پارلاندۇرۇپ تارقاقماقچى ياكى ئىستىفراغ قىلىپ سۈرۈپ چىقارماقچى بولغان ماددىلارنى ئالدى بىلەن مونزىجىلار ئارقىلىق ئوبدان پۇشۇرۇپ چىقىرىلىش سالاھىيىتىگە كەلتۈرگەندىن كېيىن ئىستىفراغ قىلغۇچى ۋە سۈرگۈچى دورىلارنى ئىشلىتىش كېرەك.

6. دورا شەكلىنى مۇۋاپىق تاللاش: بۇنىڭدا، كۆزنىڭ ئىششىقلىرىغا تېمىتىلما (قەتورات) نى ئىشلىتىش كېرەك. چۈنكى، قۇرۇق دورىلار كۆز يۇمىلىقى ۋە كۆز جىيەكلىرى ئارىلىقىدا تۇرۇپ قىلىپ ئاغرىق پەيدا قىلىدۇ. كۆزگە تىرىنچە گۆش تۇسۇش كېسىلى (زەفەرە)، كۆزگە ئاق چۈشۈش كېسىلى (بەيازۇلكەينى) قاتارلىقلارنى داۋالاشتا زەرۇرات (سىپىلما) دورىلارنى ئىشلىتىش كېرەك. كۆزنىڭ ئەتراپى ۋە يانلىرىغا دورا ئىشلىتىشتە قاچانلا ئېھتىياج چۈشسە، تېمىتىلما (قەتور) دورىلار ۋە باشقا ھەرخىل سۇيۇق دورىلارنى ئىشلىتە تەكەن ياخشى. كۆزگە سوغۇقلۇق يەتكۈزگۈچى، يۇمشاتقۇچى بولۇپمۇ ئاغرىق پەسەيتكۈچى دورىلارنى ئىشلىتىشكە توغرا كەلسە، ئۇلارنى كۈندە ھەتتا كۈندە بىر قانچە قېتىم ئىشلىتىش كېرەك. لېكىن، ئىسسىق تەبىئەتلىك دورىلارنى كۈندە بىر قانچە قېتىم ئەمەس، بەلكى ھەر كۈندە ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. ئەگەر، ئىشلىتىش بەك زۆرۈر بولسا، ئارقىمۇ-ئارقا ئۈزلۈكسىز ئىشلەتمەسلىك، بىرىنچى قېتىم دورا ئىشلىتىپ دورىنىڭ غىدىقلاش ۋە ناچار تەسىرى پەسەيگەندىن كېيىن ئىشلىتىش كېرەك. سۈرمە ۋە تېمىتىلما دورا قاتارلىقلارنى ئىشلىتىشتە ئەڭ ياخشىسى كۈندۈزى سالىقراق ۋاقىتتا ۋە تاماق يېيىشتىن ئىلگىرى ئىشلىتىش لازىم. ئەگەر، بىمار ۋە ئىشلىتىلدىغان سۈرمىنىڭ مىزاجى ئىسسىق بولسا، كەچ ياكى ئەتىگەندە ئىشلىتىش لازىم. ئەگەر، بىمار ۋە سۈرمىنىڭ مىزاجى سوغۇق بولسا، چۈش ۋاقىتىدا ئىشلىتىش كېرەك. ئەگەر، ئاغرىقنىڭ ئەمەس بەلكى سۈرمىنىڭلا مىزاجى ئىسسىق بولسا كەچتە ئىشلىتىش لازىم. مەدەن دورىلاردىن تەييارلانغان سۈرمىلەرنى ئىشلىتىشتە بىرلا ئەسەد (سۈرمە تېشى) نى ئىشلەتكەندىن كېيىن ئۇخلىغاندىن سىرت باشقىلارنى ئىشلەتكەندە ئوخلىماسلىق كېرەك. كۆزگە سۇ چۈشۈش (نۇزۇلۇمات) كېسەللىكى، كۆزگە ئاق چۈشۈش كېسەللىكى، سەبەل (تۈنۈنسىمان پەردە پەيدا بولۇش كېسىلى) قاتارلىقلاردا دورىنى ئوڭدا يېتىپ تېمىتىش ياكى سۈرمە تارتىش كېرەك. كۆز تۈۋەن قىسمىنىڭ كېسەللىكلىرى ۋە كۆز جىيەكلىرى كېسەللىكلىرىدە دوڭغىيىپ تۇرۇپ دورا ئىشلىتىش، سىپىلما (زەرۇر) دورىلارنى يۈكسەپ تۇرۇپ ئىشلىتىش كېرەك. يۇقۇملۇق كۆز ئاغرىقى ۋە كۆز جىيەك





كېسەللىكلەردە سەپمەكچى بولغان دورىنىڭ كۆز يۇمىلىقىغا سېپىلىپ كېتىپ ئاغرىش ۋە يېقىمسىزلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقارماسلىقى ئۈچۈن، دورىنى كۆز جىيەكلىرىگىلا تەككۈزۈشكە ئالاھىدە دىققەت قىلىش كېرەك. ئەگەر، داغلارنى يوقىتىش ۋە كۆزنىڭ ئېقىنى تازىلاپ پارقىرىتىش (جۇلاھ بېرىش) ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش مەقسەتلەردە دورا ئىشلەتمەكچى بولغاندا، دورىنى كۆز يۇمىلىقىغا يەتكۈزۈشكە ۋە يەرلىك ئورۇنغا سۈركەشكە بولىدۇ. كۆزگە سۇيۇقلۇق دورىلارنى تېمىشتا كۆزنى سول قولىنىڭ باش بارمىقى ۋە كۆرسەتكۈچ بارمىقى بىلەن ئېچىپ، پىلتىكۈچ نەپچىسىنى ئوڭ قول بىلەن تۇتۇپ تېمىتىش كېرەك. كۆزدە قىزىقلىق ۋە ھۆللۈك بولسا، دورا تېمىتىدىغان پىلتىكۈچ كۆمۈش پىلتىكۈچ؛ ماددىلارنىڭ ھارارىتىنى پەسەيتىش مەقسەت قىلىنسا، تىللا پىلتىكۈچ ياكى ئابىنوس دەرىخىدىن ياسالغان پىلتىكۈچ؛ كۆزدىكى ماددىلارنى پارلاندۇرۇپ تارقىتىش مەقسەت قىلىنسا، مىس پىلتىكۈچ ئىشلەتكەن ياخشى. ھەر قېتىم دورا تېمىتىپ بولغاندىن كېيىن پىلتىكۈچنى يۇيۇپ ئېلىپ قويۇش كېرەك. سۈرمە دانمۇ ئىچىگە سېلىنىدىغان سۈرمىنىڭ جىنسى بىلەن ئوخشاش يەنى بىر ئائىلە ۋە جىنسىدىكى نەرسىلەردىن ياسالغان بولۇشى لازىم. دېمەك، بەزىسى كۆمۈش، بەزىسى ئابىنوس دەرىخى ۋە شۇنىڭغا ئوخشاشلاردىن ياسالسا بولىدۇ. ئۇنىڭ شەكلى يۇمىلاق سۇزۇنچاق، ئاغزى ئاسان ئېچىلىدىغان بولۇشى لازىم. ھەر خىل شىياقلار ۋە باشقا كۆز دورىلىرىنى ئەڭ ياخشىسى مىس تېشى بىلەن سالاپە قىلىش لازىم. ئابىنوس دەرىخىدىن ياسالغان بولسىمۇ بولىدۇ. نەرسىلەرنى سوققان ياكى سالاپە قىلغاندىن كېيىنلا سۈرمە دانىمۇ يۇيۇپ ئېلىپ قويۇش لازىم. كۆز كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتا بەزىدە سىرتىدىن تېگىش، تېگىش لاتىسى ئىشلىتىش قاتارلىقلارغا ئېھتىياج چۈشىدۇ. بولۇپمۇ، كۆزگە تىغ تەككۈزۈپ جەرراھلىق قىلغاندا، مەسىلەن: سەبەل كېسەللىكىدە تۈتۈنسىمان پەردىنى كېسىپ ئېلۋەتكەندىن كېيىن كۆزنى تېگىشقا توغرا كېلىدۇ. شۇنىڭدەك كىچىك بالىلارنىڭ كۆزلىرىگە دورا سۈركەشكەن، زىماد چاپقاندا دورىلارنىڭ چۈشۈپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ھەمدە بەزى كۆز كېسەللىكلىرىنىڭ ئاخىرقى باسقۇچلىرىدا كۆزنى سىرتقى مۇھىتنىڭ يامان تەسىرلىرىدىن مۇھاپىزەت قىلىش ۋە كۆز پولىتېپ چىقىش كېسەللىكىدە كۆزنى سىقىپ تۇرۇش ئۈچۈن كۆزنى تېگىپ قويۇشقا توغرا كېلىدۇ. يەنە شۇنىڭدەك، كۆز ئاغرىقلىرىنى پەسەيتىش ۋە ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش مەقسەتلىرىدىمۇ كۆز تېگىپ قويۇلىدۇ. مەسىلەن، كۆز ۋە چېكە ساھەلىرى لوقۇلداپ سانجىپ ئاغرىش، كۆز پولىتېپ كېسەللىكى ۋە كۆز سىرتىغا كۆتىرىلىپ قىلىش كېسەللىكلىرىدە كۆزنى تېگىشنىڭ ئەھمىيىتى ناھايىتى زور.





## كۆز ئاغرىش

كۆز ئاغرىش (ئەۋجاڭئۆكە يېنى) ئۆز ئالدىغا مۇستەقىل بىر كېسەللىك بولماي، بەلكى كۆزدىكى نورمالسىزلىق ۋە كۆزنىڭ نۇرغۇن كېسەللىكلىرىدىن كېلىپ چىققان ئورتاق ئالامەتكە قارىتىلغان. كۆز ئاغرىش بەك قاتتىق بولغاندا بىمارغا ئازاب كەلتۈرىدۇ، بەك ئوزارغاندا يەنە باشقا كۆز كېسەللىكلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

سەۋەبى، ئالامىتى ۋە تەشخىسى

كۆز ئاغرىشىنىڭ سەۋەبلىرى ئون نەچچە خىل بولىدۇ. يىغىپ ئېيتقاندا ئىچكى، تاشقى ئامىللار ۋە ماددىلىق، ماددىسىز ئۆزگىرىشلەردىن كېلىپ چىقىدۇ. ئۆزىنىڭ سەۋەبلىرىنى ئېنىقلاشتا ئالدى بىلەن كۆزنىڭ ئەھۋالىنى ئالاھىدە مۇلاھىزە قىلىش، ئۆزىگە ھەر خىل تىپتىكى كۆز ياللىغى، كۆزگە تۇتۇنسىمان پەردە پەيدا بولۇش كېسىلى (سەبەل)، ئەستە پەردە (تەبەقەئى مۇلتەھەمە) نىڭ قېتىشى، كۆز چاقىلىرى، كۆز يارىلىرى، كۆز زەخمىسى ياكى كۆزگە بات نەرسە كىرىپ كېتىشتەك غەيرىي ئەھۋاللارنىڭ بار-يوقلۇقىغا دىققەت قىلىش كېرەك. چۈنكى، بۇلار كۆز ئاغرىشىنىڭ سەۋەبىنى ئايرىشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. ئەگەر، يۇقىرىقى كېسەللىكلەرنىڭ ئالامەتلىرى بارلىقى ئېنىقلانمىسا، بىماردىن ئاغرىشنىڭ خاراكتېرىنى سورايدىغانى يەنى لوقۇلداپ، سانجىپ ۋە تۇتقا قىلىق خاراكتېردە ئاغرىيدىغانلىقى قاتارلىقلارنى ئېنىقلاش كېرەك. مەسىلەن، كۆزدىكى ئاغرىش چوڭقۇر قىسمىدا بولۇپ تۇتقا قىلىق ھالدا بەزىدە تۇتۇپ، بەزىدە قوينۇتەسە، كۆز قارىچۇقى قوشۇلغان باش ئاغرىقى ۋە كۆز شەققىسىدىن ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر، باش ئاغرىش بىلەن بىرگە كۆز لوقۇلداپ ئاغرىسا، كۆزنىڭ ئۈزۈمسىمان پەردە (تەبەقەئى ئىنبەبىيە) سىدە ئىششىق بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر، ئاغرىش قاتتىق بولۇپ يىڭنە سانجىغاندەك بىلىنسە، ئاغرىش تاكى ئىككى چىكىگىچە تارقالسا ھەمدە باشنىڭ ئاغرىقى بولۇپمۇ ھەرىكەت قىلغاندا قوزغالسا، شۇنداقلا كۆزنىڭ تومۇرلىرىدىكى ئىششىقنىڭ رەڭگى قىزىل ياكى قارامتۇل قىزىلغا مايىل بولسا ھەم تۇتۇق كۆرۈنسە، بىماردا تاماق يېگۈسى كەلمەسلىك ئالامەتلىرى بولسا، كۆز مۇڭگۈز پەردە (تەبەقەئى



قەرنىيە) سىدە راک (سەرتان) كېسىلى بارلىقىدىن گومانلىنىشقا بولىدۇ. ئەگەر، ئاغرىش يىگنە سانجىغاندەك ئاغرىسا، بىمارنىڭ گومانچە كۆزىگە يات نەرسىلەر كىرىپ قالغاندەك بىلىنە ھەمدە كۆز يۇملىقىنى ئايلاندۇرۇش ۋە يورۇقلۇققا قاراش تەسكە توختىسا، كۆزنىڭ شىشىسىمان سۇيۇقلۇقى (روتوبەتى زۇجاجىيە) گە ئوزۇقلۇق يېتىشمە يۇتقانلىقىنى پەرەز قىلىشقا بولىدۇ. ئەگەر، بۇنىڭ سەۋەبى ئونىڭغا ئوزۇقلۇق كېلىدىغان قانالچىلارنىڭ قۇرغاقلاشقانلىقىدىن بولسا، بىمارنىڭ كۆزلىرى ئولتۇرۇشۇپ كېتىدۇ، ياش ئاقمايدۇ. ئەگەر، ئوزۇقلۇق يېتىشمەسىلىك توسالغۇ چۈشۈشتىن بولسا بەزىدە ياش ئاقىدۇ، بەزىدە قۇلاقلىرىدىن يىرىڭغا ئوخشاش نەرسە چىقىدۇ. ئېغىز تەمى بەتتام بولىدۇ. بۇ ئاغرىق ئېغىرراق بولۇپ كۆز ئاغرىش بىلەن بىرگە ئېغىرلاشسا ھەمدە كۆزدىن ياش ئېقىپ نەرسىلەر راۋۇرۇس كۆرۈنمەي ئەگرى كۆرۈنەنە، كۆز جىيەكلىرى بىر-بىرىگە يۇمۇلمىسا شۇنداقلا مۇڭگۈز پەردە (تەبەقەئى ئەبىيە) نىڭ يېرىمى دۇغلاشقاندا كۆرۈنەنە، ئوزۇمىسمان پەردە (تەبەقەئى ئەبىيە) نىڭ قېسىقلاشقانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. كۆز ئاغرىش قاتتىق بولۇپ، سىقىلىپ ئاغرىغاندەك بىلىنە ھەمدە كۆزنى ئىختىيارى ھەرىكەتلەندۈرەلمىسە، چۈشكۈرۈش ۋە چاپاقلشش، ياش چىقىش كۆرۈنەرلىك بولسا ئاغرىشنىڭ كۆز قىروسىمان سۇيۇقلۇق (رۇتوبەتى جەلدىيە) نىڭ سىقىلىشىدىن بولغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر، ئاغرىش قاتتىق بولۇپ كۆزنىڭ چوڭقۇر قىسمىدا بىلىنە ھەمدە كۆزنىڭ تۈرى چېچىلىپ، نورمال كۆرۈش خىزمىتى بۇزۇلسا، تورسىمان پەردە (تەبەقەئى شەبەكسىيە) پۈتۈنلۈكىنىڭ بۇزۇلغان (تەفەررۇقۇل ئىتتىسالى) لىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر، ئاغرىش كۆزنىڭ چوڭقۇر قىسمىدا بولۇپ، كۆزنىڭ دائىرىسىدە قىزىللىق كۆرۈلسە، بالا ھەمراھسىمان پەردە (تەبەقەئى مەشىمىيە) دە بۇزۇلۇش بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر، كۆز قورۇلۇپ سىقىلغاندەك ئاغرىش بىلەن بىرگە بۇ ئاغرىق كۆزنىڭ چوڭقۇر قىسمىدا بولسا ھەمدە كۆزى پولىتىپ قالسا، كۆز قاتتىق پەردە (تەبەقەئى سولبىيە) دە ئىششىق بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ ئىششىق ئەگەر قاندىن بولسا، يۇقىرىقىدەك ئاغرىش بىلەن بىرگە كۆز سوزۇلغاندەك بىلىنىدۇ ۋە قېچىشىدۇ. سەپرادىن بولسا، كۆز كۆيۈشۈش بىلەن بىرگە قاتتىق قىزىشىپ بىمارنى بىئارام قىلىدۇ. بەلغەمدىن بولسا، كۆز ئېغىرلىشىپ ئاغرىش بىلەن بىرگە كۆز جىيەكلىرىنىڭ پالەج (فالج) لىنىشى كۆرۈلىدۇ. ھەمدە بىمارنىڭ ئورنىدىن تۇرۇشى ۋە يۇقىرىغا قارىشى تەسكە توختايدۇ. سەۋاددىن بولسا، كۆزنىڭ چوڭقۇر قىسمىدا ئاغرىش بولۇش بىلەن بىرگە كۆزى ئولتۇرۇشۇپ ئارقىغا تارتىلىپ كەتكەندەك بىلىنىدۇ؛ بۇ ھەم كۆز قاتتىق پەردە (تەبەقەئى سولبىيە) دە ئىششىق بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر، كۆز بىر تەرەپكە قىبسايدىغان ھالدا سوزۇلۇپ ئاغرىسا،



قاتتىق پەردە (تەبەقەئى سولبىيە) نىڭ ئولغۇشۇپ قالغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر، بۇ خىل ئاغرىش سوزۇلغاندەك ئاغرىش بىلەن بىرگە ئاستى تەرەپكە ساڭگىلىغاندەك بىلىنىپ يۇقىرىغا قاراش تەس كەلسە، قاتتىق پەردە (تەبەقەئى سولبىيە) نىڭ پالەچلەنگەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

### داۋاسى

ئاغرىۋاتقان كۆزگە ھەرگىزمۇ سۈرمە ياكى پىلتىكۈچلەرنى ئەكىلىشكە بولمايدۇ، بەلكى دورىلارنى سۈت قاتارلىق باشقا نەرسىلەردە ئېرىتىپ ئاز-ئازدىن تېمىتىش كېرەك. قاتتىق ئاغرىش بىلەن بىرگە كەلگەن ھەر قانداق كۆز كېسەللىكلىرىدە ئالدى بىلەن ئاغرىق توختىتىش چارىلىرىنى قىلىش لازىم. لېكىن، مەس قىلىدىغان ۋە سېزىمنى يوقىتىدىغان دورا (مۇخەددىرات) لارنى ئارقا-ئارقىدىن ئىشلەتمەسلىك كېرەك. بۇ ئەھۋالدا ئەڭ ياخشىسى پەرۋىش قىلىپ داۋالاشنى قوللىنىش، مەسلەن: ئۆينىڭ يورۇقلۇقىنى پەسەيتىپ، ناخشاساز ئاڭلىتىش، ھېكايە ئېيتىپ بېرىش بىلەن بىرگە بىمارنىڭ بەدىنىنى يۇمشاق تۇتۇپ بېرىش ئارقىلىق ئۇنى تۇختىتىش كېرەك. كۆز شەققىسىدىن بولغان كۆز ئاغرىشىنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن باش ساھەسىدىن قان ئالغاندىن كېيىن ئىككى چېكىگە زۇلۇك قۇرۇتى قويۇپ قان شورىتىش، ئۇنىڭدىن كېيىن ماددىنى پۇشۇرۇپ قاندا ھەممە مۇسەھل ۋە ھەببى ئىيارەجى بېرىپ تەنقىيە قىلىش ھەمدە شەققىنى داۋالاش بويىچە داۋالاش لازىم. ئۇنىڭدىن كېيىن ئاغرىق ۋە ھارارەتنى پەسەيتىش، ماددىلارنى قايتۇرۇش ئۈچۈن توخۇ توخۇمنىڭ ئېقى ۋە قىز توغقان ئاياللارنىڭ سۈتىنى شىشىگە ئېلىپ، ئۇنىڭغا ئازراق شىپاقى مامىشا ۋە روسۇت مەككەلەرنى ئېزىپ ئارىلاشتۇرۇپ، قاينىتىپ سوۋۇغاندا بىر قانچە تامچە ئېلىپ گۈل يېغىغا ئارىلاشتۇرۇپ ھەر سائەتتە بىرەر قېتىمدىن كۆزگە تېمىتىش كېرەك. ئىككى چېكە ساھەسىگە ئاغرىق پەسەيتىش پىلاستىرى چاپلىسىمۇ بولىدۇ. ئەگەر يۇقىرىقىلار ئۈنۈم بەرمىسە، چېكە قىزىل قان نومۇرى (شەرىيان) دىن قان ئالسا بولىدۇ. بۇ كېسەلنى داۋالاشقا ھەرگىز بېرۋالىق قىلماسلىق ۋە مۆھلەت بەرمەسلىك كېرەك. ئۇنداق بولمىغاندا كۆزنى قارىغۇ قىلىپ قويۇشى مۇمكىن.

راكتىن بولغان كۆز ئاغرىش داۋا قوبۇل قىلمايدۇ. لېكىن، ئاغرىق پەسەيتىش ۋە كېسەلنى ۋاقىتلىق بولسىمۇ تورمۇزلاش مەقسىتىدە قىفالىق تومۇردىن قان ئېلىش كېرەك. قېتىق سۈزمىسى سۈيى، ئىسكەنجىبىن، ئەفتمۇن، سۇفۇفى سەۋدا، ھەببى لاجۋەرد،



مېۋە-چېۋىلەر سۈيى (ماتولفە ۋاكھ) ۋە خىيارى شەنبەر قاتارلىقلار بىلەن چوڭ تەرەتتى يۇمشىتىپ تۇرۇش ھەمدە ئارپا سۈيى (ماتوششەئىس) بىنەپشە شەربىتى، ئىسكەنجىبىن، خەشخاش شەربىتى، جۇلاپ ۋە نىلۇفەر شەربەتلىرىنى بېرىش كېرەك. تامىقىغا ھارارەت پەيدا قىلمايدىغان ۋە ياخشى ئوزۇقلۇق (كەيمۇس) بولالايدىغان بۇغداي تۈنىدىن قىلىنغان تاماقلارنى ئىستېمال قىلدۇرۇش، يەڭگىل ۋە ئاسان سىڭىدىغان گۆشلەر، مەسلەن: تۇچار قاناتلار گۆشلىرىدىن كەكلىك، قىرغاۋۇل، سېمىز چۈجە، ئوغلاق، پاقلان گۆشى ۋە كالا-پاقالچەك قاتارلىقلارنى بېرىش كېرەك. چۈچۈكبۇيا يىلتىزى (ئاقلانغان بىخسۇس)، گاۋزە بان، گۈل بىنەپشە قاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام، چىلان 15 دانە، ئاقلانغان يېڭى نىلۇفەر 7 دانە ئېلىپ ئوبدان پۇشۇرۇپ ياخشى سۈزۈپ تەييارلانغان خەشخاش شەربىتى، تاتلىق ئانار شەربىتى، بىنەپشە شەربىتى، نىلۇفەر شەربەتلىرىنىڭ بىرى قوشۇلغان ئارپا ھەرىرىسى (ئاتلىسى) تەييارلاپ تۇڭا يەنە ئازراق بادام يېغى ئارىلاشتۇرۇپ ئىچكۈزۈش ياكى ماتولجىبىنى يۇقىرىدا كۆرسىتىلگەن مۇناسىۋەتلىك شەربەتلەرنىڭ بىرەرسى بىلەن ياكى كالا سۈتى بىلەن ئىچكۈزۈشمۇ پايدىلىق.

قەدىمكى ھۆكۈمالىرىمىز: «سەۋدانىڭ مۇنزىجلىرىنى ئىشلەتكەنلەر. يەنى مەتبۇخى ئەفتمۇن، تۇنىڭدىن كېيىن ماتولجىبىنى بەزىدە سۇقۇقى مۇبەددىل ۋە سۇقۇقى مۇسەھل بىلەن ئىچكۈزگەنلەر» دەيدۇ. ھەجەرى ئەرمەنى، ھەلىلە كابۇلى، ھەلىلە ھىندى، بىستىفایەج، نەمەكى ھىندى (ھىندى تۈزى) ۋە غارىقۇنلاردىن تەييارلانغان تالقان سۇقۇقى مۇسەھل دېيىلىدۇ. تەرخەمەك، قاپاق، بادىرەڭ تۇرۇقلىرىنىڭ مېغىزى، گاۋزە بان ھىندى، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، سەندەل، تاباشىر، قىزىلگۈل، قۇرۇق يۇمغاقسۇتلەردىن ياسالغان تالقان سۇقۇقى مۇبەددىل (مىزاج تۈزگەرتكۈچى تالقان) دېيىلىدۇ. ئۇنى ماتولجىبىن بىلەن ھەر كۈندە 15 گرامدىن كاپ ئەتسە بولىدۇ. مەزكۇر سۇقۇق سىناقىتىن تۆتكەن ئۆسەتدۇر. يەنە شىيافى ئەيەزنى تۇخۇمنىڭ ئېقىدا ياكى شىيافى مامىشانى ئايال سۈتىدە ئېرىتىپ كۆزگە تېمىتىش كېرەك. تۇخۇمنىڭ ئېقىنى ئىككىلىملىك ۋە ئازراق زەئفەر بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، سىرتىدىن چاپسا ياكى ئارپا تۈنى، بىنەپشە، نىلۇفەر ۋە دادۇر تۈنى، بابۇنە، ئىككىلىملىك، كاكىنەج سۈيى، ئىت ئۈزۈمىنىڭ سۈيى قاتارلىقلاردىن ياسالغان زىمادنى چاپسا بولىدۇ. ئاق لەيلى، ھەمىشە باھار ۋە ئىت ئۈزۈمى ياپراقلىرىنى سوقۇپ، بىنەپشە يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، زىماد قىلىپ چاپسىمۇ بولىدۇ. تۇخۇم سېرىقى ۋە گۈل يېغىدىن ياسالغان قىروتىنى ھەر كېچىسى ئۈستۈنكى قاپاققا قويۇشقا بولىدۇ. يەنە شۇنىڭدەك تەركىبىدە يۇمشاتقۇچى (مۈلەيىن)، شىلماپ سىلىقلاشتۇرغۇچى (مۇنجىرىيات)، مەس قىلىپ سېزىمنى يوقانقۇچى (مۇخەددىرات) دورا تۇتقان ياسالمىلارنى ئىشلىتىشكە





بولدۇ. ئەمما ئىسسىق تەبىئەتلىك دورا ۋە ئىسسىق تەبىئەتلىك تاماقلارنى ئىستېمال قىلماسلىق كېرەك. بابۇنە، گۈل بىنەپشە، ئاقەلىلى، ئىككىلىملىك ۋە نىلۇفەر گۈللىرىنى قايناتقان سۇ بىلەن سىرتىدىن ئېقىتىپ بۇيۇش (نە تۇل قىلىش)، تۇخۇمنىڭ سېرىقىنى كەترا ياكى ئاياللارنىڭ سۈتى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ سۈرۈشمۇ پايدىلىق. شادىنەج، نىشاستىلەرنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ ئەتىگەن ۋە ئاخشامدا سۈرمە قىلىپ تارتىپ بېرىش تەۋسىيە قىلىندۇ. كۆزدىكى ئاغرىقنى پەسەيتىشتە دەسلەپتە مەس قىلغۇچى (مۇخەددىرات) دورىلارنى ئۇنىڭدىن كېيىن شادىنەج، نىشاستە، گىل مەختۇم، مامىشا ۋە مەرۋايىت ئىستېمال قىلدۇرسا ياخشىراق. ھەمدە بۇلارنى ئىشلىتىشتە كۆز ئاغرىقىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان كېسەللىك ماددىسى بەك ئورۇنلىشىپ قالغان بولۇشى كېرەك. ئەگەر ماددىلار بەك ئورۇنلىشىپ قالغان بولسا، ئاغرىقنى پەسەيتىشلا كۇپايە قىلىدۇ. بۇنىڭدا كۆك يۇمىغاقسوت سۈيى، ئىت ئۈزۈمى سۈيى، قىزىلگۈل سۈيى ۋە گۈلۈپ سۈيى، كاسىن ئورۇقى، ئاق سەندەل، قىزىل سەندەل ۋە گىل ئەرمىنلەرنىڭ ھەر بىرىدىن 3 گرام ئېلىپ ئۇلارنى 12 گرام ئەرىقى يېدىمىشكىگە ئارىلاشتۇرۇپ زىماد قىلسا ناھايىتى ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. ئاغرىق توختىغاندىن كېيىن يۇيۇلغان توتىيا، شادىنەج ۋە نىشاستە ھەر بىرىدىن 3 گرام، شىيافى مامىشا، گىل مەختۇم ھەر بىرىدىن 2 گرام، مەرۋايىتىن 1 گرام ئېلىپ، دورىلارنى سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ كۆزگە سۈرمە قىلىپ تارتىدۇ ھەمدە ئاغرىق پەسەيتكۈچى، ئىچىنى يۇمىشاقچى شىياقلار ئىستېمال قىلدۇرۇلىدۇ. بوشاشتۇرغۇچى (مۇرخىيە) لوئاب ۋە شۇنىڭغا ئوخشاشلار كۆزگە سۈرتىلىدۇ. مۇنچىغا چۈشۈپ ھۆللۈك پەيدا قىلىشمۇ پايدىلىق. سەۋدا پەيدا قىلىدىغان غىزالار، مەسلەن: لوۋيا، پەتىگان، كالا گۆشى قاتارلىقلاردىن يەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ.

شىشسىمان سۇيۇقلۇقى (روتوبەتى زۇجاجىيە) گە ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىكتىن بولغان كۆز ئاغرىقىنى داۋالاشتا ئۇنىڭ سەۋەبى تۇسالىغۇ چۈشۈشتىن بولغاچقا، تۇسالىغۇ پەيدا قىلغۇچى ئەسلىي ماددىنى نەزەردە تۇتۇپ ئىچىنى سۈردۈرۈش ۋە تازىلاش (تەنقىيە قىلىش) ئارقىلىق تۇسالىغۇلارنى ئېچىشقا تىرىشىش لازىم. مەسلەن، ئەسلىي ماددا سوغۇق بولسا بادىيان، ئىزخىر، ئەمەن، ئەفسەنتىن، سېرىق ئوت (ئەقىمۇن) ئورۇقى قاتارلىقلارنى قاينىتىپ دىنار شەرىپى بىلەن بېرىلىدۇ. ماددا ئىسسىق بولسا كاسىن ئورۇقى، بىخسۇس، ئىت ئۈزۈمى، ئورۇقدىن ئاجرىتىلغان ئۈزۈم ۋە شاھتەررەلەردىن تەييارلانغان مەتبۇخنى ئىسكەنجىيىن بىلەن ئىستېمال قىلدۇرۇلىدۇ ۋە بۇزورى شەرىپى، قۇرسى رەۋەن قاتارلىقلار بېرىلىدۇ. ئىسسىق ماددىدىن تۇسالىغۇ پەيدا بولىدىغانلىرى ناھايىتى ئاز ئۇچرايدۇ. ئەگەر تۇسالىغۇلار ئېچىلىپ بولسا، بەدەنگە ھۆللۈك پەتكۈزۈش ئۈچۈن كۆز راكىنى داۋالاش





قىسمىدىكى ئاق لەيلى ياپرىقى چۈشكەن زىمادقا تۇخۇم ئېقىنى ئارىلاشتۇرۇپ كۆزگە دائىم چىپىپ بېرىش كېرەك. شىياڧى ئەيەزنى ئاياللار سۈتىگە ئارىلاشتۇرۇپ كۆزگە تارتىش، بىنەپشە يېغى ياكى قاپاق يېغىنى بۇرۇنغا تېمىتىش كېرەك. مزاجنى ھۆللەشتۈرۈش مەقسىتىدە يەنە بادام يېغى، ئاياللار سۈتى ۋە نىلۇفەر ياغلىرىغا ئوخشاش ياغلارنى سۈركەش، كالا سۈت قايىمقى ۋە كالىنىڭ ئىلىكىدىن ياسالغان سەتۈنى بۇرۇنغا تارتىش كېرەك. كۆپ ئۇخلاش، ئاددىي شورپا، يىلتىلغان تۇخۇم سېرىقى ئىستېمال قىلدۇرۇش ۋە ئوسما، خام قاپاق، تەرخەمەكلەرنى مايلىق گۆش، سېمىز مېكىيان گۆشلىرى بىلەن پۇشۇرۇپ بېرىش لازىم. تۇزلۇق، چۈچمەل، قىرتاق ۋە قۇرۇتقۇچى نەرسىلەردىن پەرھىز قىلدۇرۇش كېرەك. ئومۇمەن، شىشسىمان سۇيۇقلۇق (روتوبەنى زوجاجىيە) گە ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىكتىن بولغان كۆز ئاغرىشىنى داۋالاشتا ھۆللۈك يەتكۈزگۈچى تاماقلار بىلەن غزالاندۇرۇش، ئارپا سۈيىنى بىر قانچە كۈنلەرگىچە ئۈزۈمەي ئىچكۈزۈش كېرەك. ئەگەر، ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك بىلەن بىرگە يەنە توسالغۇ بارلىقىمۇ مەلۇم بولسا مۇنزىچ بېرىپ بەدەننى تازىلاش (ئىستىفراغ قىلىش) كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن ياۋا سەۋزە تۇرۇقى 10 گرام، چىڭگىسەي تۇرۇقى، رۇمىبادىيان ھەر بىرى 12 گرام، سانامەككى، تۇسۇخۇددۇس ھەر بىرى 15 گرام، تۇرۇقىدىن ئاجرىتىلغان ئۈزۈم 45 گرام، تەمرى ھىندى، تەرەنجىبىن ھەر بىرى 60 گرام ۋە ئەنجۈردىن 20 دانە ئېلىپ، دورىلارنى قاينىتىپ 300 گرام قالغاندا دورىلارنى سۈزۈپ، 21 گرام شېكەر ۋە 15—10 گرام ئاچچىق بادام يېغى ئارىلاشتۇرۇپ يىلما يېتى ئىچكۈزۈلىدۇ. ئادەتتە، بۇ مەتبۇخىدىن ئىككى ئۇسۇخا تەييارلاپ بىر ھەپتىدە ئىچىپ بولىدۇ. بۇ مۇنزىچ مەتبۇخىنى ئىچكەن مەزگىللەردە ئاياللار سۈتىنى بىۋاسىتە كۆز ئەتراپى ۋە چېكىگە سۈرۈپ تۇۋۇلاش بىلەن بىرگە تۆۋەنكى زىمادنى ئارىلاپ چىپىش كېرەك.

ھەمىشە باھار ياپرىقى ياكى ئاق لەيلى ياپرىقىنى سالاھىيە قىلىپ تۇخۇم ئېقى، بىنەپشە يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ چىپىش، ئەمما كافۇرنى پۇراش ۋە كۆزگە يېقىن ئەكىلىشتىن ساقلىنىش كېرەك. شۇنى بىلىش كېرەككى، شىشسىمان سۇيۇقلۇقتا كېسەللىك بولسىلا بىنەپشە يېغى، قاپاق يېغى، سۆگەت يېغىنىڭ بىرىنى بۇرۇنغا تارتىپ چۈشكۈرتۈش (سەتۈت قىلىش) كېرەك. بولۇپمۇ، ئەگەر كۆز ئاغرىشقا باش ئاغرىقىمۇ قوشۇلۇپ كەلسە، ھۆللۈك يەتكۈزۈش ئۈچۈن شىياڧى ئەيەزنى ئاياللار سۈتى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ كۆزگە تارتىپ بېرىش كېرەك. ئەگەر كۆپلەپ ئىستىفراغ قىلىش، دائىم ئاچ قېلىشقا ئوخشاش ئىشلار تۈپەيلىدىن بەدەنگە قۇرۇقلۇق يېتىپ كۆزگە ئوزۇقلۇق يېتىشمىگەن بولسا، داۋالاش نۇقتىسىنى ئاساسلىق ھۆللۈك يەتكۈزۈشكە قارىتىش بىلەن





بىرگە ئىستىفراغ قىلىش، قۇرۇتقۇچ نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلىشتىن قەتئىي ساقلىنىش كېرەك. ھەر خىل سۈتلەرنى بىۋاسىتە باش-كۆزلەرگە سېغىش، بىنەپشە يېغىنى سەتت قىلىش، ئوغلاق ۋە كىچىك پاقىلانلارنىڭ گۆشى، ھارارىتى تۆۋەن شاراب ياكى ئارپا سۈيى ئىستېمال قىلدۇرۇش لازىم. قاتتىق تەنھەرىكەت، كۆپ تەرلەش ۋە مۇنچىغا ئۇزۇن چۈشۈپ بەك تەرلەپ كېتىشتىن ساقلىنىش لازىم. بىنەپشە، نىلۇفەر ۋە سۈگەت ياپراقلىرىغا ئوخشاش بەدەن، باش ۋە كۆزگە ھۆلۈك پەيدا قىلغۇچى دورا ۋە چارە تەدبىرلەرنى كېسەلنىڭ ياخشىلىنىش ئەھۋالىغا قاراپ قوللىنىش، ئەگەر ھۆل بىنەپشە تېپىلىدىغان پەسلى بولسا، يېڭى بىنەپشنى گۈلاب بىلەن نەمدەپ كەچتە باشقا قويۇپ ئوخلاشقا دەۋەت قىلىش كېرەك.

قارىچۇق (ئۈزۈمسىمان پەردە تۆشۈكچىسى) تارىيىپ كېتىشىدىن بولغان كۆز ئاغرىشتا ئەگەر قان ئارتۇق بولسا، ئالدى بىلەن قان ئېلىپ مزاجغا مۇناسىپ مۇسھەل بېرىپ بەدەننى تەنقىيە قىلغاندىن كېيىن باش ئاققۇزغۇچى دورا (مۇدەمىتات) لارنى كۆزگە تارتىش كېرەك. قوغۇشۇندىن كۆز چانقىغا مۇۋاپىق كېلىدىغان كۆز تويى ياساپ ئوتتۇرىسىدىن تۆشۈك قويۇپ داكا ياكى شىلمىق پىلاستىر (جياۋبۇ) بىلەن كۆزگە چاپلاش، يەنى قوغۇشۇن ئوتتۇرىدىكى تۆشۈكنى كۆزنىڭ ئۆدۈل ئوتتۇرىسىغا توغرا كەلتۈرۈپ، تۆشۈكنى ئوچۇق قويۇپ چاپلاش كېرەك. يورۇق نەرسىلەرگە قاراش، باشنى تۆۋەنگە ساڭگىلىتىشتىن ساقلىنىش كېرەك.

شىشىسىمان سۇيۇقلۇق (روتوبەتى جەلدىيە) نىڭ سىقىلىشىدىن بولغان كۆز ئاغرىشى داۋالاشتا كۆزنىڭ باشقا ئىششىق كېسەللىكلەرنى داۋالاشتا قوللانغان ئۇسۇللار قوللىنىلىدۇ. مەسىلەن كۆز ئەستە پەردىسى (تەبەقەئى مۇلتەھمە) نىڭ ياللۇغىنى داۋالاشتا قوللىنىلغان ئاغرىق پەسەيتىش ئۇسۇللىرى قوللىنىلىدۇ. ئىششىق يانغاندىن كېيىن ئىستىفراغ قىلىش، شىيافى ئەببەزنى كۆزگە تېمىتىش، ئاياللار سۈتىنى بىۋاسىتە باش-كۆزلەرگە سېغىش، مۇۋاپىق دورىلار بىلەن چۈشكۈرتۈش (سەتت قىلىش) كېرەك.

تورسىمان پەردە (تەبەقەئى شەبەككىيە) پۈتۈنلۈكى بۇزۇلغان (تەفەررۇقۇل ئىتتىسالى) دىن بولغان كۆز ئاغرىشتا، ئەسلىي كېسەللىككە داۋا قىلمىسىمۇ ئاغرىق پەسەيتىش ئۈچۈن دەسلەپتە قان ئېلىش، مزاج تەكشۈش، ئوزۇقلىنىشنى كۈچەيتىش كېرەك. ھەمدە ئەپيۇن چۈشكەن شىيافى ئەببەزنى توخۇ توخۇمنىڭ سېرىقى ۋە گۈل ياغلىرى بىلەن قوشۇپ ئىستېمال قىلدۇرۇش كېرەك.

بالا ھەمراھسىمان پەردە (تەبەقەئى مەشىمىيە) نىڭ بۇزۇلۇشىدىن بولغان كۆز ئاغرىشىنى داۋالاشتا باش ساھەسىدىن قان ئېلىش، دۈمبىسىگە لوڭقا قويۇش، ئىچىنى



يۇمشاتقۇچى دورا (مۇلەيىنات) لار بىلەن چوڭ تەرەتنى يۇمشىتىش كېرەك. ئىسبە غۇل ياپرىقى ۋە ئىت ئۈزۈمى ياپراقلىرىنىڭ سۈيىنى ئېلىپ قايىتىپ، ئارقىدىن ھوزۇز (روسۇت ھىندى) ۋە ئازراق شىياڧى ئەيەزنى ئېرىتىپ ئەتىگەن-كەچتە كۆزگە تارتسا بولىدۇ. خورما چېچىكىنى ئىسبە غۇل لۇئابى ۋە ئازراق سىركە، گۈل يېغى بىلەن يۇغۇرۇپ، ئۇخلاشتىن بۇرۇن كۆزگە چاپسىمۇ بولىدۇ.

قاتتىق پەردە (تەبەقە ئى سۇلبىيە) نىڭ ئىششىقى تۈپەيلىدىن بولغان كۆز ئاغرىشىنى داۋالاشتا ئەگەر ئوقۇدىن بولسا، باش ۋە يۈز ساھەلىرىدىن قان ئېلىنىدۇ. چوڭ تەرەتنى يۇمشىتىش ئۈچۈن كەيپىياتى يەڭگىل دورىلار، مەسلەن: بىنەپشە، نىلۇفەر، ئاق لەيلى، چىلان، سەرپىستان ۋە چالا پۇشۇرۇلغان ئارچىلارنى قايىتىپ سىقىپ سۈزۈپ، ئوڭا كۈنجۈت يېغى، قارا شېكەر ئارىلاشتۇرۇپ ئارقىمۇ-ئارقا بىر قانچە قېتىم ھۆقنە (كىلىزما) قىلىش كېرەك. ھەمدە مەتبۇخى سەرپىستان يەنى چىلان، سەرپىستان، ئەيۇلا، نىلۇفەر، ئاق لەيلى، شىرخىشت ۋە تەرەنجىبىنلەر قايىتىپ ئىچكۈزۈلىدۇ. ماددىلارنىڭ كۆزگە قۇيۇلۇشىنى توسىغاندىن كېيىن مېڭىدىن كېرەكسىز ماددىلارنى تازىلاش (تەنقىيە قىلىش) كېرەك. يۇقىرىقى چارە-تەدبىرلەرنىڭ ئۈنۈمى كۆرۈلمىسە، ئەيۇن (ئەيۇن) چۈشكەن شىياڧى ئەيەزنى قايناتقان ھۆل يۇمىغاقسۇت سۈيى، ئىت ئۈزۈمى چۆپىنىڭ سۈيى بىلەن بىللە كۆزگە تارتىش ۋە تېڭىش كېرەك. چىلان شەرىپىنى ئارپا سۈيى بىلەن داۋاملىق ئىچىش، بەزى مۇۋاپىق سەۋتۇتلارنى بۇرۇنغا تارتىپ چۈشكۈرتۈش پايدىلىق.

سەپرادىن بولغان كۆز ئاغرىشىنى داۋالاشتا زۇرۇر تېپىلسا قان ئېلىش ھەمدە يۇقىرىدىكى مەتبۇخقا سېرىق ھەلىيلە، خېمىرى بىنەپشە قوشۇپ ئىچكۈزۈپ ئىچىنى بوشتىش كېرەك ياكى قىزىلگۈل، بىنەپشە، ئەيۇلا، چىلان، تەمرى ھىندى، سېرىق ئوت ئورۇقى، كاسىن ئورۇقى، تەرەنجىبىن ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش دورىلار بىلەن چوڭ تەرەتنى بوشتىش كېرەك. ياكى سەپرا سۈرگىسى (مۇسەھلى سەفرا) بەرگەندىن كېيىن ئاقلانغان ئارپا ۋە بېھى ئورۇقى ھەر بىرىدىن 10 دانە، چەشمىخامدىن 20 گرام ئېلىپ چالا سوقۇپ ئازراق ئەزەرۈتنى قوشۇپ دورىلارنىڭ 2 ھەسسىسىچىلىك سۇ بىلەن قايىتىپ ماتۇششەئىر (ئارپا سۈيى) قىيامدەك ھالەتكە كەلتۈرۈپ، كېچە ۋە كۈندۈز بىر قانچە قېتىم كۆزگە تېمىتىپ بېرىلىدۇ. كېسەل كىشىنى ئوڭدىسىغا ياتقۇزۇپ، قاينىتىلغان سوغۇق سۇغا چىلانغان داكىنى كۆزگە قۇيۇش كېرەك. ئۇنىڭدىن كېيىن كەچتە ياتقاندا ئانار ۋە كاسىن ياپراقلىرىدىن تەڭ مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ، ئوڭا دورىلار بىلەن تەڭ مىقداردىكى ئىسبە غۇلنى قوشۇپ، گۈلاب ۋە گۈل يېغى بىلەن ئوبدان ئارىلاشتۇرۇپ كۆزگە چېپىپ تېڭىپ قويۇلىدۇ. ئەتىسى تېڭىقنى يېشىپ كۆزنى ئوبدان تازىلاپ، سوۋۇتقۇچى ۋە ھۆللەشتۈرگۈچى تاماقلار يېگۈزۈلىدۇ. ھەمدە بىنەپشە





يېغى ۋە ئاياللار سۈتىنى بۇرۇنغا تارتىپ چۈشكۈرتۈلىدۇ. بەزىدە شىياڧى ئەيەزنى كۆزگە تېمىتىسىمۇ بولىدۇ. ئىسسىقتا يول يۈرۈش، مۇنچىغا چۈشۈشتىن ساقلىنىش كېرەك.

بەلغەمدىن بولغان كۆز ئاغرىشىنى داۋالاشتا ماددىلارنى پۇشۇرۇپ، بەلغەم سۈرگىسى (مۇسھلى بەلغەم) ۋە ھەببى ئىيارەج بىلەن بەدەننى تازىلاپ (تەنقىيە قىلىپ) بولغاندىن كېيىن مەستكى يېغى بىر ھەسسە، ئىپار ھەسسە، ياۋا قاپاق يوپۇرمىقى (زوقرا) سۈيىدىن ئاز مىقداردا ئېلىپ، قاينىتىپ ھەر كۈنى ئاز-ئازدىن كۆپەيتىپ بۇرۇنغا تامغۇزۇلىدۇ. تۇنڭدىن كېيىن مۇرمەككى، قورۇلغان سىياھدان ۋە سالايە قىلىنغان زەئەفرەلەرنى رەختكە ئوراپ چۈشكۈرتۈش مەقسىتىدە بۇرۇنغا پۇرۇتۇلىدۇ. ئەگەر، چۈشكۈرتۈشنىڭ ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولمىسا كۈندۈش قوشسا بولىدۇ. ئىپارنى ئىششىق ياندۇرىدىغان دورىلار بىلەن قوشۇپ سۈرمە قىلىپ تارتسا بولىدۇ. دەسلەپكى باسقۇچلىرىدا ئاغرىق پەسەيتىش ئۈچۈن قىزىلگۈل، ئاس قاتارلىقلارنى شاراب ياكى تۇخۇمنىڭ سېرىقىدا پۇشۇرۇپ گۈل يېغى ۋە زەئەفرەلەرنى ئارىلاشتۇرۇپ زىماد قىلىنىدۇ.

كۆز ئاغرىش سەۋدا خاراكىتىلىك ئىششىقتىن بولسا مەتبۇخى ئەقىمۇن، سۇقۇڧى سەۋدا ياكى ھەببى لاجبۇرەد بىلەن بەدەن تەنقىيە قىلىنىدۇ. لېكىن، مەزكۇر سۈرگە دورىلىرىنى بېرىشتىن بۇرۇن قائىدە بويىچە مۇنزىج دورىلىرىنى بېرىپ كېسەل ماددىسى پىشۇرۇلغان ھەمدە بەدەنگە ھۆللۈك يەتكۈزىدىغان چارىلەر قوللىنىلغان بولۇشى شەرت. بۇنىڭدا كەيپىياتى يەڭگىل ئىستىفراغ دورىلىرى، مەسلەن: خىجىرى بىنەپشىنى ئەرقى گائۇزەبان بىلەن قوشۇپ بەدەننى تەنقىيە قىلىش، بەدەنگە ھۆللۈك يەتكۈزۈش ھەمدە مېڭە ۋە كۆزنى ھۆللەشتۈرۈش ئۈچۈن ھۆللۈك يەتكۈزگۈچى غىزا ۋە شەربەتلەرنى تاللاپ ئىستېمال قىلدۇرۇش لازىم. ئايال سۈتى ياكى تۈچكە سۈتىنى باش-كۆزلەرگە قۇيۇش ۋە بۇرۇنغا تېمىتىش كېرەك. ئايال سۈتى، بىنەپشە يېغى، نىلۇفەر يېغى ۋە ھەمىشە باھار سۈيىنى بۇرۇنغا تېمىتىسا، ئۈنۈمى ناھايىتى ياخشى. تامىقىغا ئارپا ۋە دادۇر سۈيىگە ئوخشاش ھۆللۈك بۇخار پەيدا قىلىدىغان تاماقلار بېرىلىدۇ.

ئەگەر يۇقىرىقى ئۇسۇللار بىلەنمۇ كۆز ئاغرىشتا ياخشىلىنىش كۆرۈلمىسە ئارپىنى كۆيدۈرۈپ شىياڧى ئەيەز بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، تۇخۇمنىڭ ئېقىدا ئېرىتىپ ئەتىگەن ۋە ئاخشامدا كۆزگە تارتىش؛ كۆزنى گولابتا نەمدەلگەن داكا بىلەن تېڭىپ قويۇش كېرەك.

كۆز ئاغرىقى يەڭگىللەپ، كۆزنىڭ چىڭقىلىپ پولىتىشى ۋە چەكچىشى ئازايسا، قىزىتىلغان لۇڭگە، گېرىلكا قاتارلىق نەرسىلەر بىلەن كۆزگە ئىسسىق تۈتكۈزۈش؛ باش ساھەسىگە ئىسسىق سۇ قۇيۇپ بېرىش كېرەك. يەنە بابۇنە، ئىككىلىملىك ۋە شۇنىڭغا





ئوخشاش ئىششىق تارقاتقۇچى دورىلارنىڭ قاينىتىلغان سۈيى بىلەن تەرلىتىش كېرەك. كۆز ئاغرىش قاتتىق پەردە (تەبەقە ئى سۈلبىيە) قۇرغاقلىشىشىدىن بولسا، كۆزنىڭ مزاجىنى ھۆللەشتۈرۈشكە تىرىشىش لازىم. بىنەپشە يېغى ياكى نىلۋەن يېغى ۋە موملار بىلەن تەييارلانغان قىروتىنى ئەسەررائى سۈيى، قاپاق لېشى سۈيى قاتارلىقلار بىلەن نەمدەپ باش ۋە پۈتۈن بەدەنگە سۈركەش كېرەك. شىياڧى ئەببەزنى سۈتتە ئېرىتىپ كۆزگە تېمىتىش، قىز تۇغقان ئاياللار سۈتىنى كۆزگە سېغىش كېرەك. ئوڭدېسىغا يېتىپ ئوخلاشتىن قەتئىي ساقلىنىش لازىم. ئەگەر، ئوي ئىسسىپ كېتىپ سىرتقا چىقىشقا توغرا كەلسە يۈزنى يېپۈپلەش كېرەك.

قاتتىق پەردە (تەبەقە ئى سۈلبىيە) نىڭ پالەجلىنىپ بوشاپ كېتىشىدىن بولغان كۆز ئاغرىشىنى داۋالاشتا، ئالدى بىلەن مۇنزىج بېرىپ كېسەل ماددىسىنى پىشۇرغاندىن كېيىن بەلغەم مۇسەلى ۋە ھەببى ئىيارەجلەر ئارقىلىق بەدەننى تەنقىيە قىلىش كېرەك. ئۈنىڭدىن كېيىن غۇنچە ئۈزۈم، ئاقىرقەرھە، دورىلىق ئاچچىقسۇ ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش تەنقىيە قىلىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە غەر-غەر دورىلار بىلەن ئېغىز چايقاش؛ مەستكى، كۈندۈر، راتىيانەج ۋە ئىگىرلەرنى يالغۇز ياكى قۇرۇق ئۈزۈم بىلەن قوشۇپ چايناش؛ قارا سەئىدھىندىنى تىلغا سۈركەش، شىياڧى ئەھمەرنى مەتبۇخى زۇفا بىلەن ئېرىتىپ دائىم كۆزگە تامغۇزۇش كېرەك. تاماقلاردىن سۇيۇقلۇقلارنى تۈزىگە شۇمۇرىدىغان ھەر خىل قورما (كاۋاپ) لار ۋە قىرغاۋۇل، كەكلىك گۆشى بىلەن پۇشۇرۇلغان تاماقلارنى ئىستېمال قىلىش كېرەك. ئەگەر كېسەل كىشىنىڭ بەدەن قۇۋۋىتى، قۇرامى، پەسىل ۋە باشقا شارائىتلار مۇۋاپىق كەلسە باش ساھەسىدىن قان ئالسىمۇ بولىدۇ. بۇ چارىلەر بىلەنمۇ كېسەللىك ياخشى بولۇپ كېتەلمىسە ئۈچەيلەرنى قويۇق سۇيۇقلۇقلاردىن تازىلايدىغان ھۆقنە دورىلىرى بىلەن كىلىزما قىلىش كېرەك. نورمال دەرىجىدە تەنھەرىكەت قىلىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. ناۋادا كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىرلىشىپ قالسا، ئۈنىڭغا باش ئاغرىقى قوشۇلۇپ قالىدۇ. مۇنداق ئەھۋالدا كۆزگە قارىتا دورا قىلىشنى توختىتىپ، باش ئاغرىقىنى داۋالاش كېرەك. چۈنكى، باش ئاغرىقى ساقايسا كۆز كېسەللىكىمۇ ساقىيىپ كېتىدۇ. ئۈزۈمسىمان تۆشۈكنىڭ ئىششىقىدىن بولغان كۆز ئاغرىشىنىڭ داۋالاش ئۇسۇلى كۆز ياللىغى (رەمەد) نى داۋالاش بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدۇ.





## قاپاق ۋە كىرىپك كېسەللىكلىرى

قاپاق ۋە كىرىپكە ر كۆزنى مۇھاپىزەت قىلىدىغان مۇھىم ئەزالاردۇر. گەرچە ئۇلار بىۋاسىتە كۆرۈش خىزمىتىگە قاتناشمىسىمۇ، لېكىن كۆزنىڭ نورمال كۆرۈشىدە مۇھىم ۋاسىتىچىلىك رول ئوينايدۇ. قاپاق تەبىئىي ھالدا ئېچىلىپ-يۇمۇلۇپ كۆزنى كۈچلۈك تۇر، سىرتقى زەخمىلەردىن ساقلايدۇ ۋە بەلگىلىك كۆرۈش ئورنى بىلەن تەمىنلەيدۇ. مۇشۇ كۆز پەردە يۈزىنى بىر قەۋەت سۇيۇقلۇق بىلەن نەم دەپ تۇرىدۇ. كىرىپكە ر كۆزنى ھەر خىل چاڭ-توزانلاردىن ساقلايدۇ. قاپاق ۋە كىرىپكە ردىكى ھەر خىل كېسەللىكلەر، مەسىلەن: قاپاق ساڭگىلاش (پالە جىلىنىش)، قاپاقتىكى ئىششىق ۋە ھەر خىل جاراھەتلەر ھەمدە تەتۈر ئۈزگەن كىرىپك قاتارلىقلار كۆزنىڭ كۆرۈش خىزمىتىگە بەلگىلىك دەرىجىدە تۇقسان يەتكۈزىدۇ يەنى قاپاقتا پالە جىلىنىش، ئىششىق بولغاندا كۆز نورمال ئېچىلمايدۇ؛ تەتۈر ئۈزگەن كىرىپك كۆز يۇمىلىقىغا سانجىلىپ بىئارام قىلىدۇ. شۇڭا ئۇلاردا كۆرۈلگەن نورمالسىزلىقلار ۋە كېسەللىكلەرنى ۋاقىتدا داۋالاپ ساقايتىش يەنىلا بەلگىلىك مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.

قاپاق كېسەللىكلىرىگە دورا ئىشلىتىپ بولغاندىن كېيىن ئەڭ ياخشىسى قاپاقنى تېڭىپ قويۇش، باشنى كېسەل بولغان تەرەپكە قويۇپ ئارام ئېلىش ياكى ئوخلاش كېرەك. دورا بىلەن ھەل قىلىشقا مۇمكىن بولسىلا دەستكارلىق (ئوپىراتسىيە) ئۇسۇلى بىلەن بىر تەرەپ قىلىشقا ئالدىرىماسلىق، دورا بىلەن داۋالاش مۇمكىن بولماي چوقۇم دەستكارلىق ئۇسۇل بىلەن داۋالاش توغرا كەلسە ئالدى بىلەن بەدەننى تەنقىيە قىلىپ ئاندىن كېيىن ئوپىراتسىيە قىلىش لازىم. ئوپىراتسىيىدىن كېيىن ھەر قانداق گۆشنى ئىستېمال قىلىشتىن ساقلىنىش، مۇناسىۋەتلىك دورىلار بىلەن تەكشۈلگەن گۈرۈچ شويلىسى، ئېرتىلگەن تۇخۇم سېرىقى قاتارلىق چىقىرىندىلىرى ئاز بولغان خىلىت تەكشۈش ۋە توختىتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە نەرسىلەر بىلەن ئوزۇقلىنىش ھەمدە بىر نەچچە كۈنگىچە قاتتىق ھەرىكەت قىلىشتىن ئېھتىيات قىلىش لازىم.





## كۆزگە قۇم تىقىلغاندەك بولۇش

كۆزگە قۇم تىقىلغاندەك بولۇش (كۆمەنە تۆلجە فەنى) كۆپىنچە ئويۇقۇدىن كېيىن كۆزگە قۇم ياكى توپا كىرىپ كەتكەندەك بىلىنىدىغان ئەھۋالغا قارىتىلغان بولۇپ، ياشانغانلاردا ۋە قۇرغاق جايلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ.

سەۋەبى

ئۇخلىغاندا ناچار يەللىك ماددىلارنىڭ قاپاق ۋە قاپاق گىرۋەكلىرىگە تىپىلىشىپ قالغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامىتى

يەللىك ماددىلار قاپاق ھەرىكىتىگە توسالغۇ پەيدا قىلغاچقا ئويۇقۇدىن كېيىن كۆزنى ئاچقاندا كۆزگە قۇم، توپا كىرىپ قالغاندەك بىلىنىدۇ.

داۋاسى

بىمار مىزاجىنىڭ دەرىجىسىگە قاراپ قان ئېلىش ۋە مۇسەھل دورىلار بىلەن بەدەندىن يەللىك ماددىلارنى تازىلاش لازىم. ھەببى سەيرە ئىستېمال قىلسا بولىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن قاپاق گىرۋەكلىرى ۋە سۇيۇقلۇق قاتلىمىنى تەنقىيە قىلىش ئۈچۈن شىيافى ئەھمەزلەين، شىيافى سۇنۇبۇلغا ئوخشاشلار ئىشلىتىلىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن زۆرۈرى ئەسفەر كەبىرى، شىيافى ئەھمەزھار، كوھلى باسلىقۇن قاتارلىقلار بىرىنىڭ كەينىدىن بىرى كۆزگە تارتىلىدۇ.

بادام يېغى، بىنەپشە يېغى، ئايال سۈتى قاتارلىقلارنى بىرلەشتۈرۈپ كۆزگە تېمىتىش، سەبىرنى يۇمشاق سۇقۇپ سۇيۇلدۇرۇپ كۆزگە سۈرمە قىلىپ تارتىش مەنپەئەتلىك.





كۆزنى دائىم يىلمان سۇدا يۇيۇش ياكى ھەر كۈنى ئەتىگەندە مۇنچىغا چۈشۈش كېرەك. ئوزۇقلىنىشتا ئاشقازاننى كۈچلەندۈرىدىغان تەبىئىي يۇمشايدىغان سىڭىشلىك تاماقلارنى ئىستېمال قىلىش، كالا گۆشى ۋە ھەر خىل پۇرچاق تۈرىدىكى يېمەكلىكلەر، كونا سۈت، قېتىق، قايماقلاردىن پەرھىز قىلىش؛ چاچنى پاكىز تۇتۇش، كۆزنى سۈت بىلەن يۇيۇش لازىم.

## قاپاق يەللىك ئىششىقى

قاپاق يەللىك ئىششىقى (تەھەبىجۈكە جىفانى، ئىتتىفاخۇكە جىفانى) قاپاقتىكى يەل خاراكتېرلىك ئىششىققا قارىتىلغان بولۇپ، بەزىدە پەيدا بولۇپ، بەزىدە يوقاپ تۈزگىرىپ تۇرىدۇ.

### سەۋەبى


ئاساسەن ئاشقازان، ئۈچەي، جىگەر، بۆرەك قاتارلىق ئەزالارنىڭ برەرسى ئاجىزلاپ، ماددا ئالمىشىش (بەدەلى مابەتەھەللەئۇ) خىزمىتىدە نورمالسىزلىق پەيدا بولسا، قاپاقتا ئىششىش كېلىپ چىقىدۇ.

1. يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ئەزالارنىڭ برەرسىدە ئەسلىي ھارارەت ئاجىزلاپ سوغۇقۇق ياكى ھۆللۈك ئېشىپ كەتسە، ھەزىم قىلىش، ماددا ئالمىشىش ئاجىزلاپ قاپاقتىكى يەللىك ئىششىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۆرەك خىزمىتى ناچارلاشقاندىمۇ پۈتۈن بەدەننىڭ، جۈملىدىن قاپاقتىكى ئىششىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

2. يۇقىرىدا ئېيتىلغان ئەزالارنىڭ برەرسىدە بەلغەم خىلىتى خاراكتېرلىك ئىششىق پەيدا بولسا، قاپاقتىكى ئىششىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

### ئالامىتى

قاپاق ئىششىقى تۈز ئالدىغا مۇستەقىل كېسەللىك بولمىسىمۇ، لېكىن ئۇ، ئىچكى ئەزالارنىڭ برەرسىدە كېسەللىك بارلىقىنىڭ مۇھىم بەلگىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئادەتتە





كشىلەر ئۇنى قاپقىم ئىشىپ قالدى، دەپ شىكايەت قىلدۇ. ئىشىق بەزىدە يوقىلىپ، بەزىدە پەيدا بولۇپ قالىدۇ. كېسەل كىشىدە سىرتقى جەھەتتىن زەخمىلەنگەنلىك تارىخى بولمايدۇ.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن ئىشىقنىڭ قايسى ئىچكى ئەزادىكى كېسەللىك تۈپەيلىدىن بولغانلىقىنى ئېنىقلاش كېرەك. ئەگەر قايسى ئەزادىن بولغانلىقى سېزىلسە شۇ ئەزانى داۋالاش، شۇ ئەزانىڭ مىزاجىنى تۈزەش ۋە بەدەننىڭ ھەزىم قىلىش، ماددا ئالماشتۇرۇش خىزمىتىنى كۈچەيتىش لازىم. شۇنداق قىلغاندىلا قاپاق ئىشىقىنى تېگىدىن ساقايتقىلى بولىدۇ. شۇڭا ئىشىغان قاپاققا ئامال قىلىش ھاجەتسىز.

## قاپاق قىچىشىش خاراكتېرلىك ئىشىقى

قاپاق قىچىشىش خاراكتېرلىك ئىشىقى (شەرا) قاپاقتا قىچىشىش بىلەن بىرگە كۆرۈلگەن ئىشىققا قارىتىلغان.

### سەۋەبى

سەپرا، قان ۋە ئاچچىق بەلغەمنىڭ ئۆتكۈزۈلۈشىدىن پەيدا بولىدۇ. بەزىدە بۇ 3 خىل ماددىنىڭ ئىككىسى ياكى ھەممىسىدىن مۇرەككەپ ھالدا كېلىپ چىقىدۇ.

### ئالامىتى

دەسلەپتە قاپاقتا قىچىشىش پەيدا بولۇپ، قىچىشقانسېرى ئۇششاق ئىشىقلار پەيدا بولىدۇ. ئىشىق كۆپىنچە كېچىسى ئېغىرلىشىدۇ. سەپرا خاراكتېرىدىكىسىدە قىچىشىش، قان خاراكتېرىدىكىسىدە قىزىللىق كۈچلۈكرەك بولىدۇ.



بەلغەم خاراكىتىرىدىكىسىدە بىمار ھورۇن بولۇپ قالدۇ.

داۋاسى

ئالدى بىلەن قىفال تومۇرىدىن ئازراق قان ئېلىش، ئەيۇلا، قارا تۈرۈك قاينىتىلمىلىرىنى ئىچكۈزۈش ياكى تەمرى ھىندى ۋە سېرىق ھەلىيە قاينىتىلمىلىرى، خېمىرى بىنەپشەلەرنى ئىچكۈزۈش ئارقىلىق ئىچىنى سۈردۈرۈشتەك يەڭگىل داۋالاش ئوسۇللىرىنى قوللىنىش كېرەك.

سەپرانى قايتۇرغۇچى ۋە سوۋۇتقۇچى، قەينى توختاتقۇچى، تەبىئىي سوغۇق، تەمى تاتلىق نەرسىلەر بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش لازىم. ئەيۇلا، قارا تۈرۈك، ئانار، غورا، ئارپا سۈيى ۋە ھەر خىل مېۋىلەر سۈيى قاتارلىقلارنى يۇيۇلغان شادىنەج تالقىنى بىلەن قاپاققا سۈرۈش كېرەك. سېرىق ھەلىيە پوستى چىلانغان قىزىلگۈل ئەرىقىنى كۆزگە تېمىتىش لازىم. ئىسبەغۇل ئۇرۇقى شىرىسىنى ئەرىقى گۈل بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، قاپاققا سۈركىسىمۇ بولىدۇ.

## قاپاق ساڭگىلاش

قاپاق ساڭگىلاپ قېلىش (ئىستىرخائىئولجەفەنى) قاپاق بوشىشىپ ساڭگىلاپ قېلىپ، كۆزنىڭ نورمال خىزمىتىگە تەسىر يەتكۈزگەنلىكىگە قارىتىلغان. ئۇ، توغما خاراكىتىرلىك ھەم ئىككىلەمچى خاراكىتىرلىك قاپاق ساڭگىلاش دەپ ئىككى خىل بولىدۇ.

سەۋەبى

قاپاقنىڭ ساڭگىلاپ قېلىشى بىرلا ياكى ئىككى قاپاققا كۆرۈلىدۇ. توغما خاراكىتىردىكىلەردە كۆپىنچە ئىككى قاپاق ساڭگىلاپ قالىدۇ. بۇ، ھامىلىنىڭ نورمال تەرەققىي قىلمىغانلىقى بولۇپمۇ قاپاق گۆشلىرىنىڭ تولۇق تەرەققىي قىلمىغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

بەزى كىشىلەردە نەسەپ تارتىش (ئېرمىيەت) خاراكىتىرىدىمۇ بولىدۇ.



ئىككىلەمچى خاراكتېردىكىسى كۆپىنچە بەلغەم ماددىسى يەنى ھۆللۈك ئېشىپ كېتىپ تۇتىنچى ھەزىمىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن يەرلىك ئورۇن قۇۋۋەتسىزلىنىپ پەيدا بولىدۇ. يەنە بەزى كىشىلەردە توقۇلمىلارنىڭ قىسمەن ھالدا بۇزۇلۇشى يەنى سىرتقى جەھەتتىن زەخمىلىنىشى (مەسىلەن: چېكە ئەسەبلىرىگە بىر نەرسە تېگىپ كېتىش) قاتارلىق سەۋەبلەردىنمۇ قاپاقنىڭ ساڭگىلاپ قېلىشى كېلىپ چىقىدۇ.

### ئالامىتى

تۇغما خاراكتېرلىك ۋە نەسەب سەۋەبىدىن بولغان قاپاق ساڭگىلاپ قېلىشتا، قاپاقنىڭ ساڭگىلاش دەرىجىسى ئوخشىمايدۇ. يېڭى تۇغۇلغان بۇۋاق بالا كۆزىنى ئاچالمىي كېيىن تەدرىجىي ھالدا قاپاق ساڭگىلىغانلىقى مەلۇم بولىدۇ.

ئىككىلەمچى خاراكتېرلىك قاپاق ساڭگىلاپ قېلىشتا، ساڭگىلاش دەرىجىسى يېنىك بولسا، قاپاق كۆزنى يېرىم توساپ ئالىدۇ. ئەگەر ئېغىر بولسا، كۆزنى پۈتۈنلەي توساپ ئېلىپ، كۆزنى نورمال ئاچقۇزمايدۇ. ئەگەر ئۆز ھۆللۈك بەك ئېشىپ كەتكەنلىكتىن بولسا ياش كۆپ چىقىپ، باش ئېغىرلىشىپ، كۆز چىڭقىلىدۇ. ئۇخلاپ قوپقاندىن كېيىن قاپاق بەكرەك ساڭگىلاش، ھەرىكەت قىلغاندىن كېيىن ئوڭلىنىپ قېلىش، سوغۇقتا كۈچىيىش، ئىسسىقتا يەڭگىلەشتەك ئالامەتلەر بولىدۇ. قاپاق گۆشلىرى بوشىشىپ كەتكەنلىكتىن بولسا، ئەتىسى ئورۇندىن تۇرغاندا قاپاق ساڭگىلاش يېنىكلەيدۇ. ھېرىپ چارچىغاندا قاپاق ساڭگىلاش ئېغىرلىشىدۇ.

سىرتقى زەخمىلىنىشلەردىن بولغانلىرىدا زەخمىلىنىش تارىخى بولىدۇ.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن سەۋەبلەرنى يوقىتىش، كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى ماددىنى تازىلاپ مىزاجىنى تەڭشەش كېرەك. ئۇنىڭدىن كېيىن پالەچكە قىلىندىغان چارىلەرنى قىلسا بولىدۇ. ئىيارەجلەر ۋە ئىترىفېل كەبىر قاتارلىق دورىلار ئىشلىتىلىدۇ. بوز بوغىنى سۇ بىلەن سۈركەپ سۈيىنى قاپاققا سۈرتۈش كېرەك. قۇندۇز قەھرىدىن 2 گرام ئېلىپ يۇمشاق يانچىپ، زەيتۇن يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئاز-ئازدىن قاپاققا چېپىش كېرەك. ئەگەر، يۇقىرىقى ئۇسۇللاردا داۋالسىمۇ ئۈزۈنمىچە ساقايمىغانلارنى بولۇپمۇ تۇغما خاراكتېرلىك قاپاق ساڭگىلاشنى مەخسۇس دەستكارلىق تۈزەش ئۇسۇللىرى بىلەن داۋالاش كېرەك.







ئەمما، قاپاق قۇۋۋەتسىزلەنگەنلىكتىن پەيدا بولغان قاپاق ساڭگلاشنى دەستكارلىق تۈسۈلى بىلەن داۋالىغىلى بولمايدۇ.

## چىمچىقلىق

چىمچىقلىق (ئىختىلاجۇلجەفەنى) قاپاقلارنىڭ ئىختىيارسىز ھالدا ئېچىلىپ يۇمۇلۇپ ھەرىكەت قىلغانلىقىغا قارىتىلغان بولۇپ، ئىككىلا كۆزنىڭ ياكى بىر كۆزنىڭ قاپاق تارتمۇش پەيلىرى ئىختىيارسىز لېپىلداپ ھەرىكەت قىلىپ كۆز نورمال كۆرۈش خىزمىتىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ.

سەۋەبى

ئىچكى - تاشقى، ئىسسىق - سوغۇق، ھۆل - قۇرۇق سەۋەبلەرنىڭ قاپاققا يامان تەسىر قىلىشى، بەزى بۇزۇق ماددىلارنىڭ مەلۇم ئورۇنلاردا تۇرۇپ قېلىشى، كۆز، قاپاق، مېڭە سېزىش كۈچىنىڭ ئاجىزلىشىپ كېتىشى ياكى توسۇلۇشى نەتىجىسىدە قاپاق ئۈزلۈكسىز ئىختىيارسىز ھەرىكەت قىلىدىغان بولۇپ قالىدۇ. قاتتىق خاپا بولۇش، كۆپ يىغلاش ۋە خۇش بولۇش، غەم - ئەندىشە قىلىش، ئۆتكۈر مۇزلۇق سۇ بىلەن باشنى يۇيۇش ياكى چىكە ساھەسىگە بىر نەرسە تېگىشتەك باھانە ئامىللار بەزى كىشىلەردە مەزكۇر كېسەللىكنىڭ كېلىپ چىقىشىغا سەۋەب بولىدۇ. مەلۇم سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن كۆزنى چىمچىقلىتىشقا ئادەتلىنىپ قېلىشتەك ئەھۋاللارمۇ بولىدۇ.

ئالامىتى

بىر كۆزنىڭ قاپىقى ياكى ئىككىلا كۆزنىڭ قاپىقى ئىختىيارسىز ھالدا يۇمۇلۇپ ئېچىلىپ، لېپىلداپ ئۈزلۈكسىز ھەرىكەت قىلىدۇ. قايسى ماددا بۇزۇلغانلىقىدىن بولغان بولسا، شۇ ماددىغا خاس بەلگىلەر كۆرۈلىدۇ. لېكىن بۇ كېسەللىك كۆپىنچە ھۆللۈكتىن بولغاچقا كۆزدىن ياش ئېقىش، سوغۇق ھاۋاغا چىققاندا كۈچىيىش، تومۇرى بوش سېلىپ، سۈيدۈكى ئاق كېلىشتەك بەلگىلەر كۆرۈلىدۇ. كۆز



قىلىپ - ئېچىلىپ تۇرغاچقا خەلق ئارىسىدا چىمچىق، دەپ ئاتىلىدۇ.

### داۋاسى

قايسى ماددىدىن بولغان بولسا شۇ ماددىنى تەكشۈش ئۈچۈن مۇناسىپ مۇنزىچ ۋە مۇسەھلارنى بېرىش ئاندىن كېيىن ئاساسەن پالەچكە قىلىندىغان دورىلارنى ئىشلىتىش بىلەن بىرگە ھەببى ئىيارەج، مەئجۇنى داۋائىلمىشكى ھار قاتارلىق دورىلارنى بېرىش كېرەك.

سىرتقى جەھەتتىن رەۋغىنى قۇستە مۇرەككەب، رەۋغىنى فەرفىيۇن قاتارلىقلار بىلەن ياغلاش كېرەك. ھەر خىل سوغۇقلۇق ئىشلار ۋە يېمەكلىكلەردىن پەرھىز قىلىش، ئاغرىقنىڭ مىزاجىغا قاراپ ئىسسىقلىق ئۇسۇل - چارىلەرنى قىلىش ۋە يېمەك - ئىچمەكلەر بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش كېرەك.

مەلۇم سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن كۆزنى چىمچىقلىتىشقا ئادەتلىنىپ قالغان بولسا، ئۇنى ئاڭلىق ھالدا تىزگىنلەشكە يېتەكلەش ياكى مەجبۇرى باشقۇرۇش ئارقىلىق تۈزەش كېرەك.

### قاپاق كېپەكلىشىش

قاپاق كېپەكلىشىش (سەئفە تۆلجە فەنى) قاپاق ۋە كىرىك تۈۋىگە تۇششاق جاراھەتلەر چىقىپ كېپەكلەشكە ئىلگىر قارىتىلغان.

### سەۋەبى

كۆپىنچە قۇرۇقلۇق ۋە ھۆللۈكتىن پەيدا بولىدۇ. يەنى بۇزۇلغان سەۋدا ياكى بەلغەم ماددىسىدىن ئۆزلىگەن يەلنىڭ قاپاققا يامان تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بەزىدە بۇ ئىككى ماددىنىڭ ئارىلاشمىسىدىن، بەزىدە سەپرا ماددىسىدىن پەيدا بولىدۇ.



## تالامىتى

قاپاق ۋە كىرىك ئاستىغا ئوششاق جاراھەتلەر پەيدا بولۇپ كېيەكلىشىدۇ. كېسەللىك ماددىسى ئېغىر بولسا كىرىكلەرمۇ تۆكۈلىدۇ. ماددىسى يەڭگىل بۇخاراتتىن بولسا، ئۈزلۈكسىز ساقىيىمۇ كېتىدۇ. بەزىدە بۇ ئوششاق جاراھەتلەر پۈتكۈل قاپاقنى ئىگىلەيدۇ. ھۆل يەنى بەلغەم خاراكىتىرىدىكىسىدە جاراھەتلىنىپ يىرىڭلاش بىلەن بىرگە چۈشكەن كېيەكلىرى ئاقۇش رەڭدە بولىدۇ. قۇرۇق يەنى سەۋدا خاراكىتىرىدىكىسىدە جاراھەتنى قۇرۇق بولۇش بىلەن بىرگە كېيەكلىرى قارىغا مايىل كۆپرەك بولىدۇ. سەپرا خاراكىتىرىدىكىسىدە كېيەكلىرى سېرىققا مايىل بولىدۇ.

## داۋاسى

ئازراق قان ئېلىش ۋە مۇناسىپ سۈرگە دورىلىرى بىلەن بەدەننى تازىلاش لازىم. قايسى ماددا كۈچلۈك بولسا ئالدى بىلەن شۇ ماددىغا مۇناسىپ سۈرگە ئىچىش لازىم.

تۈزلۈك تاماقلار، دورا قوشۇلغان يېمەكلىكلەر ۋە ھالۋا قاتارلىقلاردىن پەرھىز قىلىش، ئاسان سىڭىدىغان تاماقلار، مەسلەن: چۈچىسىنىڭ شورپىسىغا ئوخشاشلار بىلەن ئوزۇقلىنىش لازىم. قۇرۇقتىن بولغانلىرىدا ھۆللۈك پەيدا قىلىش ئۈچۈن ماۋۇلجىبىن شەرىتى ئىچكىۈزۈش ۋە كېسەللىك ماددىسىنىڭ تۆتكۈرلۈكىنى پەسەيتىش ئۈچۈن مۇنچىغا چۈشۈش لازىم. بۇغداي كېپىكىنىڭ قاينىتىلمىسى بىلەن قاپاقنى يۇيغاندىن كېيىن رۇسۇت ۋە مامىشا (تۆگە تاپىنى) قاتارلىقلارنى يۇمشاق سوقۇپ قىزىلگۈل يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ يەرلىك ئورۇنغا سۈركىگەندىن كېيىن شىيافى ئەھمەر، شىيافى ۋەج (ئىگىز) نى سۈرمە قىلىپ سۈركەش كېرەك. گۈل سۆسۈن يوپۇرمىقىنى جاراھەت ئۈستىگە 2-3 قېتىم تاڭسا جاراھەتنى ساقىيىپ كېتىدۇ.

بەلغەم خاراكىتىرىدىكىسىدە بەلغەمنى تازىلاپ بولغاندىن كېيىن ھۆللۈك پەيدا قىلغۇچى تاماقلاردىن ساقلىنىش بىلەن بىرگە شىيافى ئەسفەرنى ئۈنۈمدىن كېيىن شىيافى ئەھمەرلەيىننى سۈرمە قىلىپ تارتىش لازىم.

كېسەللىك ماددىسى كۈچلۈك بولسا خىلتنى تازىلاپ بولغاندىن كېيىن موزا، ئانار





گۈلى، خۇنسىياۋشانلارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ يېپەك رەختكە ئوراپ قاپاققا قويۇش، ئۇنىڭدىن كېيىن شىيافى ئەھمەرلەيىن بىلەن تېز تەسىر قىلغۇچى شىيافى ۋە جىنى سۈرمە قىلىش لازىم. بىر ئايغىچە ئىيارەجى فەيقەرانى 3 كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 3 گرامدىن ئىستېمال قىلىش، ئۇنىڭدىن كېيىن چۈجە شورپىسى ئىچىش بىلەن بىرگە مۇنچىغا چۈشكەندىن كېيىن گۈل يېغى بىلەن مايلاش، سەۋدا پەيدا قىلىدىغان تاماقلاردىن پەرھىز قىلىش، قوزنىڭ كالا-پاقالچەكلىرى ۋە چالا پۇشۇرۇلغان تۇخۇم سېرىقى قاتارلىقلارنى ئىستېمال قىلىش كېرەك. بۇلار مەزكۇر كېسەللىكنى داۋالاشقا ناھايىتى پايدىلىق.

ئەگەر كېسەللىك كوناغان بولسا ھەببى ئىيارەج بىلەن بەدەننى دائىم تازىلاپ تۇرۇش بىلەن بىرگە شىيافى ئەھمەر ھارنى سۈرمە قىلىپ تارتىش لازىم. ئەگەر، يۇقىرىقى دورىلار بىلەنمۇ جاراھەت يوقالمىسا، جاراھەتكە نەشتە تۇرۇپ ئازراق قان چىقارغاندىن كېيىن كۈھلى روشنائىنى سۈرمە قىلىپ تارتىش لازىم. ئادەتتە جاراھەتكە شىياف دورىلار ئىشلەتكەندە دورىنىڭ ئاسان تەسىر قىلىشى ئۈچۈن يەرلىك ئورۇننى پىلتىكۈچ بىلەن سۈركەپ قىزارتىش لازىم.

## قاپاق ۋەرمىسى

قاپاق ۋەرمىسى (ۋەرەمۇلجەفەنى) ھەر خىل ئىچكى، تاشقى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن قاپاقنىڭ ئىشىشىپ يالغۇلانغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

كۆپىنچە 4 خىلىتىنىڭ غەيرىي نورمال ئۆزگىرىپ قاپاققا يامان تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

قان ماددىسىنىڭ غەيرىي نورمال ئۆزگىرىپ قاپاققا يامان تەسىر كۆرسەتكەنلىكىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭغا قاننىڭ غالىب كېلىپ قاپاقلارغا قويۇلغانلىقى ياكى باش ساھەسىدە قان توشۇپ قاپاقلارغا چۈشكەنلىكى ياكى قاپاققا بىر نەرسە قاتتىق تېگىپ كەتكەنلىكى سەۋەب بولىدۇ. بۇلار، پەلغەمۇنى دەپ ئاتىلىدۇ، سەيرانىڭ بەدەن ۋە باش





ساھەسىگە غالىب كەلگەنلىكىدىن بولغان قاپاق ۋەرمى ھۇمرا، بەلغەمى غەلبىزنىڭ قاپاققا يامان تەسىر قىلىشى يەنى سۇغۇقتىن بولغىنى ۋەرمى رەخۇ، سوغۇق سەۋدا يەنى سوغۇق يەلدىن بولغىنى ۋەرمى سەلب دەپ ئاتىلىدۇ.

### ئالامىتى

قاپاق ۋەرمى قاندىن بولغان بولسا ئىششىقنىڭ رەڭگى قىزىل بولىدۇ، بارماق بىلەن باسقاندا قىزىللىقتا ئۆزگىرىش بولمايدۇ، قاپاق لوقۇلداپ تارتىشىپ ئاغرىيدۇ. سەپرادىن بولسا ئىششىق قاپاقنى بارماق بىلەن باسقاندا قىزىللىق ئاقىرىدۇ، قاپاق قاتتىق كۆيۈشۈپ، ئېچىشىدۇ. بەلغەمدىن بولسا بارماق بىلەن باسقاندا ئىششىق يۇمشاق، رەڭگى ئاق بولىدۇ، كۆيۈشۈش ۋە ئېچىشىش بولمايدۇ. سەۋدادىن بولسا ئىششىق قولغا قاتتىق بىلىنىدۇ. رەڭگى قارا، ئاغرىش بوشراق بولىدۇ.

### داۋاسى

قان ۋە سەپرادىن بولغانلىرىدا قان ئېلىنىدۇ. يەرلىك ئورۇنغا كۆك يۇمىغاقسۇت، كاسىن، شوخلا، ئاق لەيلى گۈلى قاتارلىقلارنىڭ سۈيى چىپىلىدۇ ياكى بۇ دورىلارنى سوغۇق سۇدا ئېزىپ ئاخشىمى قاپاققا چىپىپ، ئەتىسى ئىسسىق سۇ بىلەن يۇيۇۋېتىلىدۇ. مەتبۇخى ھەلىلە، ئەرىقى چۆبىچىنى ئىچكۈزۈلىدۇ. ئارپا كېپىكىنى كافۇر سۈيى بىلەن يۇغۇرۇپ ئىككى چېكىگە تاڭلىدۇ. زەرچۈنى گۈلاب سۈيىگە سۈرۈپ پىلتىكۈچ بىلەن قاپاققا سۈرسە ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ. سەپرادىن بولغانلىرىنىڭ دەسلەپدە ئاق سەندەل، مامىشانى يەرلىك شوخلا سۈيىدە ئېزىپ كۆزگە چاپىدۇ. بۇغداي كېپىكىنى قايناتقان سۇدا قاپاقنى يۇيىدۇ. ھەببى بىنەپشە، مەتبۇخى ئەقىمۇن ئىچكۈزۈلىدۇ.

بەلغەمدىن بولغىنىنى داۋالاشتا مەتبۇخى ھەلىلە، مەتبۇخى ئەقىمۇن، ھەببى لاجۋەرد ئىچكۈزۈلىدۇ. توخۇ، غاز يېغىغا ئازراق مۇقەل، ئاق لەيلى گۈلى تالقىنى ئارىلاشتۇرۇپ قاپاققا چاپىدۇ. قوغۇشۇننى سۇغا سۈرۈپ چاپسىمۇ، شىيافى مامىشا تاڭسىمۇ بولىدۇ. كۆزنى داۋاملىق سوغۇق سۇدا يۇيۇش، لازا قاتارلىق ئاچچىق نەرسىلەر ۋە گۆش، ياغلاردىن پەرھىز قىلىش لازىم.





## قاپاق ئوششاق جاراھتى

قاپاق ئوششاق جاراھتى (نەملە تۆلجە فەنى) قاپاققا چۈمۈلە چاققاندا ك ئوششاق جاراھەت چىققانلىققا قارىتىلغان. ئۇ، ئەتراپقا كېڭە يىگۈچى ۋە قىزىل قوناق شەكلىدە ھەم ئەتراپنى يىگۈچىدىن ئىبارەت 3 خىل بولىدۇ. ئىسسىق جايلاردا، ياز پەسلىدە كۆپرەك ئۇچرايدۇ.

سەۋەبى


كۆيىگەن سەپرانىڭ قاپاققا تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ. مەزكۇر كېسەلنىڭ ئەتراپقا كېڭىيىدىغىنى سۇيۇق سەپرادىن، قىزىل قوناق شەكلىدىكىسى قويۇق سەپرادىن، ئەتراپنى يەيدىغىنى ئۆتكۈر ۋە كۆيدۈرگۈچى سەپرادىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامىتى

قاپاققا پاشا، چۈمۈلە چاققاندا ك ئوششاق جاراھەتلەر پەيدا بولىدۇ. رەڭگى سارغۇچ بولۇپ، ئىپچىشىدۇ. قاپاق قىزىرىدۇ. ئېغىرلىرىدا بەزىدە كىرىك تۆكۈلىدۇ. كىرىك تۇۋى يېرىلىدۇ. مەزكۇر كېسەل كۆپىنچە ئىسسىق مزاج كىشىلەردە، ئوتتۇرا ياشلىقلاردا كۆرۈلىدۇ. ئەمما، ئانچە خەتەرلىك ئەمەس.

داۋاسى

باش ۋە يۈز ساھەسىدىكى تومۇردىن ئازراق قان ئېلىش، سەپرانى سۈرگۈچى دورىلار بىلەن بەدەننى تازىلاش لازىم. ئەيتۇلا، قارا تۈرۈك شەرىپىنى ئىچىش ۋە تاتلىق ئانار سۈيىگە سېرىق ھەلىيە پوستىنى چىلاپ ئىچىش ياكى قىزىلگۈل شەرىپىنى تەكرار ئىچىش ياكى سېرىق ھەلىيە، تەمرى ھىندى، سانا، شاھتەررەلەرنىڭ شەرىپىگە ئازراق سىمۇنىيا سېلىپ ئىچىش لازىم. سەپرانى قايتۇرغۇچى ۋە سوۋۇتقۇچى تاتلىق نەرسىلەر ۋە ئانار شەرىپى، تەمرى ھىندى، ناخۇش ئانار شەرىپى ۋە چۈجە شۇرپىسى قاتارلىقلارنى ئىستېمال





قىلىش ھەمدە سەپرا پەيدا قىلغۇچى تاماقلاردىن تۇزلانغان پىلىق، سۈت، سوقۇلغان ماش قاتارلىقلاردىن پەرھىز قىلىش لازىم. گىلى مەختۇمنى يۇمغاقسۈت سۈيى بىلەن ئۆپىنى گۈل يېغى بىلەن قاپاقتىكى جاراھەتكە سۈركەش لازىم. كاسىن سۈيىنى ياكى ئۆپىنى گۈل يېغى بىلەن ياكى بىر ئاز سۈركە بىلەن ياكى گىلى ئەرمىنى، رۇسۇت قاتارلىقلارنى كاسىن سۈيى بىلەن سۈركەش ياكى تۈگە تاپىنى (مامىشا) سۈيى ياكى سەبرى، رۇسۇت قاتارلىقلارنى كاسىننىڭ سۈيى بىلەن ياكى قىزىلگۈل ئەرقى بىلەن ئېرتىپ تېگىش لازىم. رۇسۇتنى سۈركە بىلەن ئېرتىپ سۈركەش ياكى شىيافى مامىشا ۋە سەندەللەرنى ھەمىشە باھار سۈيى ۋە ئەرقى گۈل بىلەن سۈركەش، پاقا يوپۇرمىقى سۈيىنى تېگىش، ئاچچىق ئانار پوستى ۋە مۇزىلارنى يۇمشاق سوقۇپ چېپىش لازىم. كۆزنىڭ قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش ۋە مىزاجىنى نورماللاشتۇرۇش ئۈچۈن شىيافى ئەھمەرلەيسىنى سۈرمە قىلىپ تارتىش لازىم.

### قاپاققا تۈگۈنچەك پەيدا بولۇش

قاپاققا تۈگۈنچەك پەيدا بولۇش (ئوقدە تۈلجەفەنى) ئۈستۈنكى قاپاق تېرە ئاستىغا قاتتىق تۈگۈنچەك پەيدا بولغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

سەۋدا ماددىسىنىڭ ئۈستۈنكى قاپاققا تۈگۈنچەكلىكىدىن پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى

دەسلەپتىلا يەللىك تاماقلاردىن پەرھىز قىلىش. سەۋدا ماددىسىنى قايتۇرغۇچى دورىلارنى ئىچكى، تاشقى جەھەتتىن ئىشلىتىش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن قاپاقنى ئىسسىق سۇ بىلەن بۇيۇش، قايناقسۇغا چىلانغان لۇڭگە ياكى گىرېلكا بىلەن ئىسسىق تۈتكۈزۈش كېرەك. مۇمنى گۈل يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ قاپاققا چېپىش، شۇمىشا ۋە زىغىرنىڭ شىرىسى (لوئابى) نى چىقىرىپ سۈرۈش لازىم. تۈگۈنچەك يۇمشىغاندىن كېيىن ئۇنى





تارقىتىش ئۈچۈن مەلھىمى داخلىيۇن قاتارلىق يۇمشىتىپ تارقاققۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش لازىم.

ئەگەر تۈگۈنچەك ياخشى سۈپەتلىك ئۆسمىگە ئوخشاش ئۆتسا ئاسان مېدىرلاپ چوڭقۇر يىلتىز تارتىمىغان بولسا مەلھىمى داخلىيۇندىن باشقا يەنە يۇمشىتىش ۋە تارقىتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە لوئابىلارنى ئىشلىتىش كېرەك.

ئەگەر، تۈگۈنچەك بارغانسېرى چوڭىيىپ رەڭگى كۆكۈش بولۇپ قالسا ھەمدە ئۇنىڭدىن تومۇردەك نەرسىلەر ئەتراپقا تارقىسا، يامان سۈپەتلىك ئۆسمىگە ئايلانغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. بۇنىڭدا دورىلار بىلەن داۋالايەن دەپ ھەپلەشمەي دەستكارلىق ئوسۇللاردا بىر نەزەرپ قىلىش كېرەك.

## قاپاق سۆڭىلى

قاپاق سۆڭىلى (سالىيۇلجەفەنى) قول قاتارلىق بەدەننىڭ باشقا ئەزالىرىغا سۆڭەك چىققاندا قاپاق گىرۋىكىگە سۆڭەك پەيدا بولغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

كۆپىنچە، ناچار سەۋدايى بەلغەمنىڭ قاپاققا تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بەزىدە سەۋدايى قان ۋە بەلغىمى غەلبىزىدىنمۇ پەيدا بولىدۇ.

ئالامىتى

بەدەننىڭ باشقا جايلىرىدىكى سۆڭەلگە ئوخشاش كۆپىنچە ئۈستۈنكى قاپاققا سۆڭەك پەيدا بولىدۇ. سەۋدادىن بولسا سۆڭەلنىڭ رەڭگى قارىغا مايىل بولىدۇ. ئۈچى ئوچلۇق كۆتىرىلىپ تۇرغىنى قەرنى دەپ، توم، تۈۋى يۇمشاق بولغىنى مېسمارى دەپ ئاتىلىدۇ. بەزىدە كۆزنىڭ جىيىكىگە يۇغان سۆڭەك پەيدا بولۇپ كۆزنىڭ مزاجىنى بۇزۇپ قويدۇ. ھەمدە يەرلىك ئورۇنغا كېلىدىغان قۇرۇقلۇقنى ئەتراپىغا تارقىتىپ، كۆپلىگەن كىچىك سۆڭەللەرنى پەيدا قىلىدۇ.





ئالدى بىلەن ئومۇمىي بەدەن ۋە مېڭىدىن غالىب كەلگەن خىلىتنى تازىلاش بىلەن بىرگە ئوزۇقلۇقنى ئىسلاھ قىلىش كېرەك. مايلارنىڭ ئاستىغا چۆككەن لېينى كۈندە بىر نەچچە قېتىم سۆگەلگە كۈچەپ سۈركەپ بېرىش كېرەك. ھۆل كەپنى كۈنىگە بىر قانچە قېتىم سۆگەلگە كۈچەپ سۈركەپ بەرسە خېلى ئۈنۈمى بار. سالايە قىلىنغان سىياھدان ۋە تۈزنى سىركە بىلەن يۇغۇرۇپ سۈركەسە، يۇلغۇن مېۋىسى ياكى ئادىراسماننى سۈركەسەمۇ بولىدۇ. بىنەپشە يېغى بىلەن داۋاملىق ياغلاپ بېرىشمۇ پايدىلىق. يەنە شۇنىڭدىكى قاپاقنى بۇغداي قاينىتىلمىسى بىلەن يۇيۇش، سېمىز ئوت يوپۇرمىقىنى سىركە بىلەن ئېزىپ يەرلىك ئورۇنغا چېپىشمۇ پايدىلىق. ئومۇمەن قىلىپ ئېيتقاندا، ئاچچىق تەملىك ۋە تۇتۇش (قابىز) خۇسۇسىيىتىگە ئىگە ھەر قانداق دورا پايدا قىلىدۇ. ئەگەر، يۇقىرىقى چارىلەر بىلەن داۋالغاندىمۇ ئۈنۈم كۆرۈلمىسە، توغرىغۇ، زەرنىخ، بەللوت ۋە تۈزلارنىڭ ھەر بىرىدىن بىر ھەسسە، ئوشەقتىن ھەسسە ئېلىپ سۇقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ سۇۋۇتولغان قايناقسۇ بىلەن يۇغۇرۇپ سۆگەلگە چاپسا بولىدۇ. چۈنكى بۇ دورا مەزكۇر كېسەلنى داۋالاشتىكى ئەڭ كۈچلۈك دورا بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئەگەر، بۇ چارە بىلەنمۇ سۆگەل يوقالمىسا دەستكارلىق ئوسۇل بىلەن داۋالاش كېرەك. بۇنىڭدا ئوتقا تۇتۇپ زەھەرسىزلەندۈرۈلگەن موچىنەك بىلەن سۆگەلنى قىسىپ تارتىپ تۇرۇپ، ئۆتكۈر تىغ بىلەن كېسىپ ئېلىۋېتىش لازىم. كېسىلگەن جايدىن بىر مەھەل قان ئاققۇزغاندىن كېيىن زاك، خونىياۋشانلارنى سوقۇپ ئۈستىگە سېپىش ياكى داكىنى كالا يېغى سۈرۈپ تېگىش كېرەك. ئەگەر جاراھەتكە ئايلىنىپ قالسا، گۆش ئۈندۈرگۈچى دورىلارنى چېپىش لازىم.

### قاپاق ياغىسمان ئۆسمىسى

قاپاق ياغىسمان ئۆسمىسى (شىرناق) ئۈستۈنكى قاپاققا ياغقا ئوخشاش كىچىك بۇقاقچە پەيدا بولۇپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان ئۇ، جەنۇب تەرەپلەردە ۋە ئەتىياز پەسىللىرىدە كۆپرەك پەيدا بولىدۇ.

قوبۇق ۋە سۇيۇق ماددىلارنىڭ قاپاققا تۆكۈلۈپ مۇنەك بولۇپ، يەرلىك ئورۇندىكى توقۇلمىلارنى كۆتەرگەنلىكىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇ كېسەل كۆپىنچە كىچىك بالىلار، ھۆل مزاج كىشىلەر، كۆزىدىن كۆكۈشەرەڭ ياش ئاقىدىغان ئاغرىقلاردا پەيدا بولىدۇ. بەزىدە زۇكام سەۋەبىدىن قاپاققا نەزلە چۈشكەنلىكىنىمۇ پەيدا بولىدۇ.

### ئالامىتى

ئۈستۈنكى قاپاق سىرتىغا ياغقا ئوخشاش مۇنەكچە پەيدا بولىدۇ. گەرچە، مەزكۇر كېسەللىك بەك قورقۇنچلۇق بولمىسىمۇ لېكىن قاپاقنىڭ سىزىمىنى تۆۋەنلىتىپ قويدۇ، كۆزنىڭ كۆرۈش كۈچىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ. داۋاملىق ياش ئېقىش، تولا چۈشكۈرۈش، كۈن ۋە چىسراققا ئوخشاش تۇرلۇق نەرسىلەرگە قارىيالماسلىق، زۇكام ۋە كۆز كېسەللىكلىرى كۆپلەپ پەيدا بولۇش بۇ كېسەلنىڭ قوشۇمچە بەلگىلىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

### داۋاسى

باش ساھەسىدىن قان ئېلىش لازىم. ئەگەر مۇمكىن بولمىسا لوڭقا قويۇش ۋە مۇناسىپ كېلىدىغان ئىچىنى سۈرگۈچى دورىلار بىلەن ئىچىنى سۈردۈرۈش كېرەك. ھەببى ئىيارەج ياكى قۇرسى بىنەپشىنى ئىچكۈزۈش، زۆرۈر تېپىلغاندا قۇرسى بىنەپشىنى ئىيارەجى فەيقرەغا قوشۇپ كۈچلەندۈرۈپ ئىستېمال قىلىش كېرەك. بابۇنە، ئابدۇلمىلىككە ئوخشاش زىيانلىق ماددىلارنى قايتۇرغۇچى دورىلارنى قاينىتىپ سۈيىگە لۆڭگىنى چىلاپ كۆزگە ئىسسىق ئۆتكۈزۈپ بېرىش ھەمدە سۈيىنى قاپاققا سۈرتۈش لازىم. پايدىلىق سۈرمىلەردىن بىرىنچى قېتىمدا زەرۋرى ئەسفەرنى ئىشلىتىپ ئىككىنچى قېتىمدا زەرۋرى ئەنەرنى ئۆتۈڭىدىن كېيىن باسلىقۇن ئەكبەرنى ئەتگەن ۋە كەچقۇرۇندا يەرلىك ئورۇنغا سۈرمە قىلىپ تارتىش كېرەك. ئىچىنى بوشاتقۇچى يېمەكلىكلەر بىلەن ئىچىنى بوشىتىش، مىزاجىنى تەڭشەش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن ھەر خىل قۇشلارنىڭ گۆشى بىلەن يېمەك-ئىچمەكلەرنى تەڭشەش، ناچار تاماقلاردىن پەرھىز قىلىش لازىم. دائىم مۇنچىغا چۈشۈپ تۇرۇش كېرەك.



ئەگەر، بۇ چارىلەر بىلەن كېسەل ياخشى بولمىسا دەستكارلىق ئۆسۈلدا بىر تەرەپ قىلىش، ياغ ئۆسۈمىنى ئېلىۋەتكەندىن كېيىن پاكىز داكنى سىركىگە چىلاپ يەرلىك ئورۇنغا قويۇش، ئىككىنچى كۈنى يەرلىك ئورۇن ئاغرىمىسا، شىپاى مامىشا قاتارلىق تۇتاشۇرغۇچىلارنى ئىشلىتىش ياكى زەرۋرى ئەسفەرنى جاراھەت ئورۇنغا سېپىش ۋە داكا بىلەن تېگىش لازىم. ئەگەر ئىششىق بولمىسا ئۆزىگە، ئادەتتىكى مەلەملەرنى تاڭگىسىمۇ بولىدۇ. ئىششىق ۋە قىزىش بولسا، شىپاى مامىشا، سەندەل، فۇقلىنى يۇمىغاقسۇت سۈيى بىلەن يۇغۇرۇپ سۈزۈش لازىم.

### قاپاق يۇمشاق ئۆسۈكچىسى

قاپاق يۇمشاق ئۆسۈكچىسى (تۇۋسە تۆلە جىفانى) ئۆستۈنكى قاپاقنىڭ سىرتىغا بولۇپمۇ ئاستىقى قاپاقنىڭ ئىچكى قىسمىغا پەيدا بولىدىغان يۇمشاق گۆشلۈك ئۆسۈكچىگە قارىتىلغان.

سەۋەبى

مەزكۇر كېسەللىكنىڭ ماددىسى كۆپىنچە ھاللاردا سەپرا، سەۋدا خىلىتىرىدىن پەيدا بولىدۇ. بەزىدە قان ماددىسىنىڭ سەۋداغا ئارىلاشقانلىقىدىنمۇ كېلىپ چىقىدۇ. يىڭناسقۇ (شەئىرە) گە ئوخشاش قۇرۇق مزاج كىشىلەردە، كۆز پەسلىدە، ياشانغانلاردا، قۇرغاق جايلاردا كۆپ يۈز بېرىدۇ.

ئالامىتى

قاپاققا ئۆسكەن بۇ يۇمشاق ئۆسۈكچە قىزىل، قارا ۋە كۆكۈش رەڭلەردە بولىدۇ. شەكلى ئۈچىمىگە ئوخشايدۇ. كۆزدە قېچىشىش، ئاغرىش بولىدۇ. كۆپىنچە ۋاقىتلاردا ئۆسۈكچىدىن قان سىرغىپ چىقىپ تۇرىدۇ.

داۋاسى

ئالدى بىلەن قىيىال تومۇردىن، ئۆزىڭدىن كېيىن پېشانە تومۇرىدىن قان ئېلىش لازىم.





ئەلەق يەنى زۇلۇك قۇرۇتى قويۇپ قان شورىتىش ۋە باش، پۇتنىڭ ئارقا تەرىپىگە لوڭقا قويۇش لازىم. سەۋدانى سۈرگۈچى دورىلار ۋە ھەببى ئەقىمۇن بېرىش كېرەك. قۇرسى بىنەپشە، مەتبۇنى ھەلىيلە، مەتبۇخى غارىقۇن ۋە ھەببى سۆتتەر بىلەن ئىچىنى سۈردۈرۈش ھەم پايدىلىق، قىزىق، يەللىك تاماقلاردىن ساقلىنىش لازىم. سۇقۇقى كەشنىزنى ئىستېمال قىلىش مەنئىي قىلىنىدۇ. يەرلىك ئورۇننى فەنت، توتيا ۋە تۆمۈرگە ئوخشاش نەرسىلەر بىلەن قاشلىغاندىن كېيىن ئۈستىگە زەرۋرى ئەسفەر، شىيافى ئەھمەرلەرنى قويۇش كېرەك. ئەگەر يۇقىرىقى ئۇسۇللار بىلەن ئۆسۈكچە گۆش يوقالمىسا، زىيادە گۆشنى يوقاتقۇچى شىيافلاردىن شىيافى ئەسفەر، شىيافى روشنائى قاتارلىقلارنى سۈرسە بولىدۇ ياكى زەنكار، تۆشۈدۈر قاتارلىقلارنى يوقالماي قالغان گۆشكە قويۇش لازىم. ئەمما بۇ دورىلار ئۆتكۈر بولغاچقا ئىشلەتكەندە كۆزنى زەخمىلەندۈرۈپ قويۇشتىن قاتتىق ساقلىنىش، كۆزنى سۈت بىلەن يۇيۇپ تۇرۇش كېرەك. شۇنداقلا، گۆش ئۈندۈرىدىغان زەرۋرات (سېپىلما) لار ۋە شىيافاتلارنى ئەھۋالغا قاراپ ماسلاشتۇرۇپ ئىشلىتىش كېرەك.

مەزكۇر كېسەلنى داۋالاشتا ئۆتكۈر تەسىرلىك دورىلارنى ئىشلەتكەنگە قارىغاندا كۆز قوتۇرنى داۋالغاندەك داۋالاش ۋە تۆمۈر ئەسۋابلار بىلەن ئىلاج قىلىش خەتەرسىزەك. ئەگەر ئۆسۈكچە گۆشنىڭ يوقىلىشى تەسكە توختىسا، موچىن بىلەن قىسىپ تۇرۇپ پاكىزلانغان قايچا بىلەن كېسۋەتسە بولىدۇ. ئۈنۈڭدىن كېيىن زەرۋرى ئەسفەرنى كەسكەن جايغا سېپىش، شىيافى ئەھمەر، شىيافى ئەسفەر ۋە باسلىقۇنلارنى كېسەللىك ئەھۋالغا قاراپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

قايتىلانماسلىقى ئۈچۈن تۇخۇمنىڭ سېرىقىنى گۈل يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ زىماد قىلىش ۋە ئۈچ كۈن گۆش ئىستېمال قىلماسلىقى لازىم.

## قاپاق ئۆسمىسى

قاپاق ئۆسمىسى (سەلئە تۆلجە فەنى) قاپاق ئۈستىگە باشقا ئەزالارغا پەيدا بولغاندەك بەزىسمان ئىششىق پەيدا بولغانغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

كۆپىنچە، قاپاقتا توسۇلۇپ قالغان خىلىتلاردىن پەيدا بولغان بەلغەمدىن كېلىپ



چىقىدۇ. سەۋدادىنىمۇ پەيدا بولىدۇ. سوغۇق مزاج كىشىلەر، ياشانغانلار ۋە سوغۇق جايلار، قىش كۈنلەردە كۆپ ئوچرايدۇ.

### ئالامىتى

قاپاقنىڭ ئۈستىگە خەرىتىگە ئوخشاش ئۆسۈملەر پەيدا بولىدۇ. شەكلى گۆش، ھەسەل، ياغ، ھالۇغا ئوخشايدۇ، ئاغرىمايدۇ.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن كېسەل پەيدا قىلغۇچى خىللىتى ئايرىش كېرەك. مەتبۇخى ئەفتمۇن ۋە غارىقۇن، توربۇت، سەبرى قوشۇپ كۈچلەندۈرۈلگەن ھەببى غارىقۇن بىلەن كېسەل ماددىسىنى، بەدەننى تازىلىغاندىن كېيىن لۇڭگىنى قايناقسۇغا چىلاپ ئىسسىق ئۆتكۈزۈش، ئورۇقىدىن ئايرىلغان قۇرۇق ئۈزۈمنى قاپاققا چېپىش لازىم. ئارپا ئونى ۋە لوۋيا ئونى كونا زەيتۇن مېيى بىلەن يۇغۇرۇپ تېگىش، ئۈنىڭدىن كېيىن مەلھىمى داخلىيۇن سۈركەش لازىم. بەلغەم ۋە سەۋدا پەيدا قىلىدىغان تاماقلاردىن پەرھىز قىلىش لازىم. ئەگەر، يۇقىرىقى دورىلار بىلەن تارقالمىسا، نەشتە تۇرۇپ قان چىقارغاندىن كېيىن بۇزۇلغان گۆشنى يوقاتقۇچى دورىلارنى يەرلىك ئورۇنغا قويۇش لازىم.

## قاپاق گىرۋەكلىرى ئىششىقى

بۇ، قاپاق گىرۋەكلىرى قىزىرىپ ئىششىپ قالىدىغان كېسەللىك (سۇلاق) بولۇپ، يېزىلاردا كۆپرەك ئوچرايدۇ. ئۇ، قاپاق گىرۋەكلىرىدىكى توك خالىلىرىنىڭ ئىششىقى بولغاچقا، قايتا تەكرارلىنىدۇ، كېسەللىك جەريانى ئۇزۇنراق بولىدۇ.

### سەۋەبى

كۆپىنچە ھاللاردا بەدەندىكى خىللىلارنىڭ ئۆزگىرىشى بولۇپمۇ خىللىتلارغا شورلۇق



بەلغەم ئارىلىشىپ قاپاق گىرۋەكلىرىگە يامان تەسىر قىلغانلىقىدىن پەيدا بولىدۇ. چاڭ-توزان، ئىچكىلىك-چىكىملىك قاتارلىقلارنىڭ يامان تەسىرى، ئويۇقغا قانماسلىق، بەدەننىڭ زەئىپلىكى، پاسكىنا قول بىلەن كۆزنى سۈرتۈش ھەمدە كۆز تازىلىقىغا دىققەت قىلماسلىقلارمۇ مەزكۇر كېسەللىكنى كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى ئامىللار بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بەزىدە، ئوھەر خىل كۆز ۋە قاپاق كېسەللىكلىرى تۈپەيلىدىنمۇ كېلىپ چىقىدۇ.

### ئالامىتى

قاپاقنىڭ گىرۋەكلىرى قىزىرىدۇ، قىچىشىدۇ. ئېغىرراقلىرىدا ئاغرىدۇ. كۆز نۇردىن قاچىدۇ، ياشاڭغۇرايدۇ. ئەتىگەندە ئورۇندىن تۇرغاندا كۆز چاچاقلشىپ قالىدۇ. چاچاقلارنى ئېلىۋەتسە، قىزىرىپ كەتكەن قاپاق گىرۋەكلىرى ئېنىق كۆرۈلۈپ قالىدۇ. ئېغىرراقلىرىدا قانغان يارا ياكى كىچىك يىرىڭلىق قاپارتچۇقلارنى كۆرگىلى بولىدۇ. كىرىپك تۈك خالىتىلىرى بۇزۇلغاچقا كىرىپكەلەر تۆكۈلۈشكە باشلايدۇ. ئىسسىقتىن بولغان بولسا، چاچاقلار سېرىق بولىدۇ. قىزىرىش، ئاغرىش كۈچلۈكرەك بولىدۇ.

### داۋاسى

1. ئىچكى داۋاسى: قايسى خىلنىڭ نورمالسىز تۈزگىرىشىدىن پەيدا بولغان بولسا، شۇ خىلنى تازىلاپ مزاجنى تەڭشەش كېرەك. بۇنىڭدا كۆپىنچە مەتبۇخى ھەلىيە، مەتبۇخى شاھتەررە بېرىلىدۇ.
  2. سىرتقى داۋاسى: (1) قەلەي كۆشتىسى، قوغۇشۇن كۆشتىسىنى پاكىز ياغلارغا ئارىلاشتۇرۇپ سىرتقى چىپىش كېرەك. (2) بىنەپشە يېغى، بادام يېغى، ئاياللار سۈتى قاتارلىقلار بىلەن قاپاقنى ياغلاش كېرەك. (3) ئىچكى داۋادا كۆرسىتىلگەن مەتبۇخى ھەلىيە قاتارلىق سۈرگۈچى دورىلارنى ئىشلىتىش بىلەن بىرگە شادەنەج، ئەدەسنى سۈرمە قىلىپ كۆزگە تارتىش كېرەك. (4) شىياڧى ئەسفەرنى ئىشلەتسىمۇ ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.
- شىياڧى ئەسفەر تەركىبى: سېرىق ھەلىيە پوستى، توتيا ھەر بىرى 15 گرام، ئاقمۇش 3 گرام، نەزەپ يىلمى 10 گرام، زەئفەر 3 گرام.
- ياسىلىشى ۋە ئىشلىتىشى: دورىلارنى يۇمشاق يانچىپ توت قەۋەت داكىدىن ئۆتكۈزۈپ، ئازراق بادىيان سۈيى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ كۆزگە تېمىتىش كېرەك. ئوزۇقلىنىش جەھەتتە مزاجنى ۋە قاپاقنى ھۆللەشتۈرگۈچى تاماق ۋە ياغلارنى ئىستېمال





قىلىش لازىم.

دېققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار: مىزاجنى قۇرۇتقۇچى ئامىللار، ئۆتكۈر سوغۇق ۋە شامالاردىن، خەتكە كۆپ قاراشتىن ساقلىنىش لازىم. كۆز تازىلىقىغا دېققەت قىلىش خۇسۇسەن پاسكىنا قول بىلەن كۆزنى تۇۋۇلماسلىق كېرەك. ئاقۋىتى: مەزكۇر كېسەللىك تەكرار قوزغالسا ياكى ئېغىرلاشسا، قاپاقنىڭ تەتۈر ئورۇلۇپ قېلىشى، تەتۈر كىرىپك ۋە جىرتاق كېسەللىكنى پەيدا قىلىشى مۇمكىن.

### يىڭناسقۇ

يىڭناسقۇ (شەئىرە) بىر خىل كۆپ ئوچرايدىغان، كۆز گىرۋەكلىرىنىڭ ئۆتكۈر يېرىڭلىق ئىششىقى بولۇپ، پەيدا بولغان ئورنىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ ئىچكى ۋە تاشقى يىڭناسقۇ دەپ ئىككىگە ئايرىلىدۇ. كۆز گىرۋەكلىرىنىڭ سىرتىدىكى يېرىڭلىق قاپارتىچۇق تاشقى يىڭناسقۇ، كۆز گىرۋەكلىرىنىڭ ئىچىدىكى يېرىڭلىق قاپارتىچۇق ئىچكى يىڭناسقۇ، دەپ ئاتىلىدۇ.

سەۋەبى

يىڭناسقۇ كۆپىنچە، قان خىلىتى باكى سەۋدا خىلىتىنىڭ تۇرمالسىز تۈزگىرىشىدىن پەيدا بولىدۇ. كۆپ ھاللاردا ئاچچىق-چۈچۈك، كۈچلۈك تاماقلارنى ھەزىم قىلماي تۇرۇپلا ئارقا-ئارقىدىن ئىستېمال قىلىش، كەچتە يېتىشتىن ئىلگىرى دائىم تاماق يەپلا ئازراق ھەرىكەت قىلماي ئوخلىغانلىقتىن بۇزۇق يەللەر پەيدا بولۇپ كۆز گىرۋەكلىرىگە يامان تەسىر قىلغانلىقى، بەزى كىشىلەردە قاپاق ۋە كۆز گىرۋەكلىرىنىڭ تازىلىقىغا دېققەت قىلماي پاسكىنا قول بىلەن كۆزنى تۇۋۇلاش ۋە ھەر خىل چاڭ-توزانلار تۈپەيلىدىن كىرىپكە ئاستىدىكى تۈك خالىتىرىغا جەراسىم (مىكروپ) نىڭ كىرىشىدىن كۆز گىرۋەكلىرىگە پۇرچاق تەك قاپارتىچۇق چىقىپ يىڭناسقۇ پەيدا بولىدۇ.

ئالامىتى

1. تاشقى يىڭناسقۇ: كۆپىنچە، كۆزنىڭ تۈۋەنكى گىرۋەكلىرىدە پەيدا بولىدۇ.





كۆزنىڭ يۇقىرىقى گىرۋەكلىرىدەمۇ كۆرۈلىدۇ. دەسلەپتە، دائىرىلىك كىچىك قاتتىق مۇدۇرچاقلار پەيدا بولىدۇ. ئازراق قىچىشىپ ئاغرىيدۇ، كېيىن قىزارغان ئىششىق دائىرىسى كېڭىيىپ باسسما ئاغرىيدۇ. بۇ يىرنىڭ تۇتۇشقا باشلىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر قاپارتىچۇق ئۇچلىرى ئاقىرىپ باسسما مىسلىقسا، يىرنىڭ پىششىپ قالغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر قىزىرىپ ئىششىق ئېغىرلاشسا، پۈتۈن قاپاققا تەسىر قىلىپ قاپاق يىرنىڭ ئىششىقىغا ئايلىنىدۇ ھەمدە قۇلاق ئالدى بەزلىرى يوغىناپ كېتىدۇ. يىرنىڭ ئېغىز ئالغاندىن كېيىن قىزىللىق، ئىششىق، ئاغرىشلار ئۆزلىكىدىن قايتىپ كېتىدۇ.

2. ئىچكى يىگناسقۇ: ئالامەتلىرى تاشقى يىگناسقۇ بىلەن ئاساسىي جەھەتتىن ئوخشىشىپ كېتىدۇ. كېسەللىك ئۆزگىرىشى كۆز جىيەكلىرىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى شىللىق پەردىدە بولغاچقا، يىرنىڭ تۇتقاندىن كېيىن قاپاق ئىچكى پەردىسىدە سېرىق رەڭلىك يىرنىڭ نۇقتىلىرىنى كۆرگىلى بولىدۇ.

#### داۋاسى

يىگناسقۇ ئادەتتە يىرنىڭ تۇتۇپ، ئۆزلىكىدىن ئېغىز ئېلىپ ساقىيىپ كېتىدۇ. لېكىن سەل قارىماي تۆۋەندىكىدەك داۋالاش چارىلىرىنى قوللانسا بولىدۇ.

1. ئىچكى داۋاسى: كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى ماددىنى بەدەندىن تازىلاش بولۇپمۇ ئالدى بىلەن مېڭىدىن تازىلاش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن مۇۋاپىق سۈرگە دورىلىرى ئىشلىتىلىدۇ. يىگناسقۇ كۆپ چىقىپ ئادەت بولۇپ قالغانلارغا ئەھۋالغا قاراپ مەتبۇخى ئەقىمۇن ياكى مەتبۇخى ھەلىلە بېرىلىدۇ.

2. تاشقى داۋاسى: (1) قايتاقسۇدا قىزىتىلغان لۇڭگە بىلەن نەم پېتى ھەر قېتىمدا 10—15 مىنۇت ئىسسىق ئۆتكۈزۈلىدۇ ياكى بوتۇلكىغا ئىسسىق سۇ ئېلىپ ئىسسىق ئۆتكۈزۈشمۇ بولىدۇ. (2) كاسىن، سەبىر، رۇسۇت، مامىشا، گىلى ئەرمىنى ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ يىگناسقۇ ئۈستىگە چىپىش كېرەك. يىرنىڭ تولغاندا تازىلانغان تىغ بىلەن ئۈچىنى يېرىپ يىرنىڭنى چىقىرىۋېتىپ، مۇۋاپىق كۆز مەلەملىرى سۈرتۈپ قويۇش كېرەك. (3) يۇقىرىقى چارىلەر ئۈنۈم بەرمىسە، تازىلانغان تىغ بىلەن يىگناسقۇ قېيى كېسىلىدۇ. ئازراق قان چىقىپ توختىغاندىن كېيىن سۇقۇنى ئەسفەر سېپىلىدۇ. (4) ئىچكى يىگناسقۇ يىرنىڭ تۇتۇپ پىشقاندىن كېيىن، يېرىپ يىرنىڭ چىقىرىۋېتىلىدۇ. يارغاندا يېرىلغان ئېغىز يولى كۆز جىيەكلىرىگە تىك قىلىپ كېسىلىدۇ. باشقا داۋالىرى يۇقىرىقىغا ئوخشاش. (5) كۆپ چىقىپ ئادەت بولۇپ قالغانلارغا، توغرا كەلگەندە







بەلگىلىك قان تومۇرلاردىن قان ئالسا بولىدۇ.

ئالدىنى ئېلىش

ئاچچىق - چۈچۈك، كۈچلۈك تاماقلارنى ئاز ئىستېمال قىلىش، كۆز تازىلىقىغا دىققەت قىلىش لازىم. كۆزنى قالايمىقان تۇتماسلىق ۋە يىڭناسقۇنى قالايمىقان سىقىمىسىلىق كېرەك.

### قاپاق قىچىشىش

قاپاق قىچىشىش (ھىككە تۈلجە فەنى) كۆز چانقىسى، گىرۋەكلىرى ۋە قاپاق جىيەكلىرى قىچىشىدىغان بىر خىل كېسەللىككە قارىتىلغان.

سەۋەبى

ئىچكى ۋە تاشقى ئامىللارنىڭ تەسىرىدىن بەزى شورلۇق ئېچىشئۇرغۇچى ماددىلار كۆز چاناقلىرىدا توختاپ قېلىپ پەيدا بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ھەر خىل كۆز ئاغرىقلىرى ئۆزۈنغا سوزۇلۇپ، يەلگە ئايلىنىپ قالىشىمۇ پەيدا بولىدۇ.

ئالامىتى

كۆز جىيەكلىرى قىزىرىپ، سولۇشۇپ كۆپ قىچىشىدۇ. بىر ئاز ئوۋۇلسا ياكى تاتلىسا، ياش ئېقىپ قىزىرىپ ئىشىشىدۇ. ھەتتا مۇدۇر پەيدا بولۇپ، جاراھەتكە ئايلىنىدۇ.

داۋاسى

ئىچكى تەرەپتىن مەتبۇخى شاھتەررە، ھەببى كىبرىت، ھەببى شاھتەررە،





مەتبۇخى ئەقىمۇن، ئىترىفېلى كەشنىز ۋە ئىيارە جەلەر ئىشلىتىلىدۇ. سىرتقى تەرەپتىن ھۆل كاستىنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ ئېزىپ، گۈل يېغى بىلەن قوشۇپ تېگىش كېرەك. كۆھلى رۇشنائى سەغرىنى قاپاققا سۈرمە قىلىپ تارتىمۇ ياكى چاپسىمۇ ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

### كۆھلى رۇشنائى سەغىر

كۈمۈشنىڭ ئېرىتىلگەن پوقى (ئىقلىمىيائى تۇقرە) 13.5 گرام، كۆيدۈرۈلگەن مىس 1.4 گرام، ئەندىرا تۈزى، پىلىپ، قەشقەر ئۆپىسى (سەفىداب كاشىغەرى)، تۈشۈدۈر، جۈندە ھەر بىرى 1.4 گرام. دورىلارنى قائىدە بويىچە يۇمشاق سوقۇپ، قېلىن ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تەييارلاپ، لازىم بولغاندا كۆزگە سۈرمە قىلىپ تارتىدۇ ياكى بادىيان سۈيى بىلەن كۈمۈلەپ قىلىپ، زۆرۈر تېپىلغاندا قايناقسۇ بىلەن ئېرىتىپ كۆزگە چاپىدۇ.

### قاپاق تۈرۈلۈش

قاپاقنىڭ تېشىغا تۈرۈلۈپ قېلىشى (شەترە) قاپاقنىڭ بىر تەرەپكە تۈرۈلۈپ قېلىپ، قاپاقنى نورمال يۇمالماسلىققا قارىتىلغان.

### سەۋەبى

قاپاق تۈرۈلۈپ قېلىش تۇغما ۋە كېيىن پەيدا بولغان دەپ ئىككى خىل بولىدۇ. بىر قاپاققا ياكى ئىككىلا قاپاققا يۈز بېرىدۇ. قاپاق سىرتىغا ياكى ئىچىگە تۈرۈلۈپ قالىدۇ. تۇغما خاراكتېردىكىسى كۆپىنچە مەلۇم ماددىنىڭ كەملىكىدىن بولىدۇ. كېيىن پەيدا بولغانلىرى كۆپىنچە، قاپاققا يىرىڭلىق چاقا چىقىش، ئارتۇقچە گۆش ئۆسۈش، تەتۈر كىرىپك چىقىش، سىرتقى سەۋەبلەردىن قاپاق تارتۇق بولۇپ كەينىگە قايرىلىپ قېلىشلاردىن كېلىپ چىقىدۇ.



## ئالامىتى

قاپاق چۆرىسى قېلىنلىشىپ، بىر تەرەپكە تارتىشىپ كۆزنى نورمال يۇمالمايدۇ. كۆز ئېقى كۆرۈنۈپ قالىدۇ. كۆز قىزىرىپ، سولۇشۇپ، ياش ئاقىدۇ. شامالدا بۇ ئالامەتلەر كۆچىشتىن سىرت كۆز ئېچىشىدۇ.

## داۋاسى

ئوغما خاراكتېرلىك قاپاق تەتۈر ئۆرۈلۈپ قېلىشنىڭ داۋاسى يوق. ئەھۋالغا قاراپ دەستكارلىق بىلەن تۈزىسە بولىدۇ. كېيىن پەيدا بولغانلىرىنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى سەۋەبلەرنى تۈگىتىش بىلەن بىرگە سەۋەبلەرنىڭ ئېغىر-بەگىگىلىكىگە قاراپ داۋالاش ئېلىپ بېرىش كېرەك. مەسىلەن، كۆزنى مەجبۇرىي يۇمدۇرۇپ ھۆل كاسىن، ھۆل يۇمغاقسۇت قاتارلىقلارنى سوقۇپ بىنەپشە يېغى، بادام يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ قاپاق ئۈستىگە قويۇپ بىر نەچچە كۈن تېگىپ بېرىش كېرەك. ھەببى قوقيا، ئامبىلە ئۆشدارى، ماڭول ئەسەل قاتارلىقلارنى كېسەللىك ئەھۋالغا قاراپ ئىشلىتىش لازىم. ھەر خىل قۇرۇقلۇق نەرسە ۋە يېمەك-ئىچمەكلىكلەردىن ساقلىنىش، ھۆل ئىسسىق تەبىئەتلىك يېمەك-ئىچمەكلىكلەر بىلەن ئوزۇقلىنىش لازىم.

## قاپاق ئىچى دانچىسىمان ئىششىقى

قاپاق ئىچى دانچىسىمان ئىششىقى (بەردە) كۆپىنچە، ئۈستۈنكى قاپاقنىڭ ئىچى تەرىپىگە يۇمىلاق دانچە پەيدا بولغانلىقىغا قارىتىلغان.

## سەۋەبى

ناچار بەلغەم ماددىسى ۋە ھۆلۈكلەرنىڭ قاپاققا يامان تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ

چىقىدۇ. ھۆل مزاج كىشىلەردە ۋە ھۆللۈكى تولراق جايلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ.

### ئالامىتى

كۆپىنچە ئۈستۈنكى قاپاقنىڭ ئىچكى تەرىپىگە، بەزىدە قاپاقنىڭ سىرتىغا قىزىتما بىلەن تەڭلا يۇمىلاق پۇرچاقسىمان دانىچە پەيدا بولىدۇ. رەڭگى ئاققا مايىل بولۇپ، مۆلدۈرگە ئوخشاپ كېتىدۇ، ئۆزى قاتتىق بولىدۇ. كېسەللىك ماددىسى كۆيدۈرگۈچى ۋە ئېچىشتۇرغۇچى ئامىللاردىن خالى بولمىغانلىقتىن بەزىدە ئاغرىش ۋە قىچىشىش بولىدۇ، قىچىشىش كېسەل كىشىگە خۇشياقىدۇ.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن قان ئېلىش بىلەن بىرگە ئىچىنى سۈرگۈچى دورىلار ھەببى ئىيارەج، ھەببى سەبرى، ھەببى قوقىيالار بىلەن بەدەننى تازىلاش كېرەك. ئەگەر بۇزۇق خىلىت كۈچلۈك بولسا خىلىتلارنى پۇشۇرغۇچى، ئىچىنى يۇمشاتقۇچى مۇنزىجلارنى بېرىپ ئۈنىڭدىن كېيىن ئاغرىق قايتۇرغۇچى دورىلارنى قوللىنىش لازىم. ماددىنى پۇشۇرۇش ئۈچۈن خېمىرنى ئارقا-ئارقىدىن تېگىش، ئۈنىڭدىن كېيىن پۇشۇرغۇچى ۋە تارقاقچى دورىلاردىن ئۆشەق، پىننە قاتارلىقلارنى سىركە ياكى زەيتۇن يېغى بىلەن قاپاققا چېپىش ياكى ھەرە ئوۋىسىنى سۇغا چىلاپ سۈيى بىلەن قاپاقنى يۇيۇش كېرەك. قىزىق مۇم ياكى ئارپا ئۈنىنى ھەسەل بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ قاپاققا چاپسىمۇ بولىدۇ. زەرۋرى ئەسفەر سەغرى، شىيافى ئەھمەرلەيىن قاتارلىقلارنى سۈرمە قىلىپ كۆزگە تارتىمۇ بولىدۇ.

ئەگەر، يۇقىرىقى ئۇسۇللار بىلەن كېسەل تارقىمىسا، قان ئالغان ۋە بەدەننى تەنقىيە قىلغاندىن كېيىن يەرلىك ئورۇننى كېسىپ مەزكۇر كېسەلنىڭ ماددىسىنى چىقىرىش ۋە ئازراق قان ئاققۇزۇش كېرەك. ئۈنىڭدىن كېيىن جاراھەتنى ساقايتىش ئۈچۈن زەرۋرى ئەسفەرنى سېپىش كېرەك. مەزكۇر كېسەلدە داۋاملىق پەرھىز تۇتۇش، ھەمدە كېسەل كىشىنىڭ بەدەن قۇۋۋىتى بەرداشلىق بېرەلسە داۋاملىق ئىچىنى سۈردۈرۈش (ئىستىفراغ قېلىش) لازىم. ياش ئاققۇزغۇچى ياكى چاپاق پەيدا قىلغۇچى نەرسىلەرنى كۆزگە سۈرمە قىلىپ تارتىماي، بەلكى ماددىنى پۇشۇرغۇچى ۋە سۇيۇقلاشتۇرغۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش لازىم، مەسىلەن: سوقۇلغان غۇنچە ئۈزۈم 10 دانە، سوقۇلغان ئارپا 3 گرام، سوقۇلغان يېھى ئۈرۈقى 10 دانە، مۇدەپپەر قىلىنغان ئاق ئەزەرۋىت 1 گرام قاتارلىقلارغا ئوغۇل توغقان ئايال سۈتى



قوشۇپ سۇيۇق ئوماچ ھالەتكە كەلگەنگە قەدەر مۇلايىم قاينىتىپ، كۈندە 4—3 قېتىمدىن كۆزگە تامغۇزۇش لازىم. بۇ تېمىتىلما كۆزدىكى قاتتىقلىقنى تارقىتىدۇ.

ئەگەر بۇنىڭ بىلەنمۇ دانىچىلار تارقىمىسا، ئازراق شۇمىشا ۋە بۇغداينى سوقۇپ ئوبدان پۇشۇرۇپ، ئوڭا سوقۇلغان ئاق لەيلى ئارىلاشتۇرۇپ، مۇۋاپىق مىقداردا بىنەپشە يېغى، گۈلخەير يېغى تامغۇزۇپ، ئازراق تۇخۇم ئېقى بىلەن مەلھەم ھالىتىگە كەلتۈرۈپ قاپاققا چېپىش كېرەك. بۇ زىمادنى ئۈزۈمەي چېپىپ بەرسە قاپاققا چىققان بۇ دانىچىلارنىڭ ماددىسىنى پۇشۇرۇش رولىنى ئوينايدۇ. دانىچە تېشىلگەندىن كېيىن تېمىتىلمىلارنى ئىشلىتىش بىلەن بىرگە سوقۇلغان ئىسبەغۇل تۇرۇقنى تۇخۇم ئېقى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ چاپسا كېسەلنىڭ ماددىسىنى شوراپ چىقىرىدۇ. مەزكۇر كېسەللىكنىڭ قالدۇقى قالسا ياكى يەرلىك ئورۇندا كىر ھاسىل بولسا شىياڧى ئەببەز، شىياڧى كۈندۈر قاتارلىقلارنى سۈرمە قىلىپ كۆزگە تارتسا بولىدۇ.

ئەگەر دانىچىلار بەك قاتتىق بولۇپ ئۈزۈم كۆرۈلمىسە، مۇچىن بىلەن قىسىپ تۇرۇپ كېسىپ ئېلۋەتكەندىن كېيىن قۇرۇتقۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش لازىم.

### قاپاق ئىچى قاتتىق قاپارتىچۇقى

قاپاق ئىچى قاتتىق قاپارتىچۇقى (كەدۇ دۇممۇل) كۆپىنچە ئاستىنقى قاپاق ئىچىگە پەيدا بولغان قاتتىق قاپارتىچۇققا قارىتىلغان.

سەۋەبى

كۆپىنچە ھاللاردا تەستە ھەزىم بولىدىغان غەلبىز تاماقلار، مەسىلەن: كالا - پاقالچاق، پورچاق، كالا گۆشى قاتارلىقلارنى كەچلىك تاماقتا كۆپلەپ ئىستېمال قىلغانلىقتىن قان قويۇلۇپ پەيدا بولىدۇ.

ئالامىتى

كۆپىنچە ھاللاردا ئاستىنقى قاپاقنىڭ ئىچكى قىسمىغا قاتتىق قاپارتىچۇق چىقىدۇ.





يارا-چاقلارنىڭ ئاغرىقىدا ك ئاغرىشىمۇ پەيدا بولىدۇ. ۋاقتىدا داۋالمىسا يىرىڭلاپ ئېغىز ئالىدۇ.

### داۋاسى

دەسلەپتە ئىسسىق سۇ بىلەن كۆزنى يۇيۇش ۋە كۆزگە ئىسسىق تۆتكۈزۈش لازىم. گۈل يېغىغا ئاق مۇمنى ئېزىپ چىپش، شىياڧى ئەھمەرنى كۆزگە تارتش كېرەك. ئەگەر، كېسەللىك ماددىسىغا سەپرا ئارىلىشىپ قالغان بولسا ئىسبەغۇل شىرىسىنى تۇخۇم ئېقىغا ئارىلاشتۇرۇپ چىپش ياكى شىياڧى ئەببەزنى چىپش كېرەك. ئابدۇمىلىك ۋە بابۇنىنىڭ قاينىتىلمىسىغا ئازراق بىنەپشە يېغى، بۇغداي يېغى ئارىلاشتۇرۇپ يۇيۇش لازىم. ئەگەر قاپارتچۇق ئېغىز ئالغان بولسا، يىرىڭلىق جاراھەتنى داۋالاش ئۇسۇلى بويىچە داۋالسا بولىدۇ. ئەگەر قاپارتچۇق كوناپ قېتىشۋالغان بولسا، مەلھىمى داخلىۋىنى چىپشقا بولىدۇ. ئەگەر ھەر قانداق دورا بىلەن ساقايمىسا دەستكارلىق ئۇسۇل ئارقىلىق ئېلىۋېتىش كېرەك.

ئەگەر، ئونىڭ تەسىرى كۆزىگە تاراپ كېتىش ئېھتىمالى بولسا، سېرىق مەلھەم سۈركىسە بولىدۇ. ئېغىز ئېلىشنىڭ ئالدىدا ئىمكان قەدەر قاپارتچۇقنى تېزىرەك يۇمشىتىش ئۈچۈن مۇمنى گۈل يېغى بىلەن ئېزىپ چىپش ياكى كەندىر ياپرىقى ۋە سېمىز ئوت ياپرىقىنى ئېزىپ گۈل يېغىدا پۇشۇرۇپ چىپش كېرەك. ئونىڭدىن كېيىن كۆك يۇمىاقسۇت سۈيىدە سەندەل، گىلى مەختۇم، توشەقنى سۈرۈپ چىپش لازىم. ئەگەر، قاپارتچۇق ئېغىز ئېلىپ يىرىڭلىسا، يىرىڭنى تازىلىغاندىن كېيىن تۇخۇم سېرىقى ۋە بىنەپشە سۈيىنى تېمىتىش لازىم. ئەگەر، قاپارتچۇق قاپاقنىڭ سىرتىدا بولۇپ يىرىڭلىغان بولسا، تازىلىغاندىن كېيىن مەلھىمى ئەسۋەرد (قارا مەلھەم) چىپش لازىم.

### قاپاق ئىچكى قىزىرىپ قېلىنىشى

قاپاق ئىچكى تەرىپىنىڭ قىزىرىپ، قېلىنىشىپ قېلىشى (سەلابە تۈلجە فەنى) كېسەللىكىدە كۆپىنچە قاپاقنىڭ ئىچكى تەرىپى قىزىرىپ، ئىشىپ چىڭقىلىپ ئاغرىدۇ.





سەۋەبى

قاپاق ئەستەر پەردىسىنىڭ ئىسسىقتىن ئىششىشى ۋە تۇزۇنغا سوزۇلۇپ كېتىشى تۈپەيلىدىن مەزكۇر كېسەللىك كېلىپ چىقىدۇ. بەزى كىشىلەردە جىسمانىي ھەرىكەتنى كۆپ قىلغانلىق ياكى ئىسسىق تۈيدە كۆپ تەرلەپ سوغۇق ھاۋا ۋە شامالغا چىققانلىقى تۈپەيلىدىن قاپاقنىكى چىقىشقا تېگىشلىك بولغان تەر ماددىلىرى توختاپ قېلىپ مەزكۇر كېسەللىكنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ئالامىتى

كۆزنىڭ ئىچى قۇم تىقىلغاندەك بولۇپ قىچىشىدۇ. قاپاق ئىچى قىزىرىپ قالىدۇ ھەمدە يۇقىرىغا ۋە ئورلۇق نەرسىلەرگە تۈزۈك قارىيالمايدۇ. كۆزدىن ياش ئاقىدۇ، ئاغرىيدۇ. قاپاقنى قايرىپ تەكشۈرگەندە قېلىنلىشىپ ۋە قىزىرىپ قالغانلىقىنى ئېنىق كۆرگىلى بولىدۇ.

داۋاسى

ئىچكى تەرەپتىن مەتبۇخى ئەفتمۇن، مەتبۇخى ھەلىلە، شىرىقېلى كەشنىز، ھەببى شەبىيار قاتارلىق دورىلار بېرىلىدۇ. سىرتقى تەرەپتىن كۆھلى رۇشئائى، توتيا سەفەد قاتارلىق دورىلار ئىشلىتىلىدۇ. ئەگەر يۇقىرىقى دورىلارنىڭ تۈنۈمى تولۇق كۆرۈلمىسە، مەخسۇس قىرىش ئۇسۇلى بويىچە داۋالاش كېرەك.

## تە تۇر كىرىپك

تە تۇر كىرىپك (شە ئىرمۇنقەلىب) كىرىپكنىڭ كۆز ئالمىسى تەرەپكە قاراپ تە تۇر ئۆسكەنلىكىدىن ئىبارەت بىر خىل كېسەللىك بولۇپ، يېزىلاردا كۆپرەك تۇچرايدۇ.



كۈرىك تۈك خالىتلىرى ئارىسىدا بەزى بۇزۇق ماددىلارنىڭ تۇرۇپ قېلىشى ياكى ئىلگىرى قاپاققا يېرىڭلىق جاراھەت، ئۇششاق مۇدۈرلەرنىڭ چىقىشى، قاپاق ئىچى قىزىرىپ قېلىنىشىدىن قاپاق گىرۋەكلىرى بۇزۇلۇشى ۋە شامالغا چىقسا كۆز ياشاڭغۇراشتەك كۆز كېسەللىكلىرى تۈپەيلىدىن داۋاملىق كۆزنى ئۇۋۇلاش ئارقىلىق كۈرىك تۈك خالىتلىرى بۇزۇلۇپ، كۈرىك تۈكۈلۈپ قايتا چىققاندا يۈنلىشى ئۆزگىرىپ مەزكۇر كېسەللىكنى پەيدا قىلىدۇ. كۆز قوتۇرى (تراخوما) مەزكۇر كېسەللىكنىڭ مۇھىم سەۋەبلىرىدىن بىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

### ئالامىتى

تەكشۈرگەندە قىسمەن كۈرىكلىرىنىڭ ئىچكى تەرەپكە قاراپ تەتۈر ئۆسكەنلىكىنى بايقىغىلى بولىدۇ. كۈرىك داۋاملىق كۆزگە قاندىلىپ، ئېچىشىپ ئاغرىيدۇ، ياش ئاقىدۇ. كۆزگە يات نەرسىلەر كىرىپ قالغاندەك بولىدۇ. تەتۈر ئۆسكەن كۈرىكلەر ھەتتا بەزىدە كۆزنى قىزارتىپ، مۇڭگۈز پەردىنى يىغىپ قويدۇ ياكى يارا قىلىپ قويدۇ.

### داۋاسى

بىرەر بۇزۇق ماددىدىن بولغان بولسا، ئالدى بىلەن شۇ ماددىنى تازىلاش بىلەن بىرگە چاپلاشتۇرغۇچى دورىلار ئارقىلىق تەتۈر كۈرىكنى تۈز كۈرىكلەرگە مەلۇم مەزگىل چاپلاش كېرەك. بۇ مەزگىلدە ئىتريفىبلاردىن ئىچىش لازىم. ئەگەر، بۇ ئۆسۈلدا تۈزەلمىسە شىياڧى ئەسفەرنى تەتۈر ئۆسكەن كۈرىككە سۈركەش ياكى مۇۋاپىق داغلاش ئۆسۈللىرى بىلەن يەڭگىل دەرىجىدە داغلاش كېرەك.

يۇقىرىقى ئۆسۈللەر ئارقىلىق تۈزەلمىسە ئەڭ ياخشىسى دەستكارلىق ئۆسۈللىرى بىلەن تۈزەش كېرەك. مەسىلەن: تەتۈر كۈرىك ئاز ساندا بولسا، قىسقىچ بىلەن قىسىپ كۈرىكنى يىلتىزىدىن ئېلىۋېتىش كېرەك ۋە باشقىلار.





ئالدىنى ئېلىش

كۆز قوتۇرى ۋە ھەر خىل كۆز جىيەكلىرى كېسەللىكلەرنى ئاكتىپلىق بىلەن داۋالاش، كۆزنىڭ تازىلىقىغا دىققەت قىلىش لازىم.

## كېرىك چۈشۈش

كېرىك چۈشۈش (ئىتتىشارۇلشە ھىدايى) كېرىكنىڭ مەلۇم ئىچكى ۋە تاشقى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ئوخشىمىغان دەرىجىدە تۆكۈلۈشىگە قارىتىلغان.

سەۋەبى

كېرىك چۈشۈش كۆپىنچە تۈك ئۆستۈرگۈچى ئوزۇقلۇق ماددىلارنىڭ تولۇق يېتىشمەسلىكى، ھۆلۈكنىڭ ئېشىپ كېتىشى، بەلغەم، سەۋدا خىلىتلىرى ياكى قۇرۇقلۇقنىڭ غالىم بولۇشى، قاپاق گىرۋەكلىرىنىڭ زەرەرلىنىشى ۋە تەب كېسەللىكلەردىن كېيىنكى بەدەن تۈكلەرى تۆكۈلۈش (دائىل سەئەب) كېسەللىكى بىلەن كېسەللىنىشتىن كېلىپ چىقىدۇ. بەزى كىشىلەردە ماخاۋ كېسىلى (جوزام) تۈپەيلىدىن قاش، كېرىكلەر چۈشىدۇ.

ئالامىتى

ھۆلۈكتىن بولغان بولسا، ھېچقانداق بىر بەلگە كۆرۈلمەيلا كېرىك ئۈزلۈكتىن چۈشۈپ كېتىدۇ. قۇرۇقلۇقتىن بولغان بولسا، قاپاق چۆرىسى قىچىشىش، قىزىرىش، كېيەكلىشىشتەك قۇرۇقلۇق ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.

داۋاسى

ئىچكى داۋاسى: ئەگەر، ھۆلۈكتىن بولغان بولسا، زىيادە بەلغەم ماددىسى تازىلىنىپ



مۇۋاپىق سۈرگە بېرىلدى.

تاشقى داۋاسى: ئىچكى جەھەتتە زىيادە بەلغەم ماددىسىنى تازىلاش بىلەن بىرگە سىرتقى جەھەتتىن كۆھلى روشنائىنى كىرىپكە تارتىش كېرەك. قۇرۇقلۇق ئېشىپ كەتكەنلىكتىن بولغانلارنى ھۆللەندۈرۈش ئۈچۈن زەيتۇن يېغى، ئۆردەك يېغى، توخۇ يېغى قاتارلىقلار بىلەن ياغلاش ھەمدە ئىسپىھان سۈرمىسى سۈرتۈش كېرەك. ئەگەر كىرىپك تۈۋى قىچىشسا، ھەجرى ئەرمىنى سۈرۈپ چىپىش لازىم. كىرىپك تۆكۈلۈش دائىل سەئەبىن بولغان بولسا، كىرىپككە سۈرمە رۇشنائىنى سۈرۈش كېرەك ياكى تۆۋەندىكى چارىنى قىلىشمۇ بولىدۇ:

خورما ئورۇقىنى كۆيدۈرۈپ سۇنپۇل، لاجىۋەرد، كۈندۈر تۆتۈننى \* ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ كىرىپك ئۈستىگە سۈرگەش لازىم.

## كىرىپك ئاقىرىش

كىرىپك ئاقىرىش (بەيازۇلشە ھىداىى) كىرىپكەرنىڭ قىسمەن ياكى پۈتۈنلەي ئاقىرىپ كېتىدىغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

ئىچكى ۋە تاشقى سەۋەبلەرنىڭ ئەكس ئەسىرى تۈپەيلىدىن شورلۇق بەلغەم قاپاق چۆرىسىدە تۇرۇپ قېلىپ، كىرىپك تەدرىجىي ھالدا ئاقىرىپ قالىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا قاپاق ۋە كۆز ئەتراپلىرىغا بەرەس كېسەللىكى پەيدا بولغاندىمۇ كىرىپك ئاقىرىپ قالىدۇ.

ئالامىتى

بەزىلەردە كىرىپك چالا ئاقىرىپ قالىدۇ. بۇ، كىرىپك ئاقىرىشنىڭ دەسلەپكى

\* كۈندۈر تۆتۈننى ئېلىش تۈمۈلى: كۈندۈرنى ئوتقا سېلىپ، چىقۇتقان ئىسقا بىر دانە چىنىنى دۈم قىلىپ تۇتقاندا چىنە ئىچى ئىسلىشىدۇ، سوۋۇغاندىن كېيىن ئىس قىرىپ ئېلىنىدۇ.



باسقۇچتا ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. كىرىپك كۆپىنچە تولۇق ئاق كۆرۈنىدۇ، قاپاق بىر ئاز قىچىشىدۇ، بەزىلەردە كۆز يەڭگىل ئېچىشىدۇ. خىلىتلارنىڭ بۇزۇلغانلىقىدىن كېلىپ چىققان كىرىپك ئاقىرىشتا دەسلەپتە بىر-ئىككى تال ئاقىرىپ كېيىن تەدرىجىي كۆپىيىپ كېتىدۇ ۋە شو خىلىتقا مۇناسىپ بەلگىلەر كۆرۈلىدۇ. بەرەس كېسەللىكى سەۋەبىدىن كىرىپك ئاقارغانلاردا ئاق كېسەللىك تارىخى بولىدۇ.

### داۋاسى

1. ئىچكى داۋاسى: ئالدى بىلەن كېسەللىك كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى شور بەلغەم ماددىسى مەخسۇس مۇنزىج دورىلار بىلەن پۇشۇرۇلغاندىن كېيىن مەخسۇس مۇسەھل دورىلار ئارقىلىق سۈرۈپ چىقىرىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئەھۋالغا قاراپ ئىبارەجى فەيقەرا، ئىرتىفېلى كەبىر، سۇفۇفى ھەلىيلە سىياھ، سىياھدان مەئجۇنى بېرىلىدۇ.
  2. تاشقى داۋاسى: 1) شاقايىق گۈلىنى زەيتۇن يېغى ياكى خوراز يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ قاپاققا تېگىش كېرەك. 2) شۇمشە ۋە ئاق لەيلىنىڭ يوپۇرمىقىنى سوقۇپ چېپىش لازىم. 3) توغرىغۇنى كۆيدۈرۈپ چاۋا ياغ بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ كىرىپككە سۈركەش لازىم. 4) كۆھلى رۇشنائى تەييارلاپ سۈرمە قىلىپ تارتىش كېرەك.
- بەرەستىن پەيدا بولغان كىرىپك ئاقىرىشتا، بەرەسنى داۋالايدىغان دورىلارغا مۇۋاپىق دورىلارنى قوشۇپ ئىشلىتىش كېرەك. كىرىپك قارىشىغا باشلىسا بەرەس كېسەللىكنىڭ ساقىيىشىغا قاراپ يۈزلىنىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر، كىرىپك قارايمسا بەرەسنىڭ ساقىيىشىدىن گەپ ئېچىش تەس، بەرەس يەنە قايتا قوزغىلىشى مۇمكىن. شۇڭا، كىرىپك ئاقارغان بەرەس كېسەللىكىدە بەرەسنى داۋالاش بىلەن بىرگە كىرىپكنى قارايتىشىغا تىرىشىش كېرەك.

## كىرىپك چاپلىشىش

كىرىپك چاپلىشىش (ئىلتىساقۇلئەھدائى) — كۆپ ھاللاردا تۇخلاپ قوپقاندىن كېيىن كىرىپكلىرىنىڭ چاپلىشىپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان. كۆپىنچە ئىككىلا كۆزدىكى كىرىپكلىرىدە كۆرۈلىدۇ.





## سەۋەبى

كۆپىنچە، چاپلاشقۇچى ھۆللوكتىن ۋە چاپلاشقۇچى ماددىلار قاپاققا تەسىر قىلغانلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ. كۆز قىزىرىپ ئاغرىش (رەمەد) كە ئوخشاش ھەر خىل كۆز ۋە رەملىرىدە قوشۇمچە ئالامەت بولۇپ كۆرۈلىدۇ.

## ئالامىتى

كۆپىنچە ئۇخلاپ قوپقاندىن كېيىن كىرىكلەر چاپلىشىپ قالغانلىقى بىلىنىدۇ. ئېغىرلاشقاندا ئادەتتىكى ئەھۋاللاردىمۇ كىرىك چاپلاشقانلىقى مەلۇم بولىدۇ.

## داۋاسى

پاكىز داكا ياكى لۇڭگىنى سوۋۇتۇلغان قايناقسۇغا چىلاپ كىرىكلەرنى سۈرتۈش بىلەن بىرگە سۈت بىلەن مۇدەببەر قىلىنغان ئەزەرۇتتىن 4 گرام، ئاق ناۋاتتىن 4 گرام، كۆپۈكى دەريادىن بىر گرام ئېلىپ تالقانلاپ يەرلىك ئورۇنغا ئاستا سۈركەش ھەمدە ئەسلى كېسەللىكنى ئاكتىپ داۋالاش كېرەك.



## كۆز بۇرجىكى كېسەللىكلىرى

كۆز بۇرجەكلىرى كۆزنىڭ ئىچكى ۋە تاشقى بۇرجەكلىرىدىن تەركىب تاپىدۇ. ئۇنىڭدا ئوچرايدىغان كېسەللىكلەرنىڭ كۆپىنچىسى كۆزنىڭ ئىچكى بۇرجىكىدە كۆرۈلىدۇ. مەسىلەن، كۆز ياشاڭغۇراش، كۆز ئىچكى بۇرجىكىدىن بەزىسىمان ئۆسمە ئۈنۈش ۋە كۆزنىڭ ئىچكى بۇرجىكىدە يىرىڭلىق جاراھەت پەيدا بولۇش قاتارلىقلار. مەزكۇر كېسەللىكلەر قاپاقلارنىڭ نورمال ھەرىكىتى ۋە كۆزنىڭ كۆرۈش خىزمىتىگە بەلگىلىك دەرىجىدە تەسىر يەتكۈزىدۇ. مەسىلەن، كۆز داۋاملىق ياشاڭغۇرسا كۆزنىڭ نەرسىلەرنى روشەن كۆرۈشىگە خېلى دەرىجىدە توسالغۇلۇق قىلىدۇ. كۆزنىڭ ئىچكى بۇرجىكىدىكى ئۆسمە گۆش ۋە يىرىڭلىق جاراھەتلەر قاپاقلارنىڭ نورمال خىزمىتىگە دەخلى قىلىپلا قالماي، بەلكى كۆزنىڭ نورمال كۆرىشىگىمۇ ئوخشىمىغان دەرىجىدە تەسىر يەتكۈزىدۇ. شۇڭا ئۇلارنى ۋاقتىدا داۋالاپ ساقايتىش كېرەك.

كۆز بۇرجىكى كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتا ئىچكى ۋە تاشقى جەھەتتە ئىشلىتىلىدىغان دورىلارنى ئوبدان تاللاش، ئىچكى ۋە تاشقى داۋالاش ئۇسۇللىرىنى مۇۋاپىق ھالدا ماسلاشتۇرۇپ قوللىنىش، دورا بىلەن داۋالاپ ساقايتىش بولسا دورا بىلەن داۋالاش ھەمدە دەستكارلىق (ئوپېراتسىيە) ئۇسۇلى بىلەن داۋالاش زۆرۈر بولسا بالدۇرراق دەستكارلىققا يوللاش كەينىگە سۈرمەسلىك كېرەك. قاپاق كېسەللىكلىرىدىكى دەستكارلىققا ئوخشاشلا دەستكارلىق ئۇسۇلىنى قوللىنىشتىن بۇرۇن بەدەننى تەنقىيە قىلىش، ئوپېراتسىيىدىن كېيىن كېسەللىك ئەھۋالىنى يەڭگىللەتكۈچى چارە-تەدبىرلەرنى قىلىش يەنى يېمەك-ئىچمەك، ھەرىكەت ۋە دەم ئېلىشنى مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇش بولۇپمۇ قاتتىق ھەرىكەت قىلىشتىن ساقلىنىش لازىم.

## كۆز ياشاڭغۇراش

كۆز ياشاڭغۇراش (سەيلا تۈلدە مەنى، جەريانى ئەشك) كۆپ ئوچرايدىغان ياش بولى



كېسەللىكلەرنىڭ بىرى بولۇپ، ئادەتتە تو، شامالغا يولۇقسا كۆز ياشاڭغۇراش ۋە ئادەتتىكى شىارائىتىمۇ كۆز ياشاڭغۇراشتىن ئىبارەت ئىككى خىل ئەھۋالغا قارىتىلغان.

### سەۋەبى

بۇ كېسەللىك ئادەتتە تۇغما ۋە كېيىن پەيدا بولغان (ئىككىلەمچى) دەپ ئىككى خىل بولىدۇ. تۇغما كۆز ياشاڭغۇراش ياش خالىتىسى، ياش يوللىرىنىڭ تۇغما يېتەرسىزلىكىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

كېيىن پەيدا بولغان (ئىككىلەمچى) كۆز ياشاڭغۇراش تۇتۇش قۇۋۋىتى (قۇۋۋە ئى ماسكە) ياكى ھەزىم قىلىش قۇۋۋىتىنىڭ ئاجىزلىشىشى، مزاجنىڭ ھۆل سوغۇقلىشىشى، كۆزگە باشقا كېسەللىكلەرنىڭ يامان تەسىر قىلىشى (يەنى قىزىملىق كېسەللىكلەر تۈپەيلىدىن كۆز ئىچىگە قىزىل چىقىش، چېچەك چىقىش، ھەر خىل جاراھەتلەر چىقىش)، زۇكام تۈپەيلىدىن قان، سەپرا، بەلغەملەرنىڭ ئۆزگىرىپ يامان تەسىر قىلىشى ۋە ياش خالىتىسىنىڭ بۇرۇن تەرەپتىكى يولى توسۇلۇپ قېلىشىدىن پەيدا بولىدۇ.

### ئالامىتى

تۇغما كۆز ياشاڭغۇراشتا بىر ياكى ئىككى كۆز داۋاملىق (يەنى تۆت پەسىلنىڭ ھەممىسىدە) ياشاڭغۇرايدۇ.

كېيىن پەيدا بولغان ئىككىلەمچى كۆز ياشاڭغۇراشتا، يۇقىرىقى سەۋەبلەرنىڭ بىرەرسى تەسىر قىلغانلىقتىن بولغان ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ ۋە شامالغا چىققاندا ياشاڭغۇراش كۈچىيىدۇ. بەدنى ئاجىزلاشقان كىشىلەر ۋە ياشانغانلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ. بىرەر خىلنىڭ ئۆزگىرىشىدىن كېلىپ چىققان بولسا شۇ خىلنىڭ خاس بەلگىلەر كۆرۈلىدۇ. قان خىلنىڭ ئۆزگىرىشىدىن بولغان بولسا كۆزى قىزىپ قىچىشىدۇ، چىڭقىلىدۇ، تومۇرى كۈچلۈك سالىدۇ. سەپرا خىلنىڭ ئۆزگىرىشىدىن بولغان بولسا ياش سۇيۇق ھەم قىزىق كېلىدۇ كۆز چاناقلىرى ئېچىشىدۇ. بەلغەم خىلنىڭ ئۆزگىرىشىدىن بولغان بولسا باش تەرەپكە ئازراق شامال تەگسىلا ياش ئېقىش كۈچىيىدۇ ياش سۈزۈك، سوغۇق ھەم كۆپ كېلىدۇ.



سەۋەبلەرنى تۈگىتىش ئارقىلىق كۆزنىڭ ياش تۆتۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇپ، ياش ئېقىشىنى تىزگىنلەش كېرەك. تۇغما كۆز ياشاڭغۇراش بىلەن ياش خالتا ۋە يوللىرىنىڭ يېتەرسىزلىكىدىن بولغان كۆز ياشاڭغۇراش كۆپىنچە ھاللاردا ساقايمايدۇ، شىيافى زەئىرانى كۆز چانقىغا كۈندە 2 قېتىم تەككۈزسە بولىدۇ.

1. ئىچكى داۋاسى: قايسى خىللىتىن بولغان بولسا، تازىلىغۇچى ۋە تەڭشىگۈچى دورىلارنى ئىشلەتكەندىن كېيىن ئىترىفىلى كەبىر، ھەببى شىفا، ھەببى ئىيارەج قاتارلىق تەييار دورىلار ئىشلىتىلىدۇ.

2. سىرتقى داۋاسى: 1) سەۋەبىنى يوقاتقاندىن كېيىن ياسالمىلاردىن شىيافى قاينى، كۆھلى رۇشئائى، كۆھلى دەمئە قاتارلىقلارنى، يەككە دورىلاردىن سۈرمە، توتىيا، ھوزۇز، مامىرانچىنى قاتارلىقلارنى سىرتتىن قاندىدە بويىچە ئىشلىتىش لازىم. 2) شىيافى مامىشاش، زەئىرە 4 ئارپا مىقدارىدا، سەبىرە 1.5 گرام، شەربىتى يەمانى، كۆك تاشلاردىن 3 گرامدىن ئېلىپ، يۇمشاق يانچىپ ئەلگە كىتىن ئۆتكۈزۈپ، كونا ھاراققا چىلغاندىن كېيىن سايدا قۇرۇتۇپ، كۆزگە سۈرمە قىلىپ تارتىش لازىم. 3) سۈرمە رۇشئائى كۆزگە كۈندە 2 قېتىم تارتىلىدۇ.

ياش خالىتىسىنىڭ بۇرۇن تەرەپتىكى يولى توسۇلۇپ قالغان بولسا، مەخسۇس بۆلۈمدە دەستكارلىق ئۆسۈل ئارقىلىق داۋالاش لازىم.

### كۆھلى دەمئە

توتىيائى مەغسۇل 27 گرام، بىخ مارجان، سېرىق ھەلىلە پوستى، سەبىرە سۇقوتىرى ھەر بىرى 10.8 گرام، پىلىپ 2.7 گرام، قارامۇچ 1.4 گرام.  
دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگە كىتىن ئۆتكۈزۈپ شىشە قۇتىدا ساقلاپ قويۇلىدۇ. لازىم بولغاندا مۇۋاپىق مىقداردىكى تۇخۇم ئېقىغا ئارىلاشتۇرۇپ كۆزگە ئەتىگەن ئاخشامدا ئىككى قېتىم چېپىلىدۇ.

## كۆز ئىچكى بۇرجىكى بەز ئۆسمىسى

كۆز ئىچكى بۇرجىكى بەز ئۆسمىسى (غۇددە ئى گوئە ئى چەشم) كۆزنىڭ بۇرۇن

تەرەپتىكى بۇرچىكىدىن بەزى خاراكتېرلىك گۆش ئۆسۈپ چىققانلىقىغا قارىتىلغان.

### سەۋەبى

بەزى نورمالسىز قويۇق ماددىلار مەلۇم سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن تەدرىجىي ھالدا كۆز ئىچكى بۇرچىكىگە يىغىلىپ، بولۇپمۇ غەيرىي سەۋدا خىلىتى كۆزگە يامان تەسىر كۆرسىتىپ ئاخىرى كۆز بۇرچىكىدىن ئۆسمە پەيدا بولۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بەزىدە، ياش خالىتىسى يىرىڭلاپ كۆز چانقىدىن يىرىڭ ئېقىش ئۇنغا سوزۇلغاندەك ئاخىرى ئۆسمە پەيدا بولۇشىغا سەۋەب بولىدۇ.

بەزى كىشىلەردە ھەر خىل كۆز كېسەللىكلىرى ئۇزۇنغا سوزۇلغانلىقتىن يەلگە ئايلىنىپ قىزىرىپ ئېچىشىش، قىچىشىش بىلەن كۆزنى تولا ئوۋۇلغاندەك كۆز بۇرچىكىدىن گۆش ئۆسۈشكە سەۋەب بولىدۇ.

### ئالامىتى

دەسلەپكى مەزگىللەردە كۆز بولۇپمۇ كۆز چانقى تولا قىچىشىدۇ. بەزىدە قىزىرىپ قالىدۇ. دىققەت بىلەن كۆزەتسە كۆزنىڭ ئىچكى بۇرچىكىدىن تەدرىجىي ھالدا گۆش ئۆسۈپ چىققانلىقىنى بايقىغىلى بولىدۇ. ئۆسمە كۆز قارىچۇقىغا قاراپ تەرەققىي قىلسا، كۆزنىڭ نورمال كۆرۈشىگە تەسىر قىلىدۇ. ئەگەر، قاپاق ئىچىگە قاراپ تەرەققىي قىلسا، قاپاقنى يۇقىرىغا كۆتىرىپ قاپاقنىڭ نورمال ئېچىلىپ يۇمۇلىشىغا تەسىر يەتكۈزىدۇ. بەزىدە ياش يوللىرىنى قىسىپ ئۆسۈپ قويسا ياش ئاقماس بولۇپ قېلىپ، بۇرۇندىن سۇيۇقلۇق ئاقىدىغان بولۇپ قالىدۇ.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن قايسى خىلىتىن بولسا شۇ خىلىتىنى پىشۇرغۇچى ۋە تازىلىغۇچى دورىلار ئىشلىتىلىدۇ. ئاندىن كېيىن كېسەللىك يېڭى بولسا، ئىچكى تەرەپتىن مەتبۇخى ھەلىلە، ھەببى ئىبارەت قاتارلىق دورىلار ئىشلىتىلىدۇ ھەمدە سىرتقى تەرەپتىن شىياڧى زانكار قاتارلىق دورىلار ئىشلىتىلىدۇ.

كېسەللىك كوناغان ھەم ئېغىرلاشقان بولسا، مەخسۇس دەستكارلىق ئۆسۈلى بىلەن





داۋالاش ئېلىپ بېرىلدى.

شىياڧى زانكار

ئەرەب يىلىمى 10.8 گرام، زانكار 2.7 گرام، كاقۇر 1.4 گرام. دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تۇخۇم بىلەن جىگدە ئورۇقى چوڭلۇقىدا شىياڧى ياساپ ئەتىگەن، ئاخشامدا تۈسكەن گۆشكە تەككۈزۈلدى.

### كۆز ئىچكى بۇرجىكى يىرىڭلىق ئاقمىسى

كۆزنىڭ ئىچكى بۇرجىكى يىرىڭلىق ئاقمىسى (ناسۇرۇلكەينى) يەنى ياش خالىتىسىنىڭ يىرىڭلىق ئاقمىسى كۆزنىڭ بۇرۇن تەرەپتىكى بۇرجىكىدە پەيدا بولىدىغان خالىتىسىمان يىرىڭلىق ئاقمىغا قارىتىلغان بولۇپ، دائىم يىرىڭ قىپىغا ئىگە بولىدۇ.

سەۋەبى

بەزى نورمالسىز قويۇق ماددىلار مەلۇم سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن تەدرىجىي ھالدا كۆز بۇرجىكىگە يىغىلىش، ئىششىق ياكى باشقا سەۋەبلەردىن ياش خالىتىسى بىلەن بۇرۇن ئارىلىقىدىكى ياش يولى تارىيىش نەتىجىسىدە ياش خالىتىسىدا سۇيۇقلۇق يىغىلىپ ئوقۇنەتلىنىپ يىرىڭلايدۇ.

بەزى كىشىلەردە كۆزنىڭ تازىلىقىغا دىققەت قىلماسلىقتىن كۆزنىڭ ئىچكى بۇرجىكى جەراسملىنىپ (يۇقۇملىنىپ) ئىششىق پەيدا بولۇش بىلەن نەتىجىدە يىرىڭ يىغىپ ئاقمىغا ئايلىنىدۇ. بەزىدە كۆز بۇلۇڭىغا بىر نەرسە تېڭىش ياكى جازاھەت چىقىش سەۋەبىدىنمۇ يىرىڭلىق ئاقما كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامىتى

دەسلەپتە كۆز (كۆپىنچە بىر كۆز) دائىم ياشاڭغۇرايدۇ. كېيىنچە ئىششىق بۇرۇن





تەرەپتىكى كۆز بۇرجىكىگە مارجان چوڭلۇقىدا ئىچىگە يىرنىڭ تولغان پولاتايما ھاسىل بولىدۇ. قول بىلەن يامسا ئاقۇش ياكى سېرىق سۇيۇقلۇق ئېتىلىپ چىقىپ ئىچى بوشاپ قالىدۇ، مەلۇم ۋاقىتتىن كېيىن يەنە يىرنىڭ يىغىلىدۇ.

ئەگەر، ئوقۇنەتلىنىش كۈچلۈك بولسا بۇرۇن تەرەپ كۆز بۇرجىكىنىڭ تېرىسى قىزىرىپ، ئىشىشىپ ئاغرىيدۇ. ئىشىشىق قاپاق ۋە چاناقلىرىغىچە كېڭىيىپ تەسىر قىلىدۇ، پۈتۈن بەدەن ئارامسىزلىنىدۇ، نەچچە كۈندىن كېيىن ياش خالتىسى قىسىمىدىكى تېرىدە سېرىق يىرنىڭ يىغىلىپ پولىتىدۇ. ياساسا مۇقىلداپ سىرتقا ئېغىز ئالىدۇ. بەزىلىرى ئېغىز ئالغاندىن كېيىن ئۈزلۈكسىز ئېغىزى پۈتۈپ يەنە ئېغىز ئېلىپ، سوزۇلما خاراكىتلىك ياش خالتىسى ئاقمىسىغا ئايلىنىدۇ. ئادەتتە تۇ، كىشىنىڭ سىرتقى كۆرۈنۈشىگە ئۇقسان يەتكۈزگەندىن تاشقىرى، تەرەققىي قىلسا كۆزنى قارىغۇ قىلىپ قويۇشى مۇمكىن.

#### داۋاسى

1. ئىچكى داۋاسى: ئالدى بىلەن قايسى ماددا سەۋەب بولغانلىقىنى ئېنىقلاپ ماددىنى تازىلاش ۋە مىزاجنى تەكشۈش كېرەك. يېڭىلىرى ۋە بەگىلەرگە ئوقۇنەتلىگەنلىرى كۆپىنچە ھۆلۈكتىن پەيدا بولغاچقا بەزى ئىسسىق دورىلار ئارقىلىق يەرلىك ئورۇننى قۇرۇتقۇچى ۋە گۆش ئۈندۈرۈپ پۈتۈرگۈچى دورىلارنى ئىشلىتىش لازىم. مەسىلەن، ھەببى ئىبارەج، ھەببى كىبىرت، مەئجۇنى چۆبەچىنى قاتارلىقلارنى بېرىش كېرەك. كۈچلۈك ئوقۇنەتلىگەنلىرىگە ھەببى بىنەپشە بېرىلسە پايدىلىق.

2. تاشقى داۋاسى: دەسلەپكى دەۋردە، دەستكارلىق ئۆسۈلى ئارقىلىق ياش خالتىسى بىلەن بۇرۇن ئارىلىقىدىكى يولغا كۆمۈش يىڭنە كىرگۈزۈپ، مەزكۇر يولنى كۆشادىلەندۈرۈشكە بولىدۇ. قىزىرىپ ئىشىغاندا ئاق لەيلى گۈلى، ھۆل يۇمغاقسۈتلەرنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ مەلھەم ياساپ تاڭسا ئىشىقىنى ياندۇرىدۇ. قوغۇشۇننى سۇدا سۈرۈپ چاپسىمۇ بولىدۇ. مامىرانچىنى، سۈرمەلەرنى يۇمشاق يانچىپ كۆز چانقىغا تارتسىمۇ بولىدۇ. شىياھى غۇرەبمۇ ياخشى تەسىر قىلىدۇ.

كونىراپ قالغان بولۇپ شارائىت يار بەرسە، دەستكارلىق ئۆسۈلدا داۋالاشقا يوللاپ بېرىش كېرەك.

ئاسان ھەزىم بولىدىغان، ئوزۇقلۇقى يۇقىرى تاماقلار بىلەن ئوزۇقلىنىش كېرەك.



## شىيافى غۇرەب (شىيافى ناسۇر)

سەبرە سۇقۇتتىرى، كۆندۈر، ئەنزەرۇت، ئانارگۈلى، سۈرمە، ئاق زەمچە، خۇنسىياۋشان ھەر بىرى 2.7 گرام، زانكار 10.8 گرام.  
دوربلارنى يۇمشاق سوقۇپ يېپەك ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ئېرىقى بادىيان بىلەن شىياف ياسىلىدۇ.  
لازىم بولغاندا قايناقسۇ ياكى توخۇم ئېقى بىلەن شىيافنى ئاقما بار جايغا كىرگۈزىدۇ.

## كۆزگە قاناتچە گۆش ئۆسۈش

كۆزگە قاناتچە گۆش ئۆسۈش (زۇفرە، گىل چەشمى) كۆز ئىچكى بۇرجىكىدىن تىرناق شەكىلدە گۆش ئۆسۈپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان.  
بۇ خىلدىكى قاناتچە گۆش كۆپىنچە كۆزنىڭ ئىچكى بۇرجىكىدىن باشلىنىپ كۆز ئېقىدىن ئۆتۈپ تەدرىجىي ھالدا كۆز قارىسىغا قەدەر يېتىپ بېرىپ كۆز قارىسىدا ئۈچ بۇرجەكلىك شەكىل پەيدا قىلىدۇ. كۆز قارىچۇقىغا يېتىپ بارسا كۆرۈشكە دەخلى يەتكۈزىدۇ.

## سەۋەبى

بۇ، كۆز ئېقى ۋە مۇڭگۈز پەردىسىدىكى قان تومۇرلارغا مېڭىدىن نورمالسىز خىلىتلار بولۇپمۇ بەلغەم ياكى سەۋدا ماددىسى چۈشۈپ پولىتىپ، تۈتۈنگە ئوخشاش پەردە ھاسىل قىلغانلىقىدىن پەيدا بولىدۇ.

بەزى كىشىلەردە ھەر خىل كۆز كېسەللىرى ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ كۆز داۋاملىق قىچىشقانلىقتىن كۆزنى دائىم ئۇۋۇلاپ كېلىپ چىقىدۇ. كۆپىنچە ئوتتۇرا ياشلىقلاردا چاڭ-توزاڭ ۋە شاماللىق جايلاردا ئۇزۇن مۇددەت ئىشلەيدىغان ئەمگەكچىلەردە كۆز چانسىغا چاڭ-توزان، قۇم-توپا قاتارلىقلار كىرىپ جەراسملىنىپ، كۆپ قىچىشىش، كۆپ ئۇۋۇلاش تۈپەيلىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

دەسلەپتە ئۇزۇنغىچە كۆز بۇرجەكلىرىدە بولۇپمۇ ئىچكى بۇرجىكىدە قىچىشىش پەيدا بولىدۇ. تەدرىجىي ھالدا كۆز بۇرجىكىدىن كۆز قارىچۇقىغا قاراپ قىزىل ساپال رەڭلىك قاناتسىمان گۆش ئۈنۈپ تەدرىجىي ھالدا كۆز ئېقىنى قاپلاشقا باشلايدۇ ھەتتا كۆز قارىچۇقىنى يېپىپ قويىدۇ، ئۇنىڭ بەزىلىرى قاتتىق، بەزىلىرى يۇمشاق بولىدۇ.

داۋاسى

1. ئالدى بىلەن قايسى خىللىتىن بولغان بولسا شۇ خىللىتى پۇشۇرۇش، تازىلاش ۋە تەكشۈش كېرەك. يېڭىراق بولسا ئاق زەمچىنى بىر ئاز سۈرۈپ، چىلان تۇرۇقىدەك چوڭلۇقتا قەلەمچە ياساپ ئەتكەن ئاخشامدا قايناقسۇغا تەككۈزۈپ ئېلىپلا كېسەل ئورۇنغا بىردەم يېقىپ تۇرۇش كېرەك. بىرقانچە قېتىم تەكرارلسا تەرەققىي قىلىشى توختاپ ئاستا-ئاستا ياخشىلىنىدۇ.
  2. يۈزدە ئىككى نىسبەتتە ئېرىتكەن كۈمۈش كۈشتىسى بىلەن قاناتچە گۆشنى كۆيدۈرۈشنىڭ خېلى ئۈنۈمى بار. لېكىن بۇنىڭدا كۆز پەردىلىرى زەخمىلەندۈرۈپ قويۇشتىن قاتتىق ساقلىنىش كېرەك.
  3. تۆۋەندىكى دورىنىڭ ئۈنۈمى ياخشى: تۆشۈدۈر 1.5 گرام، توغرىغۇ، كۆپۈكى دەريا، ئوشەق ھەر بىرى 3 گرام، زانكار 6 گرام.
  - ئوشەقنى يېڭى سوزاپنىڭ سىقلان سۈيىدە ئېرىتىپ، قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ تاسقاپ ئازراق پاكىز سۇدا ئېرىتىپ ھەممىسىنى قوشۇپ كۆزگە كۈندە 2-3 قېتىم تېمىتىش كېرەك.
  4. يېشىل زاك، نۆشۈدۈردىن سۈرتىدىغان دورا تەييارلاپ سۈرتسە ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.
- ئەگەر قاناتچە گۆشنىڭ تەرەققىي قىلىشى تېز بولۇپ كۆز قارىچۇقىنى يېپىپ، كۆرۈشكە دەخلى قىلىش ئېھتىمالى بولسا، شارائىتى بارلار دەستكارلىق يولى بىلەن قىرىپ تاشلىسا بولىدۇ. لېكىن بۇنىڭ يەنە قايتىلىنىش ئېھتىمالى بولغاچقا تەرەققىي قىلمىغان، كۆرۈش قۇۋۋىتىگە تەسىر بەتكۈزمىگەنلىرى بولسا قىرىمىسىمۇ بولىدۇ. ئەمما، تەرەققىي قىلىشىنى توسايدىغان چارىلەرنى قىلىپ تۇرۇش، قايتا قوزغىلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. كۆرۈشكە دەخلى بەتكۈزمەسلىك ئۈچۈن قاناتچە گۆشنى قارىچۇقتىن چەتلىتىش تەدبىرلىرىنى قوللىنىشقا بولىدۇ.



## كۆز ئېقى كېسەللىكلىرى

كۆز ئېقى كۆز يۇمىلىقى ئەستەر پەردىسى ۋە قاتتىق پەردىنىڭ سىرتىغا كۆرۈنۈپ تۇرغان قىسمىغا قارىتىلغان بولۇپ، گەرچە ئۇلار بىۋاسىتە كۆرۈش خىزمىتىگە قاتناشمىسىمۇ لېكىن ئومۇمىي بەدەندىكى مىزاج ئۆزگىرىشلىرى دائىم دېگۈدەك ئۇنىڭدا ئاسانلا ئەكس ئېتىدۇ. ئۇنىڭدا يۈز بەرگەن كېسەللىكلەر، مەسىلەن: كۆز قىزىرىپ ئاغرىش، نېپىز گۆش پەيدا بولۇش، ئىششىش، قىچىشىش، رەڭدار چېكىت پەيدا بولۇش، مۇدۈر پەيدا بولۇش قاتارلىقلار كۆزنىڭ نورمال خىزمىتى ۋە كۆرۈشكە ھەر خىل دەرىجىدە تۇقسان يەتكۈزۈدۇ. كۆز ئېقىدىكى نېپىز گۆش پەيدا بولۇشتەك كېسەللىكلەر تەرەققىي قىلسا ھەتتا كۆزنىڭ نورمال كۆرۈشىنى پۈتۈنلەي يوققا چىقىرىدۇ. شۇڭا كۆز ئېقىدا يۈز بەرگەن كېسەللىكلەرگە ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىش، ئۇلارنى ۋاقتىدا داۋالاپ ساقايتىش يەنىلا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.

كۆز ئېقى كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتا ئىچكى ۋە تاشقى داۋالاش تۈسۈللىرىنى مۇۋاپىق قوللىنىش، ئومۇمىي بەدەننى داۋالاش بىلەن يەرلىك ئورۇننى داۋالاشنى ماسلاشتۇرۇپ ئېلىپ بېرىش كېرەك. مىزاج خاراكتېرلىكلىرىنى داۋالاشتا ئومۇمىي بەدەننى داۋالاشقا كۆپرەك ئېتىبار بېرىش، دورىلار بىلەن داۋالاشنى ئاساس قىلىش؛ كۆزنىڭ يەرلىك ئورۇندىكى كېسەللىكلىرى، مەسىلەن: كۆز ئېقىغا نېپىز گۆش ئۆسۈش ۋە نېپىز پەردە پەيدا بولۇشقا ئوخشاشلارنى داۋالاشتا كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى ماددىنى توختىتىش ۋە يوقىتىشقا تىرىشىش بىلەن بىرگە يەرلىك ئورۇننى داۋالاشقا كۆپرەك ئېتىبار بېرىش، شارائىت يار بەرسلا دەستكارلىق تۈسۈلى بىلەن داۋالاشنى ئاساس قىلىش كېرەك. كۆز تازىلىقىغا ئەھمىيەت بېرىش، يېمەك-ئىچمەك، ھەرىكەت ۋە دەم ئېلىشنى مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇش، ئوپېراتسىيىدىن بۇرۇن بەدەننى تەنقىيە قىلىش، ئوپېراتسىيىدىن كېيىن مەلۇم مەزگىل كۆزنى پەرۋىش قىلىشقا دىققەت قىلىش كېرەك.



## كۆز ئەستەر پەردىسى قىچىشىش

كۆز ئەستەر پەردىسى قىچىشىش (ھىككەنى مۇكەھەمەنى ئەينىيە) كۆز ئەستەر پەردىسىگە يەنى كۆزنى ئوراپ تۇرغۇچى پەردىنىڭ قىزىرىپ، قىچىشقانلىقىغا قارىتىلغان بولۇپ، ئادەتتە خېلى كۆپ ئۇچرايدۇ.

سەۋەبى

ھەر خىل يەللىك نەرسىلەرنىڭ تەسىرى تۈپەيلىدىن بۇزۇق ماددىلار كۆز ئەستەر پەردىسىدە توختاپ قېلىپ قىزىرىش، قىچىشىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ياكى تۆت خىللىتىن بىرەرسىنىڭ غەيرىي تەبىئىيلىككە ئۆزگىرىپ كۆز ئەستەر پەردىسىگە يامان تەسىر كۆرسەتكەنلىكىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامىتى

كۆز ئەستەر پەردىسى يەنى كۆزنى ئوراپ تۇرغۇچى گۆشلۈك پەردە قىزىرىپ قىچىشىدۇ. قىسمەنلىرىدە گۆشلۈك پەردە قېلىنلىشىپ، كۆزنىڭ نورمال ھەرىكىتىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ. كۆزدە كۆپۈشۈش بولمايدۇ.

مەزكۇر كېسەللىك يەلدىن پەيدا بولغاندا، كېسەللىك ئالامەتلىرى بەزىدە پەيدا بولۇپ بەزىدە ئۈزلۈكسىز يوقىلىپ كېتىدۇ.

خىلىتلارنىڭ نورمالسىز ئۆزگىرىشلىرىدىن پەيدا بولغانلىرىدا ھەرقايسى خىلىتقا خاس ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. مەسىلەن، سەپرادىن بولسا قىزىرىپ قىچىشقاندىن سىرت يەنە ئېچىشىپ قاندىلىپ ئاغرىدۇ. كۆن تۇرغا يولۇقسا ئاغرىش تېخىمۇ كۈچىيدۇ. ئەگەر بەلغەم خىلىتىدىن بولسا قىزىرىش، ئېچىشىش بولمايدۇ، يەڭگىل دەرىجىدە قىچىشىش، ياش كۆپ ئېقىش قاتارلىقلار بولىدۇ.

داۋاسى

داۋالاشتا بۇقىرىقىغا ئوخشاشلا يەلدىن پەيدا بولغانلىرىغا يەلنى تارقاقچۇچى دورىلار



ئىشلىتىلىدۇ. مەسلەن، ئىيارە جى فەيقەرا، سۇقۇفى ئىترىفېلى كەشنىز، مەتبۇخى ھەلىلە قاتارلىق دورىلا ئەھۋالغا قاراپ تاللاپ قوللىنىلىدۇ. سىرتتىن كۆھلى روشنائى سەغىر ئىشلىتىلىدۇ. خىلىتلارنىڭ نورمالسىز ئۆزگىرىشىدىن بولغانلىرىغا زىيادە خىلىتنى پىشۇرۇپ تازىلايدىغان، نورمالسىز خىلىتنى تەڭشەيدىغان دورا ۋە چارە - تەدبىرلەر قوللىنىلىدۇ.

### كۆز ئەستەر پەردىسى يەللىك ئىششىقى

كۆز ئەستەر پەردىسى ئىششىقى (ئىتفاخى مۇلتەھەمەئى ئەبىيە) كۆز ئەستەر پەردىسى يەنى كۆز يۇمىلىقىنى ئوراپ تۇرغۇچى گۆشلۈك پەردىنىڭ يەڭگىل دەرىجىدە ئىششىپ ياكى يەللىك خاراكتېردە كۆپىشىپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

بەلغەم، سەۋدا خىلىتلىرىنىڭ ئۆزگىرىشىدىن بولۇپمۇ سوغۇقتىن ۋە يەلدىن كېلىپ چىقىدۇ. يەنى كۆزگە سوغۇق شامال تېگىش، بەزى كىشىلەردە تاماق ھەزىم قىلىش ئاجىزلاپ يېمەكلىكلەر تولۇق ھەزىم بولماي يەل پەيدا بولۇش ياكى نورمالسىز بەلغەم ۋە سەۋدا خىلىتىنىڭ كۆزگە ناچار تەسىر قىلىشىدىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامىتى

بەلغەم خىلىتىنىڭ نورمالسىز ئۆزگىرىشىدىن بولغان بولسا، كۆز ئەستەر پەردىسىنىڭ ئىششىقى چىڭقىلىش، ئېسىلىش ئېغىرراق بولىدۇ. ياش كۆپ ئاقىدۇ، كۆز تەسلىكتە ئېچىلىدۇ.

سەۋدا خىلىتىنىڭ نورمالسىز ئۆزگىرىشىدىن بولغان بولسا، قىچىشىش، ئاغرىش بولمايدۇ. لېكىن، ئىششىق ئېغىرراق بولىدۇ. كۆز قۇرۇق بولۇپ، ياش ئاقمايدۇ. يەلدىن بولغان بولسا، كۆز چانقى بىر ئاز قىچىشىدۇ. كۆزدە ئېغىرلىق بولمايدۇ.





ئىششىق بەزىدە پەيدا بولۇپ، بەزىدە يوقىلىپ كېتىدۇ. ھەمدە ھەزىم قىلىش ناچارلىشىش، مەئدە قۇرساق كۆيۈش، قۇرساق توق ۋاقىتتا كۆز چىڭقىلىش، توخلىغاندا ئىششىق ئېغىرلىشىشتەك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

### داۋاسى

مەزكۇر كېسەللىك ئەگەر بەلغەم خىلىتىدىن بولغان بولسا، تازىلاش ۋە مزاجنى تەڭشەش ئۈچۈن ئىيارەجى فەيقەرا، مەتبۇخى ھەلىلە، مەتبۇخى بادىيان قاتارلىقلارنى ئەھۋالغا قاراپ تاللاپ ئىشلىتىش كېرەك.

ئەگەر سەۋدا خىلىتىدىن بولغان بولسا، ئالدى بىلەن مزاجنى ھۆللەشتۈرۈش، كۆپرەك مۇنچىغا چۈشۈش، شەرىپتى بىنەپشە، شەرىپتى نىلۋەلەرنى ئىشلىتىش ۋە ھۆللۈك يەتكۈزگۈچى تاماقلارنى ئىستېمال قىلىش لازىم.

يەلدىن بولغان بولسا، ئاشقازاننى قىزىتىپ يەلنى تارقاقچى دورىلاردىن رۇمبادىيان، زىرە، قارىمۇچ قاتارلىقلارنى بىرلەشتۈرۈپ ياكى ئايرىم ئىستېمال قىلىش كېرەك. يەڭگىل تاماقلارنى يېيىش، يەللىك تاماقلاردىن پەرھىز قىلىش، كۆزنى ئىسسىق سۇدا يۇيۇش لازىم.

### كۆز ئەستەر پەردىسى ياللۇغى

كۆز ئەستەر پەردىسى ياللۇغى (ئىلتىھابى مۇكتەھەمەئى ئەينىيە) كۆز تۇتاشتۇرغۇچى پەردىنىڭ ئېغىرراق دەرىجىدە ئىششىقلانغانلىقىغا قارىتىلغان بولۇپ، كۆز ۋە ئەتىياز پەسلىدە كۆپرەك ئوچرايدىغان بىر خىل يۇقۇملۇق كۆز كېسەللىكى.

### سەۋەبى

تۆت خىلىتىنىڭ بىرەرسىنىڭ غەيرى تەبىئىي ئۆزگىرىپ كۆز ئېقى ئەستەر پەردىسىگە تەسىر كۆرسىتىش بىلەن ئوقۇنەت پەيدا قىلىپ كۆز قىزىرىپ ئاغرىشقا سەۋەب بولىدۇ.







بەزى كىشىلەردە ئەتىياز، كۆز پەسىلدە بولۇپمۇ ھاۋا كىلىماتىنىڭ ئۆزگىرىشى بىلەن ھەر خىل بوران، چاڭ-توزانلارغا ئۇچراپ كۆز جەراسىملىنىش نەتىجىسىدە كۆزنىڭ قىزىرىپ ئاغرىشقا سەۋەبچى بولىدۇ. بەزى كىشىلەر پاسكىنا لۇڭگە ياكى قول بىلەن كۆزنى تۇۋۇلاش ئارقىلىق كۆز جەراسىملىنىپ كۆز قىزىرىپ ئاغرىشقا سەۋەبچى بولىدۇ. بەزى كىشىلەردە يۇقۇملۇق زۇكام، قىزىل، چېچەككە ئوخشاش كېسەللەردىن كېلىپ چىقىدۇ.

### ئالامىتى

• دەسلەپكى مەزگىلدە كۆز ئازراق قىچىشىپ تۇۋۇلغاندىن كېيىن قىزىرىش پەيدا بولىدۇ. كۈچەيگەن مەزگىلدە كۆز قانداقلىقى ئاغرىش، ياش ئېقىش، سېرىق چاپاقلىشىپ كۆزنى ئاچالماسلىقتەك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. شۇنىڭدەك كۆز يۇمىلىقى چىڭقىلىپ يورۇقلۇققا قارىيالماسلىق، ئۇخلاپ قۇيقان مەزگىلدە ئۇزۇنغىچە كۆزنى ئاچالماسلىق ھەمدە بىر كۆز ئاغرىغان بولسا 2-3 كۈندىن كېيىنلا ئىككىنچى كۆزىگە ئۆتۈشتەك بەلگىلەر كۆرۈلىدۇ.

مەزكۇر كېسەلنىڭ يۇقۇشى تېز بولۇپ، بىر كۆزدىن ئىككىنچى بىر كۆزگە ياكى ئائىلىدىكى يېقىن مۇناسىۋەتلىك كىشىلەرگە 2-3 كۈندە يۇقۇپ تارقىلىپ كېتىدۇ. كۆزدە قىزىرىپ ئىشىشىش پەيدا بولۇپ 15—10 كۈن ئىچىدە تەدرىجىي ساقىيىدۇ. بۇ كېسەللىكنىڭ تۆت خىلى ئۆزگىرىشى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى تۆۋەندىكىچە:

قاندىن بولسا—كۆزلىرى قىزىل، تومۇرلىرى كۆپكەن بولۇپ باش چىڭقىلىپ لوقۇلداپ ئاغرىيدۇ، كۆزدىن ياش ئاقىدۇ.

سەپرادىن بولسا—كۆزدە ئېچىشىش، كۆپۈشۈش ئېغىر بولىدۇ، چاپاق كۆپ بولمايدۇ. تىلى سېرىق بولىدۇ.

بەلغەمدىن بولسا—كۆپ چاپاقلىشىدۇ، ياش كۆپ ئاقىدۇ، ئاغرىش كۈچلۈك بولمايدۇ. سەۋاددىن بولسا—كۆزلىرى قۇرۇپ، باش ئاغرىيدۇ. كۆزنى يۇمۇش تەس بولىدۇ، چاپاق ۋە ياش ئازراق بولىدۇ.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن مىزاجدىكى ئۆزگىرىشىنى ۋە بۇ ئۆزگىرىشكە سەۋەب بولغان ماددىنى تېپىپ شۇ ماددىنى تازىلاپ ئاندىن كۆزنى داۋالاش كېرەك. بەلگىلەرگە بولسا ئاغرىق





2-3 كۈندە ساقىيىپ كېتىدۇ. ماددىنى تازىلىمىسىمۇ بولىدۇ. ئاساسەن ھارارەتنى پەسەيتىدىغان، قوقاق ياندۇرىدىغان (ئوقۇنەت زەھەرلەرنى قايتۇرىدىغان) چارىلەرنى قىلىش لازىم.

ئىسسىقتىن بولغانلارغا قىز توغقان ئايالنىڭ سۈتىنى يېڭى پىنى كۆزگە تېمىتسا ۋە كۆز ئۈستىگە چاپسا بولىدۇ. ئەگەر ئاغرىق كۈچلۈك بولسا ئەپيۇندىن ئازراق قوشۇش لازىم. شىياڧى ئەيەز ئويدان پايدا قىلىدۇ. ئىچىشكە ھەببى بىنەپشە بېرىلىدۇ.

قاندىن بولغان بولسا، باشقا قوشۇمچە ئۆزگىرىشلەر بولمىسا ئەھۋالغا قاراپ قان ئېلىش كېرەك ياكى قاننى پەسەيتىش ۋە تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى ھەلىيلە، مەتبۇخى شاھتەررە، مەتبۇخى تەمرى ھىندى قاتارلىق دورىلارنى قاينىتىپ ئىچكۈزۈش لازىم. سىرتىن شىياڧى ئەيەزنى تۇخۇم ئېقى ياكى قىز توغقان ئايالنىڭ سۈتىدە ئېزىپ كۆزگە تارتىش كېرەك.

#### شىياڧى ئەيەز

كەترا، سەمغى ئەرەبى ھەر بىرى 8 گرام، نىشاستە 2.7 گرام، ئەپيۇن 0.25 گرام. دورىلارنى قانداق بويىچە بۇمىشاق سالايە قىلىپ يېپەك ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ئالغان قىلىنىدۇ. لازىم تېپىلغاندا يۇقىرىقى ئالغاندىن 0.5 گرامنى ئازراق تۇخۇم ئېقى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىككى قېتىم كۆزگە چېپىپ تېگىلىدۇ.

سەپرادىن بولغان بولسا يۇقىرىقى مەتبۇخلارنى بېرىش بىلەن بىللە كاسىن ئورۇقى، ئىسبەغۇل، بېھى قاتارلىقلارنىڭ شىرىسىنى چىقىرىپ، تۇخۇم ئېقى ياكى ئايال سۈتى بىلەن قوشۇپ كۆزگە چېپىش لازىم. ئىت ئۆزۈمىنىڭ مېۋىسى، ھۆل يۇمىغاقسۈتلەرنى سوقۇپ كۆزگە تېگىش كېرەك.

بەلغەمدىن بولغان بولسا تازىلاش ئۈچۈن ئىيارەجى پەيقەرە، ھەببى قوقيا قاتارلىق دورىلارنى بېرىش، ئاندىن ئىششىق قايتۇرۇش ئۈچۈن سەبرە، ھۇزۇز، ئاقاقىيا، زەئفەرلەرنىڭ قايسى بىرسى بولسا گۈلاب بىلەن ئېزىپ پېشانغا، كۆزگە تېگىش كېرەك.

سەۋدادىن بولغان بولسا مېڭىنى ھۆللەشتۈرۈش ئۈچۈن سۈت، ئارپا سۈيى، تۇخۇ شورىپسى، پالەك قاتارلىق نەرسىلەرنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش، قىزىق پارلىق مۇنچىدا يۇيۇنۇش بىلەن بىللە، گۈل يېغى، بىنەپشە يېغى بىلەن چېكە ۋە كۆز ئەتراپىنى ياغلاش، بېھى ئورۇقىنىڭ شىرىسىنى تۇخۇم ئېقى بىلەن كۆزگە تېگىش لازىم ھەمدە يۇقىرىقى چارىلەرنى قوللىنىش بىلەن بىللە تازىلىغۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش لازىم.





دېققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار: كۆزنى ئۇۋۇلاش ۋە چىگىقىلىپ يۇتۇلۇشتىن ساقلىنىش، كېسەل كىشىنى قاراڭغۇراق جايدا ياتقۇزۇش، پاكىز كۆك رەختنى قاينىتىپ سوۋۇتۇلغان مۇزدەك سۇغا چىلاپ سىقىپ كۆزگە، پېشانە ئەتراپىغا پات-پات قويۇپ بېرىش لازىم.

### كۆز قىزىرىپ ئاغرىش

كۆز قىزىرىپ ئاغرىش (رەمەد) كۆز ئېقى يەنى كۆز ئەستەر پەردىسىنىڭ ياللىغىغا قارىتىلغان بولۇپ، ئادەتتە خەلق ئارىسىدا كۆز قىزىرىش (ئاشۇبى چەشم) دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇ ئەتىياز، ياز ۋە كۆز پەسىللىرىدە كۆپرەك ئوچرايدىغان يۇقۇملۇق كۆز كېسەللىكىدۇر. رەمەد چوڭ جەھەتتە ئىسسىق رەمەد ۋە سوغۇق رەمەد دەپ ئىككى تۈرگە بۆلۈنىدۇ. قەدىمكى ھەكىم، ئۆلىمالىرىمىز ئونى ئۈچ خىل، تۆت خىل ھەتتا سەككىز خىلغا ئايرىيدۇ. رەمەد ئادەتتە باشقا كۆز ياللىغلىرىغا ئوخشاشلا تۆت خىلدىن بولىدۇ. رەمەد كېسىلى قەدىمدىن تارتىپ كۆپىنچە كۆزنىڭ ئىسسىقتىن بولغان قىزىرىپ ئاغرىشىغا قارىتىلغان بولۇپ، ئەمەلىيەتتە قان خىللىتىدىن بولىدىغىنى كۆپ ئوچرايدۇ. ئىككىدىن ئارتۇق خىلدىن بولىدىغان مۇرەككەپ رەمەد مۇ ئوچرايدۇ.

#### سەۋەبى

كۆز ئەستەر پەردىسى ياللىغى (رەمەد) بىلەن ئاغرىغان بىمارلاردىن يۇقۇپ ئېغىرلاشقانلىقتىن پەيدا بولىدۇ. تاشقى ۋە ئىچكى سەۋەبلەردىن تۆت خىلنىڭ بىرەرسى (بولۇپمۇ قان ۋە سەپرا) دە نورمالسىز ئۆزگىرىشلەر پەيدا بولۇپ، كۆزگە تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭدا كېسەللىك ماددىسى بەزىدە كۆزنىڭ ئۆزىدە پەيدا بولىدۇ. بەزىدە مېڭىنىڭ سىرتقى پەردىسىدىن نەزلە يولى ئارقىلىق ياكى ئىچكى پەردىسىدىن سىرغىش ئارقىلىق كۆزگە كېلىدۇ. يەنە بەزىدە پۈتۈن بەدەندىن بولۇپمۇ ئاشقازان، بالىياتقۇدىن يۇقىرىغا ئۆرلەش ئارقىلىق كېلىدۇ.

يەل (بۇخار)لار ئوفۇنەت پەيدا قىلىپ كۆزگە تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ



چىقىدۇ. ئايرىم ھاللاردا زۇكام (نەزلە)، سۈزۈنەك قاتارلىق كېسەللەر تۈپەيلىدىنمۇ كېلىپ چىقىدۇ.

يۇقىرىقىلار، كۆزدە سوئى مۇزاجلىق ھالەت يۈز بەرگەندە كۆپ كۆرۈلىدۇ.

### ئالامىتى

دەسلەپتە كۆز ئازراق قىچىشىدۇ ھەم كۆزگە غەيرىي نەرسە كىرىپ قالغاندەك بىلىنىدۇ. كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىرلىشىشقا باشلىغاندا كۆز قىزىرىپ ئىشىشىدۇ. كۆز قان قۇيغاندەك بولۇپ قالىدۇ. باش، گەجگە ۋە كۆز يۇمىلىقى چىڭقىلىپ، لوقۇلداپ ئاغرىدۇ. يورۇقلۇققا قارىيالمايدۇ، كۆزنى ئېچىش تەسكە توختايدۇ، ئويۇقۇ قاچىدۇ. كۆز چاپاقلىشىش ئەتىگەن ئورنىدىن تۇرغاندا ئېغىرلىشىدۇ. بىر كۆز ساقايغاندىن كېيىن يەنە بىر كۆز ئاغرىدۇ. بەزىدە ئىككىلا كۆز تەڭ ئاغرىدۇ. مەزكۇر كېسەلنىڭ يۇقۇشى ئادەتتە 1-2 كۈن ئىچىدە باشلىنىپ، 3-4 كۈن ئىچىدە يۇقىرى پەللىگە چىقىدۇ. ئاندىن كېيىن ئاستا-ئاستا يەڭگىللىشىپ 10-14 كۈن ئەتراپىدا ساقىيدۇ.

رەمەد قان خىلتىدىن بولغان بولسا كۆزدىكى قىزىللىق بەكرەك، كۆزدىن ئاقىدىغان سۇيۇقلۇق كۆپرەك بولىدۇ. كۆز جىيەكلىرى چاپاقلىشىپ، ئىشىشىپ قالىدۇ. تومۇرلىرى چىڭقىلىپ، باش لوقۇلداپ ئاغرىش قاتتىقراق بولىدۇ. تومۇرى توم، سۈيدۈكى قىزغۇچ، ئېغىزى تاتلىق، ئاغرىقنىڭ بېشى ئېغىر، تۈزى ھورۇن كېلىدۇ. بۇ خىل رەمەد ياشلىق دەۋرلەردە ۋە ئەتىياز پەسىللەردە كۆپ ئۇچرايدۇ.

رەمەد سەپرادىن بولسا كۆز قىزىرىش بىلەن بىرگە ئېچىشىپ، كۆپىشىپ، سانجىلىپ ئاغرىدۇ. كۆپىنچە ھاللاردا تۆتكۈر خاراكىتلىك سۇيۇق ياش ئاقىدۇ. ئەمما، ئانچە بەك چاپاقلاشمايدۇ. جىيەكلەر چاپلىشىۋالمايدۇ. ئېغىزى ئاچچىق، سۈيدۈكى قىزىل بولىدۇ. بۇ خىل رەمەد ياشلىق دەۋرلىرىنىڭ ئاخىرقى مەزگىللىرىدە، ياز پەسىلىدە كۆپ ئۇچرايدۇ.

رەمەد بەلغەمدىن بولسا كۆزدىكى قىزىللىق يەڭگىلەرەك بولىدۇ. ئەمما ياش كۆپ ئاقىدۇ؛ كۆز ئىشىشىپ قالىدۇ. چاپاق كۆپرەك بولۇپ، جىيەكلەر چاپلىشىۋالىدۇ. كۆزدىكى ئاغرىش ئانچە كۈچلۈك بولمايدۇ. ئاغرىقنىڭ ئېغىزى چۈچمەل، سۇلۇق، سۈيدۈكى تاق، تۈزى ھورۇن بولىدۇ. بۇ خىل رەمەد ياشانغان دەۋرلەردە، قىش پەسىلىدە كۆپ ئۇچرايدۇ.

رەمەد سەۋدادىن بولسا كۆز رەڭگى قىزغۇچ كۆكۈش بولىدۇ. كۆز قۇرۇشۇپ، باش ئاغرىدۇ. ياش ئاقمايدۇ، چاپاقلاشمايدۇ. چاپاقلاشسىمۇ چاپاق قويۇق بولىدۇ. جىيەكلەر



چاپلىشىۋالمايدۇ. كۆزنى يۇمۇش تەسكە توختايدۇ. بۇ خىل رەمەد ئوتتۇرا ياشلىق دەۋرلەردە، كۆز پەسىلدە كۆپرەك ئوچرايدۇ.

رەمەد يەلدىن بولسا كۆزدىكى ئېغىرلىق تۆۋەنرەك، ياش ئازراق بولىدۇ. كۆز جىيەكلىرى ئانچە بەك چاپلىشىۋالمايدۇ. يەللىك نەرسىلەرنى كۆپلەپ ئىستېمال قىلغانلىق تارىخى بولىدۇ. رەمەد نەزلىدىن بولسا زۇكامغا ئائىت ئالامەتلەر قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

### داۋاسى

رەمەد كۆپىنچە ھاللاردا تەبىئىي ھالدىكى ئىچ سۈرۈشلەر بىلەن ئۈزلۈكسىز يوقىلىپ كېتىدۇ. ئەمما، رەمەد ئاقىۋىتىنىڭ ياخشى-يامانلىقى كېسەللىك ماددىسىنىڭ كەيپىياتى ۋە مىقدارى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغاچقا پىرىنسىپ جەھەتتە يەنىلا ئەستايىدىل قاراپ، ئاكتىپ داۋالاش كېرەك. شۇڭا، ئالدى بىلەن مىزاجدىكى تۈزگىرىش ۋە بۇ تۈز-گىرىشكە سەۋەبچى بولغان ماددىنى تېپىپ ئۇنى مۇناسىپ مۇنزىجىلار بىلەن پۇشۇرۇپ مۇسەللار بىلەن تازىلاش، ئاندىن كېيىن كۆزنى داۋالاش كېرەك. يەڭگىلەر كلىرى 2-3 كۈندە ساقىيىپ كېتىدۇ، ماددىنى تازىلىمىسىمۇ بولىدۇ.

چاپاقنىڭ كۆپلۈكى ۋە سۇيۇقلۇقى كېسەللىكنىڭ دەسلەپكى باسقۇچتا ئىكەنلىكى، چاپاقنىڭ كۆز جىيەكلىرىگە چاپلىشىۋېلىشى كېسەللىك ماددىسىنىڭ پىششىقا باشلىغانلىقى، چاپاقنىڭ قويۇقلىشىپ مىقدارى كۆرۈنەرلىك ئازايغانلىقى كېسەللىك ماددىسىنىڭ تولۇق پىشقانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. كۆزدىن ئاققان سۇيۇقلۇق چاپاققا ئايلانماي داۋاملىق ئاقسا ئاقىۋىتى ياخشى ئەمەس. سوغۇق ياشنىڭ كۆپ ئېقىشى كېسەللىك ماددىسىنىڭ پىشىپ يېتىلمىگەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. چاپاقلىق كۆزدىن ئەنسىرەش ھاجەتسىز.

يازدا بولىدىغان رەمەدكە تەب قوشۇلۇپ كېلىدىغان ئەھۋاللار ناھايىتى ئاز ئوچرايدۇ. ئەگەر تەب قوشۇلۇپ كەلسە، كېسەللىك ماددىسىنىڭ تېزلا پىشىپ ياخشىلىنىپ كېتىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. قىزىتما قوشۇلۇپ كېسەل ئەھۋالى ئېغىرلىشىشقا باشلىسا ئاقىۋىتى ياخشى ئەمەس. كۆزنى قارىغۇ قىلىپ قويۇشى مۇمكىن.

رەمەد ئىسسىق جايلاردا كۆپرەك ئوچرايدۇ، تېز ساقىيىدۇ. سوغۇق جايلاردا ئازراق ئوچرايدۇ، تەستەرەك ساقىيىدۇ.

داۋالاش پىرىنسىپى جەھەتتە قىزىقلىقنى پەسەيتىدىغان، قوقاق ياندۇرىدىغان (ئوقۇنەت زەھەرلىرىنى قايتۇرىدىغان) چارىلەر قىلىنىدۇ. ئەستەر پەردە ياللىغى (رەمەد)





نىڭ قايسى خىلدىكىسى بولمىسۇن ھەممىسىگە ھەببىي بىنەپشىنى ئىچكۈزۈشكە بولىدۇ. ئىسسىقتىن (قان، سەپرا) بولغان رەمەدنى داۋالاشتا ئەگەر كېسەللىك دەسلەپكى باسقۇچتا بولسا قىز تۇغقان ئايالنىڭ سۈتىنى كۆزگە تېمىتىش، بېھىي ئورۇقى، چىلان، تاۋۇز ئورۇقى مېغىزى شىرىسى ۋە نىلۋەن شەرىتى قاتارلىق سالقىنلاققۇچى دورىلارنى ئىچكۈزۈپ كۆزنىڭ ھارارىتىنى پەسەيتىش كېرەك. سەندەل، گىل ئەرمىنى، روسۇت، ئىت ئۈزۈمى، ئاقاقىيالارنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ كۆك يۇمغاقسۇت سۈيدە ئېزىپ كۆز ئەتراپىغا چاپسىمۇ بولىدۇ ھەمدە كۆزنىڭ ئالدىغا كۆك رەڭلىك رەخت تارتىپ قويۇش كېرەك.

كۆك يۇمغاقسۇتنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، ھاۋانچىغا سېلىپ ئازراق سوۋۇتۇلغان قايناقسۇ قۇيۇپ، سوقۇپ ئېزىپ سۈيىنى چىقىرىپ ئازراق شېكەر قوشۇپ كۈندە 2-3 قېتىم ئىچسە ياكى كۆپ مىقداردىكى يۇمغاقسۇتنى سوقمايلا كۆزگە تاڭسا ناھايىتى زور مەنپەئەت قىلىدۇ. ئارپا ئۆننى تۇخۇم ئېقى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ پىشانىگە سۈرسە كېسەللىك ماددىلىرىنىڭ كۆپ ئېقىشىنى چەكلەيدۇ. بەزىدە، كەچتە ئىترىفېلى كەشنىز ئىچكۈزۈپ، ئەتىگەندە بېھىي، چىلان، قۇرۇق يۇمغاقسۇت شىرىسى ۋە بىنەپشە شەرىتلىرىنى قوشۇپ ئىشلەنسىمۇ بولىدۇ. كېسەللىك ئەھۋالغا ئاساسەن ھەلىلە، شاھتەررە، تەمرى ھىندى مەتبۇخلىرىنى ئىچكۈزۈش لازىم. ئەگەر ئاغرىق بەكرەك بولسا، كۆزگە تېمىتىدىغان ئاياللار سۈتىگە ئازراق ئەپۈن قوشسىمۇ بولىدۇ. ئەڭ ياخشىسى ھۆل ئوغرى-تىكەننى يالغۇز ياكى ئارپا ئۆنى بىلەن قوشۇپ چاپسا، ئاغرىق توختىشتا ناھايىتى ياخشى تەسىر كۆرسىتىدۇ.

قاندىن بولغانلىرىغا يۇقىرىقى چارىلەرمۇ ئۈنۈم بەرمىسە، باش ساھەسىدىن قان ئېلىش لازىم. ئاغرىق قايسى كۆزدە كۈچلۈك بولسا، شۇ تەرەپتىن قان ئالسا ئۈنۈمى ياخشىراق بولىدۇ. ئەگەر قان ئېلىش مۇۋاپىق كەلمىسە، باقالچاقنى تىلىپ لوڭقا قويسۇمۇ ياكى قۇلاق، بويۇنلارغا زۇلۇك قۇرۇتى قويسۇمۇ بولىدۇ. ئۈنىڭدىن كېيىن بىنەپشە شەرىتى 50 گرام، ئىت ئۈزۈمى ئەرىقى، سۆگەت چېچىكى ئەرىقى ۋە نىلۋەن ئەرىقى ھەر بىرى 60 گرامدىن ئېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ ئىچكۈزۈلىدۇ.

سەپرادىن بولغانلىرىغا يۇقىرىقى مەتبۇخلارنى بېرىش بىلەن بىرگە كاسىن ئورۇقى، ئىسبەغۇل، بېھىي قاتارلىقلارنىڭ شىرىسىنى تۇخۇم ئېقى ياكى ئاياللار سۈتى بىلەن كۆزگە چېپىش، ئىت ئۈزۈمى، ھۆل يۇمغاقسۇتلەرنى سوقۇپ تېگىش كېرەك. ئىسسىقتىن بولغان رەمەدنىڭ ئاخىرقى مەزگىللىرىدە ھەببىي سۈرۈخ ئىشلەنسىمۇ بولىدۇ. ماددىلارنىڭ قالدۇقلىرىنى تارقىتىش ئۈچۈن بابۇننى سۇ ۋە سىركىدە قاينىتىپ، سوۋۇغاندىن كېيىن كۆزگە تېمىتىسىمۇ بولىدۇ.





ئىسسىقتىن بولغان رەمەدكە مەنپەئەت قىلىدىغان يەككە دورىلار: يۇمغاقسۇت، ئىت ئۈزۈمى، نىيلۇفەر، كاسىن ياپىرقى، قىزىلگۈل، سۆگەت غازىڭى، ئوغرىتكەن، بىنەپشە، قىز تۇغقان ئاياللار سۈتى، ئارپا ئۆنى، تۇخۇم ئېقى، زەمچە، رۇسۇت، كافۇر، سەندەل، خىنە غازىڭى، ئەزەرۇت، دادۇر ئۆنى قاتارلىقلار بولۇپ، ئۇلارنىڭ بەزىلىرى ئىچىش، بەزىلىرى سىرتتىن چىپىش، تېمىتىش، پۇراشقا ئىشلىتىلىدۇ. تەييار دورىلار: مامىششا ئوسارىسى، ئىترىفېلى كەشنىز، ئىترىفېلى بادىيان، بۇرۇدى كافۇرى، بۇرۇدى قەرى، ھەببى ھەلىلە، ھەببى سۇرۇخ، ھەببى رەمەد، زەرۇرى ئەيەز، زەرۇرى چەشخام، زەرۇرى كافۇرى، شىيافى ئەيەر، شىيافى شەب قاتارلىقلار بولۇپ، ئۇلارنىڭ بەزىلىرى ئىچىش، بەزىلىرىنى چىپىش، يۇيۇش، تېمىتىش، سىپىش، سۈرمە قىلىشلارغا ئىشلىتىلىدۇ. بىمار ئامۇت، بېھى، ئالما قاتارلىقلارنى ئىستېمال قىلىشقا بولىدۇ. ئەمما شاپتۇل، ئەنجۈر، ئۈزۈم، قوغۇن، ئۆرۈك، خۇرما، ھەسەل قاتارلىقلارنى ئىستېمال قىلماسلىقى لازىم. چۈنكى، ئۇلارنىڭ ھەممىسى ئىسسىق رەمەدكە زىيان قىلىدۇ.

يېمەك-ئىچمەك جەھەتتە يۇمغاقسۇت، ماش، پالەك ۋە بادام مېغىزى سېلىپ تەم كىرگۈزۈلگەن تاماقلارنى بېرىش، تەمى بەك ئاچچىق ياكى تاتلىق بولۇپ كەتمەسلىكى لازىم. سۈت، بېلىق، قۇرۇتۇلغان گۆش ۋە زەيتۇن يېغى قاتارلىقلارنى ئىستېمال قىلماسلىقى كېرەك.

بەلغەمدىن بولغان رەمەد كېسەللىكىنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن كېسەللىك ماددىسىنى پۇشۇرۇش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن ئۈستۈخۇدۇس، بادىرەنجبۇيا، ئىت ئۈزۈمى، بادىيان ھەر بىرى 9 گرام، رۇمىبادىيان، قەنتەرىيۇن (دەقق) ھەر بىرى 4 گرام، ئۇرۇقىدىن ئاجرىتىلغان ئۈزۈم 24 گرام، سېرىق ئەنجۈر 4 دانە ئېلىپ مەتبۇخ قىلىپ ھەسەل گۈلۈقەنتىدىن 50 گرام قوشۇپ ئىستېمال قىلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن تازىلاش ئۈچۈن ھەببى قوقيا، ھەببى ئىبارەج بېرىلىدۇ. ئىششىقنى قايتۇرۇش ئۈچۈن سەبرە، ھوزۇز، ئاقاقيا، زەئفەرلەرنىڭ قايسى بىرى بولسا گۈلاب بىلەن ئېزىپ پىشانە ۋە قاپاققا تېگىلىدۇ. ئەگەر كېسەللىك ماددىسى بەك سوغۇق بولسا قۇندۇز قەھرى، زەئفەر، راتىبانەج قاتارلىقلارنى مۇۋاپىق مىقداردا چاپسىمۇ بولىدۇ. يۇيۇلغان شۈمشە لۇتابى ۋە زىغىر لۇتابى كۆزگە تېمىتىلىدۇ. شادىنەج مەغسۇل سۈرمە قىلىپ تارتىلىدۇ. گىرېلكا بىلەن ئىسسىق ئۆتكۈزۈش ۋە ئىسسىق مۇنچىغا چۈشۈشتەك ئۆسۈملۈك قولىنىلىدۇ. كېسەل سوزۇلۇپ كونارسا شىيافى ئەھمەرلەيىن، زەرۇرى ئەسفەر ۋە زەرۇرى ئەنەرلەر ئىشلىتىلىدۇ. كۆزنىڭ قىزىللىقى يوقمىسا ۋە ياش ئېقىش توختىمىسا يۇيۇلغان توتىيا، نىشاستە ۋە تۇپىلاردىن باشقىسىنى ئىشلەتمەسلىك، سوۋۇتقۇچى ۋە مەس قىلغۇچى دورىلاردىن قاتتىق ئېھتىيات قىلىش






كېرەك. تامىقى ئۈچۈن چۈجە گۆشى ياكى قورۇلغان گۆشلەرنى ئىستېمال قىلىش، سوغۇق ۋە بەلغەم ماددىسىنى كۈچەيتكۈچى نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىش كېرەك.

رەمەد سەۋادىدىن بولغان بولسا ئارپا سۈيى، سۈت، توخۇ شورپىسى، پالەك قاتارلىق نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلىش؛ ئاپزەن قىلىش، پارلىق مۇنچىغا چۈشۈش، لوئوقلارنى يالىتىش، قەتۇرلارنى تېمىتىش ۋە زىمادىلارنى چېپىش بىلەن بىرگە گۈل يېغى، بىنەپشە ياغلىرىنى چېكە ۋە كۆز ئەتراپىغا سۈركەش؛ بېھى ئورۇقى شىرسىنى توخۇم ئېقىغا ئارىلاشتۇرۇپ كۆزگە تېگىش ئارقىلىق مېڭىگە ھۆللۈك يەتكۈزگەندىن كېيىن بېھى ئورۇقى، سەرپىستان، گاۋزەبان ۋە نىلۈفەرلەرنى قاينىتىپ، سىقىپ سۈزۈپ، ئوڭا بادام مېغىزى شىرسىنى، قۇرۇق بۇمباقسۈت شىرسى ۋە بىنەپشە شەربەتلەرنى قوشۇپ ئىچكۈزۈلدى ۋە ياكى بىنەپشە شەربىتى، نىلۈفەر شەربىتى ۋە خەشخاش شەربىتى بېرىلدى، قان ئېلىنمايدۇ ۋە مەس قىلغۇچى دورىلار ئىشلىتىلمەيدۇ. ئەگەر، كۆزدە بىئاراملىق كۈچلۈك بولسا ئىسسىق تەبىئەتلىك دورا ۋە تاماقلاردىن پەرھىز قىلدۇرۇلدى.

كېسەللىك ماددىسىنى تازىلاشتا سانا، قۇرۇق ئۈزۈم قاتارلىقلارنى قاينىتىپ تەنقىيە قىلىپ بولغاندىن كېيىن ئەفتمۇن سۈرگىسى، ھەببى لاجۋەرد قاتارلىقلار ئىچكۈزۈلدى. ئۈنۈمدىن كېيىن شىيافى مامىشا بېرىلدى. ئاياللار سۈتى، تاتلىق بادام شىرسى قاتارلىقلار كۆزگە تېمىتىلدى. كېسەللىك دەسلەپكى باسقۇچتا شىيافى ئەيەز ئىچكۈزۈلدى. يۇقىرى باسقۇچقا چىققاندا شىيافى دىئارچۇنى سۈركەپ بېرىلدى.

سەۋدا كۆپەيتكۈچى يېمەك-ئىچمەكلىكلەردىن پەرھىز قىلىش، تامىقىغا تۇقۇت سۈيى، ماش سۈيى، ئوغلاق گۆشى، توخۇ چۈجىسى قاتارلىقلارنى ئىستېمال قىلىش كېرەك. سوغۇقتىن يەنى بەلغەم ۋە سەۋدادىن بولغان رەمەدكە مۇرمەككى، زەئفەر، كۈندۈر، سۈنبۈل، سەبزە، كۆيدۈرۈلگەن بۇغا مۇڭگۈزى، يېشىل توتىيا، زەمچە، پارپا، قەلەمپۇر، قارىمۇچ، زەرچۈبە، بادىيان سۈيى، ئىت ئۈزۈمى قاتارلىقلارنى ئىشلەتسە بولىدۇ. تەييار دورىلاردىن شىيافى ئەھمەرلەيىن، شىيافى شادىنەج ئەكبەر، شىيافى ۋەرد قاتارلىقلارنى ئىشلەتسە بولىدۇ. شىيافى ۋەردنى ئۈنۈمى ئەڭ ياخشى.

يەلدىن بولغان رەمەدنى داۋالاشتا بادىيان، ئەفتمۇن ئورۇقلىرىنىڭ شىرسىنى چىقىرىپ ھەسەل گۈلچەنتى بىلەن ئىچكۈزۈلدى. بابۇنە، ئابدۇمىلىك، مەرزەنجۇش، قەنتەرىيۇننىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ قاينىتىپ كۆزگە تېمىتىلدى. مۇنچىغا چۈشۈش تەۋسىيە قىلىندۇ. بۇغداي، قىزىل قوناق، كۈنجۈت، چىگىت، تۇقۇت كېپىكى ۋە تۇز قاتارلىقلار بىلەن كۆزگە ئىسسىق ئۆتكۈزۈلدى. بۇلار تېپىلمىسا لۇڭگە ياكى گىربىلكا بىلەن ئىسسىق ئۆتكۈزۈسە بولىدۇ. كۆزدىكى قىزىللىق يوقالمىسا كەندىر







يوپۇرمىقىدىن 5 گرام، مامرانچىدىن 10 گرام، ئاچچىق بادام مېغىزىدىن 7 دانە ئېلىپ يانجىپ ياغ بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ كۆزگە تېگىش ياكى باش ئارقىغا ئوت لوڭقىسى قۇيۇش كېرەك. يېمەك-ئىچمەك جەھەتتە يەللىك نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىش، توخۇ چۈجىسىنىڭ شورپىسىغا نان چىلاپ يېيىش، بەك تويۇنۇپ كەتمەسلىك لازىم. ئەگەر بۇ چارىلەر بىلەنمۇ ياخشىلانمىسا بەلغەم ماددىسىنى تازىلاش كېرەك.

نەزلىدىن بولغان رەمەدىنى داۋالاشتا، ئىسسىق نەزلىدىن بولغان رەمەدىنى ئىسسىقتىن بولغان رەمەدىنى داۋالغاندەك، سوغۇق نەزلىدىن بولغان رەمەدىنى سوغۇقتىن بولغان رەمەدىنى داۋالغاندەك داۋالاش كېرەك.

ئىسسىق نەزلىدىن بولغان رەمەددە يۆتەل بىللە كۆرۈلسە 18 گرام خېمىرى خەشخاشنى چىلان سۈيى، بېيى شىرسى، بىنەپشە شەرىپتى بىلەن ئىچكۈزۈش كېرەك. خەفەقان، بەۋاسىر كېسەللىكلەرى، چىش ۋە قۇلاق ئاغرىش، كۆز ئاجىزلىشىش قاتارلىقلار بىللە كۆرۈلسە ئالدى بىلەن قىزىتما ياندۇرۇش، ئاغرىق توختىتىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن كاھو شىرسى، قۇرۇق يۇمىقاسۇت شىرسى قاتارلىقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 6 گرام، ناۋاتىن 15 گرام ئېلىپ قاينىتىپ ئىچكۈزۈلىدۇ. ئاندىن كېيىن سەپرا مۇنزىچىغا ھەمىشە باھار 4 گرام، قۇرۇق يۇمىقاسۇت 6 گرام، سوقۇلغان توخىمى خىياردىن 6 گرام ۋە مۇۋاپىق مىقداردىكى گۈلسۈرۈخ، شاھتەررە، كاسىن تۇرۇقى ۋە گۈلqەنتلەرنى قوشۇپ قاينىتىپ، ئاق ناۋات سېلىپ ئىچكۈزۈلىدۇ. كېسەل ماددىسىنى پۇشۇرۇپ بولغاندىن كېيىن فۇلۇس مېغىزى 54 گرام، گۈلqەنت 36 گرام، بادام يېغى 4 گرام ئېلىپ مۇسەھل دورا قىلىپ ئىچكۈزۈپ ماددا تازىلىنىدۇ. ھەببى ئىياراج بىلەن مېڭىنى تازىلىمىسىمۇ بولىدۇ.

سوغۇق نەزلىدىن بولغان رەمەدىنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن مەتبۇخى ئۈستۈخۇدۇس ۋە ھەببى ئىيارەجلەر بىلەن مېڭىنى تازىلاش كېرەك. مزاجنى تەڭشەپ نەزلىنى توختىتىش ئۈچۈن ئىستىرىفېلى ئۈستۈخۇدۇس قاتارلىقلار بېرىلىدۇ. ياشانغانلاردا نەزلىنىڭ كۆزگە چۈشۈشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، بادىيان، گۈلqەنت قاتارلىقلارنى ئىككى-ئۈچ كۈن ئىچكۈزۈش كېرەك. ياش كۆپ بولسا رۇسۇت، قەلەمفۇرنى يۇمىقاسۇت سۈيىدە ئېزىپ كۆزگە زىماد قىلسا بولىدۇ، نەزلىنىڭ كۆزگە چۈشۈشى كۈچىيىپ قالسا، باشنى ئامال بار كۆپ ھەرىكەتلىنىدۈرۈمەسلىك، ئىسسىق مۇنچىغا چۈشمەسلىك، باشنى يۇيماسلىق ۋە مايلىماسلىق كېرەك.

مۇرەككەپ رەمەدىنى داۋالاشتا قايسى خىلىت كۈچلۈكرەك بولسا ئالدى بىلەن شۇ خىلىتتىن پۇشۇرۇپ، تازىلاپ ئاندىن كېيىن باشقىلىرىنى بىر تەرەپ قىلىشقا ئۆتۈش كېرەك.



## كۆز قۇتۇرى

كۆز قۇتۇرى (جەرە بولغىنى) بىر خىل سوزۇلما ۋە يۇقۇملۇق خاراكتېرلىك كېسەل بولۇپ بۇنىڭدا ئەستەر پەردىلەرگە قىچشىدىغان ئوششاق قاپارتقۇلار پەيدا بولىدۇ. كېيىن ئو ئاستا-ئاستا كۆزنىڭ كۆرۈش قابىلىيىتى ھەمدە كۆز ۋە قاپاقنىڭ سىرتقى شەكلىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ.

سەۋەبى

قانغا ئارىلاشقان بەلغىمى شور ۋە كۆپۈكلۈك خۇسۇسىيەتكە ئىگە ماددىنىڭ ئوقۇنەتلىنىپ كۆزگە تەسىر قىلغانلىقى، ئىسسىق بولغان كۆز ياللۇغى ۋە چاڭ-توزانلار كۆزگە كىرىپ پەيدا قىلغان ياللۇغلارنىڭ تۈزۈن مۇددەت ساقايماستىقى قاتارلىق سەۋەبلەردىن پەيدا بولىدۇ. بەزى كىشىلەردە تۈزۈن مۇددەت تۈتۈنلۈك جايلاردا تۇرۇش بىلەن بىرگە پاسكنا قول بىلەن كۆزنى دائىم ئۇۋۇلاش قاتارلىقلارمۇ كۆز قۇتۇرىنىڭ پەيدا بولۇشىغا سەۋەب بولىدۇ. ئادەتتە، كۆپىنچە ھاللاردا قول، لۇڭگە، ياستۇق قاتارلىق نەرسىلەرنى ئورتاق ئىشلىتىش ئارقىلىق يۇقۇدۇ.

ئالامىتى

كۆپىنچە ئىككىلا كۆزدە پەيدا بولىدۇ. دەسلەپكى مەزگىلدە ئۆزىگە بىلىنىدىغان ئالامەتلەر بولماسلىقى مۇمكىن. ئەمما، كېسەلنىڭ تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ كۆز قىچشىدۇ. كۆزگە بىر نەرسە كىرىۋالغاندەك ياكى قىزىشقاندەك سېزىلىدۇ. كېسەل تەرەققىي قىلغانسىرى ئالامەتلەرمۇ روشەنلىشىدۇ، يەنى قاپاق ئەستەر پەردىسى قانغا تولىدۇ، كۆز ئەستەر پەردىسى ئىششىيدۇ. ئاغرىق كىشى كۆزنىڭ يېقىمىزلىنىدىغانلىقى، بەكرەك قىچشىدىغانلىقى، كۆزى چاپاقلىشىپ ئوڭايلىقچە ئېچىلمايدىغانلىقىدىن زارلىنىدۇ. ئۇيقۇدىن ئۇيغانغاندا كۆز چاپاقلىشىپ، كۆزگە قۇم تىقىلغاندەك بىلىنىدۇ. قاپاق ئىچىدىكى قاپارتقۇقلار كۆپىيىپ كۆز داۋاملىق ياشاڭغۇرايدىغان، قانداق



ئاغرىيدىغان، يورۇققا قارىيالمايدىغان بولۇپ قالدۇ. قاپاق ئىچى تاتۇقلىشىپ ئىچىگە تارتىلىش بىلەن كىرىپ ئىچىگە قاراپ تۆسۈپ كۆز يۇمىلىقىنى غىدىقلايدۇ. ھەتتا تەدرىجىي ھالدا مۇڭگۈز پەردىنى ئىخسەلەشتۈرۈپ، كۆز قارىسىنى بۇزۇپ خۇددى تۇخۇمنىڭ كۆكۈرۈپ قالغان ئېقىدەك بىر نەرسىگە ئايلاندۇرۇپ، كۆزنى پۈتۈنلەي كاردىن چىقىرىشى مۇمكىن.

كۆز قوتۇرى ئالامەتلىرىگە ئاساسەن 4 خىلغا بۆلۈنىدۇ:

1. قاپاق ئاستى ئازراق قىچىشىش ۋە ئېچىشىش بىلەن بىرگە قاپاق ئىچكى يۈزىگە تۇششاق مۇدۈرلەر پەيدا بولىدۇ. كۆز بىر ئاز قادىلىدۇ، ياشاڭغۇرايدۇ.
2. قاپاق ئاستىدىكى مۇدۈرلەر بىر-بىرىگە قوشۇلۇپ جاراھەت ھاسىل قىلىدۇ. ئېچىشىش، قادىلىش ۋە ئاغرىش ئالامەتلىرى يۇقىرىقىغا نىسبەتەن ئېغىرراق بولۇپ كۆز دائىم ياشاڭغۇرايدۇ.
3. قاپاقنى تۇرۇپ قارىسا زەخمىلەنگەن جاي خۇددى ئەنجۈر پوستىدەك تۆشۈك كۆرۈنىدۇ. كۆز قوتۇرىنىڭ بۇ خىلى ھەممىدىن يامانراق بولۇپ، يۇقىرىقى ئالامەتلەر تېخىمۇ ئېغىر بولىدۇ.
4. قاپاق ئاستىدىكى زەخمىلىنىش قارامتۇل كۆك ئىششىققا ئايلانغان بولۇپ، بۇ خىلدىكى كۆز قوتۇرىنىڭ ئاقىۋىتى ياخشى ئەمەس.

#### داۋاسى

بىرىنچى خىلىنى داۋالاشتا: 1. بەدەندىن كېسەللىك ماددىسىنى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى ئەفتمۇن بېرىش كېرەك. 2. بەدەننى تازىلاش بىلەن بىرگە بەلگىلىك تومۇرلاردىن قان ئېلىش ياكى ئىككى چېكىگە ھىجامەت قويۇش كېرەك. 3. قاپاقنى تۇرۇپ تۇرۇپ يەرلىك ئورۇنغا شىياڧى ئەھمەر سۈركەش ياكى مۇزنى يۇمشاق يانچىپ تۇخۇم ئېقىغا ئارىلاشتۇرۇپ زەخمىلەنگەن جايغا سۈركەش لازىم.

كۆز قوتۇرىنىڭ بۇ خىلى ئەگەر ماددىلار ياكى تاشقى سەۋەبلەر (ئوقۇنەتلەر) نىڭ تەسىرىگە ئۇچرىمىسا ئاقىۋىتى ياخشى، ئەكسىچە بولسا ئېغىرلىشىپ كېتىدۇ.

ئىككىنچى خىلىنى داۋالاشتا: مەتبۇخى ئەفتمۇن بېرىش، قان ئېلىش، يەرلىك ئورۇنغا ئاغرىق پەسەيتكۈچى شىياڧلارنى قويۇش لازىم. ئاندىن كېيىن مۇدۈرلەرنى قىرىپ تاشلاش لازىم. بەزىلەر شادىنەج بىلەن قىرىشىنى، بەزىلەر تومۇر ئەسۋابلار بىلەن قىرىشىنى، بەزىلەر ئەنجۈر ياغىچى ياكى ئەنجۈر يوپۇرمىقى بىلەن قىرىشىنى كۆرسىتىدۇ. كۆپۈكى دەريا



بلەن قىرىشنىڭ ئۈنۈمى ياخشى .

ئۈچىنچى خىلىنىڭ داۋاسى ئىككىنچى خىلىنىڭ داۋاسى بىلەن ئاساسەن ئوخشىشىپ كېتىدۇ. قان ئېلىش، مەتبۇخ بېرىش بىلەن بىرگە قاپاق ئىچكى تەرىپىنى كۆرسىتىلگەن ئۇسۇللار بىلەن قىرىش كېرەك. كۆپۈكى دەريا ياكى ناۋات بىلەن قىرىش بولىدۇ. تۇخۇم سېرىقنى گۈل يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ قاپاق ئۈستىگە قويۇش لازىم.

تۆتىنچى خىلىنى داۋاشتا: قان ئالغان ۋە ھىجامەت قويغاندىن كېيىن ئىيارە جى فەيقەرا بېرىش ۋە قاپاق ئىچكى تەرىپىنى يۇقىرىقى ئۇسۇللار بىلەن قىرىش لازىم. مۇنچىغا كىرىپ يۇيۇنۇپ تەزلىگەندىن كېيىن تۆۋەندىكى دورىلارنى قائىدە بويىچە بۇرۇنغا تارتىپ چۈشكۈرتۈش كېرەك. سەبرە، جاۋاشىر، ئەنزەرۈت، ھاشا، زەئفەر، روسۇت، ئاچچىق يېسىمۇق ھەر بىرى 3 گرامدىن، كۈندۈش 15 گرام. دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگە كىتىپ ئۆتكۈزگەندىن كېيىن، ئەينەك قۇتىغا قاچىلاپ ئېغىزى ھىم ئېتىپ ساقلاپ قويۇلىدۇ. مەزكۇر ئالغاندىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ بۇرۇنغا تارتىپ چۈشكۈرتۈلىدۇ.

كۆز ئىچىدىكى يامان سۈپەتلىك سۇيۇقلۇقلارنى تازىلاپ چىقىرىش مەقسىتىدە ياش ئاققۇزغۇچى سۈرمىلەرنى كۆزگە تارتىش كېرەك. كونىراپ كەتكەنلىرىگە دەستكارلىق (ئوپىراتسىيە) چارسى قوللىنىلىدۇ.

ئالدىنقى ئېلىش ۋە دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار: كۆز قوتۇرى (تراخۇما) ئۇزاققا سوزۇلىدىغان، ئاغرىقلارنى خېلى قاتتىق ئازابلايدىغان كۆز كېسىلى بولغاچقا ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا ئالاھىدە دىققەت قىلىش لازىم.

مەزكۇر كېسەللىك كۆز قوتۇرى بىلەن كېسەللەنگەن كىشىلەر بىلەن ئۆگىنىش ئورتاق ئىشلىتىش، بىر داستا يۈز يۇيۇش، مۇنچا-سەرراپلارنىڭ ئۆگىنىلىرىدىن ئورتاق پايدىلىنىش قاتارلىق سەۋەبلەردىن ئۆزئارا يۇقۇپ پەيدا بولىدۇ. خۇسۇسەن، بۇ جەھەتتە ساتراشخانلارنىڭ ۋاستىچىلىك رولى چوڭ. شۇڭا، مۇھىت تازىلىقى ۋە شەخسىي تازىلىققا ئېتىبار بېرىش، ھەرىكەت ئۆزگىرىشىنى ئىشلىتىش، ئامال بار يۈز ۋە قوللارنى چۆگۈن، ئىۋرى قاتارلىق تازىلىق سايمانلىرىدىن سۇ ئېقىتىپ يۇيۇش (داستا يۇيغاندا ئۆزىگە خاس داس بولۇش) نى ئەمەلگە ئاشۇرۇش، ئاغرىقلار يۇيۇش سايمانلىرىنى ساغلام كىشىلەردىن ئايرىپ تۇتۇش ھەمدە قاينىتىپ دېزىنېفىكسىيە قىلىش كېرەك. ئاممىۋى تازىلىق مۇلازىمەت ئورۇنلىرى يۇيۇش سايمانلىرىنى دېزىنېفىكسىيە قىلغاندىن كېيىن ئىشلىتىشكە قاتتىق ئەمەل قىلىش كېرەك. بۇ خىل تازىلىق ساۋاتلىرىنى تەشۋىق قىلىش ۋە ئۇنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش كۆز قوتۇرىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.



## كۆز ئېقىغا رەڭدار چېكىت پەيدا بولۇش

كۆز ئېقىغا ھەر خىل رەڭدىكى چېكىتلەرنىڭ پەيدا بولۇشى (تەرىفە) ھەر خىل ئىچكى ۋە تاشقى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن كۆز ئېقىدا قىزىل ياكى كۆكۈش رەڭ ياكى قارامتۇل رەڭدە توچكا پەيدا بولغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

كۆز سىرتقى جەھەتتىن زەخملىنىش، كۈچەپ قەي قىلىش، يۈتىلىش، ۋارقىراش ۋە ئايرىم كىشىلەردە بەزى ئىچكى سەۋەبلەر (يەنى قان بېسىمى ھەددىدىن زىيادە يۇقىرى ئۆرلەش قاتارلىقلار) تۈپەيلىدىن كۆز تومۇرلىرى چىڭقىلىپ بەزى توششاق تومۇرلارنىڭ يېرىلىپ كۆز ئېقىدا تەدرىجىي ھالدا ھەر خىل رەڭدىكى چېكىتلەرنى پەيدا قىلىدۇ.

ئالامىتى

كۆز ئېقىدا دائىرىسى ئېنىق، قىزىل رەڭلىك توچكىلار پەيدا بولىدۇ. ئېغىرراق بولغاندا پارچە-پارچە قىزىل داغلارنى شەكىللەندۈرىدۇ. كېيىن رەڭگى تەدرىجىي كۆكۈش رەڭگە ئۆزگىرىدۇ. ئەڭ ئاخىرى تۇتۇق سېرىق رەڭگە ئايلىنىپ يوقاپ كېتىدۇ. ئەمما، كۆزدە ئالاھىدە ۋە رەملىنىش بەلگىلىرى كۆرۈلمەيدۇ. كۆرۈش خىزمىتىگە تەسىر يېتىش، ياش ۋە چاپاق چىقىشتەك ئەھۋاللىرى بولمايدۇ.

داۋاسى

1. قىيىفالى تومۇردىن قان ئېلىش بىلەن بىرگە كۆزگە ئايال كىشىنىڭ سۈتىنى تامغۇزۇش كېرەك.
2. كەپتەر ياكى ئۆردەكنىڭ قانىنى يۇلۇپ قانات ئوچىدىكى قانىنى كۆزگە تېمىتىش كېرەك.





3. كوندۇرنى كۆيدۈرۈپ تۇتۇنسىمۇ كۆزنى تۇتۇش كېرەك.
4. شىيافى ئەھمەرنى كۆز ئىچىگە سۈرتۈش لازىم.
5. بېھى تۇرۇقى، ئىسبە غوللارنىڭ شىرىسىنى چىقىرىپ قىز توغقان ئايالنىڭ سۈتى بىلەن قوشۇپ كۆزگە تېمىتىش كېرەك.
6. تۇخۇمنىڭ ئېقى، سېرىقىنى پاكىز پاختىغا يۇقتۇرۇپ كۆزگە تېكىش بىلەن بىرگە ئاغرىقنى ئوڭدىسىغا ياتقۇزماي يېنىچە ياتقۇزۇش لازىم.

شىيافى ئەھمەرلەيىن

شادىنەج مەغسۇل 27 گرام، كۆيدۈرۈلگەن مىس 15.4 گرام، ئەرەب يىلىمى، كەتسرا، مۇرمەككىسى ھەر بىرى 5.4 گرام، بىخ مارجان، كەھرىيا، تېشىلمىگەن مەرۋايد، سازەج ھىندى ھەر بىرى 9.4 گرام، خۇنسىياۋشان، زەئفەر ھەر بىرى 2.7 گرام، دورىلارنى يۇمشاق سالاپە قىلىپ يېپەك ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئەرىقى بادىيان بىلەن خېمىر قىلىپ شىياف ياسىلىدۇ.  
ئەھۋالغا قاراپ قايناقسۇ ياكى تۇخۇم ئېقى بىلەن ئېزىپ كۆزگە چېپىلىدۇ.

### كۆز ئەستەر پەردىسىگە نېپىز گۆش پەيدا بولۇش

كۆز ئەستەر پەردىسىگە يەنى كۆزنى ئوراپ تۇرغۇچى پەردىگە قىزىل ياكى قارامتۇل نېپىز گۆش پەيدا بولۇش (توۋسەئى مۇلتەھەمەئى ئەينىيە) كۆزنىڭ ئىچكى بۇرجىكىگە يېقىن جايلىرىدىكى ئەستەر پەردىگە چوڭلۇقى تىرىقتەك يۇمشاق قىزىل ياكى قارامتۇل ئۆسمە گۆش پەيدا بولغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

كۆزنىڭ ئىچكى بۇرجىكىگە يېقىن جايلاردىكى ئەستەر پەردىدە بۇزۇلغان قان يىغىلىپ قېلىش ياكى جاراھەتلىنىش نۆپەيلىدىن توقۇلمىلار بۇزۇلۇپ، تاتۇق شەكىلدە نېپىز گۆش تۇسىدۇ.



## ئالامىتى

كۆز قىچىشىش، قاندىلىپ ئاغرىشتەك بەلگىلەر خېلى ئېنىق بىلىنىدۇ. كۆز قىزىرىش خېلى روشەن ھالدا كۆرۈلىدۇ. بەزىدە كۆز قارىچۇقى ئازراق توسۇلۇشتەك ئەھۋاللارمۇ بولىدۇ.

## داۋاسى

بۇ كېسەل يېڭى پەيدا بولغاندا قايسى خىلدىن بولسا كېسەل ماددىسىنى تازىلاش ئۈچۈن، شۇڭا مۇناسىپ ھالدىكى تازىلىغۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش بىلەن بىرگە سىرتتىن شىياڧى قەيسەر ئىشلىتىش لازىم.

## شىياڧى قەيسەر

يۇيۇلغان شادىنەج 32.4 گرام، ئەرەب يىلىمى 27 گرام، زەنگار 5.4 گرام، كۆيدۈرۈلگەن قىلقاتار 5.4 گرام.

دورىلارنى قاندىنە بويىچە يۇمشاق سالاپە قىلىپ يېپەك ئەلگەكتىن تۆتكۈزۈپ، ئەرىقى بادىيان بىلەن خېمىر قىلىپ شىياڧ ياسىلىدۇ.

ئەھۋالغا قاراپ تۇخۇم ئېقى ياكى قايناقسۇ بىلەن ئېرىتىپ تۈسكەن گۆش ئۈستىگە چېپىپ تېڭىپ قويۇلىدۇ. ئەگەر بۇ دورا بىلەن ياخشىلانمىسا كۆزگە قاناتچە گۆش ئۆسۈپ قېلىشىنى داۋالىغاندەك دەستكارلىق ئۇسۇل بىلەن داۋالاش لازىم.

## كۆز ئېقىغا مۇدۈر پەيدا بولۇش

كۆز ئېقىغا مۇدۈر پەيدا بولۇش (ۋەدقە) كۆز ئەستەر پەردىسىگە ئوخشىمىغان چوڭلۇققا ئۇششاق، قاتتىق مۇدۈرلەر پەيدا بولغانلىقىغا قارىتىلغان.



## سەۋەبى

ئاساسلىقى خىلىتلارنىڭ قايسى بىرى نورمالسىزلىققا قاراپ ئۆزگىرىپ كۆزنىڭ ئەستەرى بەردىسىگە تەسىر قىلغانلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ. بەزى كىشىلەردە چاڭ-توزاننىڭ تەسىرىدىن كۆز ئېقى جەراسملىنىپ پەيدا بولىدۇ. كۆپىنچە ھاللاردا كۆز ئەستەرى بەردىسىنىڭ ئىششىقىدىن كېيىن كېلىپ چىقىدۇ.

## ئالامىتى

قاپاقنى قايرىپ تەكشۈرگەندە كۆز ئېقىدا توششاق مۇدۈرلەرنىڭ بارلىقىنى ئوچۇق كۆرگىلى بولىدۇ. كۆزدە يات بىر نەرسە باردەك كۆز قادىلىپ ئاغرىيدۇ ھەتتا كۆزنى ئاچالماي قالىدۇ. ئۈنىڭدىن باشقا ھەر بىر خىلىتنىڭ ئۆزىگە خاس بەلگىلىرى كۆرۈلىدۇ.

## داۋاسى

مەزكۇر كېسەل ئەگەر قان ياكى سەپرادىن بولغان بولسا، ئەھۋالغا قاراپ مۇۋاپىق تېپىلغاندا بەلگىلىك تومۇرلاردىن بىر ئاز قان ئېلىش ياكى ئارپا سۈيى، تەمرى ھىندى، چىلانلارنى قاينىتىپ ئىچكۈزۈش، بىنەپشە شەرىپتى بېرىش لازىم. سىرتتىن بىر پارچە كۆك رەختنى گۈلاب ياكى سوۋۇتۇلغان قايناقسۇ بىلەن ھۆل قىلىپ كۆزگە يېپىپ قويۇش كېرەك. شىيافى ئەيەزنى ئاياللارنىڭ سۈتى بىلەن ئېرىتىپ چىپىش كېرەك. ئەگەر بەلغەمدىن بولغان بولسا ئىيارەجى فەيقەرا بېرىش، سەۋدادىن بولغان بولسا مەتبۇخى ئەقىمۇن بېرىش لازىم.





## كۆز قارسى كېسەللىكلىرى

كۆز قارسى قاتتىق پەردىنىڭ ئالدىكى 1/6 قىسمى بولغان مۇڭگۈز پەردە ۋە بالا ھەمراھسىمان پەردە (يەنى قاتئومۇرلۇق پەردە) نىڭ ئالدىنقى قىسمى بولغان ئۈزۈمسىمان پەردە (يەنى رەڭدار پەردە) دىن تۈزۈلگەن بولۇپ، ئادەتتە ئۇ قارا كۆرۈنگەچكە كۆز قارسى دەپ ئاتىلىدۇ. مۇڭگۈز پەردىدە گەرچە قان تومۇرلار بولمىسىمۇ، لېكىن ئەسەب (نېرۋا) لەرگە باي بولغاچقا بىر قەدەر سەزگۈررەك كېلىدۇ. ئۇنىڭدىكى كېسەللىك تۈزگىرىشلىرى كۆپىنچە ھاللاردا ئۈزۈمسىمان پەردىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ. كۆزنىڭ قارسى كۆرۈش خىزمىتىگە ۋاسىتىلىق قاتناشقاندا ئۇنىڭدا كۆرۈلگەن غەيرىي تەبىئىي ئۈزگىرىشلەرگە ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىش، ئۇنىڭدا كۆرۈلگەن كېسەللىكلەرنى ۋاقتىدا داۋالاپ ساقايتىش كېرەك. ئۇنداق بولمىغاندا كۆزنىڭ كۆرۈش خىزمىتىگە خېلى ئېغىر دەرىجىدە تەھدىت سالىدۇ. مەسىلەن، كۆزگە پەردە چۈشۈش، كۆزگە ئاق چۈشۈش، كۆز پەردىلىرىدە يىرىڭلىق جاراھەت پەيدا بولۇش ۋە كۆز قارسىدىكى ھەر خىل غەيرىي ئۈزگىرىشلەر كۆزنىڭ كۆرۈش خىزمىتىگە خېلى ئېغىر دەرىجىدە ئۇقسان يەتكۈزىدۇ.

كۆز قارسىدا يۈز بەرگەن كېسەللىكلەرنى داۋالاشتا، ئىچكى ۋە تاشقى داۋالاش ئۇسۇللىرىنى ئەھۋالغا قاراپ مۇۋاپىق قوللىنىش، ئومۇمىي بەدەننى داۋالاش بىلەن يەرلىك ئورۇننى داۋالاشنى ماسلاشتۇرۇپ ئېلىپ بېرىش كېرەك. ئالدى بىلەن كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى ئامىللارنى توساش ۋە يوقىتىش ھەمدە كېسەل ماددىسىنى تازىلاپ چىقىرىشقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. يەرلىك ئورۇننى داۋالاشقۇمۇ كۆپلەپ ئېتىبار بېرىش، كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ شارائىت يار بەرسلا دەستكارلىق ئۇسۇلنى قوللىنىش كېرەك. كۆز تازىلىقىغا ئەھمىيەت بېرىش، يېمەك-ئىچمەك، ھەرىكەت ۋە دەم ئېلىشنى مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇش، ئوپىراتسىيىدىن بۇرۇن چوقۇم بەدەننى تەنقىيە قىلىش، ئوپىراتسىيىدىن كېيىن مەلۇم مەزگىل كۆزنى تۇيدان پەرۋىش قىلىش بىلەن بىرگە ئېغىر نەرسىلەرنى كۆتىرىش، قاتتىق ۋارقىراش، يۆتىلىش، چۈشكۈرۈشكە ئوخشاش باشنى چىڭقالدۇرۇپ كۆز بېسىمىنى ئاشۇرىدىغان ھەرىكەتلەردىن ساقلىنىش لازىم.



## كۆزگە پەردە چۈشۈش

كۆزگە پەردە چۈشۈش (سەبەل) كۆزنىڭ مۇڭگۈز پەردىسىگە بۇلۇت ۋە تۈتۈنگە ئوخشايدىغان پەردە چۈشۈپ، كۆزنىڭ نورمال كۆرۈشىگە قىسمەن ياكى پۈتۈن تەسىر قىلغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

تۈتۈن، چاڭ-توزان، ئۆتكۈر ئىسسىق ياكى سوغۇق ھاۋا، كۆپ يىغلاش، توششاق نەرسە ۋە خەتلەرگە كۆپ قاراش، كۈچلۈك يورۇقلۇق مەنبەلىرىگە تىكىلىپ كۆپ قاراش قاتارلىق كۆزگە زىيان قىلغۇچى ئامىللار تەسىرىدىن ھۆلۈك ياكى قۇرۇقلۇق تۈز ئېتىدالدىن چىقىپ تەدرىجىي ھالدا كۆزگە بۇلۇت ۋە تۈتۈنگە ئوخشاش پەردە چۈشىدۇ. بۇ كۆپىنچە ياشانغان كىشىلەردە كۆپرەك ئۇچرايدۇ.

ئالامىتى

كۆز نومۇرلىرى چىڭقىلىپ بىر ئاز كۆپۈشۈپ قىزىپ قالىدۇ. باش لوقۇلداپ ئاغرىيدۇ. مۇڭگۈز پەردە ئۈستىگە بۇلۇت ياكى تۈتۈنگە ئوخشاش دۇغ پەردە پەيدا بولۇپ، كۆرۈشكە بەلگىلىك دەرىجىدە دەخلى يەتكۈزىدۇ. ئەگەر ھۆلۈكتىن بولسا كۆزلىرى سولۇشۇپ باش كۆپ چىقىدۇ. قۇرۇقلۇق ياكى قويۇق ماددىدىن بولسا كۆز قۇرۇق بولۇپ، باش كۆپ ئاقمايدۇ.

داۋاسى

ئالدى بىلەن سەۋەبچى ماددىنى تازىلاش كېرەك. بۇنىڭدا كۆپىنچە ئىيارەجى فەيقەرا بېرىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە باش تەرەپنى تەرلىتىش، قورساق ئاچ ۋاقتىدا مۇنچىغا چۈشۈش، بەزى غەلىز، تەستە سىڭىدىغان تاماقلاردىن پەرھىز قىلىپ،





يەڭگىل ۋە ئاسان سىڭىدىغان تاماقلارنى ئىستېمال قىلىش كېرەك. سىرتقى تەرەپتىن كۆزگە توتىيا، كۆھلى باسلىقۇن، كۆھلى رۇشئائى سەغىر قاتارلىق دورىلارنى تارتىش كېرەك. ئەگەر مەزكۇر كېسەل كونا ھەم ئېغىرراق بولسا، مەخسۇس دەستكارلىق (ئوپېراتسىيە) ئۆسۈلى بىلەن داۋالاش كېرەك.

## كۆزگە ئاق چۈشۈش

كۆزگە ئاق چۈشۈش (سەفەيدى چەشم، بەيازۇلئەينى) كۆزنىڭ مۇڭگۈز پەردىسىگە بىر خىل ئاق پەردە چۈشكەنلىكىگە قارىتىلغان بولۇپ، نېپىزراق بولغىنى غەمام دەپ ئاتىلىدۇ. قېلىنراق بولغىنى بەيازۇلئەينى دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ كۆزنىڭ كۆرۈش خىزمىتىگە ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە تەسىر يەتكۈزىدۇ.

### سەۋەبى

بۇ ئادەتتە بىرلەمچى (توغما) ۋە ئىككىلەمچى (كېيىن پەيدا بولغان) دەپ ئىككى خىلغا ئايرىلىدۇ. ئىككىلەمچى پەيدا بولغانلىرىدا ئاساسەن كۆزنىڭ ھەر خىل زەخىملىنىشلىرى (كۆز ئەتراپىغا قىزىل، چېچەك ۋە باشقا جاراھەتلەر چىقىش)، كۆز ھەرقايسى پەردىلىرىنىڭ ياللۇغلىرى، مۇڭگۈز پەردىنىڭ يىرىڭلىق جاراھىتى قاتارلىقلارنى ۋاقتىدا داۋالماستىكى ياكى داۋالاشتىكى خاتالىقلار تۈپەيلىدىن كۆزنى ئۇزۇنغىچە ئاچالماي يۇمۇپ يۈرۈش نەتىجىسىدە قويۇق بۇزۇق ماددا مۇڭگۈز پەردىدە توختاپ قېلىپ پەيدا بولىدۇ. يەنە، كوناغان باش ئاغرىقى، باشنىڭ يېرىمى ئاغرىش (شەقىقە)، ئېغىر دەرىجىدىكى يېقىندىن كۆرۈش كېسىلى ۋە زىياست كېسىلى سەۋەبلىرىدىن مەزكۇر پەردىگە بۇزۇق ماددا تۆكۈلۈپ ئاق پەيدا بولىدۇ. يەنە بەزى ئومۇمىي بەدەن كېسەللىكلىرى، تېرە كېسەللىكلىرى ۋە كەسپىي سەۋەبلەر (تەينەكچىلىك) تۈپەيلىدىن مۇڭگۈز پەردىگە بۇزۇق ماددا تەسىر قىلىپ كۆزگە ئاق چۈشۈش كېلىپ چىقىدۇ. توغما پەيدا بولغانلىرى ئاساسەن سۆزىنەك كېسىلى بار ئاندىن توغۇلغان بالىلارنىڭ كۆزىگە ۋاقتىدا داۋا قىلماسلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ.

بەزىدە بەك ياشانغانلىقتىنمۇ كۆزگە تەدرىجىي ھالدا ئاق چۈشۈپ قالىدۇ.



## ئالامىتى

مەزكۇر كېسەلنىڭ ئىككىلەمچى پەيدا بولغانلىرى كۆپ ئوچرايدۇ. كۆپىنچە ئىككىلا كۆزگە ئاق چۈشىدۇ. پەقەت ئاقنىڭ ئىلگىرى-كېيىن چۈشۈش مەسىلىسىدىنلا ئىبارەت. ئاق پەقەت بىرلا كۆزدە ئۇزۇن مۇددەتكىچە بولسا كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى سەۋەبىنىڭ تېخى مەۋجۇتلۇقىنى پەرەز قىلىش كېرەك. دەسلەپتە كۆز قارىسىدا بولۇپمۇ كۆز قارىچۇقىدا ئاق چېكىت پەيدا بولىدۇ. ئاق روشەن مەلۇم بولىدۇ. ئاقنىڭ بەزىلىرى نېپىز، سۈزۈك، خۇددى ئاق بۇلۇتتەك بولىدۇ. بەزىلىرى قېلىن، توق ئاق رەڭدە بولۇپ مۇڭگۈز پەردىدە چوڭقۇر ئورۇنلاشقان بولىدۇ. بەزىلىرى مەزكۇر پەردە بىلەن بىللە سىرتقا بىرئاز بولتىپ چىقىدۇ.

كۆزگە ئاق چۈشۈش ئادەتتە 3 دەۋرگە بۆلۈنىدۇ: 1. دەسلەپكى دەۋرى،  
2. تەرەققىي قىلىش دەۋرى، 3. پىشىش دەۋرى.

## داۋاسى

كۆزگە چۈشكەن ئاق دەسلەپكى دەۋردە بولۇپ سۈزۈك، نېپىز بولسا، مۇۋاپىق چارە-ئۇسۇل ۋە دورىلار بىلەن ساقىيىپ كېتىدۇ. بۇنىڭدا تۆۋەندىكى دورىلارنى ئىشلەتسە بولىدۇ:

1. مەرۋايىت، سەدەپلەرنى قائىدە بويىچە كۆيدۈرۈپ كۈلنى قىز تۇغقان ئايالنىڭ سۈتى بىلەن قوشۇپ ئاق چۈشكەن كۆزگە قايتا-قايتا سۈرمە قىلىپ تارتسا بولىدۇ.
2. يېڭى لالە گۈلنىڭ سىقىلغان سۈيىدىن 10 مىللىلىتىرگە 0.1 گرام تۆشۈدۈر قوشۇپ كۆزگە تارتىش كېرەك.
3. تۇتىيانى كۆزگە تارتىشىمۇ بولىدۇ.
4. توشقاننىڭ ئوغۇز سۈتىگە 0.1 گرام ئىپار قوشۇپ كۆزگە تارتىشىمۇ كۆزگە چۈشكەن ئاقنى يوقىتىدۇ.

ئەگەر، كۆزدىكى ئاق قېلىن ھەم كوناغان بولسا مۇۋاپىق تېپىلغاندا ئالدى بىلەن بەلگىلىك تومۇرلاردىن قان ئېلىش ياكى قايسى خىللىققا مەنسۇپ بولسا مۇناسىپ ھالدىكى شۇ خىللىقنى يوشۇرغۇچى ۋە تازىلىغۇچى دورىلارنى بېرىش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن ھەبىي ئىبارەج، ھەبىي قوقىيا، ئىتريفېلى كەشىز قاتارلىق دورىلار بېرىلىدۇ. سىرتتىن شىياقى



زانكار، شىيافى ئەخزەر، شىيافى ئەجىب قاتارلىق دورىلارنى كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئىشلىتىش لازىم. ئەگەر يۇقىرىدىكى دورىلارنى مەلۇم ۋاقىت ئىشلەتكەندىن كېيىنمۇ ئۈنۈمى كۆرۈلمىسە، ئاق پىشقان دەۋردە مەخسۇس دەستكارلىق (ئوپىراتسىيە) ئۈسۈلى بىلەن داۋالاش لازىم.

#### دەققەت قىلىدىغان ئىشلار

كۆزنى بەك ئىسسىق ۋە سوغۇق ھاۋادىن ساقلاش بىلەن بىرگە ئىسسىق سۇ ياكى تەرىقى بادىيان بىلەن پات-پات يۇيۇپ تۇرۇش لازىم. دەستكارلىق ئۈسۈل بىلەن داۋالانغاندىن كېيىن، شىشسىمان سۇيۇقلۇق (روتوبەتى زۇجاجىيە) نىڭ ئالدى ھوجرا (ھوجرە ئى مۇقەددەمە) گە كىرىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن كۆز قارىچۇقى كىچىكلەپ نورمال ھالىتىگە كېلىشتىن بۇرۇن باشنى تۈۋەنگە ئېگىشتۈرمەسلىك كېرەك.

### كۆز يىرىڭلىق جاراھىتى

كۆز يىرىڭلىق جاراھىتى (قۇرۇھۇلكەينى) ئاساسلىق كۆزنىڭ ئەستەر پەردە، مۇڭگۈز پەردە ۋە ئۈزۈمسىمان پەردىلىرىگە پەيدا بولغان يىرىڭلىق جاراھەتكە قارىتىلغان.

#### سەۋەبى

بۇ ئاساسەن 4 خىلنىڭ بىرەرسىدە نورمالسىز ئۆزگىرىشلەر پەيدا بولۇپ، ئۆتكۈر كۆيدۈرگۈچى ۋە زېدىلىگۈچى بۇزۇلغان ماددىلارنىڭ كۆز قەۋەتلىرىدە توختاپ كۆز تەبىقەلىرىنى زېدە قىلغانلىقى ۋە پۈتۈنلۈكىنى بۇزغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

#### ئالامىتى

ھەرقايسى پەردىلەردە بولغان يىرىڭلىق جاراھەتنىڭ ئۆزىگە خاس ئايرىم بەلگىلىرى





بولدۇ. ئەگەر يىرىڭلىق جاراھەت كۆزنىڭ ئەستەر پەردىسىدە بولسا، كۆز ئېقىدا توششاق چېكىتتەك قىزىل داغلار كۆرۈلىدۇ. ئەگەر مۇڭگۈز پەردىدە بولسا، كۆز قارىچۇقىغا توششاق ئاق چېكىتلەر پەيدا بولىدۇ. ئەگەر ئۈزۈمسىمان پەردىدە بولسا، كۆز قارىچۇقى ئۆدۈلغا توششاق قىزىل چېكىت ۋە يىپىچىلار پەيدا بولىدۇ.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن قايسى خىلىنىڭ تۈزگىرىشىدىن بولغانلىقىنى ئېنىقلاپ شۇ خىلىنىڭ كېسەل پەيدا قىلغۇچى ماددىسىنى مۇناسىپ مۇنزىچىلار بىلەن پىشۇرغاندىن كېيىن ئۇنى بەدەندىن تازىلاپ، مىزاجنى تەڭشەش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن ئەھۋالغا قاراپ مۇۋاپىق تېپىلسا قىفال تومۇردىن قان ئېلىش بىلەن بىرگە ئىچكى نەرسە مەتبۇخى ھەلىيە، مەتبۇخى تەمرى ھىندى، ئىيارەجى فەيقەرا قاتارلىق دورىلار كېسەل پەيدا قىلغۇچى خىلىغا قاراپ تاللاپ ئىشلىتىلىدۇ.

دەسلەپكى باسقۇچلىرىدا ھۆلە (شۈمشە) ئورۇقى، زىغىر ئورۇقىنىڭ شىرسى (ئۇتابى) نى چىقىرىپ سىرتتىن كۆزگە تاڭسا بولىدۇ. يىرىڭلىق جاراھەت ئېغىز ئالغاندىن كېيىن شىيافى ئەيەز، زەرۋرى ئەزەرۇت قاتارلىق جاراھەت پۈتتۈرگۈچى دورىلارنى تۇخۇم ئېقى ياكى قىز تۇغقان ئايالنىڭ سۈتى بىلەن ئېزىپ كۆزگە چېپىش كېرەك.

### دەققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار

بۇ مەزگىلدە قويۇق ۋە تەستە سىڭىدىغان تاماقلاردىن پەرھىز قىلىش، ئېغىر جىسمانىي ھەرىكەت، قاتتىق يۈتۈلۈش، قۇسۇش، چۈشكۈرۈشكە ئوخشاش باشنى چىڭقالدۇرۇپ كۆز بېسىمىنى ئاشۇرىدىغان ھەرىكەتلەردىن ساقلىنىش لازىم.

## كۆز قارىسىنىڭ قۇرغاقلىشىشى

كۆز قارىسىنىڭ قۇرغاقلىشىشى (خۇشۇنەنى قەرنىيە) ئاساسەن كۆز مۇڭگۈز پەردىسىنىڭ قۇرغاقلىشىشى ۋە يىرىكىلىشىشىگە قارىتىلغان.





## سەۋەبى

ئۆتكۈر خاراكتېرلىك خىلتلارنىڭ مۇڭگۈز پەردىگە تەسىر قىلىشى، بەلغىمى شور ماددىسىنىڭ مۇڭگۈز پەردىگە تۈكۈلۈشى، ھەددىدىن زىيادە ئىستېمال قىلىنغان ئۆتكۈر ئىسسىق دورىلارنىڭ مۇڭگۈز پەردىگە تەسىر قىلىشى تۈپەيلىدىن كۆزنىڭ قۇرغاقلىشىشى كېلىپ چىقىدۇ.

گەرچە مۇڭگۈز پەردىنىڭ قۇرغاقلىققا قارشى تۇرۇش ئىقتىدارى يۇقىرى بولسىمۇ ھەمدە كۆز قاپاقلىرى ئۈزلۈكسىز يۇمۇلۇپ ئېچىلىپ كۆزنى نەمدەپ تۇرسىمۇ، يۇقىرىدا سۆزلەنگەن زىيادە سەۋەبلەر تەسىرىدىن مۇڭگۈز پەردىنىڭ قۇرغاقلىققا قارشى تۇرۇش ئىقتىدارى تۆۋەنلەپ كۆزنىڭ قۇرغاقلىشىشى ھەتتا يىرىكىلىشىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

## تالامىتى

ھەر دائىم كۆزنىڭ ئوچۇق تۇرغان قارا قىسمى قۇرغاقلاشقاندا كېلىنىدۇ. قۇرغاقلىق قاپاقلىرىنى يۇمۇپ ئاچسىمۇ ياخشىلانمايدۇ. بولۇپمۇ ئۈستۈنكى قاپاقتا يات بىر نەرسە باردەك بېلىنىدۇ. كۆز ئېچىشىپ ئىختىيارسىز ياش ئاقسىمۇ كۆزنىڭ قارا قىسمى يەنىلا قۇرغاقلىشىپ تۇرىدۇ.

## داۋاسى

داۋانى ئالدى بىلەن يېمەكلىكلەر ئارقىلىق داۋالاشتىن باشلاش كېرەك. يېمەكلىكلەردىن ھۆللۈك خاراكتېرىدىكى غىزالارنى، مەسىلەن: شورپا، قوي ۋە ئۆچكە پاقالچەكلىرى، توخۇنىڭ سىڭىرى، ياش ئۆچكىنىڭ سۈتى قاتارلىقلار سېلىنغان تاماقلارنى ئىستېمال قىلدۇرۇش لازىم.

ئەگەر تەب بولمىسا مېڭىگە ھۆللۈك يەتكۈزىدىغان شەربەتلەردىن شەربىتى نىيلىۋەرنى ئىستېمال قىلسا بولىدۇ. خېمىرى بىنەپشە يېشىمۇ كۆپ مەنپەئەتلىك. باش ساھەسىنى ھۆللۈك يەتكۈزىدىغان ياغلار بىلەن ياغلاش ۋە سۈت بىلەن يۇيۇش لازىم. مۇنچىغا چۈشۈش ۋە تېمىتلىما دورىلارنى ھۆللۈك يەتكۈزگۈچى ياغلار، قىز تۇغقان ئايالنىڭ





سۈتى، ئىسبە غۇل شىرسى (لۇئايى) قاتارلىقلار بىلەن بىرلىكتە كۆزگە تېمىتىش كېرەك. يۇمغاقسۈت سۈيىنى ئىسبە غۇل شىرسى بىلەن بىللە كۆزگە تېمىتىسىمۇ بولىدۇ. ئازراق ئېلىپ تۇرۇپ تۇرۇپ كۆزگە تېمىتىسىمۇ بولىدۇ. قىز تۇرغان ئايالنىڭ سۈتىنى كۈندە كۆپ قېتىم كۆزگە تېمىتىسىمۇ كۆپ مەنپەئەت قىلىدۇ.

ئەگەر كۆز قۇرغاقلىشىشى خىلىتلارنىڭ شورلۇق ماددىسىدىن ياكى سەپرا خىلىتىنىڭ تەسىرىدىن پەيدا بولغان بولسا، شورلۇق ماددا ۋە غالىب كەلگەن سەپرا ماددىسىنى تازىلاش ئۈچۈن بىنەپشە، قىزىلگۈل، نىلۇفەر قاتارلىقلارنىڭ بىرىدىن 10 گرام، سەرپىستان 6 دانە، چىلان 20 دانە، قۇلۇس مېغىزى، تەرەنجىبىلەرنىڭ ھەر بىرىدىن 60 گرام ئېلىپ قاينىتىپ ئۇنغا گۈلگە ئىتىش 36 گرام، بادام يېغىدىن 7 گرام قوشۇپ ئىچكىزۈلىدۇ. ئەڭ ياخشىسى ماتۇلجىبىن ئىچسە كۆپ مەنپەئەت قىلىدۇ. بېھى لۇئايىغا كەترا قوشۇپ ئازراق مىقداردىكى بىنەپشە يېغى بىلەن كۆزگە تارتىسىمۇ بولىدۇ. كەپتەر باچكىسىنىڭ قانىتىنى يۇلۇپ قانات تۇچىدىكى قانىنى كۆزگە تېمىتىشنىڭ پايدىسى كۆپ.

## كۆز قارىسىنىڭ يېرىلىشى

كۆز قارىسىنىڭ يېرىلىشى (شىساقى قەرنىيە) ئاساسەن كۆز مۇڭگۈز پەردىسىنىڭ يېرىلغانلىقىغا، ئېغىر بولغاندا بىرتىلىپ ئۈزۈمسىمان بەردىنىڭ ئازراق كۆتۈرۈلۈپ سىرتقا چىقىپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

كۆزنىڭ يىرىكىلىق جاراھىتى، مۇڭگۈز پەردىگە مۇدۈر چىقىش قاتارلىق كۆز كېسەللىكلىرى ياخشى ساقايماستىن، تۈزلۈك نەرسىلەرنى ھەددىدىن ئارتۇق ئىستېمال قىلغانلىقتىن مۇڭگۈز پەردە بەك قۇرغاقلىشىش قاتارلىق سەۋەبلەردىن مۇڭگۈز پەردە يېرىلىدۇ. خىلىتلىق ۋە خىلىتسىز ماددىلارنىڭ كۆزگە كۆرسەتكەن يامان تەسىرىنى دەقىقى قىلغان مەزگىللەردە كېسەل كىشى قاتتىق چۈشكۈرۈش، كۈچلۈك ۋارقىراش ۋە يۆتىلىش، ھەمدە تۇرۇلۇش، سوقۇلۇش قاتارلىق سىرتقى زەخمىلەر تۈپەيلىدىن مۇڭگۈز





پەردىسىنىڭ يېرىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

## ئالامىتى

مۇڭگۈز پەردىسىنىڭ يېرىلىشى تۆۋەندىكىدەك بىر قانچە خىل دەرىجىدە بولىدۇ:

1. مۇڭگۈز پەردىسىنىڭ كۆرۈنۈپ تۇرغان سىرتقى يۈزى يېرىلىدۇ. ئەمما، مۇڭگۈز پەردىسىنىڭ ئىچكى يۈزى ۋە ئۈزۈمسىمان پەردە سالامەت بولىدۇ. 2. مۇڭگۈز پەردىسىنىڭ سىرتقى يۈزى سالامەت بولۇپ، ئىچكى يۈزى ئاكتە سەۋەبىدىن يېرىلغان ياكى ئىششىغان بولىدۇ. 3. مۇڭگۈز پەردە سەل ئېغىرراق دەرىجىدە يېرىلغان بولۇپ، ئۈزۈمسىمان پەردە يېرىلغان جايدىن ئوخشىمىغان دەرىجىدە كۆتۈرۈلۈپ چىقىدۇ. ئۈزۈمسىمان پەردىنىڭ كۆتۈرۈلۈپ چىقىشى ئادەتتە 4 خىل دەرىجىدە بولىدۇ. ئۇلارنىڭ تۈز ئالدىغا ئايرىم-ئايرىم ناملرى بولىدۇ.

ئومۇمەن قىلىپ ئېيتقاندا، كۆز قارىسىنىڭ يېرىلغانلىقىنى ئاددىي كۆز بىلەن بايقىغىلى بولىدۇ. كۆرۈش خېلى ئېغىر دەرىجىدە دەخلىگە ئۇچرايدۇ. بىمارنىڭ تۈزىگىمۇ كۆزدىكى غەيرىي نورماللىق ناھايىتى ئېنىق بىلىنىدۇ.

## داۋاسى

داۋالاشقا ناھايىتى ئاكتىپ ئەستايىدىل پوزىتسىيە تۇتۇش كېرەك. ئۇنىڭ ئادەتتىكى داۋاسى تۆۋەندىكىدەك:

1. كۆزنىڭ يىرىگىلىق جاراھىتى، كۆزگە مۇدۇر پەيدا بولۇشىنى داۋالغان تۈسۈل-چارىلەرنى قوللانسا بولىدۇ.

2. مۇۋاپىق تېپىلسا بەلگىلىك تومۇرلاردىن قان ئالسا ۋە ئىچىنى سۈردۈرسە بولىدۇ.
3. ئىچىنى سۈردۈرۈپ بەدەننى تازىلىغاندىن كېيىن، ئەگەر مىزاجدا ھارارەت بولمىسا تاتلىق سۇلۇق مۇنچىدا يۇيۇتۇش ۋە ئۇنىڭدا تۇزۇنراق تۇرۇش كېرەك. لېكىن باش ساھەسىنى ئىسسىق سۇ ياكى ئىسسىق دورىلار بىلەن قاينىتىلغان سۇ ياكى سوغۇق سۇلار بىلەن ھەددىدىن ئارتۇق زىيادە يۇيماسلىق كېرەك. باشنى ھەر خىل ياغلار بىلەن مايلىماسلىق كېرەك.

4. ئوزۇقلىنىش جەھەتتە قۇۋۋىتى يۇقىرى ئەمما سىڭىشلىك بولغان ھۆل سوغۇق تەبىئەتلىك تاماقلار بېرىش كېرەك. ئۆسۈلۈقى ئۈچۈن گۈلاب، ئانار سۈيى، سېمىز ئوت



ئورۇقنىڭ شىرسى قاتارلىقلارنى بېرىش؛ ئەگەر ھازارەت كۈچلۈك بولسا ئارپا سۈيىنى ئىستېمال قىلدۇرۇش كېرەك.

5. سىرتقى جەھەتتە توخۇ توخۇمنىڭ ئېقىنى قىز تۇغقان ئايالنىڭ سۈنى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ كۆزگە تېمىتىش، ئۆنگىدىن كېيىن شىياڧى ئەيەزنى قىز تۇغقان ئايالنىڭ سۈتىدە ئېرىتىپ كۆزگە تېمىتىش كېرەك.

6. كۆيدۈرۈپ يۇيۇلغان ئىقلىمىيا، كۆيدۈرۈپ يۇيۇلغان قەلەينىڭ ھەر بىرىدىن 2 گرام، ئاقاقىيا، سەمغى ئەرەبىنىڭ ھەر بىرىدىن 3 گرام، قەلەي توپسىدىن 1 گرام ئېلىپ، سوقۇپ رەخت ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ توخۇ توخۇمنىڭ ئېقى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ شىياڧ تەييارلاپ، قىز تۇغقان ئايالنىڭ سۈتىدە ئېرىتىپ پاكىز پاختىغا تەككۈزۈپ كۆزگە قويسا بولىدۇ.

ئىسبەغۇل ئورۇقنىڭ لۇئابىنى گۈلاب بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ كۆزگە سۈرتۈش ياكى پاكىز يۇمغاقسۈت سۈيى، گۈل يېغى قاتارلىقلارنى كۆزگە تەكرار سۈرتۈش ھەمدە كۆزنى پاكىز داكا بىلەن بوش تېڭىپ قويۇش كېرەك.

كۆزدە ئاغرىش كۈچلۈكرەك بولسا شىياڧى ئەيەزنى ئازراق ئەپپۈن بىلەن ئىستېمال قىلىسا بولىدۇ. لېكىن ئاغرىق پەسەيتكىۈچى دورىلارنى كۆزگە ھەرگىز ئىشلەتمەسلىك لازىم.

ئاغرىق پەسەيىپ، ئۆتكۈر خىمىلىق ماددىلارنىڭ ئېقىشى تۈگىشى بىلەنلا كېسەل ماددىسى پىششىقا باشلايدۇ. بۇ چاغدا ئەزەرۈت، ئېشەك سۈتى، نىشاستە، ناۋات قاتارلىقلارنى تاكى قان يېرىك چىقىپ كەتكىچە ئىستېمال قىلىش كېرەك.

يېمەك-ئىچمەكنى ياخشى ئورۇنلاشتۇرۇشتىن سىرت ئاغرىقنى ئوڭدىسىغا ياتقۇزۇپ ئارام ئالدۇرۇش، ئۇخلىتىش كېرەك. بەك تويۇتۇپ غىزالانماسلىق، يەللىك تاماقلاردىن پەرھىز تۇتۇش، يۆتىلىش، چۈشكۈرۈش ۋە قەي قىلىشتىن ساقلىنىش ھەمدە ئىتريفېلى سەغىرنى ئىستېمال قىلىپ بېرىش كېرەك. ئەگەر مۇسەھللاتلار (تازىلىغۇچى دورىلار) غا ئېھتىياج چۈشسە مەتبۇخى ھەلىلە ياكى مەتبۇخى فاۋاكىھە، ئىيارەجى فەيقەرلارنى ئىچسە بولىدۇ.

ئۈزۈمسىمان پەردە يىرتىلغان مۇڭگۈز پەردىدىن چىقىپ قالغانلىرىغا ئىلاج يوق. شۇڭا ئەڭ ياخشى غەرىجە داۋالاش دوختۇرخانىلىرىغا يوللاپ داۋالاش كېرەك.





## كۆز قارىسىنىڭ يىگىلەپ كېتىشى

كۆز قارىسىنىڭ يىگىلەپ كېتىشى (سەلخى قەرنىيە) ئاساسەن مۇڭگۈز پەردىنىڭ يىگىلەپ كېتىشىگە قارىتىلغان بولۇپ، كۆپىنچە كىچىك بالىلاردا كۆرۈلىدۇ.

سەۋەبى

كۆپىنچە كىچىك بالىلاردا پەيدا بولىدۇ. چۈنكى كىچىك بالىلارنىڭ ھەرقايسى ئەزالىرى يۇمشاق، يۇمران ھالەتتە ھەمدە مزاجى ئىسسىققا مايىل بولغاچقا ئۇلارنىڭ بەدىنىدە كۆرۈلگەن ئارتۇق ھارارەت ئاسانلا كۆزىگە يامان تەسىر قىلىپ مەزكۇر كېسەلنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

بەزىدە كۆيدۈرگۈچى، پاراقىراتقۇچى ئۆتكۈر تەسىرلىك دورىلارنىڭ بىۋاسىتە تەسىرىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامىتى

دەسلەپتە كۆرۈنەرلىك بەلگىلىرى بولمايدۇ. ئاغرىق كۆزىنىڭ قۇرغاقلىشىدىغانلىقى، قىچىشىدىغانلىقى ۋە ئېچىشىدىغانلىقىدىن زارلىنىدۇ. كېيىن تەدرىجىي ھالدا كۆز قارىسىنىڭ كىچىكلەپ كېتىۋاتقانلىقىنى بايقىغىلى بولىدۇ. ئېغىرلاشقانسېرى كۆز قارىسىنىڭ تارايغانلىقى بېلىنىدۇ.

داۋاسى

بەدەندە توشقانلىق بولسا، ئالدى بىلەن مۇۋاپىق تېپىلغاندا بەلگىلىك تومۇرلاردىن قان ئېلىش كېرەك. ئۇنىڭدىن كېيىن بەدەندە قايسى خىلىت غالىب بولسا، شۇ خىلىتى تازىلاش لازىم. كۆزنى قىچىشتۇرمايدىغان شىپايى ئىپارغا ئوخشاش دورىلارنى سۈرمە





قىلىپ تارتىش كېرەك. زەرۋرى ئەنەنە، كۆيدۈرۈپ يۇيۇلغان سەدەپنى كۆزگە سېپىش كېرەك. كۆزنىڭ يىرىڭلىق جاراھىتى، كۆزگە مۇدۈر چىقىش، كۆز قارىسى يېرىلىشتا قوللانغان تۇسۇل - چارىلەرنى قوللانسا بولىدۇ.

قۇرۇتقۇچى دورىلاردىن پەرەز قىلىش، ئوزۇقلۇق جەھەتتە تامىقىغا قۇش گۆشلىرىنى سېلىپ بېرىش، ئۆسسۈزلۈقى ئۈچۈن گۈلاب، سېمىز ئوت ئورۇقى شىرىسى، ئارپا سۈيى قاتارلىقلارنى ئىچكۈزۈش كېرەك.





## كۆز قارىچۇقى كېسەللىكلىرى

تىبابىتىمىزدە كۆزنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى قىرۇسىمان سۇيۇقلۇق قىيى (غىلافى رۇتوبە تى جەلدىيە) يەنى كۆز گۆھرى، كىرىكىسىمان چاندىر (زەۋاندى ھودىيە) لار، شىشىسىمان سۇيۇقلۇق (رۇتوبە تى زۇجاجىيە)، بالا ھەمراھسىمان پەردە (تەبەقە ئى مەشىمىيە) يەنى قان تومۇرلۇق پەردە ۋە ئۇنىڭ ئالدى قىسمى بولغان ئۈزۈمسىمان پەردە (تەبەقە ئى ئىنەبىيە)، تورسىمان پەردە (تەبەقە ئى شەبەكىيە) ۋە ئۇنىڭدىكى كۆز توقچىقى (قۇرسۇلبە سەرى) ھەمدە ئۇنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى سىرىق ئوقتا (ئۇقە ئى زەرد) ۋە كۆرۈش نېرۋىسى (ئەسەبى مۇجەۋۋە فە) قاتارلىقلاردىكى غەيرىي نورمال ئۆزگىرىشلەردىن كېلىپ چىققان كۆز كېسەللىكلىرىنى كۆز قارىچۇقى كېسەللىكلىرى قاتارىغا كىرگۈزىدۇ.

كۆزنىڭ بۇ ئەزالىرى كۆرۈش خىزمىتىدە ئوخشىمىغان دەرىجىدە مۇھىم رول ئوينىغاچقا ئىچكى-تاشقى سەۋەبلەر، خىلىتلىق-خىلىتسىز مزاج ئۆزگىرىشلىرى ۋە روھ-قۇۋۋەتلەرنىڭ نورمالسىزلىنىشىدىن ئۇلاردا سادىر بولغان مزاج، شەكىل ۋە ھالەت جەھەتتىكى نورمالسىزلىقلار ۋە كۆز كېسەللىكلىرى كۆزنىڭ كۆرۈشىگە بىۋاسىتە ھالدا ئېغىر دەرىجىدە تەسىر يەتكۈزىدۇ. مەسىلەن، كۆز ئاجىزلىقى (زەئفۇلبە سەرى)، كۆز كۆرمەسلىك (بوتلانى بەسەر)، ئالغايلىق (ھەۋەل)، نامازشام قارىغۇسى (شەبىكورى)، كۆندۈزى كۆرمەسلىك (رۇزكورى)، كۆزنىڭ يورۇقلۇقلاردىن قېچىشى (بوغزۇلبە يىنى)، كۆزنىڭ نۇر يىغالماسلىقى (ئىتتىشارۇلبە سەرى)، كۆز قارىسىنىڭ پولىتىيىپ چىقىشى (مۇرسەرەج)، كۆز قارىچۇقىنىڭ كېڭىيىشى (ئىتتىسائى مۇجەۋۋە فە)، كۆز قارىچۇقىنىڭ تارىيىشى (زەيىقى سۇقە ئى ئىنەبىيە)، كۆزگە سۇ چۈشۈش (ئۇزۇلۇلما)، كۆزگە كۆمۈت، پاشىغا ئوخشاش نەرسىلەر ئۇچقاندا كۆرۈنۈش (خىيالات) قاتارلىقلاردا كۆزنىڭ نەرسىلەرنى نورمال، روشەن ياكى تولۇق كۆرمەسلىكى كېلىپ چىقىدۇ. شۇڭا ئۇلاردىكى نورمالسىزلىق ۋە كېسەللىكلەرنى داۋالاش باشقا كۆز كېسەللىكلىرىگە قارىغاندا ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدۇ ۋە ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.

كۆز قارىچۇقىغا تەئەللۇق كۆز كېسەللىكلىرىنى داۋالاش جىددى ۋە ئىنچىكلىكنى تەلەپ قىلىدۇ. شۇڭا ئۇلارنى داۋالاشتا مەسئۇلىيەتچان، ئەستايىدىل ۋە ئىلمىي پوزىتسىيە





تۇتۇش لازىم. بەزىلىرىدە ئىچكى جەھەتتىكى داۋالاشنى چىڭ تۇتۇپلا قالماي، بەلكى سىرتقى جەھەتتىكى داۋالاشنى بولۇپمۇ دەستكارلىق ئۇسۇلى بىلەن داۋالاشنى زىچ ماسلاشتۇرۇش كېرەك. ئىچكى جەھەتتە داۋالاشتا كېسەل ماددىسىنى پەرق ئېتىش ۋە مزاجنى ئوڭلاشقا ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىش، كۆزنى ۋە بەدەننى قۇۋۋەتلىگۈچى دورىلارنى مۇۋاپىق تۈردە ئىشلىتىشنى ئاساس قىلىش لازىم. مەسىلەن، كۆز ئاجزىلىقى، كۆز كۆرمەسلىك، نامازشام قارىغۇسى ۋە كۈندۈزى كۆرمەسلىك، ئالغايلىق، خىيالات قاتارلىقلار. سىرتقى جەھەتتە داۋالاشتا يەرلىك ئورۇنغا دورا ئىشلىتىشنى مۇۋاپىق كۈچەيتىپلا قالماي، بەلكى دەستكارلىق ئۇسۇلىنى شەرت-شارائىتىنى كۆزدە تۇتقان ھالدا بىرلەشتۈرۈپ ئېلىپ بېرىش لازىم. مەسىلەن، كۆزگە سۇ چۈشۈش (نوزۇلۇلماك)، كۆزگە ئاق چۈشۈش (بەيازۇلكەينى)، كۆز قارىسى پولىتىپ چىقىش قاتارلىقلار. دەستكارلىق ئەمەلىيىتىنى ئېلىپ بېرىشتا مەزكۇر كېسەللىكلەردە دەستكارلىق زۆرۈرىيىتى ھازىر بولغان بولۇپلا قالماي، بەلكى ئاغرىقتا بولۇشقا تېگىشلىك بەزى شەرتلەر ھازىر بولغان بولۇشى، شارائىت تولۇق بولۇشى، (شارائىت بولمىسا غەرىبچە داۋالاش ئورۇنلىرىغا يوللىشى) ھەمدە تېۋىپ دەستكارلىق مەشغۇلىيەتلىرىگە پىشقان بولۇشى لازىم. چۈنكى كۆز قارىچۇقىدىكى دەستكارلىققا تەئەللۇق كېسەللىكلەر مۇرەككەپ بولۇپلا قالماي، بەلكى دەستكارلىق باسقۇچلىرىمۇ ناھايىتى مۇرەككەپ. دەستكارلىق ئۇسۇلىنى قوللىنىشتىن بۇرۇن بەدەننى تەنقىيە قىلىش، ئوپېراتسىيىدىن كېيىن مەلۇم مەزگىل كۆز پەرۋىشىنى ئالاھىدە چىڭ تۇتۇش، بولۇپمۇ ئېغىر نەرسىلەرنى كۆتۈرۈش، قاتتىق ۋارقىراش، يۈتىلىش، چۈشكۈرۈش ۋە باشنى تۈۋەنگە ئېگىشتۈرۈشتىن ساقلىنىش، ياخشى ئارام ئېلىش كېرەك. يېمەك-ئىچمەكنى رەتتە سېلىش، ئوزۇقلىنىشنى كۈچەيتىش، ئوزۇقلۇق قىممىتى يۇقىرى ئەمما ئاسان سىڭىدىغان غىزالارنى ئىستېمال قىلىش لازىم.

### كۆز ئاجزىلىقى

كۆز ئاجزىلىقى (زەئىفۇلبەسەرى) ھەر خىل ئىچكى ۋە تاشقى ئامىللارنىڭ تەسىرىدىن كۆزنىڭ كۆرۈش كۈچى تەدرىجىي ئاجزىلاپ، نورمال كۆرەلمەيدىغان بولۇپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان.





## سەۋەبى

كۆرۈش ئالەتلەرنىڭ زەرەرلىنىشى (كۆز سۇيۇقلۇقلىرىنىڭ نورمالسىزلىنىشى) يەنى نازىيىش، كۆپىيىش، قويۇلۇش-سۇيۇلۇشى، كۆز قەۋەتلىرىدىكى برەر كېسەللىك ئاسارتى، بالا ھەمراھسىمان پەردە يەنى رەڭدار پەردە ۋە تۇخۇم ئېقىسىمان سۇيۇقلۇقنىڭ نورمالسىزلىنىشى، كىرىپكىسىمان چاندىرلارنىڭ نورمالسىزلىنىشى، سېرىق تۇقتىنىڭ زەخىملىنىشى قاتارلىقلار ۋە مىزاجنىڭ يۇزۇلۇشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. مىزاجنىڭ يۇزۇلۇشىدا ئومۇمىي بەدەنگە ھۆللۈك، قۇرۇقلۇق، ئىسسىقلىق، سوغۇقلۇققا ئوخشاش كەيپىياتلار خىلىتلىق ياكى خىلىتسىز ھالدا تۈزگىرىپ، برەرسى كېچىپ ياكى غالىب كېلىپ كۆز ئاجىزلىقىغا سەۋەب بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ھەزىم نورمالسىزلىنىش، سۈپىتى تۆۋەن، يىرىك ۋە غەلىز يېمەكلىكلەرنى ئۇزۇن مۇددەت ئىستېمال قىلىش، جىنسىي ئالاقىنى كۆپ قىلىش، ئېغىر دەرىجىدىكى كەم قۇۋۋەت، كەم قانلىق، ئەقلىي ئەمگەك بىلەن كۆپ شۇغۇللىنىش، يورۇقلۇقى كەم شارائىتتا كىتابنى چىق كۆرۈش، خەتنى كۆپ يېزىش، كۆرۈش كۈچىنىڭ ئاجىزلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. قېرىلىق، مەس قىلغۇچى نەرسىلەرنى كۆپ ئىستېمال قىلىش، ئوزۇقلۇق ماددىلار كەمچىل بولۇش، ئۇزۇن مۇددەت ئۆتكۈز تۇرلۇق ياكى قارغا ئوخشاش نۇر قايتۇرغۇچى نەرسىلەرگە بىۋاسىتە قاراش ۋە بەزى نەزلە، زۇكام، مېڭە كېسەللىكلىرى قاتارلىقلار تەدرىجىي ھالدا كۆرۈشنىڭ ئاجىزلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

## ئالامىتى

كۆزنىڭ كۆرۈشى ناچارلىشىپ نەرسىلەرنى ئېنىق، توغرا كۆرەلمەسلىك ئاساسلىق ئالامەت بولىدۇ. بەزىلەردە كۆز قارىچۇقىنىڭ چوڭ ياكى كىچىكلىكى مەلۇم بولىدۇ. بۇ نۇر ئۆتكۈزگۈچى تۈشۈكنىڭ كېڭەيگەن ياكى تارايغانلىقىنىڭ ئىپادىسى. ئەگەر قارىچۇقنىڭ رەڭگى ئاق ياكى دۇغلاشقان بولسا، نۇر ئۆتكۈزگۈچى تۈشۈككە يېڭىدىن سۇ چۈشكەنلىك ياكى كۆپ ئىچى سۈرۈپ سۇيۇقلۇق يوقاتقانلىق، قان يوقاتقانلىق، كۆپ جىنسىي ئالاقە قىلغانلىقىنىڭ بەلگىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئەگەر كۆزگە پاشا، چىۋىن، چاڭ-توزانغا ئوخشاش نەرسىلەر كۆرۈنمەس مۇڭگۈز پەردە، تۇخۇم ئېقىسىمان سۇيۇقلۇقلارنىڭ قويۇق، قېلىنلىشىپ قالغانلىقىنىڭ بەلگىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.





ئەگەر بەدەن ئورۇق، نومۇرى ئىنچىكە قاتتىق سالىسا كۆزلىرى ئولتۇرۇشۇپ كەتسە جىگەر، ئاشقازان ئاجزىلىقىدىن بولغان كۆز ئاجزىلىقى ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ.

ئەگەر سىرتقى جەھەتتىن بىر قاراشتىلا كۆزنىڭ چوڭ-كىچىكلىك ھەجمىدە ئۆزگىرىش بولمىسا ياكى قىزىرىشتەك ئالامەتلەر كۆرۈلمىسە ئاز-ئازدىن ياش ئېقىپ، كۆزنىڭ بۇرۇن تەرەپ بۇرچىكىدىن پات-پات بۇغدايدەك قويۇق چاپاق چىقسا، بۇ كۆپىنچە تاماق ھەزىم بولۇشنىڭ ناچارلىقى، جىنسىي ئالاقىنى كۆپ قىلىش، تاماق ئۈستىگە تاماق يەپ تولا كېكىرىشلەر تۈپەيلىدىن كۆز ئاجزىلىقى پەيدا بولغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.

ئۇنىڭدىن باشقا بىمارلاردىن تەپسىلىي سوراڭ ئارقىلىق ئىلگىرىكى كېسەللىك تارىخىنى سۈرۈشتە قىلىش، ئوبدان مۇھاكىمە قىلىش ئارقىلىق بەلگىلىرىنى تەپسىلىي ئايرىش لازىم.

#### داۋاسى

ئالدى بىلەن سەۋەبىنى تېپىپ، سەۋەبىنى تۈگىتىشكە ئامال قىلىش كېرەك. ماددىدىن بولغان بولسا، ماددىنى پىشۇرۇش، تازىلاش، تەكشۈش، ئۇنىڭدىن كېيىن شۇ ئەزانى قۇۋۋەتلەپ ئەسلىگە كەلتۈرۈش لازىم.

خىلىتىنى پىشۇرۇش ئۈچۈن ھەر بىر خىلىغا مۇناسىپ ھالدا مەتبۇخى ھەلىيە، شەربىتى بىنەپشە بېرىلىدۇ. تازىلاش ئۈچۈن ئىيارەجى پەيقەرا، ھەببى زەھەب، ھەببى شەبىيار، ھەببى قوقىيالار بېرىلىدۇ.

قۇۋۋەتلەش ئۈچۈن ئىترىفېلى بادىيان، سۇقۇفى ئامىلە بېرىلىدۇ. تورۇپ، چامغۇرنى كۆپ ئىستېمال قىلىش، ناۋات بىلەن يۇمغاقسوت، كاسىنى سوقۇپ بېرىش لازىم. سىرتتىن كۆھلى روشنائى، كۆھلى باسلىقۇن ئىشلىتىلىدۇ.

كۆرۈش ئاجزىلىقى ئىسسىقتىن بولغانلىرىغا سىرتقى جەھەتتە بىنەپشە ۋە نىلۇفەر يېغى قاتارلىق سوغۇق تەبىئەتلىك ياغلار بىلەن باشنى ياغلاش، تاتلىق بادام يېغىنى كۆزگە تېمىتىش كېرەك. چىلاننى قاينىتىپ ئىچكۈزۈشمۇ ئوبدان مەنپەئەت قىلىدۇ.

سوغۇقتىن بولغانلىرىغا پاققان ۋە مېكىيان توخۇ گۆشىنى كاۋاپ قىلىپ قوۋزاق دارچىن قاتارلىق ئىسسىق دورىلار بىلەن پىشۇرۇپ يېشى، ياسمەن يېغىنى بۇرۇنغا تېمىتىش، ئىسسىق دورىلار سۈيى بىلەن يۇيۇتۇش ياكى ھورىدا باشنى تەرلىتىش لازىم. بادىيان، بادىيان بىلتىزى، چۈچۈكبۇيا بىلتىزى، پىرسىياۋشان، ئۈستۈخۇددۇس قاتارلىقلارنى ناۋات







بلەن قوشۇپ قاينىتىپ بەرسە تېخىمۇ ياخشى. كۆزگە پاشا، كۆمۈتغا ئوخشاش نەرسىلەر ئۇچقاندەك بىلىنىدىغان كۆرۈش زەئىپلىكىدە مەئجۇنى ۋە ج قاتارلىقلارنى مەلۇم ۋاقىت ئىستېمال قىلىش كېرەك.

كۆرۈشنىڭ ئاجىزلىشىشى قېرىلىق ياكى بەدەن ئاجىزلىقتىن بولغان بولسا ھەببى شەبىيار، ھەببى قوقيا، ماددە تولھايات، ئىتريفىلى كەبىر، شەرىپى مائۇلئەسەل قاتارلىق دورىلارنى ئىستېمال قىلدۇرۇش، سىرتىدىن كۆھلى جەۋاھىر ئىشلىتىش لازىم. ئەگەر، باشقا كېسەللىكلەر سەۋەبىدىن بولغان بولسا شۇ كېسەلنى داۋالاش بىلەن بىرگە كۆزنىڭ كۆرۈش كۈچىنى ئاشۇرغۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش لازىم. ھەرخىل سەۋەبلەردىن بولغان كۆرۈشنىڭ ئاجىزلىقىغا كۆھلى جەۋاھىرنىڭ ئۈنۈمى ياخشى.

### كۆھلى جەۋاھىر

سۈرمە 16.2 گرام، توتيا 0.8 گرام، بىخ مارجان، مېرقيششا ھەر بىرى 5.4 گرام، مەرۋايد 18.6 گرام، سازەج ھىندى 2.6 گرام، ئىپار 0.5 گرام. دورىلارنى قائىدە بويىچە يۇمشاق ئېزىپ يېپەك ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ئالقان ياسىلىدۇ. كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ ئەتىگەن - كەچتە مەخسۇس پىلتىكۈچ بىلەن كۆزگە تارتىلىدۇ.

### پەرھىزى

ئادەتتىكى ۋاقىتلاردا كۆزنى ياخشى ئاسراش ۋە مۇۋاپىق ئارام ئالدىرۇش، ھاراق، تاماكا، مەس قىلغۇچى دورا قاتارلىقلاردىن قاتتىق ساقلىنىش، ھەرخىل يەللىك، غەلىز تاماقلاردىن پەرھىز قىلىپ، ئاسان ھەزىم بولىدىغان، ئوزۇقلۇق قىممىتى يۇقىرى يېمەكلىكلەر بىلەن ئوزۇقلىنىش كېرەك. قورساقنى ئويغۇزۇپلا ئوخلاش كۆزگە ناھايىتى زىيانلىق. جىگەر كاۋاپلىرى، بولۇپمۇ موزاي جىگىرى، قوي جىگىرىنى چالا كاۋاپ قىلىپ ئۇزۇن مۇددەت ئىستېمال قىلىش، بېلىق يېغى ئىچىش كۆرۈنەرلىك ئۈنۈمگە ئىگە.

## كۆز كۆرمە سىلىك

كۆز كۆرمە سىلىك (بۇتلاتۇلبەسەرى) ئىچكى - تاشقى ھەرخىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن



كۆرۈش كۈچى ئاجزلاپ، تەدرىجىي ھالدا بىر كۆز ياكى ئىككىلا كۆزنىڭ كۆرۈش كۈچى پۈتۈنلەي يوقىلىپ كۆرمەس بولۇپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان.

### سەۋەبى

خىلىتلارنىڭ نورمالسىز ئۆزگىرىشلىرى تۈپەيلىدىن كۆزنىڭ ھەرقايسى پەردىلىرىگە قىسمەن نورمالسىز قويۇق ماددا ۋە ھۆلۈكلەر يىغىلغانلىقى ياكى توخۇم ئېقىسىمان سۇيۇقلۇقنىڭ نورمال ھۆللىكىنى قويۇلدۇرۇپ، دوغلاشتۇرۇپ كۆز نۇرىنى توسقانلىقىدىن كۆز بىراقلا كۆرمەس بولۇپ قالىدۇ.

بەزى كىشىلەر ئۇزۇن مۇددەت قاراڭغۇ جايدا ئولتۇرغانلىقتىن كۆزنىڭ نۇر ئۆتكۈزگۈچى تۈشۈكى (قارىچۇقى) بەك كېڭىيىپ، سۇيۇقلۇقلار قويۇلۇپ كۆز خىزمىتى ئېغىر دەرىجىدە تۆۋەنلەيدۇ. بىردىنلا يورۇقلۇققا چىقسا، يورۇقلۇقنىڭ قاتتىق تەسىرىدىن نۇر ئۆتكۈزگۈچى تۈشۈك توساتتىن ناھايىتى بەك تارىيىپ كېتىپ ياكى كۆز پائالىيەتلىرىنى قاتتىق بۇزۇپ كۆز بىراقلا كۆرمەس بولۇپ قالىدۇ. شۇنىڭغا ئوخشاش ئۆتكۈر نۇرغا ھەددىدىن زىيادە تىكىلىپ كۆپ قاراشمۇ مەلۇم مەزگىللىك كۆز كۆرمەسلىكىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بەزى كىشىلەردە كۆزگە سۇ چۈشۈش، كۆز كۆرۈش كۈچىنىڭ ئاجىزلىشىشى قاتارلىق كېسەللەرنىڭ قايسى بىرى كۈچىيىپ ئاخىرقى باسقۇچقا يەتكەندە كۆز پۈتۈنلەي كۆرمەس بولۇپ قالىدۇ. جىگەر خىزمىتى بۇزۇلغان ياكى جىگەرگە قاتتىق زەربە يەتكەن ئەھۋاللاردا كۆرۈش ۋاقتىنچە توسۇلۇپ ياكى غۇۋالىشىپ قالىدۇ.

### ئالامىتى

بىمارنىڭ كۆزى كۈندۈزى ياكى قاراڭغۇدىكى ئورلاندىرۇلغان جايلاردىمۇ نەرسىلەرنى ئوچۇق، ئېنىق كۆرمەيدۇ ياكى پۈتۈنلەي كۆرەلمەيدۇ.

خىلىتلارنىڭ نورمالسىز ئۆزگىرىشلىرى تەسىرىدىن بولغان بولسا، شۇ خىلىتقا خاس بەلگىلەر كۆرۈلىدۇ ياكى كۆزنىڭ نورمال كۆرۈشىگە زىيان يەتكۈزىدىغان ھەرخىل ئىچكى-تاشقى ئامىللارنىڭ تەسىرىدىن بولسا، شۇ ئامىلغا مۇناسىپ ھالدىكى ئالامەت ياكى كېسەل تارىخى بولىدۇ. مەسىلەن، ئەگەر باش قىسمىغا بىرەر نەرسە تېگىش، يىقىلىش ياكى مېڭىنىڭ باشقۇرۇش خىزمىتىگە تەسىر قىلىشتەك ھادىسىلەر



تۆپە يىلدىن پەيدا بولغان بولسا كۆز ئىشىشى، چىڭقىلىش بەزىدە كۆز پولىتېش، باش ئاغرىش، قۇلاق غوڭغۇلداشتەك ئالامەتلەر سەۋەبىنىڭ ئېغىر-يېنىكلىكىگە قاراپ ئوخشىمىغان دەرىجىدە كۆرۈلىدۇ.

### داۋاسى

ئەگەر كۆزنىڭ كۆرمەسلىكى بەزى قويۇق ماددىلارنىڭ تۈر تۆتكۈزگۈچى توشۇكى تاراپىشى، توسۇشىدىن بولغان بولسا، ماددىنى يۇمشىتىش ئۈچۈن سىركەنجىبىن بۇزۇرى، سىركەنجىبىن ئەنسىلى (تاغ پىسىزى)، شەرىپتى تۈستۈخۇدۇسلار بادىيان سۈيى ياكى بادىيان ئەرىقى بىلەن قوشۇپ بېرىلىدۇ.

تازىلاش، توسالغۇلارنى ئېچىش ئۈچۈن ھەببى ئىيارەج، ھەببى قوقيا، ھەببى شەبىيار قاتارلىق دورىلار ئىشلىتىلىدۇ. گۈلھەتتى بادىيان سۈيى بىلەن ئىستېمال قىلدۇرۇش، شەرىپتى تۈستۈخۇدۇس ئىچكۈزۈش لازىم.

ئەگەر ئۇزۇن مۇددەت قاراڭغۇ جايدا ئولتۇرۇش ياكى تۆتكۈر تۇرغا قاراشتىن كۆرمەس بولۇپ قالغان بولسا، داۋالاشتا كېسەل كىشىنى بەك يورۇقمۇ ئەمەس، بەك قاراڭغۇمۇ ئەمەس نورمال جايدا ئولتۇرغۇزۇپ كۆز تودۇلغا كۆك رەڭلىك بىر پارچە رەختنى ئېسىش ۋە يەنە قوغۇشۇننى توششاق ئېكەكلەپ قاچىغا ئېلىپ كۈندە بىر قانچە قېتىم قارىتىش لازىم. سىرتتىن كۆھلى روشنائى، شىيافى مىرراتلارنى كۆزگە تارتىش لازىم.

كۆزگە سۇ چۈشۈش، كۆرۈش قۇۋۋىتى ئاجىزلىقىنىڭ ئاخىرقى باسقۇچىدا پەيدا بولغان كۆرمەسلىك كېسىلىنى داۋالاپ ساقايتىش تەس. شۇنداقتىمۇ ئەسلىي كېسەلنى داۋالاپ ساقايتىشقا تىرىشىش كېرەك.

كۆزگە زىيانلىق تاماقلارنى ئىستېمال قىلىش ۋە جىنسىي ئالاقىنى كۆپ قىلىش، باشقا ئېغىر جىسمانىي ئەمگەك ۋە باشقا زىيانلىق ھەرىكەتلەر بىلەن شۇغۇللىنىشتىن ساقلىنىش لازىم.

### ئالغايلىق

ئالغايلىق (ھەۋەل) ئىچكى ۋە تاشقى سەۋەبلەر تۆپە يىلدىن كۆز قارىسىنىڭ بىر تەرەپكە





سڭايان بولۇپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان. بۇنىڭدا ئادەتتە بىر نەرسە ئىككى كۆرۈنىدۇ. مەزكۇر كېسەل خەلق ئارىسىدا ئالغاي دەپ ئاتىلىدۇ، كىچىك بالىلاردا كۆپرەك، چوڭلاردا ئاز ئوچرايدۇ. چوڭلاردىكى ئالغايلىق كۆپىنچە بالىلىق ۋاقتىدىكى ئالغايلىق ساقايماي ئاسارەت قالغانلىقتىن بولىدۇ.

### سەۋەبى

كۆز قارىسى ھەر خىل يامان تەسىرلەر تۈپەيلىدىن ئوڭ-سول، يۇقىرى-تۆۋەن تەرەپلەرنىڭ بىرەرسىگە سڭايان بولۇپ قېلىپ، بىر نەرسىنىڭ ئىككى كۆرۈنۈشىگە سەۋەب بولىدۇ. بۇ كۆپىنچە كۆز يۇمىلىقىنى نورمال ئىككى تەرەپكە تارتىپ تۇرغان پەي-گۆشلەردىن بىرەرسىنىڭ بوشاپ كەتكەنلىكىدىن كېلىپ چىقىدۇ ياكى مەزكۇر گۆشنىڭ تۇغما ھالدا تولۇق تەرەققىي قىلمىغانلىقىدىن بولىدۇ.

كىچىك بالىلاردىكى سەۋەب ئاساسەن 3 خىل بولىدۇ:

1. بالىلار بۇرۇن سەرسام (مېڭە پەردە ياللۇغى)، سەرنى، دۆلىنىش قاتارلىق كېسەللەر ياكى يۇقىرى قىزىتمىلىق كېسەللىكلەر بىلەن ئاغرىغان مەزگىللەردە كۆزنىڭ قەۋەت پەردىلىرى ياكى كۆز يۇمىلىقىنى تارتىپ تۇرغۇچى پەي گۆشلىرىنىڭ بىرەرسى تارتىشىپ كۆز بىر تەرەپكە مايىل بولۇپ قالىدۇ.

2. ئانىلار بالىنى نورمال تەربىيەلىمەي، داۋاملىق بىر تەرەپ بىلەن سۈت ئېمىتىپ ئادەتلەندۈرۈپ قويغانلىقتىن بالا شۇ تەرەپكە ئۆگىنىپ قېلىپ، شۇ تەرەپچە ئۇخلاش، سۈت ئېمىش ھەتتا يىغلىسىمۇ شۇ تەرەپكە قاراپ يىغلاشقا ئادەتلىنىپ قېلىپ ئالغاي بولۇپ قالىدۇ.

3. كىچىك بالا ئۇخلاپ ياتقاندا ياكى بىخەۋەر تۇرغاندا ئۈستۈمتۈت قاتتىق ئاۋازدىن بىراقلا چۆچۈپ بىر تەرەپكە قاراش بىلەن كۆز يۇمىلىقىنى تارتىپ تۇرغۇچى گۆش پەيلىرىدىن بىرەرسى بىر تەرەپكە مايىل بولۇپ تارتىشىپ قالغانلىقتىن ئالغاي بولۇپ قالىدۇ.

4. بەدەندىكى ھۆلۈك ۋە سوغۇقلىق ئېشىپ كېتىپ كۆز يۇمىلىقىنى نورمال تۇتۇپ تۇرغۇچى گۆش-پەيلىرىنى بوشاشتۇرغانلىقتىن كۈچلۈكرەك كەلگەن گۆش-پەي كۆز يۇمىلىقىنى بىر تەرەپكە تارتىپ كېتىپ ئالغايلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.



## تالامتى

كېسەل بالىنىڭ كۆز قارىسى بىر تەرەپكە، كۆپ ھاللاردا ئىچكى تەرەپكە مايىلراق بولۇپ قالىدۇ. كۆز ئېقى ئادەتتىكىدىن چوڭراق كۆرۈنىدۇ. كۆپىنچە بىر كۆز، ئايرىم ھاللاردا ئىككىلا كۆز ئالغاي بولۇپ قالىدۇ. باشقىلارغا ئالغاي بولۇپ قاپتۇ دېگۈدەك مەلۇم بولىدۇ. نەرسىلەر قوش كۆرۈنىدۇ.

## داۋاسى

ئەگەر باشقا كېسەللەرنىڭ تەسىرىدىن بولغان بولسا، ئالدى بىلەن شۇ كېسەلنى داۋالاشنى ئاساس قىلىش بىلەن بىرگە ئالغايلىقنى قوشۇمچە داۋالاش كېرەك. سەۋەب بولغان كېسەل ساقايىسا ئالغايلىق ئومۇمەن ياخشىلىنىپ كېتىدۇ.

كىچىك بالا بۆشۈكتە داۋاملىق بىر تەرەپكە قاراپ كۆنۈپ قالغانلىقتىن بولغان بولسا، قارشى تەرەپكە قىزىل رەڭلىك بىر نەرسىنى ئېسىپ قويۇپ بالىنى شۇ تەرەپكە كۆپرەك قاراشقا ئۈندەش ئارقىلىق ئالغايلىقنى ئاستا-ئاستا تۈزەش كېرەك. چۈنكى بالىلارنىڭ ئەزا-توقۇلمىلىرى يۇمشاق بولغانلىقتىن تەسىراتىنى ئاسانلا قوبۇل قىلىدۇ. كىچىك بالىلارنى نامۇۋاپىق ئادەتلەر ۋە بەزى ئېغىر تاماقلاردىن پەرھىز قىلدۇرۇپ نورمال تەربىيەلەش لازىم. كۆزنى تۇتۇپ تۇرغۇچى پەيلەرگە ھۆللۈك ياكى سوغۇقلۇق يەتكەندىن كېلىپ چىققان ئالغايلىق بولسا، بوشاپ كەتكەن پەينى چىگىتىشنىڭ ئامالىنى قىلىش كېرەك.

ئالغايلىق چوڭ كىشىلەردە كۆرۈلسە ئۇنىڭ ئۆزىگە خاس 3 خىل سەۋەبى بولىدۇ:

1. ئېغىر يۇقۇملۇق كېسەللەر تەسىرىدىن ياكى كۆز يۇمىلىقىنى نورمال تۇتۇپ تۇرغۇچى گۆش پەي توقۇلمىلىرىغا قۇرۇقلۇق يەتكەنلىكتىن كۆز بىر تەرەپكە قىسمەن تارتىلىپ سىڭايان بولۇپ قالىدۇ.

2. كۆز يۇمىلىقىنى تۇتۇپ تۇرغۇچى گۆش پەيلەرنىڭ بىرەرسى ھۆللۈكتىن بوشاپ كېتىپ قارشى تەرەپتىكى پەينىڭ تارتقانلىقىدىن كۆز بىر تەرەپكە مايىل بولۇپ قالىدۇ.

3. گال قاتتىق بوغۇلۇش، باش قاتتىق سىلكىنىش، سىقىلىش قاتارلىق سەۋەبلەردىن كۆزنىڭ پەردە ۋە سۇيۇقلۇقلىرىدىن بىرەرسى ئۆز جايىدىن قوزغىلىپ بىر تەرەپكە مايىل بولۇپ قالسا، كۆز ئالغاي بولۇپ بىر نەرسىنى ئىككى كۆرىدىغان بولۇپ قالىدۇ.

## ئالامىتى

يۇقۇملۇق كېسەللەر ياكى قۇرۇقلۇق تەسىرىدىن بولغان ئالغايلىقتا كۆز بىر ئاز قىسىلىپ بەزىدە يۇمۇلۇپ قالغاندەك بولىدۇ، ياش ئاقماي قۇرۇق بولىدۇ. ئالغايلىق ئەگەر ھۆللوكتىن، كۆز يۇمىلىقىنى تۇتقۇچى گۆش پەيلىرى بوشاپ كەتكەنلىكتىن بولغان بولسا كۆزنىڭ بىر تەرەپكە مايىللىقى ئېغىرراق بولىدۇ، ياش كۆپرەك ئېقىپ، سوغۇق ھاۋادا كۈچىيىپ قالىدۇ. ئەگەر كۆز سۇيۇقلۇقى بىرەر سەۋەبتىن ئۆز جايىدىن قوزغالغانلىقىدىن بولسا كۆز داۋاملىق ھەرىكەت قىلىپ، قاپاق تارتقاندا كەسىلىدۇ، ياش ئاقىدۇ.

## داۋاسى

قۇرۇقلۇقتىن بولغان ئالغايلىقنى داۋالاشتا ھۆللەشتۈرگۈچى دورىلارنى قاينىتىپ سۈيىنى پېشانىسىگە سۈرتۈش، تىرىپىنى چېكىگە تېگىش، شۇنىڭدەك بىنەپشە يېغى، قىز تۇغقان ئايال سۈتى قاتارلىقلارنى كۆز ۋە بۇرۇنغا تېمىتىش لازىم.

كۆز يۇمىلىقىنى تۇتقۇچى گۆش پەيلىرى بوشاپ كەتكەنلىكتىن بولغان ئالغايلىقنى داۋالاشتا ئارتۇقچە ھۆللوكتىنى تازىلاش، ھەببى ئىبارەج، ھەببى قوقيا قاتارلىق دورىلارنى ئەھۋالغا قاراپ ئىشلىتىش لازىم. مامىرانچىنى ئىرقى بادىيانغا چىلاپ سۈيىنى كۆزگە تېمىتىش كېرەك.

ئەگەر بىرەر سۇيۇقلۇق ئۆز جايىدىن قوزغالغان بولسا، سەۋەبىنىڭ ئېغىر-يەڭگىلىكىگە قاراپ تەدبىر قوللىنىش لازىم. ئەگەر بىماردا قىزىتما بولمىسا ئېشەك سۈتىنى ھۆل تەبىئەتلىك ياغلار بىلەن ئىچۈرسە بولىدۇ. كالا سۈتىنى بادام يېغىغا قوشۇپ ئىچكۈزۈش ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.

## نامازشام قارىغۇسى

نامازشام قارىغۇسى (شەب كورى، ئەشاك) بىمارنىڭ كۆزى كۈندۈزى نەرسىلەرنى نورمال كۆرۈشمۇ كۈن ئولتۇرۇپ قاراڭغۇ چۈشكەنسىرى نورمال، تولۇق كۆرەلمەسلىكىگە ياكى پۈتۈنلەي كۆرەلمەسلىكىگە قارىتىلغان. مەزكۇر كېسەللىك خەلق ئارىسىدىمۇ نامازشام



قارىغۇسى دەپ ئاتىلىدۇ.

سەۋەبى

مېڭىدىن چۈشكەن ھۆلۈك ياكى ئاشقازاندىن تۈرلىگەن قويۇق يەل ياكى ھەر خىل باشقا سەۋەبلەردىن پەيدا بولغان ئارتۇقچە ھۆلۈكنىڭ كۆز تۇخۇم ئېقىسىمان سۇيۇقلۇقى (روتوبەتى بەيزىيە) غا يامان تەسىر كۆرسىتىپ ئۇنى قويۇلدۇرۇپ قويغانلىقىدىن كۆرۈش قۇۋۋىتى ئاجىزلىشىپ پەيدا بولىدۇ. شۇڭا مەزكۇر كېسەللىك كۈندۈزى يورۇقلۇق ياكى كۈن نۇرىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىسىلا قويۇلۇپ قالغان كۆز تۇخۇم ئېقىسىمان سۇيۇقلۇقى سۇيۇقلىشىپ يەنىلا نەرسىلەرنى ئوخشاشلا ياخشى كۆرىدۇ.

مەزكۇر كېسەللىك بىرلەمچى ۋە ئىككىلەمچى بولىدۇ. ئىككىلەمچى بولغانلىرى كۆپىنچە ئوزۇقلىنىش خاراكتېرلىك بولىدۇ. يەنى بەدەندە ئوزۇقلۇق ماددىلارنىڭ يېتىشمەسلىكى، ئومۇمىي بەدەننىڭ زەئىپلىكى، ياشانغانلىق ۋە جىگەرنىڭ ئاجىزلىقىدىمۇ كۆزنىڭ كۆرۈش كۈچى تەدرىجىي ھالدا ئاجىزلىشىپ نامازشام قارىغۇسى كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامىتى

ئاغرىقنىڭ كۆزى كۈندۈزى نەرسىلەرنى نورمال كۆرىدۇ. كۈن ئولتۇرۇپ گۆگۈم چۈشۈشكە ئەگىشىپ نەرسىلەرنى بارغانسېرى روشەن كۆرەلمەيدۇ. كەچ كىرىشى بىلەنلا بەزى ئاغرىقلار دەسلەپتە ئىنچىكە، توششاق نەرسىلەرنى كۆرەلمىسىمۇ ئادەتتىكى نەرسىلەرنى پەرق ئېتەلەيدۇ. كېيىنچە ئادەتتىكى نەرسىلەرنىمۇ كۆرەلمەس بولۇپ قالىدۇ. بەزىلىرى ھەتتا يۇلتۇزنىمۇ كۆرەلمەيدۇ. ئەتىسى تاڭ ئاتقاندىن كېيىن نەرسىلەرنى يەنىلا نورمال كۆرۈۋېرىدۇ. كۆزنى سىرتقى جەھەتتە تەكشۈرگەندە باشقا نورمالسىز ئۆزگىرىشلەر كۆرۈلمەيدۇ. مەزكۇر كېسەللىك كۆپىنچە كىچىك بالىلاردا كۆپرەك كۆرۈلىدۇ. ئادەتتە ئاقۋىتى ئانچە ئېغىر ئەمەس.

داۋاسى

ئالدى بىلەن سەۋەبىچى بولغان ئامىلنى ئېنىقلاپ شۇ سەۋەبىنى چەكلەش ۋە يوقىتىش كېرەك. قايسى خىلىنىڭ نورمالسىزلىشىشىدىن كېلىپ چىققان بولسا، شۇ خىلىنىڭ





كېسەللىك كەلتۈرۈپ چىقارغان ماددىسىنى تازىلاپ، خىلتىنى تەكشۈش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن ھەبىي ئىبارەج، مەئجۇنى ۋەج، مەتبۇخى ھەلىلە، ئەرىقى بادىيانلار ئەھۋالغا قاراپ ئىشلىتىلىدۇ. قاننىڭ كۆپلۈكىدىن بولسا، مۇۋاپىق تېپىلغاندا قىفال تومۇردىن قان ئېلىشنى ئويلاشسا بولىدۇ.

قويۇق يەللەر (بۇخارات) نىڭ كۆز تۇخۇم ئېقىسىمان سۇيۇقلۇقىنى قويۇقلاشتۇرغانلىقىدىن كېلىپ چىققان نامازشام قارىغۇسىنى داۋالاشتا:

1. قارىمۇچ، كۈندۈش، قۇندۇز قەھرى، سەبىرى قاتارلىق دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ بۇرۇنغا تارتىش ئارقىلىق چۈشكۈرتۈپ، نورمالسىز ھۆللۈك ۋە بۇخاراتلارنى تازىلاش لازىم.  
2. جەرەن ياكى قوتازنىڭ جىگىرىدىن 100 گرام ئېلىپ توغراپ، ئۇنىڭغا 10 گرام ئارپا بادىيان ۋە 5 گرام پىلىپ قوشۇپ، بىر كىلوگرام مىقداردىكى سۇدا قاينىتىپ، ھورغا باش-كۆزنى تۇتۇپ ھورداپ بىر قانچە قېتىم تەرلەتسە مەزكۇر كېسەلگە پايدا قىلىدۇ.

3. 1 گرام ھەسەلنى 3 گرام ئارپا بادىيان سۈيى بىلەن تەكشۈپ كۆزگە تارتىش كېرەك.

4. تاغ تېكىسىنىڭ جىگىرىگە 5 گرام سوقۇلغان قارىمۇچ سېپىپ ياكى قارىمۇچقا بىر ئاز ئارپا بادىيان قوشۇپ بىرگە سوقۇپ جىگەرگە سېپىپ جىگەرنى ئوتتا قويۇپ، جىگەرنىڭ ھۆللۈكى تارتىلغاندىن كېيىن قۇرۇتۇپ يۇمشاق ئېزىپ كۆزگە تارتسا ناھايىتى تېز تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئوزۇقلۇق ماددىلارنىڭ يېتىشمەسلىكى، بەدەننىڭ زەئىپلىكى، ياشانغانلىق ۋە جىگەرنىڭ ئاجىزلىقىدىن بولغانلىرىنى داۋالاشتا ئوزۇقلۇقنى كۈچەيتىش، بەدەننى كۈچلەندۈرۈش بىلەن بىرگە ھايۋاناتلارنىڭ جىگىرىنى دائىم ئىستېمال قىلىش كېرەك. ئۈچكە جىگەرگە پىلىپنى سوقۇپ سېپىپ كاۋاپ قىلىپ جىگەردىن ئېقىپ چىققان سۈيى ئېلىپ كۆزگە تامغۇزۇش بىلەن بىرگە جىگەرنى يېيىش لازىم. بادام يېغى، كۈنجۈت يېغى، نىلۋەر ياغلىرىنى باشقا سۈركەپ بەرسە ناھايىتى پايدىلىق. كەپتەر قېنىنى كۆزگە تېمىتسا تېخىمۇ ياخشى.

## كۈندۈزى كۆرمە سىلىك

كۈندۈزى كۆرمە سىلىك (رۇزكورى) دەل نامازشام قارىغۇسىنىڭ ئەكسىچە بولۇپ،







ئاغرىقنىڭ نەرسىلەرنى كۈندۈزى ئوچۇق كۆرەلمەي، كېچىسى خېلى روشەن كۆرىدىغانلىقىغا قارىتىلغان.

### سەۋەبى

ھەر خىل ئىچكى ۋە تاشقى سەۋەبلەرنىڭ كۆزگە يامان تەسىر كۆرسەتكەنلىكى تۈپەيلىدىن كۆرۈش قۇۋۋىتى ئاجىزلىشىپ كۈندۈزى ياكى كۈن ئۈرى ئاستىدا كۆز نۇرنى يىغالمىي كۈندۈزى كۆرمەسلىك كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭدا ئىچكى سەۋەبلەر، يەنى مېڭە ۋە روھىي جەھەتتىكى زەئىپلىشىش، جىنسىي ئالاقە بىلەن كۆپ شۇغۇللىنىش، كۆپ ئېھتىلام بولۇش، كۆپ ئىچى سۈرۈش قاتارلىقلاردىن بەدەن زەئىپلىشىش؛ باشقا ھەر خىل كۆز كېسەللىكلىرى بىلەن ئاغرىپ تولۇق ساقايماستىلىق ياكى توغرا داۋالىنىشقا قاتارلىقلار. تاشقى سەۋەبلەر، يەنى بەك يورۇق ياكى بەك قاراڭغۇ ئورۇنلاردا ئۇزۇن مۇددەت ئوششاق خەتلىك كىتاب-ماتېرىيال، خەت-چەكلەر بىلەن مەشغۇل بولۇش، كۈچلۈك يورۇقلۇق ۋە كۈن ئۈرى ئاستىدا كۆپ تۇرۇش، تەستە ھەزىم بولىدىغان ناچار يېمەكلىكلەرنى دائىم كۆپ ئىستېمال قىلىپ ئوڭدىسىغا يېتىپ تۇخلاش قاتارلىقلار.

مەزكۇر كېسەل كۆپىنچە ئىسسىق جايلاردا كۆپرەك ئوچىرايدۇ.

### ئالامىتى

گەرچە كۆزدە غەيرىي نورمال ئۆزگىرىشلەر بولمىسىمۇ، لېكىن كۈندۈزى بولۇپمۇ ھاۋا ئوچۇق كۈنلىرى كۆز ئۈزۈكىدىن پەردە تارتقاندا كۆز بولۇپ نەرسىلەرنى تولۇق كۆرەلمەيدۇ. ئەكسىچە، ھاۋا بۇلۇتلىق، تۇتۇق كۈنلەردە بولۇپمۇ كېچىسى ۋە ھاۋا سالقىن چاغلاردا كۆزنىڭ نۇر يىغىش ئىقتىدارى ياخشىلىنىپ نەرسىلەرنى خېلى نورمال كۆرەلەيدۇ. بەزى كىشىلەردە كۆزگە زىيانلىق بولغان ۋە كۆزنىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاجىزلاشتۇرىدىغان ئامىللار كۈچەيگەنسېرى كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ ئېغىرلاشقانلىقى مەلۇم بولىدۇ. مەسىلەن، كۈچلۈك نۇر، كۆپ جىنسىي ئالاقە، كۆپ ئىچى سۈرۈش، غەلىز تاماقلارنى كۆپ ئىستېمال قىلىش قاتارلىقلار.



ئالدى بىلەن مەزكۇر كېسەلنى ئېغىرلاشتۇرغۇچى ئامىللارنى چەكلەش ۋە يوقىتىشقا تىرىشىش لازىم.

ئىچكى ۋە تاشقى جەھەتتە ئاساسلىق مېڭىگە ھۆلۈك يەتكۈزگۈچى تۈسۈك-چارىلەر قوللىنىلدى. بۇنىڭ ئۈچۈن:

ئىچكى جەھەتتە شەرىپتى بىنەپشە، شەرىپتى نىيلۇفەرلەر ئىچكۈزۈلدى. سېمىز ئوت ئۇرۇقى، ئىسبەغۇل ئۇرۇقى قاتارلىقلارنىڭ شىرسىنى چىقىرىپ سىركەنجىبىن بىلەن بىرلىكتە ئىچىنىمۇ بولىدۇ ياكى ئەتىگەندە يېھى ئۇرۇقى، سېمىز ئوت ئۇرۇقى، يۇمىغاقسۈت ئۇرۇقلىرىنىڭ ھەر بىرىدىن 3 گرام ئېلىپ لۇئايى (شىرسى) نى چىقىرىپ، 50 گرام چىلان شەرىپتى بىلەن ئىچكۈزۈلدى. چۈشتە چىلان شىرسى بىلەن تەييارلانغان خېمىرى ئەبىرىسىدىن 5 گرام ياكى جەۋھىرات سېلىنغان خېمىرى گاۋزەباندىن 5 گرام ياكى جەۋھىرلىق مارجان قۇرسىدىن 1 تال ئىچكۈزۈلدى.

تاشقى جەھەتتە قاپاق مېغىزى يېغى، بىنەپشە يېغى، قىز تۇغقان ئايال سۈتى قاتارلىقلار بىلەن چېكىنى ياغلاش، بۇرۇنغا تېمىتىش كېرەك. ئاق سەندەلنى گۈلابقا چىلاپ پىشانغا قويسۇمۇ بولىدۇ. قايماقنى پات-پات بېشىغا سۈركىسىمۇ بولىدۇ. قاپاق مېغىزى يېغى، گۈل يېغىنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ بۇرۇنغا تېمىتىسىمۇ بولىدۇ. ئەفۇن قوشۇلغان شىپايى ئەيەز ياكى بوزۇرى كافۇرىي ياكى كۆھلى كافۇرىيدىن بىرىنى كۆزگە سۈرمە قىلىپ تارتىش كېرەك. تۆۋەنكى سۈرمىنى كۆزگە تارتىسىمۇ بولىدۇ: سىماق تالقىنى 3 گرام، قارا سۈرمە 3 گرام، كافۇردىن 3 گرام ئېلىپ ئېھتىياجغا لايىق گۈلابقا چىلاپ تەييارلىنىدۇ. تۈنىڭدىن باشقا ئىسسىق سۇ بىلەن باشنى بۇيۇش ۋە ھورداش لازىم.

ئوزۇقلىنىش جەھەتتە، كۆزنىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرىدىغان يېمەكلىكلەردىن قورداق، كالىلا-پاقالچەك، سېمىز كالا گۆشى قاتارلىقلارنى ئىستېمال قىلىش كېرەك. قۇۋۋىتى تۆۋەن، تەستە سىڭىدىغان غەلىز تاماقلاردىن، تۇزلۇق، ئاچچىق يېمەكلىكلەردىن پەرھىز قىلىش كېرەك.

ھاراق ئىچىش، تاماكا چېكىش، كۆپ جىنسىي ئالاقە قىلىش، غەم-قايغۇ ۋە باشقا روھىي ئامىللاردىن، كۈن ئۆرى ئاستىدا، ئىسسىق ھاۋالىق مۇھىتتا ئۇزاق تۇرۇش ۋە ئىشلەپ چارچاشتىن ساقلىنىش لازىم.



## كۆزنىڭ يورۇقلۇقتىن قېچىشى

كۆزنىڭ يورۇقلۇقتىن قېچىشى (خەفەش، بوغزۇلكەينى) ئاغرىقلار كۈن تۈرى ۋە چىراقلىرىغا قارىيالماسلىقىغا قارىتىلغان بولۇپ، كۆپىنچە بالىلاردا كۆپرەك ئۇچرايدۇ. ئۇ تۇغما (بىرلەمچى) ۋە كېيىن پەيدا بولغان (ئىككىلەمچى) دەپ 2 خىلغا ئايرىلىدۇ.

سەۋەبى

1. تۇغما خاراكتېرىدىكىسىدە ھامىلىگە ئانا قورسىقىدىكى چېغىدىلا بەزى ئوزۇقلۇقلار يېتىشمەسلىك ياكى كۆز قۇۋۋىتىنى ئاجىزلاشتۇرىدىغان بەزى ئامىللار ئاندا پەيدا بولۇپ، ھامىلە كۆزنىڭ مۇڭگۈز پەردىسى ۋە ئۈزۈمسىمان پەردىلىرى تولۇق تەرەققىي قىلالماي نورمالسىز تۇغۇلۇپ قېلىش ياكى كۆز تۇخۇم ئېقىسىمان سۇيۇقلۇق نورمالسىز (بەك سۇيۇق ۋە ئاق) پېتى تۇغۇلۇپ قېلىش سەۋەبىدىن كۆزنىڭ كۆرۈش كۈچى ئاجىزلىشىپ تۇردىن قاچىدىغان بولۇپ قالىدۇ.

2. كېيىن پەيدا بولغان خاراكتېرىدىكىسىدە خىلىتلارنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشلىرى تۈپەيلىدىن كۆزنىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتىگە سۇيۇقلۇقلارنىڭ قويۇلۇش-سۇيۇلۇش ئەھۋاللىرى تەسىر قىلىشى ياكى كۆزگە ئۆتكۈر ئىسسىقلىق ۋە سوغۇقلۇقلارنىڭ تەسىر قىلىشى، باشقا كېسەللەرگە سەۋەبچى بولغان ئامىللارنىڭ كۆزگە تەسىر قىلغانلىقى تۈپەيلىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامىتى

كۆزنى سىرتتىن قاراپ تەكشۈرگەندە گەرچە غەيرىي ئۆزگىرىشلەر بولمىسىمۇ، لېكىن ئاغرىق كۈندۈزى كۈن تۇرىغا، ئاخشىمى چىراققا قاراشتىن ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە قاچىدۇ. نۇر كۈچى ۋە يورۇقلۇق قانچە كۈچلۈك بولسا، كۆزنىڭ تۇردىن قېچىشى شۇنچە ئېغىر بولىدۇ ھەمدە كۆزى چىمىلداپ كۆزنى چوڭ ئېچىپ قارىيالمىدۇ، كۆز تورلىشىدۇ. بەگگىل دەرىجىدە ئېچىشىپ، قادىلىپ ئاغرىش، ياش ئېقىش





قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلدى. ئەمما قاراڭغۇراق، نۇرسىز جايلاردا، ھاۋا تۇتۇق كۈنلەردە كۆزنىڭ كۆرۈش خىزمىتى نورمال بولىدۇ، باشقا تۈزگىرىشلەر بولمايدۇ.

### داۋاسى

ئوغما خاراكتېرىدىكىسىنى داۋالاپ ساقايتىش تەسرەك. شۇڭا ئۆز ھالىتىنى ساقلاپ قېلىشقا چارە قىلىش، كۈن نۇرىدىن ساقلىنىدىغان رەڭدار ئەينەك تاقاش، كۆزنى كۈچلەندۈرگۈچى ئۆسۈل-چارىلەرنى قوللىنىپ تۇرۇش لازىم. مەسلەن، ھەببى شەببىار، ھەببى قوقيا، ئىتريفىلى بادىيان، مەئجۇنى ۋە ج قاتارلىقلارنى ئەھۋالغا قاراپ تاللاپ ئىشلەتسە بولىدۇ. كېيىن پەيدا بولغان خاراكتېرىدىكىسىنى داۋالاشتا قايسى خىلىنىڭ نورمالسىزلىقىدىن بولغانلىقىنى ئېنىقلاپ تازىلاش، تەكشۈش ئېلىپ بېرىش، سەۋەبچى ئامىللارنى تۈگىتىشكە ئامال قىلىش، كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى كېسەللەرنى داۋالاش لازىم. كېسەلنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالغا قاراپ ھەببى ئىيارەج، ئىتريفىلى بادىيان، مەتبۇخى ھەلىيلە، تۇتىيا قاتارلىقلارنى تاللاپ ئىشلەتسە بولىدۇ. مېڭىنى كۈچەيتكۈچى تاماقلارنى ئىستېمال قىلىش، قاتتىق ھەرىكەت ۋە زىيادە جىنسى ئالاقە قىلىشتىن ساقلىنىش كېرەك.

## كۆزنىڭ نۇر يىغالماسلىقى

كۆزنىڭ نۇر يىغالماسلىقى (ئىتتىشارۋىيە سەرى) ئىچكى، تاشقى سەۋەبلەرنىڭ ئەكس تەسىرى تۈپەيلىدىن كۆز ئەزالىرىنىڭ بولۇپمۇ پەردە ۋە قارىچۇقلارنىڭ خىزمىتى بۇزۇلۇپ، كۆز نۇرى چېچىلىپ كۆزنىڭ نەرسىلەر شەكلىنى نورمال كۆرەلمەس بولۇپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان.

### سەۋەبى

كۆزگە سىرتتىن بىر نەرسە تېگىش، كۆزگە جاراھەت چىقىش، ئىگىز جايدىن يىقىلىش قاتارلىق سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن تور پەردە بۇزۇلۇپ كۆز نۇر يىغالمى نورمال





كۆرمەسىلىك، بەزىدە ئۈزۈمسىمان پەردىنىڭ تۇر تۇتۇش تۈشۈكى يەنى قارىچۇقى كېڭىيىش كۈچەيگەندە نۇر مەركەزدىن يىراقلىشىپ كۆزنىڭ نۇر يىغالماسلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

### ئالامىتى

كېسەللەنگەن كۆزنىڭ ئالدىغا بىر كىشى يېقىن كېلىپ تۇز قارسا، بىمارنىڭ كۆزىدە قارىغۇچى كىشىنىڭ تەسۋىرى كۆرۈنمەيدۇ. كۆزنى قاراپ تەكشۈرگەندە كۆزگە چاڭ-توزان قونغاندەك كۆز قارىسى دۇغلىشىپ قالىدۇ. باشقا ئالاھىدە بەلگىلەر كۆرۈلمەيدۇ.

### داۋاسى

كېسەل يېڭى باشلانغان ياكى كېسەللىك ئەھۋالى يەڭگىلەرەك بولسا، سەۋەبىچى ئامىلغا قاراپ داۋالاش ئېلىپ بارسا بولىدۇ.

ئەگەر كېسەل كونارغان ياكى كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىرراق بولسا دورا بىلەن داۋالاپ ساقايتىش قىيىن. شۇڭا ئەڭ ياخشىسى چېچىلىغان نۇرنىڭ دەرىجىسىگە ماسلاشتۇرۇپ مۇۋاپىق كۆزەينەك تاقاش لازىم. كۆزگە تېمىتىش ۋە باشقا سۈرۈش ئۈچۈن ئېشەك سۈتى ئىشلەتسە بولىدۇ. ئىسكەنجىبىن ساددە ئىچكۈزۈلىدۇ. چۈجىنىڭ گۆشى ۋە چالا پىشۇرۇلغان توخۇم ئىستېمال قىلىش ناھايىتى مەنپەئەتلىك.

## ئۈزۈمسىمان پەردىنىڭ چىقىپ قېلىشى

ئۈزۈمسىمان پەردىنىڭ چىقىپ قېلىشى (مۇرسەرەج) سىرتقى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن كۆز مۇڭگۈز پەردىسىنىڭ يىرتىلىپ بالا ھەمراھسىمان پەردىنىڭ ئالدى قىسمى بولغان ئۈزۈمسىمان پەردە يەنى رەڭدار پەردىنىڭ سىرتقا پولىتىپ ئۈزۈمدەك چىقىپ قالغانلىقىغا قارىتىلىدۇ. بۇنىڭدا كۆز ھېچ نەرسىنى كۆرمەس بولۇپ قالىدۇ.



## سەۋەبى

كۆزنىڭ مۇڭگۈز پەردىسىگە بىر نەرسە تېگىش، سانجىلىپ كېتىش، ھەرخىل يىرىڭلىق جاراھەتلەر چىقىشتەك سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن مەزكۇر پەردە يىرتىلىپ كۆزنى قارا قىلىپ كۆرسىتىپ تۇرغان پەردىلەر ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە ئۈزۈمدەك پولىتىپ چىقىدۇ.

## ئالامىتى

مۇڭگۈز پەردە بىر قەدەر ئېغىرراق دەرىجىدە يىرتىلغان بولۇپ، ئۈزۈمسىمان پەردە پولىتىپ چىقىپ قالغانلىقىنى ئادەتتىكى كۆز بىلەن كۆرگىلى بولىدۇ. يېڭى ۋاقتىدا كۆزدە قىزىرىش، ئىشىشىش، ئاغرىشتەك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. كوناغاندا بۇ ئالامەتلەر ئاساسەن بولمايدۇ. لېكىن كۆز قارىسى كىچىكلەپ بىر تەرەپكە مايىل بولۇپ قېلىپ، كۆز ھېچ نەرسىنى كۆرمەس بولۇپ قالىدۇ.

## داۋاسى

مەزكۇر كېسەلنى يېڭى ۋاقتىدىلا تېزلىك بىلەن غەربچە داۋالاش دوختۇرخانىلىرىنىڭ كۆز بۆلۈمىگە ئاپىرىپ كۆرسىتىپ داۋالاش لازىم. شارائىت يار بەرمىگەن جايلاردا ئاغرىقنى ھەرىكەت قىلدۇرماي تىنچ ئارام ئالدۇرۇش بىلەن بىرگە جاراھەتنى پۈتتۈرگۈچى چارىلەرنى قىلىش لازىم. كۆز قارىسىنىڭ يىرىلىشىنى داۋالغاندىكى چارىلەرنى قوللانسا بولىدۇ.

كېسەل كوناغان بولسا، يىرتىلغان پەردىلەرنىڭ چۆرىسى قېلىنلىشىپ قېلىپ كۆزدە قىزىرىش، ئاغرىش بولمايدۇ ھەمدە داۋالاشمۇ قىيىنغا توختايدۇ. بۇ مەزگىلدە كېسەلنىڭ نەزەققىي قىلىپ كۈچىيىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن كۆھلى ئىكسىرىن تۇسخىنى تەييارلاپ كۆزگە تارتىش لازىم.

## كۆھلى ئىكسىرىن

سۈرمە ئىسپھانى، ئىقلىمىيائى تۇقرە ھەر بىرى 10.8 گرام، بىخ مارجان، سازەج



ھىندى ھەر بىرى 2.7 گرام، مەرۋايىت، زەئەفر ھەر بىرى 1.4 گرام، ئېپار 0.65 گرام. دورىلارنى يۇمشاق ئېزىپ، سالاھىيە قىلغاندىن كېيىن ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ پاكىز شېشە قۇتىغا ئېلىپ ساقلاب قويۇلدى.

بىر گرام دورىنى بىر تۇخۇمنىڭ ئېقىغا ئارىلاشتۇرۇپ كۈنگە 2 قېتىم چېپىش لازىم.

بىمارنىڭ يېمەك-ئىچمەكنى ياخشى ئورۇنلاشتۇرۇش بىلەن بىرگە بىمارنى ئوڭدىسىغا ياتقۇزۇپ ئارام ئالدىرۇش، ئوخلاتىش كېرەك. بەك تويۇنۇپ غىزالانماسلىق، يەللىك تاماقلاردىن پەرھىز تۇتۇش، باشنى تۈۋەنگە ئېگىشتۈرۈش، يۆتىلىش، چۈشكۈرۈش ۋە قەي قىلىشنى ساقلىنىش لازىم. كۆز ئەتراپى مۇسكۇللىرى بوشىشىپ كەتكەندىن پەيدا بولغان بولسا ئىيارەجلەر بىلەن تەنقىيە قىلغاندىن كېيىن سېرىق ھەلىلە ياكى پىياز سۈيىگە ئوخشاش ياش ئاققۇزغۇچى دورىلارنى كۆزگە تارتىش كېرەك. شۇنىڭدەك كۆندۈش، جۇندى بىدەستور، قىچا، پىلپىل، مەرزەنجۇش قاتارلىق ئۆتكۈر پۇراقلىق دورىلار پۇرتىلىدۇ. قاندىن بولغان بولسا ئالدى بىلەن مۇۋاپىق تېپىلسا قان ئېلىپ بولغاندىن كېيىن مەتبۇخى شاھتەررەنى ئىستېمال قىلدۇرسا بولىدۇ. ئاغرىق ئاپتاپتا كىتاب كۆرۈش ۋە مۇنچىغا چۈشۈشتىن ساقلىنىشى كېرەك.

## كۆز قارىچۇقىنىڭ كېڭىيىشى

كۆز قارىچۇقىنىڭ كېڭىيىشى (ئىتسىئاتىئولمۇجەۋۋەفى) ھەر خىل ئىچكى ۋە تاشقى سەۋەبلەرنىڭ كۆزگە يامان تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىققان كۆز قارىچۇقىنىڭ غەيرىي نورمال ھالدا كېڭىيىپ كەتكەنلىكىگە قارىتىلغان. بۇنىڭدا كۆز نەرسىلەرنى ئوچۇق كۆرەلمەس بولۇپ قالىدۇ. كۆز قارىچۇقى نورمال ھالدا كېڭىيىش ۋە تارىيىش ئارقىلىق نۇرلارنىڭ كۆز ئىچكى قىسمىغا نورمال مىقداردا كىرىشىنى تەمىن ئېتىدۇ ھەمدە كۆزنىڭ نورمال كۆرۈش خىزمىتىگە ئوڭايلىق تۇغدۇرۇپ بېرىدۇ. كۆز قارىچۇقىنىڭ غەيرىي نورمال ھالدا كېڭىيىپ كېتىشى تۈۋەندىكىدەك بىر قاتار سەۋەبلەردىن كېلىپ چىقىدۇ:

1. مېگە پەردە ياللۇغى (سەرسام) نىڭ ئاسارەت قىلىش، 2. باش ساھەسىگە زەرىيە تېگىش، 3. مېگە-كۆز تومۇرلىرى چىڭقىلىدىغان، كۆز ئىچكى يېسىمى ئېشىپ





كېتىدىغان كونا باش ئاغرىقى، شەققە كېسەللىكلىرى ئۇزاق داۋاملىشىش، 4. كۆزنى ھەرىكەتلەندۈرگۈچى ئەسەبلەر پالەجلىنىش، 5. كۆز رەڭدار پەردىسىنى تارايىتىۋېتىدىغان تەشەننۇج يۈز بېرىش ياكى ئەسەبىي شىركىي يۇقىرى دەرىجىدە پائالىيەتچانلىشىش، 6. يۇلتۇندىكى قارىچۇقنى ئىدارە قىلغۇچى ئەسەب مەركىزىنىڭ زەخمىگە ئۇچرىشى، 7. قارىچۇقنى كېڭەيتىۋېتىدىغان جەۋزى ماسلىغا ئوخشاش دورىلارنى ئۇزاق مۇددەت ئىستېمال قىلىش، 8. بۇزۇق خىلىت ھەم يەللەرنىڭ ئۈزۈمىسىمان پەردە ۋە كۆرۈش ئەسەبلىرى ئەتراپىغا يامان تەسىر قىلىشى قاتارلىق سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن كۆز قارىچۇقى بەك ئارتۇقچە ياكى كېسەللىك خۇسۇسىيەتتە كېڭىيىپ كېتىدۇ.

### ئالامىتى

ئادەتتە سىرتقى جەھەتتە بىر قاراپلا قارىچۇقنىڭ كېڭەيگەنلىكىنى سەزگىلى بولمايدۇ. سىنچىلاپ قارىغاندىلا قارىچۇقنىڭ كېڭىيىپ كەتكەنلىكىنى بايقىغىلى بولىدۇ. ئاغرىق كۆزى خىرەلەشكەنلىكى، نەرسىلەرنى ئوچۇق كۆرەلمەيۋاتقانلىقى، بىرەر نەرسىگە قاتتىق تىكىلىپ زەڭ سېلىپ قارىغاندىلا ئۇنىڭ شەكلىنى قارامتۇل بىر نەرسە ھالىتىدە پەرق ئېتەلەيدىغانلىقى، ئەمما ئوچۇق كۆرەلمەيدىغانلىقىدىن شىكايەت قىلىدۇ. قارىچۇققا تۇر تەسىر قىلسا قارىچۇقنىڭ تارىيىشى كۆرۈنەرلىك بولمايدۇ ياكى تارايمايدۇ. ئەگەر بەزى سەۋەبلىرى يوقىتىلسا ياكى يوقسا كۆرۈش بىر قەدەر ئەسلىگە كېلىشى مۇمكىن. لېكىن ۋاقىت ئۇزارغانسېرى كېسەللىك ئەھۋالى تەدرىجىي ئېغىرلىشىدۇ.

### داۋاسى

بۇ كېسەللىك يېڭى بولسا، ئەسلىي سەۋەبىگە قاراپ داۋالاش ئېلىپ بېرىش بىلەن بىرگە كۆز قارىچۇقنىڭ تارىيىش خىزمىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە تىرىشىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن ئاساسلىق مېڭە ۋە ئەسەبلەردىكى كېسەللىك تۈزگىرىشلىرىنى داۋالاش، قارىچۇقنى تارايىتقۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش كېرەك. شىياڧى مىرراتىنى كۆزگە تارتىش كېرەك. شىياڧى ئەيەزنىڭ بەلگىلىك داۋالاش ئۈنۈمى بار. ئۈنۈم كۆرۈلمىسە كېسەللىكنى شۇ ھالىتىدە ساقلاشقا چارە قىلىش كېرەك. تۇرۇلۇش-سوقۇلۇشتىن پەيدا بولغان بولسا مېۋىلەر سۈيى بىلەن تەبىئەتنى يۇمشىتىش لازىم. ئەگەر ھۆللۈكنىڭ كۆپلۈكىدىن ۋە بەدەندە قاننىڭ زىيادىلىكىدىن بولسا ئالدى بىلەن قان ئېلىپ، ئاندىن







بەدەن ئەھۋالىغا ئاساسەن مۇۋاپىق ھالدا بەلغەم مۇنزىجى بېرىپ، ئارقىدىن ھەببى ئىيارەج ئىچكۈزسە بولىدۇ.

## كۆز قارىچۇقىنىڭ تارىيىشى

كۆز قارىچۇقىنىڭ تارىيىشى (زەيىقى سوقبەئى ئىنەبىيە) كۆزنىڭ ئۈزۈمىسمان پەردىسىدىن ھاسىل بولغان نۇر ئۆتكۈزۈش تۈشۈكى — قارىچۇقىنىڭ تارىيىپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان بولۇپ، ئۇ ئىككى خىل بولىدۇ. بىرى توغما خاراكىتىلىك، يەنە بىرى كېيىن پەيدا بولغان خاراكىتىلىك بولىدۇ. توغما خاراكىتىلىك بولغىنى شۇ ئەھۋالغا كۆنگەن بولىدۇ. گەرچە ئۇنىڭ كۆرۈشكە تەسىرى ئازراق، خەتىرى ئانچە چوڭ بولمىسىمۇ داۋالاش قىيىنراق.

كېيىن پەيدا بولغانلىرى ھەر خىل ئىچكى ۋە تاشقى سەۋەبلەرنىڭ كۆزگە يامان تەسىر قىلىشىدىن كېلىپ چىققان بولۇپ، تەرەققىي قىلىش ئەھۋالىغا ئاساسەن كۆزنىڭ كۆرۈش ئىقتىدارىغا ئوخشىمىغان دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىدۇ.

### سەۋەبى

كېيىن پەيدا بولغان كۆز قارىچۇقى تارىيىشنىڭ ئومۇمىي سەۋەبلىرى ئاساسلىق تۆۋەندىكىچە:

كۆز پەردىلىرىنىڭ ھەر خىل ئىششىقلىرى، نورمالسىز ھۆلۈك ياكى قۇرۇقلۇقلارنىڭ كۆز ئۈزۈمىسمان پەردىسىگە يامان تەسىر قىلىپ ئۇنى بىر تەرەپكە مايىل قىلىپ قويۇشى؛ نورمالسىز قويۇق خىلتلارنىڭ قارىچۇق ئەتراپىغا يىغىلىپ قېلىشى قاتارلىقلاردىن كېلىپ چىقىدۇ.

كونكرېت سەۋەبلىرى ئاساسلىق تۆۋەندىكىچە:

1. قارىچۇقنى كېڭەيتىش - تارايىتقۇچى تارامۇشلارنىڭ تەشەنۈجلىنىشى،
2. يولۇندىكى مۇناسىۋەتلىك نېرۋا مەركىزىنىڭ
3. قارىچۇق تارامۇشلىرىنى تارايىتقۇچى دورىلارنى ئۇزۇن مۇددەت ئىستېمال قىلىش،
4. كۆز قارىچۇقىغا بەك قۇرۇقلۇق يەتكەنلىكتىن كېلىپ چىقىدۇ.



## ئالامىتى

ئەگەر كۆز ئىششىقلىرىنىڭ تەسىرىدىن بولسا كۆز چىڭقىلىپ ئاغرىش، كۆز قانلىق پەسكە قارىيالماسلىق، باش ئاغرىشلار بولىدۇ.  
ئەگەر ھۆلۈك ئېشىپ كېتىشتىن بولسا كۆز قارىچۇقى بىر تەرەپكە مايىل بولۇپ قېلىپ، كۆزدىن كۆپلەپ ياش ئاقىدۇ ھەمدە ھۆلۈك ئېشىپ كەتكەنلىكىنىڭ باشقا بەلگىلىرىمۇ كۆرۈلىدۇ.  
قۇرۇقلۇقتىن بولغان بولسا كۆز بىر ئاز قىسىلىپ، باش ئاغرىيدۇ. كۆزدىن ياش چىقمايدۇ. ئاغرىقنىڭ ئويۇسى كەم بولىدۇ.  
ئەگەر نورمالسىز قويۇق خىلىتىن بولسا، كۆز دۇغلىشىپ تەدرىجىي ھالدا كۆز قارىچۇقىدا روشەن كۆرگىلى بولمايدىغان پەردە ھاسىل بولىدۇ.

## داۋاسى

ۋاقتىدا داۋالاش كېرەك، بولمىسا ئاخىرى مەزكۇر تۆشۈكنىڭ پۈتۈنلەي توسۇلۇپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.  
ھۆلۈك، قۇرۇقلۇق ياكى قويۇق خىلىتىن بولغانلارغا. ئالدى بىلەن تۈزىگە خاس خىلىتىنى يۇمشاتقۇچى، تازىلاپ تەڭشىگۈچى دورىلارنى ئىشلىتىش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن ئالدى بىلەن مەتبۇخى ھەلىلە ئىشلەتكەندىن كېيىن ھەببى قوقيا قاتارلىق تازىلىغۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش كېرەك.  
ئەگەر قۇرۇقلۇقتىن بولسا، ئالدى بىلەن كېسەلنىڭ مىراجىنى ھۆللەشتۈرگۈچى دورىلارنى ئىشلىتىش لازىم. بۇنىڭدا ئىچكى تەرەپتىن سەپشە شەرىپتى، ئارپا سۈيى ئىچكىكۈزۈش، سىرتقى جەھەتتىن بادام يېغى، قاپاق يېغى قاتارلىقلار بىلەن چېكىنى ياغلاش، قىز تۇغقان ئايالنىڭ سۈتىنى كۆزگە تېمىتىش لازىم.  
زانكار، ئۈشەقنىڭ ھەر بىرىدىن بىر ھەسسە، زەئفەردىن بىر ھەسسە، سەبرىدىن 5 ھەسسە، ئىپاردىن بىر ھەسسە ئېلىپ، يۇمشاق يانچىپ سالايە قىلىپ شىياف تەييارلاپ ئىشلەتسە بولىدۇ.



## كۆزگە سۇ چۈشۈش

كۆزگە سۇ چۈشۈش (ئۇزۇلۇماك) كۆز گۆھرىنىڭ سۈزۈكلۈكتىن دۇغلاشقان ھالەتكە ئۆزگىرىپ، كۆرۈشنىڭ تەدرىجىي ھالدا قىسمەن ياكى پۈتۈنلەي توسۇلغانلىقىغا قارىتىلغان.

كۆز گۆھرى يەنى قىروسىمان سۇيۇقلۇق قىيى (غىلافى روتوبەتى جەلدىيە) ئىچىدە قىروسىمان كىرىستال سۇيۇقلۇق (روتوبەتى جەلدىيە) بار بولۇپ، ئۇ سۈزۈك، پارقراق، نۇر تۆتكۈزۈپان كېلىدۇ. ئۇنىڭدا ئادەتتە ۋەرەملىنىش بولمايدۇ. ئۇنىڭ ئاساسلىق كېسەللىكى سۈزۈكلۈكتىن كۆپىنچە مەرۋايىت رەڭگىگە ئوخشاش دۇغلاشقان ھالەتكە ئۆزگىرىپ، كۆرۈشكە دەخلى يەتكۈزگەنلىكتىن ئىبارەت بولىدۇ. بۇ، كۆزگە سۇ چۈشۈش دەپ ئاتىلىدۇ.

مەزكۇر كېسەل كۆپىنچە، ياشانغانلىقتىن كۆزگە سۇ چۈشۈش، تۇغما خاراكتېرلىك كۆزگە سۇ چۈشۈش، باشقا كېسەللەر شېرىكلىكىدىن بولغان كۆزگە سۇ چۈشۈشتىن ئىبارەت 3 خىل بولىدۇ.

### سەۋەبى

1. ياشانغانلىقتىن كۆزگە سۇ چۈشۈشنىڭ سەۋەبى:  
بەزى ياشانغان كىشىلەردە مەلۇم خىلدىكى ماددا ئالمىشىش ئاجىزلاشقانلىقتىن كۆز گۆھرىنىڭ ئوزۇقلىنىشى تەسىرگە ئۇچراپ، كۆز گۆھرى سۇيۇقلۇقىنىڭ سۈزۈكلۈكى پەيدىنپەي دۇغلۇققا ئۆزگىرىدۇ.
2. تۇغما خاراكتېرلىك سۇ چۈشۈشنىڭ سەۋەبى:  
بۇنىڭدا، بالا قورساقتىكى چاغدا ھامىلىنىڭ كۆز گۆھرى ناچار تەسىرلەرگە ئۇچرىغانلىقى ئاساسلىق سەۋەب بولىدۇ ياكى ئاتا-ئانىدىكى ئىرىسىيەت ئامىللىرى بىلەن باغلىنىشلىق بولۇشىمۇ مۇمكىن.
3. باشقا كېسەللەر شېرىكچىلىكىدىن بولغان كۆزگە سۇ چۈشۈشنىڭ سەۋەبى:  
كۆز ئۈزۈمىسىمان پەردىسى (تەبەقە ئىسەبىيە) يەنى رەڭدار پەردە ۋە ئۇنىڭغا قوشۇمچە



## ئالامىتى

بولغان قىسىملارنىڭ ۋەرەملىنىشىگە ئوخشاش كېسەللەر كۆز ئىچىنىڭ ئوزۇقلىنىش ئەھۋالىنى ئۆزگەرتىپ كۆز گۆھرىنىڭ نورمال خىزمىتىگە تەسىر يەتكۈزگەنلىكىدىن بولىدۇ.

1. ياشانغانلىقتىن كۆزگە سۇ چۈشۈشتە: كۆزنىڭ سىرتقى كۆرۈنۈشىنىڭ تەدرىجىي دۇغلىشىشىغا ئەگىشىپ، كۆرۈش كۈچى پەيدىنپەي ئاجىزلىشىدۇ. كۆزگە چۈشكەن سۇ كۆرۈنەرلىك تەرەققىي قىلغاندىن كېيىن قارىچۇق كۆلرەڭ ئاق رەڭگە كىرىدۇ. بۇ چاغدا كۆرۈش كۈچى زور دەرىجىدە ئاجىزلايدۇ ھەتتا پۈتۈنلەي كۆرمەس بولۇپ قالىدۇ. بەدەن زەئىپلىشىشتىن سىرت باشقا كۆز كېسەللىكلەرنىڭ ئالامەتلىرى بولمايدۇ.

2. تۇغما خاراكىتىرلىك كۆزگە سۇ چۈشۈشتە: كۆزگە چۈشكەن سۇ كۆپىنچە دائىرىلىك، چەكلىك بولىدۇ. داۋاملىق كېڭەيمەيدۇ. كۆرۈش كۈچىگە بولغان تەسىرى ئونىڭ چوڭ-كىچىكلىكى، قويۇق-سۇيۇقلۇقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ.

مقدار جەھەتتە، سۇ جىقراق چۈشسە قارىچۇقنى پۈتۈنلەي توسۇۋالىدۇ. كۆز ھېچ نەرسىنى كۆرمەس بولۇپ قالىدۇ. چۈشكەن سۇ ئازراق بولسا قارىچۇقنىڭ بىر تەرىپى توسۇلمايدۇ. توسۇلمىغان تەرەپتىكى نەرسىلەرنى كۆرۈپ، توسۇلغان تەرەپتىكى نەرسىلەرنى كۆرەلمەيدۇ. نەرسىلەرنىڭ يېرىمىنى ياكى بىر قىسمىنى كۆرۈپ، قالغىنىنى كۆرەلمەيدۇ. باشنى ئايلاندۇرسا كۆرەلىشى مۇمكىن. بەزىدە نەرسىلەرنى بىر قېتىم تولۇق كۆرۈپ، يەنە بىر قېتىمدا تولۇق كۆرەلمەيدۇ. بەزىدە كۆزگە چۈشكەن سۇ قارىچۇقنىڭ يۇقىرى تەرىپىدە بولسا كۆز ئاسىنى تەرەپتىكى نەرسىلەرنى كۆرۈپ، ئۈستى تەرەپتىكى نەرسىلەرنى كۆرمەيدۇ. سۇ قارىچۇقنىڭ دەل ئوتتۇرىسىدا بولۇپ چۆرىسى ئوچۇق قالسا، نەرسىلەرنىڭ ئەتراپى كۆرۈنۈپ ئوتتۇرىسى كۆرۈنمەيدۇ. بىمارغا ئۇ يەردە بىر قاراڭغۇلۇق باردەك بىلىنىدۇ. قويۇق-سۇيۇقلۇقى جەھەتتە، چۈشكەن سۇ سۇيۇق ۋە سۈزۈك بولسا ئۇنى توسمايدۇ، كۆرۈشكە بولغان تەسىرىمۇ تۆۋەنرەك بولىدۇ. قويۇق بولسا ئۇنى توسايدۇ، كۆرۈشكە تەسىر يەتكۈزىدۇ. بەزىلەرنىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسى ناھايىتى قاتتىق بولۇپ، سۇ چۈشكەن دائىرىدىن چىقىپ كەتكەن بولىدۇ.

رەڭ جەھەتتە، چۈشكەن سۇنىڭ رەڭگى كۆپىنچە مەرۋايىت رەڭگىدە بولىدۇ. بەزىلىرى ئاق گەج رەڭگىدە كۆكۈش رەڭدە ۋە باشقا رەڭلەردە بولىدۇ.

3. باشقا كېسەللەر شېرىكچىلىكىدىن بولغان كۆزگە سۇ چۈشۈشتە: ئوخشاشلا



يۇقىرىقى ئالامەتلەر كۆپىنچە ئورتاق كۆرۈلىدۇ. ئەسلىي كېسەلنىڭ دەرىجىسىگە قاراپ ئېغىرلىق دەرىجىسى بەلگىلىنىشى ياكى ئېغىر بولىدۇ.

مەيلى قايسى خىلدىكى كۆزگە سۇ چۈشۈش بولمىسۇن دەسلەپكى مەزگىلدە سەۋەبى ئېنىق بولمىغان ھالدا كۆزگە كۆمۈت، پاشىغا ئوخشاش نەرسىلەر ئۇچقاندەك كۆرۈنىدۇ. لېكىن بۇلارنىڭ تۈز ئالدىغا بەلگىلىك پەرقى بار.

سېلىشتۇرما تەشخىسى

كۆزگە سۇ چۈشۈش بىلەن كۆزگە كۆمۈت، پاشىغا ئوخشاش نەرسىلەر ئۇچقاندەك كۆرۈنۈش (خىيالات) كېسەللىكىنىڭ پەرقى تۆۋەندىكىچە:

1. كۆزگە سۇ چۈشۈشتە بىر كۆزنى يۇمغاندا يەنە بىر كۆزنىڭ قارىچۇقى كېڭىيىدۇ. كۆزگە كۆمۈت، پاشىغا ئوخشاش نەرسىلەر ئۇچقاندەك كۆرۈنۈشتە قارىچۇق كېڭەيمەيدۇ.
2. كۆزگە كۆمۈت، پاشىغا ئوخشاش نەرسىلەر ئۇچقاندەك كۆرۈنۈش بىر كۆزدە كۆپرەك ئۇچرايدۇ ياكى ئالدى بىلەن بىر كۆزدىن باشلىنىدۇ ياكى بىر كۆزدە ئېغىرراق بولىدۇ. كۆزگە سۇ چۈشۈشتە ئىككىلا كۆزدە كۆپرەك ئۇچرايدۇ.
3. كۆزگە كۆمۈت، پاشىغا ئوخشاش نەرسىلەر ئۇچقاندەك كۆرۈنۈش بارغانسېرى زىيادىلىشىدۇ. يەنى دەسلەپتە پاشىدەك كېيىنچە چىۋىدەك نەرسىلەر كۆرۈنىدۇ.
4. كۆزگە كۆمۈت، پاشىغا ئوخشاش نەرسىلەرنىڭ ئاز ياكى جىق كۆرۈنۈشى مەيدىنىڭ بوش ياكى كۆپكەنلىكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. كۆزگە سۇ چۈشۈشتە مەيدە بىلەن مۇناسىۋىتى بولمايدۇ.
5. كۆزگە سۇ چۈشۈشتە چۈشكەن سۇنىڭ رەڭگىگە قاراپ كۆز مۇناسىپ ھالدا شۇ رەڭدە بولىدۇ. كۆزگە كۆمۈت، پاشىغا ئوخشاش نەرسىلەر ئۇچقاندەك كۆرۈنۈشتە كۆز رەڭگىدە ئۆزگىرىش بولمايدۇ.
6. كۆزگە كۆمۈت، پاشىغا ئوخشاش نەرسىلەر ئۇچقاندەك كۆرۈنۈشتە كۆز رەڭگىدە ئۆزگىرىش بولمايدۇ.
7. كۆزگە كۆمۈت، پاشىغا ئوخشاش نەرسىلەر كۆرۈنۈشتە مۇسەلاتلار (تازىلىغۇچى دورىلار) ۋە ئىيارەجلەر ناھايىتى ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. كۆزگە سۇ چۈشۈشتە بۇ دورىلار نەتىجە بەرمەيدۇ.

داۋاسى

چۈشكەن سۇنىڭ قويۇق خىللىرىدىن شۇنداقلىرى باركى تەدرىجىي ھالدا ناھايىتى





قاتتىقلىشىپ سۇ چۈشۈش دائىرىسىدىن چىقىپ كېتىدۇ ۋە تۇنى داۋالىغىلى بولمايدۇ. گەج رەڭدىكىسىنى، يېشىل ۋە گۆڭگۈرت رەڭلىكلىرىنى، تۇم قارا ۋە سېرىق رەڭدىكىلىرىنى داۋالاشمۇ ھەتتا كېسىپ ئېلىۋېتىشمۇ مۇمكىن ئەمەس. باشقا رەڭدىكىلىرىنى داۋالىغىلى بولىدۇ، بولۇپمۇ سۇيۇق ھەم سۈزۈك خىلدىكىسى داۋالاشنى ئاسان قوبۇل قىلىدۇ.

كۆزگە سۇ چۈشۈش ئىكەنلىكى ئېنىقلانغاندىن كېيىن ماددىنى پىشۇرۇش ئۈچۈن ھەببى زەھەب، تازىلاشقا تۆۋەندىكى ماتىئۇتسۇل بېرىلىدۇ: چىڭسەي يىلتىزى، بادىيان يىلتىزى، بىخ كەبىر ھەر بىرى 30 گرام، رۇم بادىيان، چىڭسەي تۇرۇقى ھەر بىرى 6 گرام، قەنتەريۇن 9 گرام.

دورىلارنى چالا سوقۇپ، بىر كېچە سۇغا چىلاپ قويۇلىدۇ. ئەتىسى 2 لىتر سۇ بىلەن قاينىتىپ يېرىمى قالغاندا سۈزۈۋېلىپ، 120 گرام گۈلۈقەنت قوشۇلىدۇ. كۈنگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 5 قوشۇقتىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ ھەمدە ھەببى زەھەب، ھەببى شەبىيار، ئىيارەجى فەيقرە، ئىترىفېلى كەشنىزەلەر تۇزاق مۇددەت ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئەمما بۇ خىل دورىلارنى بەرگەندە ئاغرىقنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالىنى نەزەرگە ئېلىش لازىم. سۈرگە دورىلىرىنى بەك كۈچلۈك ياكى ئارتۇق بەرگەندە زەرەر كەلتۈرۈشى مۇمكىن. مۇۋاپىق كەلگەندە قان ئېلىش، بولۇپمۇ قۇلاق ئارقا نومۇرىدىن قان ئېلىشنى ئويلىشىپ كۆرۈش كېرەك.

سۇ چۈشۈپ تاماملانغاندا كۆز پۈتۈنلەي كۆرمەيدۇ. بۇنىڭ ئەڭ ياخشى داۋاسى پەقەت دەستىكارلىق يولى بىلەن داۋالاشتىن ئىبارەت. ھازىرقى زامان تىبابەتچىلىكىمۇ ئوپېراتسىيە ئوسۇلى بىلەن مەزكۇر كېسەلنى داۋالايدۇ. ئادەتتە، كۆزگە سۇ چۈشۈش كېسىلى ئىكەنلىكى بېكىتىلگەن ھامان كېسەللىك باشلىنىشتىلا تەدبىر قىلىش لازىم، شۇندىلا ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. كۆزگە چۈشكەن سۇنىڭ ۋاقتى تۈزىراپ قېتىشىپ قالسا، قەدەھ ئوسۇلى بىلەن بىر تەرەپ قىلىپ داۋالاشتىن باشقا ئامال يوق.

### قوشۇمچە: قەدەھ (قدح) ئوسۇلى

قەدەھ ئوسۇلى ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكىنىڭ كۆزگە سۇ چۈشۈش كېسىلىنى جەرراھىيە يولى بىلەن داۋالايدىغان قەدىمكى ئوسۇلى بولۇپ، تۇنى قەدىمكى تىببىي كىتابلاردا «ئەمەلىي قەدەھ ياكى قەدەھ ئوسۇلى»، بۇ ئوسۇلنى قوللىنىپ مەزكۇر كېسەلنى داۋالىغۇچى تېۋېنى «قەدداھ» دەپ ئاتىغان. بۇ ئوسۇل ئارقىلىق كۆز گۆھىرى يەنى





قەدەھ سۇيۇقلۇق قېپى (غىلافى روتۇبەتى جەلدىيە) ئىچىگە چۈشكەن دۇغلاشقان قويۇقراق سۇيۇقلۇقنى بىر تەرەپكە ئىتتىرىش ياكى مەخسۇس ئەسۋاب بىلەن شوراپ چىقىرىش ياكى كېسىپ ئېلىش ئارقىلىق كۆرۈشكە بولغان توسالغۇ يوقىتىلىدۇ. بۇ ئۆسۈل تا ھازىرغىچە بەزى جايلاردا قوللىنىلىدۇ ۋە بۇ ئۆسۈلنى قوللانغۇچى تېۋىپ (قەدداھ) لارمۇ بار.

قەدەھ ئۆسۈلنى قوللىنىدىغان ئاغرىقلاردا تۆۋەندىكى شەرتلەر بولۇشى كېرەك:

1. كۆزگە چۈشكەن سۇ قويۇقراق بولۇشى، بارماق بىلەن باسقاندا ھەر ياققا تارقاپ، باسمىغاندا قايتا يىغىلىدىغان بولۇشى كېرەك.
2. كۆزنىڭ كۆرۈش كۈچى ناچار بولسىمۇ، نۇرغا قارىتا ئىقتىدارى ياخشى بولۇشى يەنى كۈن نۇرى ۋە چىراغ يورۇقىنى ئازراق بولسىمۇ ھېس قىلالايدىغان بولۇشى لازىم. بۇ، كۆزدە باشقا كېسەللىكلەرنىڭ يوقلۇقىنى بىلدۈرىدۇ.
3. ئاغرىق چۈشكۈرگەندە كۆزىگە نۇر چاقىنغاندەك سېزىلىشى لازىم.
4. كۆز چىڭقالمايدىغان بولۇشى شەرت. ئەگەر كۆز چىڭقالسا كۆز ئىچكى بېسىمنىڭ ئېشىپ كەتكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. كۆز بېسىمى يۇقىرى بولسا قەدەھ ئەمەلىيىتىنى قوللانغىلى بولمايدۇ.
5. كۆز سىرتى پاكىز، ۋەرەملەنمىگەن بولۇشى، ياش يوللىرى كۆشادە بولۇشى لازىم.
6. تېنى ساغلام، بەدەن ئومۇمىي ئەھۋالى ياخشى، يۇقىرى قان بېسىمى (جوشانى خۇن)، تومۇر قېتىش، قەنت سېيىش (زىيايەت) كېسىلى ۋە باشقا سوزۇلما كېسەللىكلەردىن خالى بولۇشى لازىم.

### قەدەھ مەشغۇلاتىنىڭ باسقۇچلىرى

ئالدى بىلەن كېسەل كىشىنىڭ كۆز ساھەسى، تېۋىپنىڭ قولى قائىدە بويىچە تازىلىنىشى، ئەسۋابلار جەراسىمىسىزلاندۇرۇلۇشى كېرەك. ئاندىن كېيىن پاكىز تۆيدە ئاغرىقنى قەدداھ تېۋىپ ئۆز ئالدىدا ئولتۇرغۇزۇدۇ ھەمدە كېسەل كىشىگە كۆز قارىچۇقىنى كۆز بۇلۇڭىغا قارىتىش بۇيرۇلىدۇ. تېۋىپ كۆزنىڭ ئېقىغا سەل يۇقىرىدىن قارايدۇ ۋە شۇ خىل مەشغۇلىيەتتە ئىشلىتىلىدىغان «مىخ قەدەھ» دەپ ئاتىلىدىغان ئەسۋابنى قولغا ئېلىپ، تېشىشكە تېگىشلىك جايغا 2—1 قېتىم تەككۈزىدۇ. بۇ چاغدا كېسەل كىشىنىڭ ئاغرىققا چىدىغان. چىدىمىغانلىقىغا دىققەت قىلىش كېرەك. ئەگەر ئاغرىققا قارىتا چىدامچانلىق بولسا، شۇ جاي يانتۇ تېشىلىدۇ. بۇ چاغدا ئەسۋابنى





بىر قەدەر كۈچەپ بېسىش كېرەك، شۇنداق قىلغاندىلا تېشىشكە تېگىشلىك كۆز پەردىلىرىنى تېشىپ تۈتكىلى بولىدۇ.

ئەگەر پەردە بەك يۇمشاق، ئۇنىڭغا مىخ قەدەھنى كىرگۈزگىلى بولمىسا، ئالدى بىلەن يۇمىلاق باشلىق ئوچلۇق بىر نەشتەرنى كىرگۈزۈپ توشۇك ئاچقاندىن كېيىن ئاندىن مىخ قەدەھنى كىرگۈزۈش كېرەك. لېكىن نەشتەرنى ناھايىتى ئېھتىيات بىلەن مۆلچەرلەپ سېلىش، بەك چوڭقۇر كىرگۈزۈۋېتىپ شىشسىمان سۇيۇقلۇق (روتوبەتى زۇجاجىيە) گە يەتكۈزۈپ تاشلاپ كۆزنى پۈتۈنلەي كاردىن چىقىرىپ قويۇشتىن قاتتىق ساقلىنىش لازىم.

مىخ قەدەھنى كىرگۈزگەندە ئەسۋابنىڭ كۆز ئەستەر پەردىسىدىن تېشىپ تۈتۈپ ئۇنىڭ ئاستىدىكى كۆز گۆھىرى يەنى قىروسىمان سۇيۇقلۇق قېيى (غلافى روتوبەتى جەلىدىيە) گە يېتىپ بارغانلىقىنى ئېھتىيات بىلەن كۆزىتىش شەرت. ئاندىن ئەسۋابنى ئاستا-ئاستا بېسىپ قىروسىمان سۇيۇقلۇق قېيىدىكى دوغلانما سۇيۇقلۇقنى بىر تەرەپكە ئىتتىرىش لازىم. بۇ چاغدا دۇغلانغان سۇيۇقلۇق قايتا ئۆز ئورنىغا كېلىۋالامدۇ-يوقمۇ يۇقىرىقىتىن قاراپ تەكشۈرۈش كېرەك. ئەگەر قايتىپ كېلىۋالسا، يەنە 2-3 قېتىم بېسىپ ئىتتىرىش لازىم. شۇنداق قىلىپ دۇغلانغان سۇيۇقلۇقنىڭ باشقا جايدا تۇرۇپ قالغانلىقىنى ئېنىق بىلگەندىن كېيىن مىخ قەدەھنى ئايلاندۇرۇپ تۇرۇپ ئاستا تارتىپ چىقىرىۋېلىش كېرەك ھەمدە دەرھال سۇس شاكىراب (تۈز سۈيى) ۋە زىرە سۈيى تېمىتىش، ئاندىن كېيىن تۇخۇم سېرىقى، گۈل يېغى بىلەن مەلھەم قىلىپ كۆزنى قائىدە بويىچە مەزمۇت تېگىپ كېسەل كىشى قاراڭغۇ تۈيدە ئوڭدا ياتقۇزۇپ قويۇلىدۇ. دەستىكارى ئەمەلىيىتىنىڭ نەتىجىسىز بولۇپ قالماستىن ئۈچۈن ئۈچ كۈنگىچە كېسەل كىشى ھېچقانداق ھەرىكەت قىلماي جىمجىت يېتىپ ئارام ئېلىشى، چۈشكۈرۈش، يۆتىلىش، ئىنجىقلاش، ۋارقىراپ سۆزلەشلەردىن ساقلىنىش لازىم.

### قەدەھ ئەمەلىيىتىنىڭ ئىككىنچى خىل ئۆسۈلى

كۆزگە سۇ چۈشۈش كېسەللىكىنى قەدىمكى قەدەھ ئۆسۈلى بويىچە داۋالاش چارىلىرى دەۋرنىڭ تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ داۋاملىق ئۆزگەرتىلىپ كەلگەن، تۆۋەندە قەدەھ ئۆسۈلىنىڭ بىر قەدەر ئىسلاھ قىلىنغان ئۆسۈلى تونۇشتۇرۇلىدۇ. بۇ ئۆسۈل زامانىۋى قەدەھ ئۆسۈلىغا يېقىنراق كېلىشى مۇمكىن.

بۇ ئۆسۈلدىمۇ خۇددى يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئۆسۈلدىكى ئالدىنقى شەرتلەر ئاساس







قىلىنىدۇ ۋە كۆزگە سۇ چۈشۈشنىڭ سەۋەبلىرىگە، ئۇنىڭ پىشقان-پىشمىغانلىقىغا دىققەت قىلىپ شۇلارغا ئاساسەن تەدبىر قوللىنىلىدۇ.

داۋالىغۇچى تېۋىپ (قەدداھ) قائىدە بويىچە قوللىرىنى يۇيۇپ رېزىنكە قولقاپ كېسىپ تەييارلىق كۆرۈدۇ. ئاغرىقنىڭ كۆز ساھەسى تەلەپ بويىچە تازىلانغاندىن كېيىن، كۆز مۇسكۇللىرى مەس قىلىنىدۇ. بارلىق قەدەھلىق سايمانلىرى (پىچاق، قىسقىچ، يىڭنە، يىپ، قايچا ۋە باشقىلار) يۇقىرى بېسىملىق ھوردا ھورداپ جەراسمىسىزلاندۇرۇلىدۇ، ئاغرىقنىڭ بېشى ۋە يۈزىگە پەقەت كۆزى كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان تۆشۈكلۈك جەراسمىسىزلاندۇرۇلغان يوپۇق يېپىلىدۇ.

ئالدى بىلەن مۇڭگۈز پەردە (تەبەقە ئى قەرنىيە) نىڭ ئۈستۈنكى يېرىمىغا يىڭنە سانجىپ يىپ بىلەن تارتىپ قويۇلىدۇ، ئاندىن يەڭگىل بېسىم بىلەن كۆز قاتلاملىرى نۆۋەت بويىچە كېسىلىپ، قىروسىمان سۇيۇقلۇق قېپى ئاشكارلىنىدۇ. كېيىن مەخسۇس ئەسۋاب بىلەن قىروسىمان سۇيۇقلۇق قېپى (غىلافى روتوبە تى جەلدىيە) كېسىپ ئېچىلىدۇ ۋە قاپ ئىچىدىكى دوغلاشقان ماددا ئېلىپ تاشلىنىپ قېپى قالدۇرۇلىدۇ. بۇ خىل قەدەھ ئۇسۇلى «قاپ سىرتىدىن ئېلىۋېتىش ئۇسۇلى» دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ ئۇسۇل تولۇق پىشقان كۆزگە سۇ چۈشۈشكە ماس كېلىدۇ.

تولۇق پىشمىغان، سۇيۇق دۇغسىمان ھۆللۈك بولغان سۇ چۈشۈشلەردە «قاپ ئىچىدىن كېسىپ ئېلىۋېتىش ئۇسۇلى» قوللىنىلىدۇ، بۇ ئۇسۇلدا قىروسىمان سۇيۇقلۇق قېپىنى يىرتىپ ئاچماي، قىروسىمان سۇيۇقلۇقنى قىسىپ تۇرۇپ دۇغسىمان ھۆللۈك پۈتۈنلەي كېسىپ ئېلىۋېتىلىپ مۇڭگۈز پەردە ئۈستۈنكى يېرىمىغا ئۆتكۈزۈلگەن يىپ بىلەن باغلاپ قويۇلىدۇ.

تۇغما كۆزگە سۇ چۈشۈشتە ئۈزۈمسىمان پەردە (تەبەقە ئى ئىنەبىيە) نى قوشۇپ ئېلىۋېتىش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ.

ئەگەشمە كۆزگە سۇ چۈشۈش كۆپىنچە كۆز باشقا قەۋەتلىرى ياكى ھۆللۈكلىرىنىڭ ئىلتىھابى ۋە كۆزگە يېشىل سۇ چۈشۈش (گىلاڭكوما)، زىيابت كېسەللىكلەردىن كېيىن پەيدا بولىدۇ، بۇنداق ھاللاردا قىروسىمان سۇيۇقلۇقنىڭ ھەممە قىسمى دۇغلىشىپ كۆرۈش دەخلىگە ئۇچرىغانلىقتىن پۈتۈن قىروسىمان سۇيۇقلۇق ئېلىپ تاشلىنىدۇ.

زەخىملىنىشتىن كۆزگە سۇ چۈشكەندىمۇ كۆز ئىچكى بېسىمى كۆتۈرۈلۈپ قىروسىمان سۇيۇقلۇق دۇغلىشىدۇ، بۇ خىل كېسەللىكتىمۇ ئۇنى پۈتۈنلەي ئېلىۋېتىشكە توغرا كېلىدۇ.

ئومۇمەن قەدەھ ئۇسۇلى بىلەن داۋالانغان كۆزگە سۇ چۈشۈش كېسەللىكى بىلەن





ئاغرىغۇچىلارنىڭ كۆز قىروسىمان ھۆللىۈكى كېسىپ ئېلىۋېتىلگەنلىكى تۈپەيلىدىن يېقىندىن كۆرۈش ئىقتىدارى بۇزۇلۇپ، يۇقىرى دەرىجىلىك يىراقتىن كۆرۈش (تەۋبىلىۋبە سە) ھالىتى شەكىللىنىپ قالدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن دەستكارى ئەمەلىيىتىدىن كېيىن بۇ خىل ئاغرىقلار دۇمباق ئەينەكلىك (ئوتتۇرىسى قېلىن، چۆرىسى نېپىز) كۆزەينەك تاقاپ كۆرۈشتىكى ئۆزگىرىشنى تۈزىتىش لازىم. بۇنداقتا تۇر دۇمباق ئەينەكتىن ئۆتكەندىن كېيىن شەيشلەرنىڭ تەسۋىرى ئىلگىرى سۈرۈلۈپ كۆرۈش تور پەردىسى (تەبەقە ئى شەبەككىيە) گە نورمال ھالەتتە چۈشىدۇ. شۇنىڭ بىلەن نەرسىلەرنى كۆرگەندە تۇلار ئېنىقراق كۆرۈنىدۇ.

### كۆزگە كۆمۇتا، پاشىغا ئوخشاش نەرسىلەر ئوچقانداك كۆرۈنۈش


كۆزگە كۆمۇتا، پاشىغا ئوخشاش نەرسىلەر ئوچقانداك كۆرۈنۈش (خىيالات) ئاساسەن كۆزنىڭ شىشىسىمان سۇيۇقلۇقى دۇغلاشقانلىقتىن كۆز يۇملىقىنىڭ ھەرىكىتىگە ئەگىشىپ كۆزگە كۆمۇتا، پاشا ۋە تۆمۈچۈك تورغا ئوخشاش نەرسىلەرنىڭ تەڭ ئوچۇپ يۈرگەندە كۆرۈنگەنلىكىگە قارىتىلغان.

سەۋەبى

خىيالات كېسىلى ئاساسەن ئاشقازان خىزمىتىنىڭ ناچارلاشقانلىقى تۈپەيلىدىن ئۇنىڭدىن ئۆرلىگەن بۇخاراتلار كۆز پەردىلىرى ۋە كۆز سۇيۇقلۇقلىرىغا بولۇپمۇ شىشىسىمان سۇيۇقلۇققا زەرەر يەتكۈزگەنلىكىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭدا شىشىدەك سۈزۈك بولغان سۇيۇقلۇقتا كۆمۇتا، پاشا، تۆمۈچۈك تورىدەك نەرسىلەر پەيدا بولۇپ، ئۇنىڭ سايبىسى كۆرۈش پەردىسىگە چۈشىدۇ. دە، كۆزگە بۇ نەرسىلەرنىڭ شەكلى كۆرۈنىدۇ. ھۆكۈمالىرىمىز ئۇنى كۆزگە سۇ چۈچۈش (ئۇزۇلۇماك) كېسىلى باشلانغانلىقىنىڭ ئالامىتى دەپمۇ قارايدۇ.

ئالامىتى

كۆز يۇملىقىنىڭ ھەرىكىتىگە ئەگىشىپ ئاغرىقنىڭ كۆزىگە خال.





توچكسىمان، پاشسىمان، يېسىمان، تۆمۈچۈك تورسىمان ۋە چاڭ-توزانغا ئوخشاش نەرسىلەر ئۇچۇپ يۈرگەندەك كۆرۈنىدۇ. كۆز يۇمىلىقى ئوڭ-سول، يۇقىرى-تۆۋەن تەرەپلەرگە ھەرىكەت قىلسا، شۇ تەرەپكە ئۇچقاندەك بولىدۇ. يەڭگىلەرەك بولسا، كۆك ئاسمانغا قارىغاندەك بىلىنىدۇ. ئېغىرراق بولسا نەرسىلەرگە قارىغاندەك كۆرۈنىدۇ. بەزىدە قۇرساق ئاچ ۋاقتلاردا ئالامەتلەر يەڭگىللىشىدۇ. بەزىدە ھاۋا تۇتۇق كۈنلىرى ئالامەتلەر روشەن بىلىنىگەندەك سېزىلىدۇ. كۆپىنچە ئىككىلا كۆزدە ئىپادىلىنىدۇ. بەزىدە بىر كۆزدە ياكى ئاۋۋال بىر كۆزدە، ئاندىن ئىككىلا كۆزدە ئىپادىلىنىدۇ. كۆزدە قىزىرىش، ئېچىشىش، ياش ئېقىش ئالامەتلىرى كۆرۈلمەيدۇ.

### داۋاسى

مۇسھىل (تازىلىغۇچى دورا) بېرىشنى ئاساس قىلىش كېرەك، ئاشقازاندىكى بۇخاراتلارنى پەسەيتىش ۋە يوقىتىش ئۈچۈن سەۋەبچى ماددىنى تەكشۈش ۋە تازىلاش كېرەك. تەكشۈش ئۈچۈن مەتبۇخى ھەلىپلە، تازىلاش ئۈچۈن ھەببى ئىبارەج، ھەببى قوقيا، ھەببى زەھەب، ھەببى شەبىيار، ئىترىفېلى سەغىر، ئىترىفېلى كەشىنىز قاتارلىق دورىلارنى ئەھۋالغا قاراپ قوللىنىش لازىم. مەتجۇنى ئىگىر مەزكۇر كېسەلنىڭ مەخسۇس دورىسى بولۇپ، داۋاملىق ئىستېمال قىلىپ بەرسە ناھايىتى ئوبدان مەنپەئەت قىلىدۇ. سىرتقى جەھەتتە كۆھلى مىرارە ئىشلەتسە بولىدۇ. ئەگەر كېسەللىك ماددىسى ئاشقازان كىرىش ئېغىزىدا بولسا تۇرۇپ سۈيى، كۆك چېچەك سۈيى ۋە ئىسكەنجىنلەر بىلەن قەي قىلدۇرۇش لازىم. ئەگەر ئاشقازاننىڭ چوڭقۇر قىسمىدا بولسا پىشۇرغۇچى ۋە ئارتۇق ماددىلارنى يوقاتقۇچى دورىلاردىن كېيىن قاتتىق قەي قىلدۇرغۇچى دورىلارنى ئىستېمال قىلدۇرۇش لازىم. ئەگەر ئاشقازاندىن ئۆزلىگەن ئىسسىق يەلدىن بولغان بولسا ئالدى بىلەن ئىترىفېلى كەشىنىز يەپ ئۈستىدىن ئەرىقى شاھتەررەگە چىلان سېلىپ قاينىتىپ، ناۋات سېلىپ ئىچسە بولىدۇ.

### قوشۇمچە: كۆزگە رەڭگا-رەڭ نەرسە كۆرۈنۈش

بۇ، كۆزگە ھەر خىل رەڭدىكى نەرسىلەرنىڭ كۆرۈنۈشى بىلەن ئىپادىلىنىدىغان كېسەللىك بولۇپ، كۆز كۆرۈش قۇۋۋىتىنىڭ پەۋقۇلئاددە ئېشىپ كېتىشى ھەمدە بۇنىڭدىن ئىلگىرى كۆزگە ھەر خىل نەرسىلەر چىقىش، كۆزگە سىرتتىن تۆتكۈر





ئىسسىق ياكى سوغۇقنىڭ تەسىر قىلىشى قاتارلىق سەۋەبلەردىن كېلىپ چىقىدۇ.

داۋاسى

مەزكۇر كېسەللىكنىڭ داۋاسى كۆزگە كۆمۈتتا، پاشىغا ئوخشاش نەرسىلەر ئوچقاندەك كۆرۈنۈشىنى داۋالاش بىلەن ئوخشاش.



## كۆزنىڭ باشقا كېسەللىكلىرى

كۆزنىڭ باشقا كېسەللىكلىرى سىرتقى زەخمىدىن بولغان كۆز كېسەللىكلىرىگە قارىتىلغاندىن سىرت، نوقۇل ھالدا يۇقىرىدىكى كۆز كېسەللىكلىرىنىڭ مەلۇم بىر تۈرىگە مەنسۇپ بولمايدىغان كۆز كېسەللىكلىرىنىمۇ تۈز ئىچىگە ئالىدۇ. مەسلەن، سىرتقى زەخمىلىنىشتىن بولغان كۆز كېسەللىكلىرىدىن قاپاق كۆكرىش (زۇرقەت)، كۆزگە غەيرىي جىسىملار كىرىپ كېتىش (قەزا)، كۆزگە زەربە تېگىش (زەربە تۆلەينى)، كۈچلۈك نۇر تەسىرىدىن كۆز تورلىشىش (قومۇر) قاتارلىقلار، نوقۇل ھالدا كۆز كېسەللىكلىرىنىڭ مەلۇم بىر تۈرىگە كىرمەيدىغان كۆز كېسەللىكلىرىدىن كۆز يۇمىلىقى پولىتسىپ چىقىش (نوتۇئۆلەينى)، كۆز يۇمىلىقى ئولتۇرۇشۇپ كېتىش (ھۇزالۇلەينى) ۋە كۆك كۆزلۈك (زۇرقە تۆلەينى) كېسىلى قاتارلىقلار. كۆزنىڭ سىرتقى زەخمىدىن بولغان كېسەللىكلىرى كۆزنىڭ سىرتقى كۆرۈنۈشىگە تەسىر يەتكۈزۈپلا قالماي، بەلكى نورمال كۆرۈش خىزمىتىگە دەخلى يەتكۈزىدۇ ھەتتا بەزىلىرى قارىغۇلۇقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. مەسلەن، كۆزگە زەربە تېگىش ئېغىر دەرىجىدە بولغاندا ياكى كۆزگە غەيرىي جىسىملاردىن ئەينەك پارچىسى قاتارلىق ئوچلۇق نەرسىلەر ئېغىرراق كىرىپ كەتكەندە مۇۋاپىق تەدبىر قىلمىسا يامان ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. كۆز كېسەللىكلىرىنىڭ مەلۇم بىر تۈرىگە كىرمەيدىغان كېسەللىكلەرمۇ كۆزنىڭ شەكلى ۋە رەڭگى قاتارلىقلارغا تەسىر يەتكۈزۈپلا قالماي، بەلكى بەزىلىرى تەرەققىي قىلسا ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە كۆرۈش خىزمىتىنى بۇزىدۇ. مەسلەن، كۆز پولىتسىپ چىقىش، كۆك كۆزلۈك كېسىلى قاتارلىقلار.

شۇڭا كۆزنىڭ باشقا كېسەللىكلىرىگىمۇ سەل قارىماي ۋاقتىدا داۋالاش كېرەك. سىرتقى زەخمىدىن بولغان كۆز كېسەللىكلىرىنىڭ بەزىلىرىنى، مەسلەن: كۈچلۈك تۈز تەسىردىن بولغان كۆز تورلىشىش، قاپاق كۆكرىش، كۆزگە غەيرىي نەرسىلەر



كسرپ كېتىش قاتارلىقلارنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن كېسەل پەيدا قىلغۇچى ئامىللارنى توسۇش ۋە توختىتىش بىلەن بىرگە بەزى تەدبىرلەرنى قوللىنىش، كېسەللىك ئەھۋالغا قاراپ يەرلىك ئورۇننى داۋالاشنى ئاساس، ئىچكى داۋالاشنى قوشۇمچە قىلىش كېرەك. بەزىلىرىنى، مەسىلەن: كۆزگە زەربە تېگىش قاتارلىقلارنى داۋالاشتا يەرلىك ئورۇننى داۋالاشنى ئاساس قىلىش يەنى كېسەللىك ئەھۋالغا قاراپ يۇيۇش، دورا تېمىتىش، دورا چېپىش، تېگىش بىلەن بىرگە بەزى مۇناسىۋەتلىك دورىلارنى ئىچكىۋۇش لازىم. كۆز كېسەللىكلىرىنىڭ مەلۇم بىر تۈرىگە مەنسۇپ بولمايدىغان كېسەللىكلەر، مەسىلەن: كۆز يۇمىلغۇ پولىپىپ چىقىش، كۆز يۇمىلغۇ يىگىلەپ ئولتۇرۇشۇپ كېتىش، كۆك كۆزلۈك كېسىلى قاتارلىقلارنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن كېسەللىك ماددىسىنى تازىلاش بىلەن بىرگە ئىچكى جەھەتتىن داۋالاشنى ئاساس، سىرتقى جەھەتتىن داۋالاشنى قوشۇمچە قىلىش ھەمدە يېمەك-ئىچمەكنى مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇش، كېسەللىك ئۇلغايىتقۇچى ئامىللاردىن ساقلىنىشقا دىققەت قىلىش لازىم.

## قاپاق كۆكرىش

قاپاق كۆكرىش (زۇرقەت، خۇزرە تۆلجە فەنى) كۆپىنچە سىرتقى ھادىسىلەر تەسىرىدىن زەخمىلىنىشكە ئۇچراپ قاپاق كۆكرىپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان. بەزىدە سىرتقى زەربىدىن بولمىغان قاپاق چۆرىسى سۇس كۆكرىپ قېلىشلارمۇ كۆرۈلىدۇ. بۇ كۆپىنچە ھاللاردا زىيادە ھېرىپ-چارچىغانلىق ياكى باھ قوۋۋىتى ئاجزلاشقانلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ.

سەۋەبى

قاپاققا تايماقتەك نەرسىلەر تېگىش، بىر جايدىن يىقىلىش، تويۇقسىز بىر نەرسىلەرگە سوقۇلۇپ كېتىش ۋە قاتتىق ھۇ بولۇش، كۆپ قوسۇش تۈپەيلىدىن تۇششاق قان تومۇرلاردا قان توسۇلۇپ قېلىپ، قاپاق كۆكرىپ قالىدۇ. مەزكۇر سەۋەبلەرنى ئاغرىقتىن ياكى ئاغرىقنىڭ يېقىن كىشىلىرىدىن سوراخ ئارقىلىق ئېنىقلىغىلى بولىدۇ.

ئالامىتى





بىر قاراپلا قاپاقنىڭ كۆكرىپ قالغانلىقىنى بىلگىلى بولىدۇ. بەزىلەردە زەخمىلىنىش، ئىشىشىش ئالامەتلىرىمۇ كۆرۈلىدۇ. قاپاق كۆكرىش كۆنرىغان بولسا كۆپىنچە ھاللاردا يېنىپ كەتكەن بولىدۇ. تۇتسا چىڭقىلىپ ئاغرىيدۇ. قاپاق ھەرىكىتى راۋان بولمايدۇ.

### داۋاسى

جاراھەت ياكى ئىشىشى بولسا ئالدى بىلەن جاراھەتنى پۈتتۈرگۈچى، ئىشىشى ياندۇرغۇچى دورىلار ئىشلىتىلىدۇ. تۈنڭدىن كېيىن قاپاقنى كۆكنى يوقىتىش ئۈچۈن يېڭى ساپالنى سىركىدە سۈرۈپ تاتىقىنى چىقىرىپ يەرلىك ئورۇنغا چىپىش ياكى تورۇپنىڭ تورۇقىنى سوقۇپ كۆك يۇمىلاقسۇت سۈيى بىلەن قوشۇپ تېگىش ياكى ئىسسىق سۇغا بىر ئاز تۇز قوشۇپ قاپاقنى يۇيۇش لازىم. موزنى سوقۇپ، كۈنجۈت يېغدا ئاستا قاينىتىپ كۆزگە تارتسا ياكى ئىت ئۈزۈمى سۈيىنى تېمىتسا ناھايىتى پايدىلىق.

باھ قۇۋۋىتىنىڭ ئاجىزلىقى ۋە زىيادە ھېرىپ-چارچىغانلىقتىن بولغان قاپاق كۆكرىشىنى داۋالاشتا ئاساسلىق بەدەن ۋە باھ قۇۋۋىتىنى كۈچەيتىدىغان دورىلارنى ئەھۋالغا قاراپ ئىشلىتىش ھەمدە دەم ئېلىش، يېمەك-ئىچمەكنى تەڭشەش لازىم. كۆنكەرت داۋالاش جەھەتتە باھ ئاجىزلىقىنى داۋالاشتىكى ئۈسۈل-چارە ۋە دورىلاردىن پايدىلانسا بولىدۇ.

## كۈچلۈك نۇر تەسىرىدىن كۆز تورلىشىش

كۈچلۈك نۇر تەسىرىدىن كۆز تورلىشىش (قۇمۇر) بەزى كىشىلەرنىڭ كۈچلۈك تۆتكۈر يورۇقلۇققا كۆپ قارىغانلىقتىن كۆزى تورلىشىش، ھەتتا رەڭلىك نەرسىلەرمۇ ئاق كۆرۈنۈش ياكى كۆزى پۈتۈنلەي كۆرمەس بولۇپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

ھاۋا ناھايىتى ئوچۇق كۈنلەردە كۈچلۈك كۈن نۇرىغا كۆپ قاراش، بەك كۈچلۈك چىراغ





ئۆرى ۋە توك بىلەن كەپشەرلىگەندە چىققان نۇرغا ئوخشاش ئۆتكۈر نۇرلۇق نەرسىلەرگە كۆپ قاراش ياكى قارلىق جايلاردا كۆپ يۈرۈش بىلەن ئۆتكۈر نۇرلار كۆز ئۆرنى قايتۇرۇش، تارقىتىش، قالايمىقانلاشتۇرۇشى نەتىجىسىدە كۆز تورلىشىش ھەتتا يىراقنى كۆرەلمەسلىك، رەڭلىك نەرسىلەرنى ئاق كۆرۈشتەك ئەھۋاللار كېلىپ چىقىدۇ.

### ئالامىتى

مەزكۇر كېسەل يېڭى ۋە يەڭگىلەرەك بولسا، كۆزدە بىر ئاز قىزىرىش، ئىشىشىش، ئېچىشىش، ياش ئېقىش، باش ئاغرىشتەك بەلگىلەر بولىدۇ. كونا ۋە ئېغىرراق بولسا كۆز تورلىشىش، پۈتۈنلەي كۆرەلمەسلىك ياكى رەڭلىك نەرسىلەرنى يىراقتىن ئاق كۆرۈشتەك ئالامەتلەر بولىدۇ.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن كېسەل پەيدا قىلغۇچى ئامىللارنى توساش، سەۋەبلەرنى تۈگىتىش، ئۆزىدىن كېيىن كۆزگە قارا كۆزەينەك تاقاش، تۇتۇق (قارا) رەڭلىك كىيىملەرنى كىيىش كېرەك. كۆزنىڭ بەزى سۇيۇقلۇقلىرىنى يۇمشىتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش، چېچىلغان نۇرنى يىغىش ئۈچۈن ئاچچىق بادامنى سوقۇپ كۆزگە چېپىپ قارا رەخت بىلەن تېگىش، ئىسسىق سۇ قاتارلىق نەرسىلەر بىلەن ئىسسىق ئۆتكۈزۈش لازىم. ياخشى ئوزۇق بولىدىغان نەرسىلەر بىلەن ئوزۇقلىنىش، بولۇپمۇ يېڭى كۆكتات، مېۋە-چېۋە، سۇيۇق-سەلەڭ قۇۋۋەتلىك تاماقلارنى يېيىش لازىم. مەزىرىلىك جايلاردا ساياھەت قىلىش ناھايىتى پايدىلىق.

## كۆزگە غەيرىي نەرسىلەر كىرىپ كېتىش

كۆزگە غەيرىي نەرسىلەر كىرىپ كېتىش (قەزا) ھەر خىل سىرتقى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن كۆزگە ھەر خىل ئوششاق غەيرىي جىسىملار كىرىپ كېتىپ كۆزنى ناھايىتى بىئارام قىلغانلىقىغا قارىتىلغان.





## سەۋەبى

قاتتىق بوراندا ياكى ئىتتىك سۈرئەتتە كېتىۋاتقاندا، دەرەخ ۋە ئىگىز نەرسىلەرگە قارىغاندا تۇيۇقسىز قۇم، توپا، پاشا، كۆمۈت قاتارلىق كىچىك نەرسىلەرنىڭ كۆزگە كىرىپ كېتىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

## ئالامىتى

كۆزگە كىرگەن غەيرىي جىسىم كۆزگە قارىلىپ كۆزدىن ياش چىقىشقا باشلايدۇ. كۆزنى ئەركىن ئېچىپ بىر نەرسىگە قاراش تەس كېلىدۇ. ئېغىرراق بولسا كۆز قارىلىپ ئاغرىيدۇ. بەزىدە غەيرىي جىسىم كۆزگە سانجىلىپ كۆزنى قىزارتىپ قويدۇ ھەتتا كۆز مۈڭگۈز پەردىسىنى بۇزۇپ زەخمىلەندۈرۈش، ئىششىش قاتارلىق ئەھۋاللارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

## داۋاسى

كۆزنى ئوۋۇلاشتىن قەتئىي ساقلىنىش، پاكىز يۇمشاق داكنى قىزىق سۇدا ھۆل قىلىپ كۆزنى سۈرتۈش، باشنى سىڭايان قىلىپ كۆزنى ئېچىپ تۇرۇپ پاكىز سۇنى ئېقىتىپ قايتا-قايتا يۇيغاندىن كېيىن ئاياللارنىڭ سۈتىنى تېمىتىش كېرەك. ئەگەر بۇ ئۆسۈلدا چىقىمسا قاپاقنى قايرىپ ئوبدان ئىنچىكلەپ قاراپ، غەيرىي جىسىمنى قىسقىچ ئارقىلىق ئېھتىيات بىلەن قىسىپ ئېلىش ياكى پاكىز داكىغا يېپىشتۇرۇپ ئېلىۋېتىش كېرەك. ئەگەر بۇ ئۆسۈلدا چىقىپ كەتمىسە، شېكەر ياكى نىشامىنى يۇمشاق سوقۇپ كۆزنىڭ ئىچىگە قويۇپ 5 مىنۇت توختىتىپ ئاندىن كۆزنى قىزىق سۇ بىلەن يۇيۇپ پاكىز رەخت ياكى داكا بىلەن قاپاقنى سۈرتۈپ تازىلاش ئارقىلىق چىقىرىۋېتىش كېرەك.

ئەگەر بۇغداي، ئارپا قاتارلىق زىرائەتلەرنىڭ قىلىرىقى ياكى شىشە سۇتۇقى، تۆمۈر پارچىسى قاتارلىق ئوچلۇق نەرسىلەر كىرىپ كەتسە جىددىي مۇئامىلە قىلىش، سەل قارىمىسلىق، كۆزنى قەتئىي ئوۋۇلماسلىق، دەرھال ئاغرىقنى ئوڭدا ياتقۇزۇپ قول ياكى مەخسۇس قىسقىچ بىلەن قىسىپ ئېلىۋېتىش لازىم. تۆمۈر پارچىسىنى ماگنىت تېشى بىلەن تارتقۇزۇپ ئېلىشقا ئامال قىلسا بولىدۇ. جاراھەتلىنىش ۋە ئىششىشقا ئوخشاش يامان



ئاقۋەتلەردىن ساقلىنىش ئۈچۈن تۇخۇم ئېقى ياكى ئاياللارنىڭ سۈتىنى تېمىتىش كېرەك. نەرسە كۆرۈنگەندىن كېيىن پاكىز پاختىنى كۆز جىيىكىگە تۇتۇپ تۇرۇپ، نىشاستىنى كۆزگە تېمىتىپ كىرىپ كەتكەن نەرسە يېنىپ چىقىدۇ. ئەگەر بەك ئۇششاق نەرسە بولسا زەيتۇن يېغى ياكى باشقا ياغلارنى تېمىتىپ بولىدۇ.

## كۆزگە زەربە تېگىش

كۆزگە زەربە تېگىش (زەربە تۈلەينى، زەربە ئى چەشم) ھەر خىل سىرتقى زەربىلەر تەسىرىدىن كۆز يەڭگىل ياكى ئېغىر دەرىجىدە قاناپ قىزارغان، قاپاق ئىشىشىپ كۆكرىپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان.

### سەۋەبى

ئۇرۇلۇش-سوقۇلۇش، دۈم يىقىلىش، كۆزگە بىر نەرسە قاتتىق تېگىش قاتارلىق سەۋەبلەردىن كېلىپ چىقىدۇ.

### ئالامىتى

سىرتقى جەھەتتە قارىغاندا قاپاقنىڭ كۆكرىپ، ئىشىشىپ قالغانلىقىنى ھەتتا زەخىمىلەنگەنلىكىنى بايقىغىلى بولىدۇ. قاپاقنى ئېچىپ تەكشۈرگەندە كۆز ئېقى يەنى كۆز ئەستەر پەردىسىنىڭ قاناپ قان ئويۇپ قىزىرىپ قالغانلىقىنى ئېنىق كۆرگىلى بولىدۇ.

### داۋاسى

يۇقىرىقى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن بولغان كۆزدىكى زەخىمىلىنىشتە كۆپىنچە كۆزنىڭ ئەستەر پەردىسى تەسىرگە ئۇچراپ كۆز ئېقى قانغا تولغاچقا، داۋالاشتا ئەھۋالنىڭ يەڭگىل-ئېغىرلىق دەرىجىسىگە قاراپ كۆزگە يېقىن بولغان چېكە تومۇردىن بىر ئاز قان ئېلىش ياكى شەخەك قويۇش لازىم. ئاندىن كېيىن تۇخۇمنىڭ ئاق-سىرىقىغا ئازراق





گۈل يېغى قوشۇپ كۆزنى تېگىش كېرەك. ئىچىشكە ھەببى قوقيا، ئىيارە جى فەيقەرا بېرىلىدۇ.

چىلان، گۈلى بىنەپشە، قىزىلگۈل، نىلۈفەر قاتارلىقلارنى چىلاپ ئىچۈزۈش، ھەر خىل ھۆل مېۋىلەرنىڭ سۈيىنى ئىچكۈزۈش، كۆك يۇمغاقسۈت، پۈدىنىلەرنىڭ سىقىلغان مۇيىگە بىر ئاز كافۇر قوشۇپ كۆزگە چېپىش لازىم.

ئەگەر، كۆزگە زەربە قاتتىقراق تېگىپ جاراھەتلىنىش ئېغىرراق بولسا، 10 گرام يۇيۇلغان شادىنەج مەغسۇلغا 0.3 گرام كافۇر قوشۇپ، يۇمشاق ئېزىپ خام تۇخۇمغا ئارىلاشتۇرۇپ كۆزگە تېگىش لازىم.

تۇخۇمنىڭ ئېقى ۋە سېرىقىنى گۈل يېغىغا ئارىلاشتۇرۇپ پاختىغا مىلاپ كۆزگە قۇيسا بولىدۇ. ئەگەر قىزىتما بولسا يۇقىرىقىغا كۆك يۇمغاقسۈت قوشۇۋەتسە تېخىمۇ ياخشى، كۆزدىكى قىزىللىق ۋە قىزىش يانمىسا ماش تۇندىن 2 ھەسسە، زەرچوبە، ھۇزۇز، گىلى ئەرمىنى، مامىرانچىنى، زەئفەر، مەستىكىلەرنىڭ ھەر بىرىدىن بىر ھەسسە ئېلىپ بۇلارنى گۈل يېغىدا ئېزىپ كۆزگە تېمىتىسىمۇ بولىدۇ. تۇندىن باشقا كۆز ئاغرىش كېسەللىكىدە ئېتىلغان چارىلەرنى قوللانسىمۇ ياخشى ئۈزۈم بېرىدۇ.

## كۆز يۇمىلىقى پولىتىپ چىقىش

كۆز يۇمىلىقىنىڭ پولىتىپ چىقىشى (توتۇتۇلغان) ھەر خىل ئىچكى-تاشقى ئامىللارنىڭ يامان تەسىرى تۈپەيلىدىن كۆز يۇمىلىقى يەنى كۆز يۇمىلىقىنىڭ ئادەتتىكى نورماللىقتىن چىقىپ پولىتىپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

تۇزۇن مۇددەتلىك روھىي زەربە، غەم-ئەندىشە، قايغۇ-ھەسرەت قاتارلىق روھىي ئامىللارنىڭ ئەسەب (نېرۋا) لارنى داۋاملىق غەيرىي تەبىئىي ھالدا قوزغىغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭدا بەدەندىكى ماددا ئالمىشىش (بەدەلۇمىيە تەھەللۇق) تەسىرىگە ئۇچراپ غەيرىي نورمال ھۆللىۈكلەر بويۇندىكى بەزلەرگە يىغىلىپ، كۆزنى تۇتۇپ تۇرغۇچى پەيلەرنى بوشىتىپ كۆزنىڭ سىرتقا پولىتىپ چىقىشىغا شارائىت يارىتىپ





بېرىدۇ.

مېڭە ۋە كۆز بېسىمى ئارتىپ كەتسىمۇ ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدىكى كۆز پولىتىپ چىقىش كېلىپ چىقىدۇ. يىقىلىش، بوغۇلۇش قاتارلىق سىرتقى ئاسىللارنىڭ تەسىرىدىمۇ كۆز پولىتىپ قالىدۇ.

### ئالامىتى

كېسەللىك ئەھۋالى يەڭگىلەرەكلىرىدە كۆزنىڭ پولىتىپ چىقىپ قالغانلىقىنى ئانچە بىلگىلى بولمايدۇ. ئېغىرراقلىرىدا بىر قاراشتلا كۆز يۇمىلىقىنىڭ روشەن ھالدا پولىتىپ چىقىپ قالغانلىقىنى بايقىغىلى بولىدۇ. قاپاقلار ھەرىكىتى توسالغۇغا ئۇچرايدۇ، بولۇپمۇ يۇقىرىقى قاپاق تولۇق يېپىلماي كۆز ئېقى كۆرۈنۈپ قالىدۇ ھەتتا مۇڭگۈز پەردە قۇرغاقلىشىپ زەخىملىنىشى، يارا پەيدا بولۇشى ۋە كۆرمەس بولۇپ قېلىشى مۇمكىن.

كېسەل كىشى ئاسانلا غىدىقلىنىشقا ئۇچراپ، بىر قاتار روھىي ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. كەيپىيات جەھەتتە تەۋرىنىش بولۇپ تۇرىدۇ ھەمدە داۋاملىق ئويۇقىسى قاچىدۇ. بەدىنى ئورۇقلايدۇ. ئاسانلا چارچايدۇ. يۈرەك ھەرىكىتى تېزلىشىدۇ. كۆپىنچە ئاغرىقلاردا بويۇن بەزلىرى يوغىناپ قالىدۇ. بەزىلىرىدە بويۇن بەزلىرى ئىچكى بەز شەكلىدە بولۇپ، تۇتۇپ تەكشۈرمىگىچە بىلىنمەيدۇ. ئاغرىق ئاسانلا ئاچچىقلىنىدىغان ۋە يىغلايدىغان بولۇپ قالىدۇ. قوللىرى يەڭگىل دەرىجىدە تىترەيدۇ. ئاغرىقنىڭ قولىنى ئالدىغا سوزغۇزۇپ تەكشۈرگەندە تىترەش تېخىمۇ ئېنىق بولىدۇ. بەدىنى داۋاملىق ئىسسىغاندەك بولۇپ كۆپ تەرلەيدۇ. مەزكۇر كېسەل ئەرلەرگە قارىغاندا ئاياللاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. بولۇپمۇ بالاغەتكە يەتكەن قىزلار، ئوتتۇرا ياشلىق ۋە ھەيز توختىغان ئاياللاردا كۆپ ئۇچرايدۇ.

نورمالسىز ھۆلۈكنىڭ ئارتىپ، يىغىلىپ قالغانلىقىدىن كۆزنى تۇتۇپ تۇرغان پەيلەر بوشىشىپ پەيدا بولغانلىرىدا دەسلەپتە كۆزدىن ياش ئېقىپ كۆز تەدرىجىي پولىتىپ چىقىپ قالىدۇ. مېڭە ۋە كۆز بېسىمى ئارتىشتىن كېلىپ چىققانلىرىدا باش چىڭقىلىپ ئاغرىش بىلەن بىرگە كۆزىمۇ چىڭقىلىدۇ.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن قايسى سەۋەبتىن پەيدا بولغانلىقىنى ئېنىقلاپ سەۋەبىنى تۈگىتىش



لازم.

ھۆلۈك ئېشىپ كەتكەندىن بولسا تازىلاش ئۈچۈن ئىيارەجلەرنى ۋە ئىسسىق مەئجۇناتلارنى كېسەلنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا قاراپ ئىشلىتىش لازىم. مەزكۇر كېسەلنىڭ پەيدا بولۇشىدا روھىي ئامىللارنىڭ تەسىرى كۈچلۈك بولغاچقا روھىي جەھەتتە داۋالاش، بىمارنى تىنچلاندۇرۇش ناھايىتى مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ.

سىرتتىن شىياڧى مامىشا، شىياڧى ئاقاقىيالارنى بادىيان سۈيى ياكى ئاياللار سۈتى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ كۆزگە تارتىش ۋە تېڭىش، بىمارنىڭ بېشىنى پەسرەك قىلىپ ئوڭدا ياتقۇزۇپ ئارام ئالدۇرۇش كېرەك.

ئەگەر باشقا كېسەللەرنىڭ تەسىرى نەتىجىسىدە مېڭە ۋە كۆز بېسىمى ئېشىپ كېتىپ چىڭقىلىشتىن كۆز پولىئاغان بولسا سەۋەبىنى يوقىتىش، بېسىمنى تۆۋەنلىتىش، داۋاملىق ئىسچىنى سۈرۈپ تازىلاپ تۇرۇش، يەڭگىل ئاسان سىڭىدىغان تاماقلاردا ئوزۇقلىنىش، ئوبدان ئارام ئېلىش كېرەك.

بوغۇلۇشتىن بولغانلىرىدا دەرھال سەۋەبىنى تۈگىتىش كېرەك.

دېققەت قىلىشقا تېڭىشلىك ئىشلار

ئېغىر نەرسىلەرنى كۆتۈرۈش، ئۇزۇن يول مېڭىش، كۈچەپ ناخشا ئوقۇش، ۋارقىراش، قاتتىق قەي قىلىش، يۈتىلىش، تاماق ئۈستىگە تاماق يەپ بەك تويۇتۇپ كېتىشتەك كۆز بېسىمىنى ئاشۇرغۇچى سەۋەبلەرنىڭ ھەممىسىدىن قاتتىق ساقلىنىش لازىم.

## كۆز يۇمىلىقى يىڭىلەپ ئولتۇرۇشۇپ كېتىش

كۆز يۇمىلىقىنىڭ يىڭىلەپ ئولتۇرۇشۇپ كېتىشى (ھۇزالۇلەينى، لاغەرى چەشم) بىر كۆز ياكى ئىككى كۆز يۇمىلىقىنىڭ بەك ئورۇقلاپ ئولتۇرۇشۇپ كەتكەنلىكىگە قارىتىلغان.

سەۋەبى

ئىچكى-تاشقى سەۋەبلەرنىڭ تەسىرى بىلەن ئومۇمىي بەدەنگە ياكى مېڭىگە ۋە كۆزگە ئىنتايىن ئېغىر دەرىجىدە قۇرۇقلۇق يېتىپ، كۆزدىكى توخۇم ئېقىسىمان سۇيۇقلۇق (روتوبەتى بەيزىيە) ۋە شېشىسىمان سۇيۇقلۇق (روتوبەتى زۇجاجىيە) تىن



ئىبارەت تەبىئىي ھۆلۈكلەرنىڭ قۇرۇپ ئازىيىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇ ياشانغانلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ. كۆزگە ئوزۇقلۇق يەتكۈزگۈچى تۇششاق تومۇرلاردا توسالغۇ پەيدا بولۇشىدىن ئوزۇقلۇق ۋە ھۆلۈك يېتىشمەي كۆزگە قۇرۇقلۇق يېتىپ ئورۇقلاپ ئولتۇرۇشۇپ كېتىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا كۆز ئاجزلىقىنىڭ ئاخىرقى دەۋرلىرىدىمۇ پەيدا بولىدۇ. تۆلۈم ئالدىدىمۇ مۇشۇ خىل ئەھۋال كۆرۈلىدۇ.

بەزى كىشىلەردە كۆپ ئىچى سۈرۈش، ئاچ قېلىش، ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك قاتارلىق ئامىللار سەۋەبىدىنمۇ پەيدا بولىدۇ. لېكىن بۇ، ۋاقىتلىق ئەھۋال بولۇپ سەۋەبلىرى تۈگىسە ئۈزلۈكسىز ياخشىلىنىپ قالىدۇ.

### ئالامىتى

ئاغرىقنىڭ كۆزى قۇرۇق ھەم ئورۇق بولۇپ بىر قاراشتلا ئادەتتىكىگە قارىغاندا ئولتۇرۇشۇپ قالغانلىقىنى بايقىغىلى بولىدۇ، ياش چىقمايدۇ. بىر نەرسىگە دەرھال قارىسا كۆز قىسمەن دەرىجىدە تورلىشىدۇ.

### داۋاسى

قۇرۇقلۇقتىن بولغان بولسا مزاجنى ھۆللەشتۈرۈش ئۈچۈن ھەر خىل مېۋىلەرنىڭ سۈيى، ئارپا سۈيى، پاقلان گۆشى شورپىسى قاتارلىق ھۆللەشتۈرگۈچى دورا ۋە ئوزۇقلار بىلەن ئوزۇقلىنىش، بەدەننى بولۇپمۇ چېكىنى بادام يېغى، بىنەپشە يېغى بىلەن ياغلاش، تۇخۇم ۋە سۈتنى مائۇلەسەل بىلەن ئىستېمال قىلىش لازىم.

ئەگەر توسالغۇلاردىن بولغان بولسا توسالغۇلارنى ئېچىش بىلەن بىرگە يۇقىرىقى ئوزۇقلۇقلارنى ئىستېمال قىلىش، پات-پات قىزىق مۇنچىدا يۇيۇتۇش، كۆزگە قىز تۇغقان ئايالنىڭ سۈتنى تېمىتىش كېرەك.

يۇقىرىقىدەك ھۆللەشتۈرگۈچى ۋە سەمرىتىكۈچى چارە-ئۆسۈملۈكلەرنى قىلىش بىلەن بىرگە بەدەننى قۇرۇتقۇچى ۋە ئورۇقلاتقۇچى ناماق ۋە ئىش-ھەرىكەتلەردىن ساقلىنىش كېرەك. بۇنىڭ داۋالاش ئۈنۈمىگە چوڭ ياردىمى بولىدۇ.

بولكىنىڭ تۇۋىقىنى قىز تۇغقان ئايال سۈتىدە ئېزىپ، تۇخلاش ئالدىدا كۆزگە چاپسا بولىدۇ. نىلۋەھەر ۋە بىنەپشە ياغلىرىنى تېمىتىشمۇ بولىدۇ. پات-پات ئىسسىق سۇ بىلەن باش-كۆزىنى يۇيۇش كېرەك.





## كۆك كۆزلۈك كېسىلى

كۆك كۆزلۈك (زۇرقە تۆلەينى، گۆربە ئى چەشم، زەرقاڭ) كېسىلى كۆز قارىسىنىڭ كۆپكۈك رەڭگە كىرىپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان بولۇپ، خەلق ئارىسىدا مۇشۇ كۆزلۈك كېسىلى دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

### سەۋەبى

مەزكۇر كېسەللىك توغما ۋە كېيىن پەيدا بولغان دەپ ئىككى خىلغا ئايرىلىدۇ. بالىلاردا كۆپرەك پەيدا بولىدۇ. كېيىن پەيدا بولغانلىرى كۆپىنچە ھەر خىل ئىچكى ۋە تاشقى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ھۆللۈك ياكى قۇرۇقلۇقنىڭ ئارتىپ كۆزگە يامان تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

### ئالامىتى

مەزكۇر كېسەللىكتە كۆزنىڭ قارىسى كۆپكۈك رەڭگە كىرىپ قالىدۇ. بىر قاراشتىلا كۆزنىڭ مۇشۇ كۆزىگە ئوخشاش كۆكرىپ قالغانلىقىنى بايقىغىلى بولىدۇ. كەلتۈرۈپ چىقارغان كېسەللىك سەۋەبىنىڭ ھەر خىللىقى تۈپەيلىدىن كۆرۈش كۈچى ئوخشىمىغان دەرىجىدە يوقالغان بولىدۇ. قۇرۇقلۇقتىن بولغان كۆك كۆزلۈكتە كۆز ئومپىپ قالغان بولۇپ، تەدرىجىي ھالدا پۈتۈنلەي كۆرمەس بولۇپ قالىدۇ.

### داۋاسى

ئەگەر مەزكۇر كېسەللىك توغما بولسا ئۇنى ساقايتماق تەس ياكى ئاساسەن ساقايمىدۇ. ئەگەر بالىلىق مەزگىلىدە پەيدا بولۇپ ياشلىق مەزگىللىرىدە ئۈزلۈكسىز كۆك كۆزلۈك يوقاپ كەتسە داۋالاش ھاجەتسىز. بۇ خىلدىكى كۆز كۆك كۆزلۈك دەپ ئاتىلىدۇ.





ئەگەر ھۆلۈكنىڭ ئارتىشىدىن كېلىپ چىققان بولسا، مۇناسىپ دورىلار بىلەن بەدەن ۋە كۆزدىن ھۆلۈكنى تازىلاش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن ھۆلۈك تازىلىغۇچى دورا ۋە ئۆسۈل-چارىلارنى قىلىش، ئۇزۇن مۇددەت ھۆلۈك تازىلىغۇچى يېمەك-ئىچمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلىش كېرەك.

ئەگەر قۇرۇقلۇقنىڭ ئارتىشىدىن كېلىپ چىققان بولسا، مۇناسىپ دورىلار بىلەن بەدەن ۋە كۆزگە ھۆلۈك يەتكۈزۈشكە تىرىشىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن ھۆلۈك پەيدا قىلغۇچى كۈچلۈك دورا ۋە ئۆسۈل-چارىلەرنى قىلىش، ئۇزۇن مۇددەت كۆپلەپ ھۆلۈك يەتكۈزگۈچى يېمەك-ئىچمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلىش كېرەك. دەستكارلىق ئۆسۈلنى قوللانسا ساقايمايدۇ.

بۇ خىلدىكى كۆك كۆزلۈك كېسىلىنىڭ كۆزگە سۇ چۈشۈش كېسىلى بىلەن پەرقى شۇكى، كۆزگە سۇ چۈشۈش (ئۇزۇلۇما) كېسەللىكنىڭ دەسلەپتە كۆزگە پاشا، كۆمۈتسىغا ئوخشاش كىچىك نەرسىلەر ئۇچقاندا كۆرۈنىدۇ. مەزكۇر كېسەللىككە بۇنداق ئەھۋال بولمايدۇ. كۆزگە سۇ چۈشۈش كېسەللىكى دەستكارلىق ئۆسۈلى بىلەن ساقايىتقىلى بولىدۇ. مەزكۇر كېسەللىكى دەستكارلىق ئۆسۈلى بىلەن داۋالاپ ساقايىتقىلى بولمايدۇ.







## كۆز كېسەللىرىگە ئىشلىتىلىدىغان بىر قىسىم دورىلار

### كۆز ئەستەر پەردە ياللۇغىنى داۋالايدىغان دورىلار

بېھي ئورۇقى، چىلان، قوغۇن ئورۇقلىرىدىن قائىدە بويىچە شىرە (لۇتاب) چىقىرىپ كۆزگە سىرتىن چېپىلىدۇ.

ئاق سەندەل (سەندەل سەفید)، گىلى ئەرمىنى، ھوزۇز مەككى، ئەنگورى شىفا (ئىت ئوزۇمى)، ئاقا قىيالارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ كۆك يۇمغاقسۇت سۈيى بىلەن مەلھەم ياساپ زىماد قىلىنىدۇ.

يۇقىرىقى كېسەللىكلەرنى داۋالاش ۋە كۆزنى كۈندىن كۈندىن ساقلاش ئۈچۈن كۆزگە كۆك رەڭلىك كۆزەينەك تاقىۋېلىش كېرەك. شارائىت بولمىغاندا پاكىز كۆك رەختى كۆز ئالدىغا ئېسۋالسىمۇ بولىدۇ.

يەنە مەزكۇر كېسەللىكلەردە ئاغرىقنىڭ مىزاجىغا قاراپ ھەببى زەھەب، ھەببى شەبىيار، ئىترىقېلى كەشىنىز، شەرىپتى بىنەپشەلەر مۇۋاپىق مىقداردا ئىستېمال قىلدۇرۇلىدۇ. كۆك يۇمغاقسۇت سۈيىنى ئايال سۈتى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، كۆز ئىچىگە تېمىتسا ئاغرىق پەسەيتىپ، ئىششىقنى قايتۇرىدۇ.

ھەببى زەھەب، سەبىرى سۇقۇتورى 54 گرام، سېرىق ھەلىلە پوستى 27 گرام، كەترا 8.1 گرام، مەستكى رۇمى 8.1 گرام، قىزىلگۈل 13.5 گرام.

تەبىئىيلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى قائىدە بويىچە يۇمشاق سوقۇپ، تاسقاپ، ئەرىقى گۈلاب ياكى ئەرىقى بادىيان بىلەن خېمىر قىلىپ 0.1 گراملىق كۆمۈلۈچ قىلىنىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: ھەر خىل كۆز كېسەللىكلىرىگە كۆز بېسىمىنى پەسەيتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. كۈندە بىر قېتىم تاماقتىن بۇرۇن 0.1 گرامدىن ئۈچ گرامغىچە ئىستېمال قىلىنىدۇ.





## كۆزگە رەڭدار چېكىت چۈشۈش كېسىلگە ئىشلىتىلدىغان

### دورىلار

كۆك كەپتەر باچكىسىنىڭ قۇيرۇقىنى يۇلۇپ، ئىچىدىن چىققان قان ئىسسىق ھالدا كۆزگە تېمىتىلىدۇ. باشقا ئوچار قۇشلاردىن پاختەك، ئوردەكلەرنىڭ قۇيرۇقى ياكى قاننىنى يۇلغاندا قان چىقىمسا قۇيرۇق قىسمىغا جەراسمىسىز لاندۇرۇلغان يىڭنە سانجىش ئارقىلىق قان چىقىرىلىشىمۇ بولىدۇ ياكى شۇ قاننى پاختىغا يۇقتۇرۇپ كۆز ئۈستىگە تاشسىمۇ بولىدۇ.

بۇلاردىن باشقا، بىر گرام سەبىرنى 20 مىللىلتر سىركىدە ئېرىتىپ رەڭدار چېكىت چۈشكەن كۆزگە تېمىتىش ياكى بىر گرام تاباشىرنى ئون گرام سېنەپشە يېغىغا ئارىلاشتۇرۇپ كۆز ئىچىنى ياغلاش كېرەك. ئونىڭدىن باشقا، كۆك تۇرۇپ سۈيىنى سىقىپ چىقىرىپ باراۋەر مىقداردا گۈل يېغى (رەۋغەنى ۋەرد) ئارىلاشتۇرۇپ كۆز ئىچىنى ياغلاش كېرەك.

مەرۋايىتى ئۇششاق ئالقاتلاپ، بىر قانچە قېتىم داكىدىن ئۆتكۈزۈپ ئونىڭغا كەكلىك تۆتىنى ئارىلاشتۇرۇپ سۈرمىدەك كۆزگە تارتسىمۇ بولىدۇ.

## كۆز بۇرجىكىدىن ئۆسكەن تىرناقسىمان گۆشىنى داۋالايدىغان دورىلار

2.8 گرام ئۆشۈدۈر، 1.4 گرام سەمى ئەرەبىنى يۇمشاق سوقۇپ لاهۇر تۈزىنىڭ سۈيى بىلەن خېمىر قىلىپ قاندىە بويىچە شىياپ ياساپ قويۇلىدۇ. لازىم بولغاندا مەزكۇر شىياپنى كۆز بۇرجىكىدىكى تىرناقسىمان گۆشكە كۈندە بىر قانچە قېتىم سۈركەپ بېرىلسە ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

يەنە ئەركەك ئوغلاقنىڭ تۆت سۇيۇقلۇقىنى 10 گرام ساپ ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ كۆز بۇرجىكىگە سۈركەپ بەرسە ئۆسكەن گۆشى يوقىتىدۇ.

قەدىمكى ھۆكۈمالارنىڭ تەجربىسىگە ئاساسلانغاندا، شەپەرەڭ مايسىنى





كۆيدۈرۈپ تەڭ مىقداردىكى سۇقمۇتسىيا بىلەن بىللە يۇمشاق سوقۇپ ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ كۆز بۇرجىكىگە داۋاملىق سۈركەپ بەرسە مەزكۇر كۆشنى ئۆسۈشتىن چەكلەيدۇ ۋە يوقىتىدۇ.

ئەڭ ئىشەنچلىك چارىسى دەستكار ئۆسۈلۈ بىلەن تىرىقچىسىمان كۆشنى قىرىپ ئېلىۋېتىش، ئاندىن يۇقىرىدىكى دورىلاردىن بىرنى ئاللاپ ئىشلىتىپ قايتا ئۆسۈشنى چەكلەشتىن ئىبارەت.

### كۆزگە چۈشكەن ئاققا ئىشلىتىلىدىغان دورىلار

بىر گرام گۇڭگۇرت (كسېرت) نى يېرىم گرام زاك بىلەن بىللە ئۇششاق سوقۇپ سىركىدە خېمىر قىلىپ قاندا بويىچە شىياپ ياساپ، ئاق چۈشكەن كۆزگە ھەر كۈنى ئەتىگەن-ئاخشامدا بىر قېتىمدىن سۈركەپ بېرىلىدۇ.

ئەگەر چۈشكەن ئاق بەك كونا بولسا، ئاق توغرىغۇ، تۆشۈدۈر، دانىكارلارنى باراۋەر مىقدارلاردا ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ يېپەك ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئاق چۈشكەن كۆزگە سۈرمە قىلىپ تارتىلىدۇ.

پېشىقە دەملەرنىڭ ئېيتىشىچە، ئاقنى يوقىتىش ئۈچۈن بەدەننى تەنقىيە قىلىش لازىم. مەسىلەن: ھەببى زەھەب، ئىبارەجى پەيقەرا، ئىترىفېلى سەغىر، مەتبۇخى ئۈستىخۇددۇس، مەتبۇخى ئەقىمۇنلاردىن بىرى كېسەلنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا قاراپ ئىشلىتىلىدۇ. شۇنىڭدەك بۇرۇدى ئەسۋەد سىرتىن ئىشلىتىلىدۇ.

### بەرۇدى ئەسۋەد

قارا سۈرمە، ئاق تۇتيا ھەر بىرى 32 گرام، تېشىلمىگەن مەرۋايىت 5.4 گرام، سازەج ھىندى 2.7 گرام، زەئفەر 1.4 گرام، ئالتۇن ئىقلىمىياسى 21.6 گرام، ئىبار، كاھۇر ھەر بىرى 1.4 گرام.

يۇقىرىدىكى دورىلارنى كۆرسەتمە بويىچە ئېلىپ، قاندا بويىچە سوقۇپ، تاشقىغاندىن كېيىن رەڭلىك شىشە ساقلاپ قويۇلىدۇ. لازىم بولغاندا ئىنچىكە پىلتىكۈچكە يۇقتۇرۇپ ئاق چۈشكەن كۆزگە كۈندە 2 قېتىم سۈرمەدەك تارتىلىدۇ.





كۆھلى فىللىمۇ مەنپەئەت قىلىدۇ. ئۇنىڭ تەركىبى ۋە ياسىلىشى تۆۋەندىكىچە:  
قارىمۇچتىن 12 گرامنى ئوششاق تالقانلاپ، يېڭى سويۇلغان توپاق تۆتى بىلەن خىمىر  
قىلىنىدۇ. ئونى يەنە سايدا قۇرۇتقاندىن كېيىن قايتىدىن يۇمشاق سوقۇپ ئېزىپ رەڭلىك  
شىشىدە ساقلاپ قويۇلىدۇ. لازىم كەلگەن چاغدا، ئاق چۈشكەن كۆزگە سۈرمىگە  
ئوخشاش كۈندە 2 قېتىم تارتىلىدۇ.

قوشۇمچە

كۆز قىچىشىش، كۆپ ياشاڭغۇراشلاردا خوراز تۆتى بىلەن ئەرىقى بادىيان تەڭ مىقداردا  
ئېلىپ تەڭشەپ، كۆزگە پىلتىكۆچ بىلەن سۈرتۈلىدۇ.





## كۆز كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدىغان بىر قىسىم مۇرەككەپ دورىلار

### بەرۇدى ھۇسۇم

تەركىبى: تۇتيا 28 گرام، زەنجىبىل، سېرىق ھەلىيە پوسنى 13.5 گرامدىن، فلفل، مامرانچىنى 8.1 گرام، نەمەكى ھىندى 2.7 گرام.  
تەييارلىنىشى: دورىلارنى قائىدە بويىچە يۇمشاق سوقۇپ، يېپەك ئەلگەكتە تاسقاپ، پىششىغان ئاق ئۆجمە سۈيىنى داكا ئارقىلىق سىقىپ، سۈزۈپ يۇقىرىقى سۇقۇققا قۇيۇپ 20 كۈن تۇرغۇزۇلۇدۇ. ئاندىن كېيىن سايدا قۇرۇتۇپ ئىككىنچى قېتىم قايتا سوقۇپ تاسقاپ رەڭلىك شىشەدە ساقلاپ قويۇلۇدۇ. لازىم بولغاندا ئىنچىكە پىلىتكۈچ بىلەن ئەتىگەن-ئاخىشامدا كۆزگە تارتىلۇدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كۆز ياشاڭغۇراش، كۆز شىللىق پەردىلىرى قېلىنلىشىش، كۆز بۇرجىكىدىن گۆش ئۈنۈش، كۆزگە پەردە چۈشۈش قاتارلىق كېسەللىكلەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

### بەرۇدى كافۇر

تەركىبى: تۇتيا 13.5 گرام، كافۇر 1.5 گرام.  
تەييارلىنىشى: دورىلارنى قائىدە بويىچە يۇمشاق سوقۇپ رەڭلىك شىشەدە ساقلاپ قويۇلۇدۇ. لازىم بولغاندا كۆزگە ئەتىگەن-ئاخىشامدا سۈرمىدەك تارتىلۇدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كۆزنىڭ قىزىللىقى ۋە ئېچىشىپ ئاغرىشىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

### كۆھلى روممانەين

تەركىبى: تۇتيا، سازەج ھىندى، كۆيدۈرۈلگەن مىس ئالقىنى ھەر بىرى 6





گرام، سەبىرى، قارىمۇچ، فلفل، يۇيۇلغان شادەنج ھەر بىرى 3 گرام، مامىشا، موزا، ئەنزەرۇت، كۆپۈكى دەريا ھەر بىرى 1.5 گرام.  
تەييارلىنىشى: دورىلارنى قائىدە بويىچە يۇمشاق سوقۇپ، يېپەك ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ئالغان تەييارلىنىدۇ.

ئاچچىق ۋە تاتلىق ئاناردىن تەڭ مىقداردا ئېلىپ، داكا ئارقىلىق سىقىپ يۇقىرىدىكى دورىلار تالقىنى چىلاشقىدەك مىقداردا قۇيۇلىدۇ. ئۈچ كۈندە بىر قېتىمدىن ئۇدا بەش قېتىم ئانار سۈيى ئالماشتۇرۇلىدۇ، ئاندىن سايدا قۇرۇتۇلىدۇ. قۇرۇغاندىن كېيىن قايتا سوقۇپ، تاسقاپ رەڭلىك شىشە ساقلاپ قويۇلىدۇ. لازىم بولغاندا كۆزگە سۈرمە قىلىپ تارتىلىدۇ.

خۇسۇسىيىتى: كۆزنى قۇۋۋەتلەيدۇ، كۆز ياشاڭغۇراش، كۆزگە ئاق چۈشۈش، كۆز جىيەكلىرىنىڭ قىچىشىنى داۋالاش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

### داۋائى تەنكارى

تەركىبى: ئۆشۈدۈر، تەنكار (دانكار) ھەر بىرى 3 گرام.  
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى قائىدە بويىچە يۇمشاق سوقۇپ، يېپەك ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تەييارلىنىدۇ. لازىم بولغاندا تۇخۇم ئېقى بىلەن مەلھەم قىلىپ كۆز جىيىكى ۋە بۇرچىكىگە سۈركىلىدۇ.

خۇسۇسىيىتى: كۆز جىيەكلىرىنىڭ قىچىشىنى ۋە كۆزگە تىرناقچە گۆش تۇنۇشىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

### داۋائى ناخۇنەئى فىل

تەركىبى: پىلىنىڭ قۇرۇتۇلغان تىرنىقى، توتىيا ھەر بىرى 7 گرام، زەئفەر 1 گرام.

تەييارلىنىشى: دورىلار قائىدە بويىچە يۇمشاق سوقۇلۇپ، يېپەك ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تەييارلىنىدۇ. لازىم بولغاندا قىز توغقان ئايال سۈتى بىلەن نەملەپ كۆزگە چېپىلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كۆزگە چۈشكەن ئاقنى يوقىتىدۇ.

### زەرۋرى مەغسۇل





تەركىبى: قالغاچ مايىقى، ئاقىرقەرھە، ئەزەرۇت، كۆمۈش ئېقلىمىياسى ھەر بىرى 3 گرام، ساپ ھەسەل 10 گرام.  
 تەييارلىنىشى: دورىلارنى قائىدە بويىچە يۇمشاق سوقۇپ، يېپەك ئەلگەكتە تاسقاپ ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇلدى. ھەر كۈنى كۆزگە چۈشكەن ئاق ئۈستىگە سۈركەپ، ئەتىگەندە ئەرەقى بادىيان بىلەن كۆز يۇيۇلدى.  
 خۇسۇسىيىتى: كۆزگە چۈشكەن ئاققا مەنپەئەت قىلدى.

زەرۋرى تۇتىيا (بىرىنچى تۇسخا)

تەركىبى: تۇتىيا 27 گرام، سېرىق ھەلىلە پوستى، سەبرى، زەردچۈبە، فلفىل، قارىمۇچ ھەر بىرى 7 گرام.  
 تەييارلىنىشى: دورىلارنى قائىدە بويىچە سوقۇپ، تاسقاپ، پىلتىكۈچ بىلەن ئەتىگەن-كەچتە كۆزگە تارتىلدى.  
 خۇسۇسىيىتى: كۆز تورلىشىش، ھەر خىل سەۋەبتىن بولغان كۆرۈش ئاجىزلىقلىرىغا مەنپەئەت قىلدى.

زەرۋرى تۇتىيا (ئىككىنچى تۇسخا)

تەركىبى: تۇتىيا، نىشاستە، قەلەي تۇپپىسى ھەر بىرى 7 گرام.  
 تەييارلىنىشى: قائىدە بويىچە يۇمشاق سوقۇپ، تاسقاپ كۆزگە سۈرمە قىلىپ تارتىلدى.  
 خۇسۇسىيىتى: يۇقىرىقى بىلەن ئوخشاش.

زەرۋرى كافۇر

تەركىبى: كۆيدۈرۈلگەن سەدەپ، نېشىلمىگەن مەرۋايىت ھەر بىرى 7 گرام، نىشاستە 3.5 گرام، كافۇر 0.5 گرام.  
 تەييارلىنىشى: دورىلارنى قائىدە بويىچە يۇمشاق سالايە قىلىپ، تاسقاپ شىشىدە ساقلاپ قويۇلدى.  
 خۇسۇسىيىتى: كۆز قىزىرىپ ئاغرىشقا مەنپەئەت قىلدى.



## شىيافى رۇشائى

تەركىبى: كۆمۈش ئىقلىمىياسى، ئالتۇن ئىقلىمىياسى، تېشىلمىگەن مەرۋايىت ھەر بىرى 7 گرام، كافۇر، ئىپار ھەر بىرى 1 گرام.  
تەييارلىنىشى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تاسقاپ ئەرقى بادىيان بىلەن خېمىر قىلىپ، قائىدە بويىچە شىياف ياساپ شىشىدە ساقلاپ قويۇلىدۇ. لازىم بولغاندا قايناقسۇدا ئېرتىپ كۆزگە سۈرتىلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كۆزگە سۇ چۈشۈش، ئاق چۈشۈش، گۆش ئۈنۈش ۋە كۆز تۇر يىغالماسلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

## شىيافى ئەسۋەد

تەركىبى: كۆيدۈرۈلگەن مىس، تېشىلمىگەن مەرۋايىت، بىخ مارجان، ئاقاقىيا ھەر بىرى 3 گرام، ئەپيۇن، زەئەفەر ھەر بىرى 1 گرام.  
تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى قائىدە بويىچە يۇمشاق ئېزىپ، يېپەك ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئەرقى بادىيان بىلەن خېمىر قىلىپ قائىدە بويىچە شىياف ياساپ شىشىدە ساقلىنىدۇ. لازىم بولغاندا قايناقسۇ بىلەن ئېرتىپ كۆزگە سۈرتۈلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كۆزگە ئاق چۈشۈش، بەردە چۈشۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

## كۆھلى مۇقەۋۋى بەسەر

تەركىبى: تۇتىيا 54 گرام، زەنجىبىل، فىلىل، قارىمۇچ، مامىرانچىن ھەر بىرى 7 گرام، تۆشۈدۈر 3.5 گرام.  
تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تاسقاپ ئەرقى بادىيان بىلەن خېمىر قىلىپ، ساپىدا قۇرۇتۇپ 2-قېتىم يەنە ئېزىپ شىشىدە ساقلاپ قويۇلىدۇ. لازىم بولغاندا سۈرمە قىلىپ كۆزگە تارتىلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: ھەر خىل سەۋەبتىن بولغان كۆز ئاجزىلىقى، كۆزگە سۇ چۈشۈش، ئاق چۈشۈش، توششاق نەرسىلەر ئوچقانداك كۆرۈنۈش قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

## زەرۋرى ئەزەرۇت



تەركىبى: ئەزەرۇت، مۇرمەككى (ئېشەك سۈتگە چىلانغان)، سەمغى ئەرەبى، ناۋات ھەممىسى تەڭ مىقداردا.

تەييارلىنىشى: ناھايىتى يۇمشاق سوقۇپ تاختا ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ كۆزگە سېپىلدۇ.

خۇسۇسىيىتى: كۆز ياشاڭغۇراشنىڭ دەسلەپكى دەۋرلىرىدىكى كۆز ئاغرىقلىرىغا مەنپەئەت قىلدۇ.

### زەرۋرى ئەسقىر

تەركىبى: زەھەرسىزلەندۈرۈلگەن ئەزەرۇت 15 گرام، شىياڧى مامىشا (توگە تاپان ياپرىقى) 6 گرام، سەئىدى، زەئفەر، رۇسۇت، قىزىلگۈل ئۇرۇقى ھەر بىرى 2 گرام، ئەپيۇن 3 گرام.

تەييارلىنىشى: ناھايىتى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ كۆزگە سېپىلدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كۆزدىن يىرىڭ ۋە زەرداپ ئېقىشنى توختىتىپ، ئارتۇق ھۆلۈكنى قۇرۇتىدۇ.

### زەرۋرى ئەببەز

تەركىبى: كۆمۈش كۆيۈندىسى، ئۈچ كۆيۈندىسى، قەلەي ئۆپسى ھەر بىرى 6 گرام، كەترا 60 گرام، سەمغى ئەرەبى 120 گرام، ئادراسمان گۈلى 180 گرام، نىشاستە 90 گرام، ئەپيۇن 30 گرام.

تەييارلىنىشى: يۇمشاق تالقانلاپ ئارپا بادىيان سۈيىگە چىلاپ، ئاندىن قۇرۇتۇپ پارشوك ياساپ كۆزگە سېپىلدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كۆزدىن ياشاڭغۇراشقا ئىشلىتىلىدۇ.

### زەرۋرى سەبرى

تەركىبى: يۇيۇلغان توتىيا 30 گرام، سېرىق ھېلىبە پوستى، سەبرى، زەردچۈبە، فىلىل ھەر بىرى 15 گرام، قارامۇچ 6 گرام  
تەييارلىنىشى: تالقان قىلىپ تەييارلىنىدۇ.



خۇسۇسىيىتى: كۆز قىچىشىش ۋە ياشاڭغۇراشلارنى داۋالايدۇ. بولۇپمۇ ياشانغانلارغا مۇۋاپىق كېلىدۇ.

### زەرۋرى قەلەي

تەركىبى: يۇيۇلغان توتىيا، قەلەي ئوپسى تەڭ مىقداردا.  
تەييارلىنىشى: يۇمشاق تالقانلاپ كۆزگە سېپىلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كونا كۆز ئاغرىقى، كۆز قىزىلىقى، كۆز ياشاڭغۇراشلارنى داۋالايدۇ.

### زەرۋرى كافۇر

تەركىبى: كۆيدۈرۈلگەن سەدەپ، تېشىلمىگەن مەرۋايت ھەر بىرى 6 گرام، نىشاستە 3 گرام، كافۇر بىر گرام.  
تەييارلىنىشى: ناھايىتى يۇمشاق تالقانلاپ كۆزگە سېپىلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كۆز قىزىقلىقىنى پەسەيتىدۇ. رەمەد (كۆز ياللوغى) نى داۋالايدۇ.

### زەرۋرى مامىران

تەركىبى: ھەشقىپچەك ئورۇقى ياكى زىخ ئورۇقى، ئەنزەرۇت ھەر بىرى 30 گرام، مامىران چىنى، خۇنسىياۋشان ھەر بىرى 6 گرام.  
تەييارلىنىشى: تالقانلاپ كۆزگە سېپىلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: بالىلار كۆز ئاغرىقىنى داۋالايدۇ.

### زەرۋرى مەغسۇل

تەركىبى: قالغىچ مابىقى، ئاقىرقەرھە، ئەنزەرۇت، زەنگار، مېتال كۆيۈندىسى.  
تەييارلىنىشى: ھەسەل بىلەن يۇغۇرۇپ، كۆزگە چېپىلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كۆزگە يەڭگىل دەرىجىدىكى ئاق چۈشۈشنى داۋالايدۇ.

### زىمادى ئەنزەرۇت

تەركىبى: ئاق سەندەل 3 گرام. ئەنزەرۇت 2 گرام، تۇخۇم ئېقى مەلۇم مىقداردا.





تەييارلىنىشى: ئاق سەندەلنى سۈرۈپ، ئۈستىدىن ئەزەرۈتنى ئارىلاشتۇرۇپ، توخۇم ئېقى بىلەن يۇغۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كۆز ياشاڭغۇراشنى داۋالایدۇ.

### تلائى ھودبى

تەركىبى: خورمىنىڭ كۆيدۈرۈلگەن ئۇرۇقى، سۈنبۇل، چاشقان مايقى (كۆيدۈرۈلگەن)، فىلىل ھەر بىرى بىر ھەسسەدىن، سۈرمە 3 ھەسسە، قەلەي 6 ھەسسە، زەئفەر يېرىم ھەسسە.  
تەييارلىنىشى: ناھايىتى يۇمشىتىپ سىرتىدىن ئىشلىتىلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كىرىپك تۆكۈلۈشنى توختىتىدۇ.

### قە ئۆرى ئە شا

تەركىبى: سۇزاپ سۈيى، يۇمغاقسۇت سۈيى تەڭ مىقداردا.

تەييارلىنىشى: دورلارنى قوشۇپ يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ. كۈنگە 2-3 قېتىم كۆزگە تېمىلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كەچتە كۆرەلمە سىلىك كېسىلىنى داۋالایدۇ.

### كۆھلى ئەزىرى

تەركىبى: كۆيدۈرۈلگەن ئىسپىھان سۈرمىسى 15 گرام، كۈمۈش كۆيۈندىسى، ئالتۇن كۆيۈندىسى، شادەنج، ماش، ھىندى تۇتىياسى، كۆيدۈرۈلگەن مىس ھەر بىرى 6 گرام، سېرىق ھېلىلە پوستى، سازەج ھىندى، قارىمۇچ، فىلىل، ئۆشۈدۈر، سەبرى، رۇسۇت، زەئفەر، دېڭىز قىسقۇچ پاقىسى (سەرەتانى بەھرى) ھەر بىرى 3 گرام، زەنجىبىل 2 گرام، كافۇر بىر گرام، ئىپار 2 گرام، قەلەمپۇر 1.5 گرام.  
تەييارلىنىش: ئادەتتىكى ئۇسۇل بىلەن تەييارلاپ كۆزگە سۈرتۈلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كۆزنى روشەنلەشتۈرىدۇ. كۆز قاراڭغۇلىشىش، كۆز ياشاڭغۇراشلىرىنى داۋالایدۇ.





### كۆھلى دەمئە (بىرىنچى تۇسخا)

تەركىبى: سېرىق ھېلىلە بىر دانە، زەئفەر ئاز مىقداردا.  
تەييارلىنىشى: ھەلىلىنى خېمىرغا ئوراپ خىش ئۈستىدە قويۇپ قىزىتىلغان توتۇر ئىچىگە سېلىپ قىزارغاندىن كېيىن ئېلىپ، ھەلىلىنى ئايرىۋېلىپ زەئفەر بىلەن ناھايىتى يۇمشاق سالاپە قىلىپ سۈرمە قىلىندۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كۆز ياشاڭغۇراشنى توختىتىدۇ.

### كۆھلى مۇقەۋۋى

تەركىبى: يۇيۇلغان 60 گرام ھۆل رەيھاندىن سىقىۋېلىنغان سۇنىڭ قۇرۇتۇلمىسى مەلۇم مىقداردا، زەنجۈبىل، قارامۇچ، مامىرانچىنى 6 گرامدىن، توشۇدۇر 3 گرام.  
تەييارلىنىشى: توتۇيا ۋە رەيھان سۈيى قۇرۇتۇلمىسىنى سۈرۈپ قالغانلىرىنى سوقۇپ يىپەك رەختتىن ئۆتكۈزۈپ سۈيىگە چىلاپ قۇرۇتۇپ تونىيانى ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن كۆزگە سۈرتۈلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كۆزنىڭ كۆرۈش كۈچىنى ئاشۇرىدۇ. كۆزدىن ياش ئېقىشىنى توختىتىدۇ.

### كۆھلى مۇنبىت

تەركىبى: كۆيدۈرۈلگەن خورما تۇرۇقى 15 گرام، كۆندۈر كۈلى 12 گرام، سۇنبۇل 9 گرام، لاجۋەرد، ھەببى بىلسان ھەر بىرى 3 گرام.  
تەييارلىنىشى: ئادەتتىكى ئوسۇلدا تەييارلىنىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كىرىك ئۈندۈرىدۇ (تەجرىبىدىن ئۆتكەن).

### كۆھلى مىلكايا

تەركىبى: ئېشەك سۈتىدە مۇدەببەر قىلىنغان ئەزەرۇت، ئاق شېكەر، نىشاستە ھەر بىرى 15 گرام، ئۈزۈم تۇرۇقىنىڭ مېغىزى 3 گرام.  
تەييارلىنىشى: يۇقىرىقىغا ئوخشاش.  
خۇسۇسىيىتى: ھەر خىل سەۋەبتىن بولغان كۆز ياشاڭغۇراشلىرىنى داۋالايىدۇ.





### كۆھلى دەمئە (ئىككىنچى-تۇسقا)

تەركىبى: تۇتيا 7 گرام، بىخ مارجان، سېرىق ھەلىلە پوستى، سەبرى سۇقۇترى ھەر بىرى 3 گرام، قارا ھەلىلە، فىلىل ھەر بىرى 0.7 گرام.  
 تەييارلىنىشى: تۇتيانى قىزىتىپ يەتتە قېتىم ئەرىقى گۇلابتا سۇغۇرۇپ ئاندىن تالقانلىنىدۇ ۋە باشقا دورىلار بىلەن قوشۇپ يۇمشاق سالاپە قىلىپ يېپەك رەختىن تۆتكۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.  
 خۇسۇسىيىتى: ياشاشغۇراشنى توختىتىش، كۆزنى قوۋۇتەش تەسىرىگە ئىگە.

### كۆھلى ۋەرد

تەركىبى: تازىلانغان قەلەي 24 گرام، ئالتۇن كۆيۈندىسى، سەمغى ئەرەبى، يۇيۇلغان شادىنەج ياكى كۆيدۈرۈپ يۇيۇلغان ماگىنت تېشى ھەر بىرى 12 گرام، بەسباسە، كۆيدۈرۈلگەن مىس، زەئفەر ھەر بىرى 3 گرام، ئەپيۇن 3 گرام، كافۇر بىر گرام.  
 تەييارلىنىشى: يۇقىرىقىغا ئوخشاش.  
 خۇسۇسىيىتى: يۇقىرىقىغا ئوخشاش.

### كۆھلى ھەۋەل (ئالغاي سۈرمىسى)

تەركىبى: سۈزۈك رەڭلىك سىندۇرۇس مەلۇم مىقداردا، ئىپار، ئەنەر ئاز مىقداردا. ياسىلىشى: سىندۇرۇسنى سالاپە قىلىپ، بىر پىلىكچە خالتىغا قاچىلاپ، بىر قاچىدا قويۇپ، ئۈستىگە مەلۇم مىقداردا گۈل يېغى ۋە سۈت قويۇلىدۇ. خالتا ئۈچىغا ئوت يېقىپ، يۇقا مىس پەتنۇسى ئوت يېقىلغان پىلىك خالتا ئۈستىگە ئېسىپ قويۇلىدۇ. پىلىكچە كۆيۈپ ئۇنىڭ ئىسى بىلەن پەتنۇسنىڭ تېگى ئىسلاشقاندىن كېيىن، ئىسنى توخۇ قانتى بىلەن سۈپۈرۈپ يىغۇپ، ئاز مىقداردا ئىپار، ئەنەرلەرنى ئارىلاشتۇرۇپ سۈرمە تارتىلىدۇ.  
 خۇسۇسىيىتى: ئالغايلىقنى داۋالايدۇ.



## ئىتريفېلى بادىيان

تەركىبى: يۇمغاقسۇت ئورۇقى، سېرىق ھەلىلە پوستى، ھەلىلە كابىلى پوستى، بەلىلە پوستى، ئامبىلە، قىزىلگۈل ھەر بىرى 7.5 گرام، ئارپا بادىيان 55 گرام، ھەسەل 291 گرام.

تەييارلىنىشى: دورىلارنى سوقۇپ، تاسقاپ كۆپكى ئېلىنغان ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ مەلجۇن قىلىندۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كۆزنى روشەن قىلىش، مېڭىنى قۇۋۋەتلەش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

## شىياڧى نارەنجى

تەركىبى: نارەنجى سۈيى مۇۋاپىق مىقداردا، تۇنيا 35 گرام، كەترا، نشاستە، ئەنزە رۇت، قىزىلگۈل، سەبرى سۇقۇترى، رۇسۇت ھەر بىرى 3.5 گرام، ئاق قەلەي ئۆپسى، سېرىق ھەلىلە ئۈچكىسى ھەر بىرى 7 گرام. ئەپيۇن 4.5 گرام.  
تەييارلىنىشى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ قاندا بويىچە شىياڧ تەييارلىنىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كۆزگە ئاق چۈشۈش، ياشاڭغۇراش، كۆز قىچىشىش كېسەللىكلىرىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

## شىياڧى كافۇر

تەركىبى: قوغۇشۇن 10.5 گرام، كەترا، سەمغى ئەرەبى ھەر بىرى 14 گرام، كافۇر بىر گرام.  
تەييارلىنىشى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ سۇ بىلەن سالايە قىلىپ شىياڧ تەييارلىنىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كۆز قىزىرىپ ئاغرىغان كېسەللەرگە بېرىلىدۇ.

## شىياڧى ئەسۋەد

تەركىبى: زەمچە 20 گرام، رۇسۇت 10 گرام، ئەپيۇن 2 گرام، سەپىداپ



كاشغەرى، كۆك تۇتيا، ئاقىرقەرها پوستى ھەر بىرى 0.75 گرام.  
تەييارلىنىشى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ سۇ بىلەن شىياف تەييارلىنىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كۆزنىڭ قىزىپ ياشاڭغۇراشلىرىغا ئىشلىتىلىدۇ.

### كۆھلى روشنائى

تەركىبى: سۈرمە تېشى 360 گرام، سەڭگى سەبرى 12 گرام، مەرۋايىت 24 گرام، مامرانچىنى 6 گرام، مارجان 15 گرام، ئالتۇن ۋەرەق 4 گرام.  
تەييارلىنىشى: ئالتۇن ۋەرەقتىن باشقا دورىلارنى ھەلىلە سۈيىدە ناھايىتى يۇمشاق سۈرۈپ ئېرىتىپ، 4 كۈن تورغۇزۇلىدۇ. ئاندىن كېيىن يەنە گۈلابقا قوشۇپ 4 كۈن تورغۇزۇلىدۇ. 9-كۈنى ئالتۇن ۋەرەقنى ئارىلاشتۇرۇپ، گۈلابقا يەنە سۈرۈپ تەييارلاپ، تۆمۈر ياكى چىنە قاچدا ساقلىنىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كۆزنىڭ كۆرۈش كۈچىنى ئاشۇرىدۇ. ھەر خىل تېپىكى كۆز ئاغرىقلىرىنى داۋالايدۇ.

### كۆھلى بەياز

تەركىبى: كۆپۈكى دەريا، توغرىغۇ، كېلەر مايىقى، ئاق شېكەر تەڭ مىقداردا، مامرانچىنى، ئىگىر ھەر بىرى 10 گرام، سۇ 280 مىللىتر.  
تەييارلىنىشى: مامران ۋە ئىگىرلارنى سۇغا سېلىپ، قالغىچە قاينىتىپ، يۇقىرىقى دورىلارنى ئېرىتىپ ئاپتاپتا قويۇپ قۇرۇتقاندىن كېيىن يېپەك رەختىن ئۆتكۈزۈپ تەييارلاپ كۆزنىڭ ئىچىگە سۈرتۈلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كۆزگە چۈشكەن ئاقنى ئالىدۇ. ئادەتتە بىر ئاي ئەتراپىدا ئىشلەتسە ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

### كۆھلى غىشاۋە (خىرەلىشىش سۈرمىسى)

تەركىبى: فلفىل، قارىمۇچ، قەنىل تەڭ مىقداردا.  
تەييارلىنىشى: كۆھلى روشنائى ياساشقا ئوخشايدۇ.





خۇسۇسىيىتى: كۆز خىرەلىشىش كېسىلىنى داۋالايىدۇ (سناقتىن ئۆتكەن).

### مەتبۇخى قەنتەرىيۇن

تەركىبى: قەنتەرىيۇن، تۇرپۇت 9 گرامدىن، بسفايەج 21 گرام، ئورۇقى يوق ئۈزۈم 60 گرام.

ياسىلىشى: ھەممىنى چالا سوقۇپ بىر لىتر سۇدا قىسمى قالغىچە قاينىتىپ سىقىپ سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كۆز ياشاڭغۇراشنى توختىتىدۇ.

### ھەببى شەبىيار

تەركىبى: سەبرى سۇقۇتىرى 18 گرام، قىزىلگۈل، سېرىق ھەلىلە پوستى، مەستكى رومى، ئاق تۇرپۇت ھەر بىرى 8 گرام، سەقمۇنيا 4 گرام.


تەرييارلىنىشى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، بادىيان ئەرقى بىلەن خېمىر قىلىپ 0.25 گراملىق ھەب قىلىنىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كۆزنىڭ كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرىدۇ. نامازشام قارغۇسىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

### ئەرقى بادىيان

تەركىبى: بادىيان بىر كىلوگرام، سۇ 5 لىتر.  
تەييارلىنىشى: دورىنى تاسقاپ توپا چاڭلاردىن تازىلىغاندىن كېيىن پار قازىنىغا سېلىپ، ئۈستىگە سۇ قۇيۇپ بىر خىل ئوتتا قاينىتىپ پارغا ئايلاندۇرۇپ ئەرقى تارتىلىدۇ. تارتىلغان ئەرق بىر لىترغا يەتكەندە ئوت توختىتىلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: كۆرۈش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، سۈيدۈك يولىدىكى توسالغۇلارنى ئېچىش، ئاغرىق پەسەيتىش، سۈيدۈك ماڭدۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە.

### مەئجۇنى ۋەج (ئىگىر مەئجۇنى)

تەركىبى: ئىگىر، ئىبارەج فەيقەرا، ئارپا بادىيان، سەئەتەر، ھىلتى (ھىك)، زەنجىبىل







ھەر بىرى 28 گرام، ھەسەل 504 گرام.

تەييارلىنىشى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تاسقاپ، ھەسەلنى 336 م ل ئەرىقى  
بادىياندا قىيام قىلىپ سوۋۇغاندىن كېيىن ئۈستىگە دورىلارنى سېلىپ مەئجۇن  
تەييارلىنىدۇ.

خۇسۇسىيىتى: كۆز كۆرۈش قۇۋۋىتىنىڭ سۇملىشىشى، روشەن كۆرمەسلىك، كۆزگە  
ھەر خىل نەرسىلەر تۇچقانداك كۆرۈنۈش، بىر نەرسىنىڭ ئەينى كۆرۈنمەي چېچىلاشۇ  
كۆرۈنۈشىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.





## قۇلاق كېسەللىكلىرى

قۇلاق پارسىچە گۆش، ئەرەبچە تۇز دەپ ئاتىلىدۇ. تۇ ئادەم بەدىنىدىكى تاشقى بەش سەزگۈ (ھەۋاسى خەمسە زاھىرى) ئەزانىڭ بىرى. تۇنىڭ ئاساسلىق ۋەزىپىسى تەبىئەت دۇنياسىدا ھاسىل بولغان ھەرخىل ئاۋازلارنى توغرا قوبۇل قىلىپ، تۇنى ئۆز ئەينى بويىچە چوڭ مېڭە ئالدىنقى قىسمىدىكى ئاڭلاش مەركىزىگە يەنى ئورتاق ھېس قىلىش (ھىسسى مۇشتەرەك) ئورنىغا يەتكۈزۈپ نورمال ئاڭلاش سېزىمىنى بارلىققا كەلتۈرۈشتىن ئىبارەت. ئۇ بۇ ۋەزىپىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن تۇزىگە خاس ئاڭلاش كۈچى (قۇۋۋەتى سامىئە) گە تايىنىشتىن تاشقىرى قۇلاق سىرتى ۋە ئىچىدىكى ئەزالىرىنىڭ مۇھىم بولغان ۋاستىچىلىك رولىغا تايىنىدۇ. قۇلاقنىڭ ئاڭلاش خىزمىتى نورمال بولغاندىلا ئىنسانلار ئاۋۇشلارنى توغرا تەلەپپۇز قىلىش، سۆزلەرنى تولۇق سۆزلەش ۋە توغرا ئىلىم ئۆگىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولالايدۇ. شۇڭا تىبابىتىمىز قۇلاقنىڭ سىرتى ۋە ئىچكى قىسمىدا يۈز بەرگەن كېسەللىكلىرى يەنى ئۇلاردىكى مىزاجلىق، مىزاجسىز ئۆزگىرىش ۋە سىرتقى زەخىمىدىن بولغان كېسەللىكلەرنىڭ سەۋەبى، ئالامىتى، داۋاسى (ئىچكى ۋە تاشقى داۋاسى، دەستكارلىق توسۇللىرى)، پەرھىزى، ئوزۇقلىنىشى قاتارلىقلارنى تۇزىگە خاس مىللىي ئالاھىدىلىكى بويىچە بىر قەدەر تەپسىلىي بايان قىلىدۇ.

قۇلاق كېسەللىكلىرى بىلەن تونۇشۇش ۋە ئۇلارنى توغرا داۋالاپ بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن قۇلاقنىڭ تۈزۈلۈشىنى پىششىق ئىگىلەشكە توغرا كېلىدۇ.

## قۇلاقنىڭ تۈزۈلۈشى

قۇلاق بەدەندىكى تاشقى بەش سەزگۈ (ھەۋاسى خەمسە زاھىرى) ئەزانىڭ بىرى بولۇپ، ئاڭلاش خىزمىتىنى بېجىرىشتىن سىرت ئادەم بەدىنىنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى





ساقلاشتا مۇھىم رول ئوينايدۇ. ئۇنىڭدا يۈز بەرگەن كېسەللىكلەرنى توغرا تونۇش (تەشخىس قىلىش) ۋە بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ئۇنىڭ تۈزۈلۈشىنى ئىگىلەش كېرەك. قۇلاق سىرتقى قۇلاق، ئوتتۇرا قۇلاق ۋە ئىچكى قۇلاق دەپ ئۈچ قىسىمغا بۆلۈنىدۇ. سىرتقى قۇلاق ئادەتتە قۇلاق، دەپلا ئاتىلىدۇ. ئۇ، قۇلاق تۆشۈكى يەنى سىرتقى قۇلاق يولى ئارقىلىق ئوتتۇرا قۇلاق بىلەن تۇتىشىدۇ. ئوتتۇرا قۇلاق قۇلاق ناغرىسى يەنى قۇلاق پەردىسى ئارقىلىق ئىچكى قۇلاق بىلەن تۇتىشىدۇ.



## سىرتقى قۇلاق

سىرتقى قۇلاق — قۇلاق سۇپرىسى ۋە سىرتقى قۇلاق يولىدىن تەركىب تاپقان.

### قۇلاق سۇپرىسى

قۇلاق سۇپرىسى — باشنىڭ ئىككى يېنىغا چىقىپ تۇرغان، سەتھى (يۈزى) ئويمان-دۆڭ، ئېگىز-پەس تەكشى بولمىغان، شەكلى سەدەپ قېيى ياكى بۆرەككە ئوخشايدىغان ئەزادۇر. ئۇ ئەۋرىشىمچانلىققا ئىگە تاللىق يۇمشاق كۆمۈرچەكتىن تۈزۈلگەن ۋە سىرتى تېرە بىلەن قاپلانغان. قۇلاق سۇپرىسىدا ئادەتتە مۇسكۇل بولمايدۇ. ئەمما ھايۋانلاردا مەسلەن، ئىت، ئېشەك، توشقان قاتارلىق ھايۋانلاردا ئوخشىمىغان چوڭلۇقتىكى مۇسكۇللار بولىدۇ. شۇڭا ئۇلار بۇ مۇسكۇللار ئارقىلىق قۇلاقلىرىنى ھەرىكەتلەندۈرەلەيدۇ. بەزى ئادەملەرنىڭ قۇلقىدىمۇ ئاز ھەم كىچىك مۇسكۇللار بولىدۇ. شۇڭا ئۇلارمۇ قۇلقىنى ئازدۇر-كۆپتۈر مېدىرلىتالايدۇ. قۇلاق سۇپرىسىدىكى ئېگىز-پەس، ئويمان-دۆڭ جايلارنىڭ تىبابىتىمىزدە ئۆزىگە خاس ناملىرى بار. مەسلەن: قۇلاق سۇپرىسىنىڭ چۆرىسىدىكى كانارىسى — ئىھاتە تاجى، ئۇنىڭ تۆدۈلىدىكى دۆڭكە قىر-ئوتتۇرا تاجى، بۇ ئىككى تاجى ئوتتۇرىسىدىكى سوزۇنچاق ئويمانلىق قولۋاقسىمان ئورەكچە، ئوتتۇرا تاجىنىڭ يۇقىرىدا ئىككىگە بۆلۈنۈشىدىن پەيدا بولغان ئويمانلىق ئۈچبۇرجەكلىك ئورەكچە، ئوتتۇرا تاجىنىڭ ئالدىدىكى چوڭقۇرراق ئويمانلىق مەركىزىي ئورەكچە دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇنى ئىھاتە تاجىنىڭ پەسلىگەن ئۈچى ئىككىگە بۆلۈۋېتىدۇ. مەركىزىي ئورەكچىنىڭ ئوتتۇرىسى قۇلاق تۆشۈكى دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇنىڭ





4، 5-رەسىم (قەدىمكى كىتابلاردىكى قۇلاقنىڭ تۈزۈلۈش سىخىمىسى)

ئۇدۇلدىكى دۆڭچىنىڭ ئاستى تەرىپى قۇلاق يۇمشىقى دەپ ئاتىلىدۇ. قۇلاق يۇمشىقىدا كۆمۈرچەك بولمايدۇ. قۇلاق سۇپىسى تېرە ئاستى توقۇلمىلىرى كۆمۈرچەك بىلەن مەھكەم جىپسىلاشقان بولغاچقا، سىرتقى زەخمىدىن بولغان قانلىق ئىششىقلار ئاسانلىقچە شۇمۇرۇلمەيدۇ. قۇلاق يۇمشىقى تېرە ئاستى ياغلىرىدىن تۈزۈلگەچكە، قۇلاق سۇپىسى ۋەرەملەنگەندە ئادەتتە ئۇنىڭغا تەسىر بەتمەيدۇ. قۇلاق سۇپىسى نېپىز بولۇپ قان تومۇرلار يۈزەكى جايلاشقانلىقتىن، ئۇنىڭدا ئۇششۇك يارىسى ئاسانلا پەيدا بولىدۇ. قۇلاق سۇپىسى سىرتقى دۇنيادىكى ئاۋاز دولقۇنلىرىنى يىغىپ قۇلاق تۈشۈكى ئارقىلىق قۇلاق ناغرا پەردىسىگە يەتكۈزۈپ بېرىش رولىنى ئوينايدۇ.





## سرتقى قۇلاق يولى

سرتقى قۇلاق يولى — مەركىزىي ئورەكچە چوڭقۇر يېرى يەنى قۇلاق توشۇكىدىن باشلىنىپ قۇلاق ناغرا پەردىسىدە ئاخىرلىشىدۇ. ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 2 ئىلىك (ھازىرقى تۆلچەمدە 3.5—2.5 سانتىمېتىر) كېلىدۇ. ئۇ تۈز بولماي ئەگرى بولىدۇ يەنى ئالدى قىسمى كەڭرەك، ئوتتۇرا قىسمى تارراق كېلىدۇ. سرتقى  $1/3$  ئۇلۇشى كۆمۈرچەك، ئىچكى  $2/3$  ئۇلۇشى سۆڭەكتىن تەركىب تاپىدۇ. كۆمۈرچەك قىسمىدا كۆپلىگەن ھەر خىل كىچىك بەزلەر بولىدۇ. بۇلاردىن بىر خىل مۇسسىمان سۇيۇقلۇق سرغىپ چىقىپ تۇرىدۇ. بۇ ئادەتتە قۇلاق كىرى دەپ ئاتىلىدۇ. جەراسىملاردىن ئاسانلا يۇقۇملىنىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا يەنە ماي بەزلىرى ۋە تۇششاق تۈكلەر بار بولۇپ، تۈكلەر ھەر خىل چاڭ-توزانلار ۋە ھاساراتلارنىڭ قۇلاق ئىچىگە كىرىپ كېتىشىدىن ساقلايدۇ. قۇلاق يولىنىڭ كۆمۈرچەك بىلەن سۆڭەك قىسمى ئاباغلاشقان قىسمى تار بولۇپ، بۇ جاي يات نەرسىلەرنى قىسىپ ئۆتكۈزۈمەسلىك رولىغا ئىگە بولۇپلا قالماي، بەلكى ئۇنىڭدا ئەسەبلەر ناھايىتى كۆپ بولىدۇ.

## ئوتتۇرا قۇلاق

ئوتتۇرا قۇلاق — ناغرا پەردە، ناغرا بوشلۇقى، يۇتقۇنچاق ناغرا كانىلى، ناغرا يولى ۋە ئەمچەكسىمان ئۆسۈكچىلەرنى تۈز ئىچىگە ئالىدۇ.

## قۇلاق ناغرا پەردىسى

قۇلاق ناغرا پەردىسى سوزۇلۇشچان، يېرىم سۈزۈك نېپىز پەردىدىن تۈزۈلگەن بولۇپ، قۇلاق يۇتقۇنچاق ناغرا كانىلىنىڭ گىرۋەكلىرى بىلەن تۇتاشقان بولىدۇ. بولغا سۆڭەكنىڭ سېپى مۇشۇ پەردىنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۈزۈكسىمان ھالەتتە چاپلىشىپ تۇرىدۇ. ئىچكى تەرەپكە تارتىپ تۇرىدۇ. شۇڭا قۇلاق پەردىسىنىڭ ئىچكى تەرىپى دۆڭرەك، سرتقى تەرىپى ئويمانراق كېلىدۇ. بولغا سۆڭەك بىلەن تۇتاشقان قىسمى 3 قەۋەت بولۇپ، سرتقى قەۋىتى ئەستەرسىمان تېرە، ئوتتۇرا قەۋىتى يېسىمان، ئىچكى قەۋىتى شىلمىشىق پەردىدىن تەركىب تاپقان. ئىچكى تەرىپى ناغرا بوشلۇقى بولۇپ، ئۇنىڭدا كىچىك 3 دانە ئاڭلاش سۆڭىكى بولغا سۆڭەك، سەندەل سۆڭەك ۋە تۈزەڭگە سۆڭەكلەر بولىدۇ. بولغا





سۆڭەك قۇلاق پەردىسى بىلەن چېتىلىپ تۇرىدۇ. ئوتتۇرىدىكى سەندەل سۆڭەكنىڭ بىر تەرىپى بولغا سۆڭەك بىلەن يەنە بىر، تەرىپى تۈزەڭگە سۆڭەك بىلەن تۇتىشىپ تۇرىدۇ. بۇ سۆڭەكلەر تارامۇش، چاندىرلار يەنى ئالدىنقى چاندىر (رباتى مۇقەددەم)، تۆۋەنكى چاندىر (رباتى مۇتەخخەر)، ئېسىپ تورغۇچى چاندىر (رباتى مۇتەللەق)، يۇمىلاق چاندىر (رباتى مۇستەدىر) قاتارلىق 4 چاندىر ئارقىلىق ئۇزۇنلۇق تۇتىشىپ ئاڭلاش زەنجىرىنى ھاسىل قىلىدۇ. يەنە كىچىك مۇسكۇللارمۇ بولۇپ، بولغا سۆڭەك ۋە تۈزەڭگە سۆڭەك ھەرىكىتىنى تىزگىنلەپ تۇرىدۇ. ئاۋاز دولقۇنى قۇلاققا يېتىپ كەلگەندە ئالدى بىلەن قۇلاق پەردىسىنى تەۋرىتىدۇ. قۇلاق پەردىسى مەزكۇر ئاڭلاش سۆڭەكلىرىنى تەۋرىتىدۇ. ئەگەر ئاۋاز دولقۇنى بەك كۈچلۈك بولۇپ كەتسە ئاڭلاش سۆڭەكلىرى ئونى پەسەيتىش، بەك ئاجىز بولۇپ كەتسە ئونى نورمال ھالدا ئاڭلاش نېرۋا (ئەسەبى سامىئە) سىغا يەتكۈزۈپ بېرىشكە ياردەم بېرىش رولىنى ئوينايدۇ.

### ناغرا بوشلۇقى

ناغرا بوشلۇقى — ئوتتۇرا قۇلاق بوشلۇقى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. سىرتقى قۇلاق بىلەن ناغرا بوشلۇقىنى ناغرا پەردە ئايرىپ تۇرىدۇ. ناغرا بوشلۇقى چېكە سۆڭەكنىڭ ئىچىگە جايلاشقان. بۇ بوشلۇق رەتسىز 6 تېمى بار بوشلۇقتىن ئىبارەت بولۇپ، سىرتقى تېمى قۇلاق ناغرا پەردىسى بولۇشتىن سىرت ئالدى تېمى ئويۇق قىزىلقان تومۇرى (شەريانى سۇبات) بىلەن ئارقا تېمى چېكە سۆڭەك ئەمچەكسىمان ئۆسۈكچىسىنىڭ ھەرە ھۆكۈنكىسىمان قىسمى بىلەن، ئۈستى تېمى نېپىز سۆڭەك قەۋىتى بىلەن، ئاستى تېمى بويۇن ئىچكى كۆك تومۇرى ئۆسۈكچىسى بىلەن، ئىچكى تېمى ئىچكى قۇلاق بىلەن چېگرىلىنىدۇ. ناغرا بوشلۇقى ئىچىدە ھاۋا بار بولۇپ، قۇلاق پەردىسىنىڭ تەۋرىنىشى ۋە ئاڭلاش سۆڭەكلىرىنىڭ تىرىشىگە ئاسانلىق يارىتىپ بېرىدۇ.

### يۇتقۇنچاق ناغرا كانىلى

يۇتقۇنچاق ناغرا كانىلى — قۇلاق يۇتقۇنچاق نەبجىسى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن بىر يېرىم ئىلىك (3.5 سانتىمېتىر) بولۇپ، سىرتقى  $1/3$  قىسمى سۆڭەك، ئىچكى  $2/3$  قىسمى كۆمۈرچەكتىن تەركىب تاپىدۇ. ئىچىگە ئۇزۇن، ياپىلاق كېلىدۇ. ناغرا پەردىسىدىن باشلىنىپ، قىيىسق ھالدا تۆۋەنگە مېڭىپ يۇتقۇنچاق يان تېمىدا





ئېغىز ئېچىلىدۇ. شۇڭا ئىسسىقتىن بولغان نەزلە (نەزلە ئى ھار) دە ياكى بادامسىمان بەز ئىششىقىدا ئىششىق تۈپەيلىدىن قۇلاق توسۇلۇپ قالغاندەك يۇقىرى ئاۋازدا سۆزلىمىسە تاڭلىماس بولۇپ قالىدىغان ئەھۋاللار كۆرۈلىدۇ.

يۇتقۇنچاق كانىلى ناغرا بوشلۇقىنىڭ سىرتقى مۇھىت بىلەن ئالاقە قىلىدىغان بىردىن-بىر يولى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. كىچىك بالىلارنىڭ يۇتقۇنچاق ناغرا كانىلى چوڭلارنىڭكىگە قارىغاندا قىسقا، توم ھەم توغرا ھالەتتە بولۇپ، بۇرۇن يۇتقۇنچاق قىسمىدىكى يۇقۇملىنىش ئاسانلا ئوتتۇرا قۇلاققا كىرىپ كېتىدۇ. بۇ كىچىك بالىلارنىڭ ئاسانلا قۇلاق ياللۇغى، قۇلاق ئاقمىسى بىلەن ئاغرىشىدىكى ئاساسىي سەۋەبتۇر. قۇلاق يۇتقۇنچاق نەيچىسى بوشلۇقىدىكى ھاۋانى نورمال مىقداردا تەڭشەپ تۇرىدۇ. تۇخۇددى نەي ئاۋازىنىڭ زىل ۋە ياڭراق چىقىشىغا شارائىت يارىتىپ بەرگەندەك ناغرا بوشلۇقىدىكى ئارتۇق ھاۋالارنى نەيچىسى ئارقىلىق سىرتقا چىقىرىپ تۇرىدۇ. ناغرا بوشلۇقى ئىچىدىكى بەلغەمسىمان، ئىلىمىشىق سۇيۇقلۇقلارنى مۇشۇ نەيچە ئارقىلىق گال تەرەپكە چۈشۈرىدۇ. شۇڭا بۇ نەيچىلەر توسۇلۇپ قالسا قۇلاق ئېغىرلىق ۋە تاڭلاشنىڭ يېتەرسىزلىكى كېلىپ چىقىدۇ.

### ناغرا يولى ۋە ئەمچەكسىمان ئۆسۈكچە

ناغرا يولى ناغرا بوشلۇقىنىڭ ئارقا يۇقىرى سۆڭەك قىسمىغا سوزۇلغان ھاۋا دالانىچىسى بولۇپ، يېڭى تۇغۇلغان بالىلاردا سىرتقى قۇلاق يولىنىڭ يۇقىرىقى تەرىپىگە جايلىشىدۇ. بالىلار ئۆسۈش جەريانىدا ناغرا يولى داۋاملىق ئارقا تەرەپكە سوزۇلۇپ، ھەرە ھۆكۈنكىگە ئوخشاش كىچىك ھۆكۈنەكلەرنى ھاسىل قىلىدۇ. بۇ ئەمچەكسىمان ئۆسۈكچە دەپ ئاتىلىدۇ. بالا تۇغۇلغاندىن كېيىنلا ناغرا يولى بولۇپ، بىر ياشتىن كېيىن ئەمچەكسىمان ئۆسۈكچە يېتىلىشكە باشلايدۇ. بالاغەتكە يەتكەندە تولۇق يېتىلىپ بولىدۇ. ئەمچەكسىمان ئۆسۈكچە كىچىك دالانىچىسى ئىچىدە بىر نېپىز قەۋەتلىك شىللىق پەردە بار بولۇپ، ناغرا يولى، ناغرا بوشلۇقى قاتارلىقلار بىلەن ئۆزئارا تۇتىشىدۇ. شۇڭا ئوتتۇرا قۇلاق ۋە رەملىگەندە جەراسىملار ناغرا يولى ئارقىلىق ئەمچەكسىمان ئۆسۈكچىسىگە كىرىپ، بىرىڭلىق ئەمچەكسىمان ئۆسۈكچە ۋە رەمنى پەيدا قىلىدۇ. ناغرا يولى، ئەمچەكسىمان ئۆسۈكچىنىڭ ئۈستى تەرىپى بىر نېپىز سۆڭەك ئارقىلىق مېڭە مەركىزىي ئويىمىنى بىلەن ئايرىلىپ تۇرىدۇ. ئەمچەكسىمان ئۆسۈكچە ئارقا ئىچكى تېمى كىچىك مېڭە ۋە ئەمچەك ئۆسۈكچە كىچىك دالانىچىسىنى ئاجرىتىپ تۇرىدۇ. شۇڭا ئەمچەكسىمان ئۆسۈكچىدە



يىرىڭلىق ياللۇغ بولغاندا ناغرا يولى، ئەمچە كىسمان ئۆسۈكچە ئۈستى نېپىز سۆڭەكنى چىرىتىپ مېگە ئىچىدە قوشۇمچە كېسەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

## ئىچكى قۇلاق

ئىچكى قۇلاقنىڭ تۈزۈلۈشى مۇرەككەپ پارق بولغاچقا ھۆكۈمالىرىمىز ئونى جاڭگال يول، دەپمۇ ئاتىغان. ئۇ چېكىنىڭ قاتتىق قىسمىغا جايلاشقان بولۇپ، ئەتراپى قاتتىق سۆڭەك ماددىسىدىن تۈزۈلگەن. شۇڭا ئۇ، سۆڭەكلىك جاڭگال يول دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇنىڭ ئىچكى تەرىپى پەردە بىلەن ئەستەرلەنگەن بولۇپ پەردىلىك جاڭگال يول دەپ ئاتىلىدۇ. پەردە ئىچى سۇيۇق، پارقراق بىر خىل سۇيۇقلۇققا تولغان بولۇپ، ئاڭلاش ئەسەبلىرىنىڭ تۈگەنچە شاخلىرى مۇشۇ پەردە قىسمىدا ئاخىرلاشقان بولىدۇ.

### سۆڭەكلىك جاڭگال يول

سۆڭەكلىك جاڭگال يول 3 قىسىمغا بۆلۈنگەن بولۇپ، ئالدى تەرىپىدىكى نەيچە قۇلاق قۇلۇلىسى، ئونىڭ ئارقا تەرىپىدىكى بوشلۇق قۇلاق دالانىچىسى، دالانىچە ئارقا تەرىپىدىكى 3 تال يېرىم دائىرە يېڭى ئايىسمان نەيچىلەر دەپ ئاتىلىدۇ. دېمەك قۇلاق دالانىچىسى ئوتتۇرىغا جايلاشقان بولۇپ ئالدى قۇلاق قۇلۇلىسى، ئارقا يېرىم دائىرىلىك ئايىسمان نەيچىلەر بىلەن تۇتىشىدۇ.

1. قۇلاق قۇلۇلىسى: قۇلاق قۇلۇلىسى بۇرما شەكلىدىكى سۆڭەك نەيچە بولۇپ، شەكلى قۇلۇلىگە ئوخشايدۇ، بەنى تاڭ يورۇغاندەك دائىرىسىمان كېلىدۇ. شۇڭا قۇلاق قۇلۇلىسى دەپ ئاتالغان. ئوتتۇرىسىدىكى تۈۋرۈككە ئوخشاش ئوقىغا سۆڭەك نەيچىلىرى ئارتىلىپ ئىككى يېرىم دائىرە ئايلىنغان بولىدۇ. ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 1.5 ئىلىك (ھازىرقى ئۆلچەمدە 3 سانتىمېتىر) كېلىدۇ. تۈۋى تەرىپىدە تۆشۈكلەر بار بولۇپ، ئاڭلاش ئەسەبلىرىنىڭ شاخلىرى تۇتۇشكەن بولىدۇ. بۇرما نەيچە بىر خىل تولۇق بولمىغان پەردە ئارقىلىق ئىككىگە ئايرىلىپ تۇرسىمۇ، لېكىن ئىچى بىر خىل سۈزۈك، پارقراق سۇيۇقلۇق بىلەن تولغان بولىدۇ.

2. قۇلاق دالانىچىسى: قۇلاق دالانىچىسى ئىچكى قۇلاقنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى قىسمى بولۇپ، شەكلى تۇخۇمغا ئوخشايدۇ. ئونىڭ ئۇزۇنلۇقى ۋە كەڭلىكى 1.2 ئىلىك كېلىدۇ. ئونىڭ 3 دىۋارى ۋە ئىككى بېشى بولىدۇ. سىرتقى دىۋارىدا تۇخۇمىسىمان تۆشۈك بولىدۇ.





مەزكۇر تۆشۈك ئۈزەككىسىمان سۆڭەك بىلەن يېپىلىپ تۇرىدۇ. ئىچكى دىۋارنىڭ ئالدى تەرىپىدە بىر يۇمىلاق ئويمانلىق بولۇپ، ئۇنىڭدا ئاڭلاش ئەسەب تاللىرى ئۆتىدىغان بىرقانچە تۆشۈكلەر بولىدۇ. قۇلاق دالانىچىسى بىلەن تۇتىشىپ تۇرىدىغان يېڭى ئايىسىمان دىۋارىدا يەنە بىر تۇخۇمىسىمان ئويمانلىق بولىدۇ. قۇلاق دالانىچىسىنىڭ كەينى يېشى يېڭى ئايىسىمان نەيچىلەرنىڭ 5 تال تۆشۈكى بىلەن، ئالدى يېشى قۇلاق قۇلۇلىسىنىڭ تۆشۈكى بىلەن تۇتىشىدۇ.

3. يېڭى ئايىسىمان نەيچىلەر: مەزكۇر نەيچىلەر 3 تال بولۇپ، بىرى دالانىچىنىڭ ئالدى تەرىپىدە، يەنە بىرى كەينى تەرىپىدە، يەنە بىرى سىرتقى تەرىپىدە تۇرىدۇ. ئۇلارنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئوخشاش ئەمەس بولۇپ، ئوملىقى تەخمىنەن 1.5 ئىلىك (ھازىرقى ئۆلچەمدە 1—1.5 سانتىمېتىر) كېلىدۇ. بۇ نەيچىلەر شەكىل جەھەتتە يېڭى چىققان ئايغا ئوخشاش يېرىم دائىرىلىك بولىدۇ. بۇ ئۈچ نەيچە 5 دانە تۆشۈك ئارقىلىق قۇلاق دالانىچىسىنىڭ ئىچىدىكى تۇخۇمىسىمان خالتىچاق پەردىگە ئېچىلىدۇ. ھەرقايسى نەيچىلەرنىڭ باشلانغان يېرى كۆپكەن يەنى ئازادىرەك بولىدۇ. پەردىلىك جاڭگالدا بىر خىل سۇيۇقلۇق تولغان بولۇپ ئاڭلاش ئەسەب تاللىرى شۇ يەردە ئاخىرلىشىدۇ. ئاۋاز دولقۇنلىرى شۇ سۇيۇقلۇقتا دولقۇن پەيدا قىلىدۇ. ئاڭلاش ئەسەب يېپىچىلىرى تەسىر قوبۇل قىلىپ ئۆز خىزمىتىنى ئورۇنلايدۇ ۋە ئورگانىزىمنىڭ تەڭپۇڭلۇق سېزىمى ئۈچۈنمۇ ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدۇ. دېمەك يېڭى ئايىسىمان نەيچىلەر ئاۋاز دولقۇنىنى ئۆزىدىكى سۇيۇقلۇقلارغا توپلايدۇ ۋە ئۇنى ئاڭلاش ئەسەبلىرىگە يەتكۈزۈپ بېرىدۇ.

### پەردىلىك جاڭگال يول

پەردىلىك جاڭگال يول — سۆڭەكلىك جاڭگال يول ئىچىگە جايلاشقان بولۇپ، ئىچىدە سوزۇق تۇخۇمىسىمان بىر خالتا بولىدۇ. ئۇنىڭدا يېڭى ئايىسىمان نەيچىلەرنىڭ 5 تال تۆشۈكى ئېچىلغان بولىدۇ. سوزۇق تۇخۇمىسىمان خالتىغا يەنە بىر كىچىك يۇمىلاق خالتىچاق قوشۇلۇپ كەلگەن بولىدۇ. دېمەك، سوزۇق تۇخۇمىسىمان خالتا، يۇمىلاق خالتىچاق ۋە 3 تال يېڭى ئايىسىمان نەيچىلەرنىڭ ھەممىسى قوشۇلۇپ پەردىلىك جاڭگال يولىنى تەشكىل قىلىدۇ. پەردىلىك جاڭگال يولىنىڭ ئىچكى قىسمى ئىنتايىن نېپىز بىر خىل پەردە بىلەن ئەستەرلەنگەن بولۇپ، ئۇ خۇددى مەخمەلنىڭ تۈپلىرىگە ئوخشاش سۇيۇقلۇققا تولغان بولىدۇ. ئاڭلاش ئەسەبلىرىنىڭ تاللىرىمۇ مۇشۇ جايدا ئاخىرلىشىدۇ. بۇ سۇيۇقلۇق ئاۋاز دولقۇنلىرىنى ئاڭلاش ئەسەبلىرىگە يەتكۈزۈپ بېرىدۇ.



## قۇلاققا پايدىلىق ۋە پايدىسىز ئامىللار

قۇلاقنىڭ ئاساسلىق خىزمىتى ئاۋاز سېزىشتىن ئىبارەت. قۇلاقنىڭ ئاۋاز ھېس قىلالىشى ئاڭلاش قۇۋۋىتى (قۇۋۋەتى سامىئە)دىن باشقا سىرتقى ۋە ئىچكى قۇلاق يەنە قۇلاق سۇپرىسى، قۇلاق يولى، قۇلاق پەردىسى، ئاڭلاش سۆڭەكلىرى ۋە ئاڭلاش ئەسەبلىرى قاتارلىقلارنىڭ ھەر خىل دەرىجىدىكى ۋاسىتىلىق رولى ئارقىلىق مېڭىگە يېتىپ بارغان. بىدىن كېيىن ئورتاق ھېس قىلىش (ھىسسى مۇشتەرەك) كۈچى تۈپەيلىدىن بارلىققا كېلىدۇ. شۇڭا ئاڭلاش خىزمىتىنىڭ نورماللىقىغا كاپالەتلىك قىلىش ۋە قۇلاق كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا قۇلاقنىڭ ھەر قايسى ئەزالىرىنى ئاسراشقا ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىش، قۇلاققا پايدىلىق ۋە پايدىسىز ئامىللار بىلەن تونۇشۇش مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. قۇلاقنىڭ ھەر خىل كېسەللىك ئۆزگىرىشلىرى كۆپىنچە ھاللاردا مېڭىدىكى ئۆزگىرىشلەرنىڭ ئىنكاسى بولۇپ، مەلۇم مەنىدە ئېيتقاندا قۇلاقنى ئاسراش رەئىس ئەزا مېڭىنى ئاسرىغان بىلەن تەڭ.

قۇلاقنىڭ تازىلىقىغا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. بۇنىڭدا ئاساسلىق سىرتقى قۇلاق يولىنىڭ تازىلىقىغا دىققەت قىلىش، قۇلاقنى قالايمىقان كولىماسلىق كېرەك. تۇنداق بولمىغاندا قۇلاق يولىغا كىرىپ قېلىپ قۇلاق قىچىشى قاتارلىق كېسەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. تۇنىڭغا قۇلاقنى قالايمىقان كولاش قوشۇلسا، قۇلاق يولى جەراسىملاردىن ئوقۇنۇپ قۇلاق ۋە رىسى، قۇلاققا مۇدۇر-چاقا چىقىشىلارنى پەيدا قىلىدۇ. مۇدۇر-چاقىلاردىكى يەنىمۇ ئوقۇنۇپ تەلەنگەن جەراسىملار قۇلاقنىڭ ئېغىر دەرىجىدىكى كېسەللىكلەرنى پەيدا قىلىپلا قالماي، بەلكى قۇلاققا يېقىن بولغان ئەزا مېڭىدە ئىششىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھەتتا ھاياتقا خەۋپ يەتكۈزىدۇ. شۇڭا ئامال بار چاڭ-توزانلىق جايلاردا كۆپ تۇرماسلىق، بۇلغانغان سۇ ۋە ھاشارات قاتارلىقلارنىڭ قۇلاق يولىغا كىرىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش، قۇلاقنى قالايمىقان كولىماسلىق كېرەك. يۈز-كۆزنى يۇيغاندا قۇلاقنى پاكىزە يۇيۇش، قۇلاق يولىغا سۇ كىرگۈزۈۋەتمەسلىك شەرتى ئاستىدا سىرتقى قۇلاق تۈشۈكىنىڭ ئېغىزىغا بارماق يۇمشىقىنى ئايرىپ ئايلاندۇرۇپ تازىلاش، سىرتقى قۇلاق يولىغا ھەپتە-ئون كۈندە بىر قېتىم بادام يېغى تېمىتىش ياكى پاكىزەلەنگەن پاختا بىلەن پىلىتىكۈچ ياساپ ئۇنى بادام يېغى، گۈل يېغى ۋە كۈنجۈت يېغى قاتارلىقلارغا تەككۈزۈپ سىرتقى قۇلاق يولىغا ئېھتىيات بىلەن كىرگۈزۈپ قۇلاق تاملىرىنى سۈرتۈش



كېرەك. ئۇنىڭدىن كېيىن قىزىق مۇنچىغا چۈشسە ياكى قۇلاقنى ھوردىسا كېرەك ئۈزلۈكسىز چىقىپ كېتىدۇ. چاڭ-توزان ۋە شامال-بوران چىققان شارائىتتا ئىشلىگەن ياكى قۇلاققا سۇ كۆرپ كېتىش ئېھتىمالى بولغان ۋە كىچىك قۇرۇت-ھاشارات كۆپ بولغان مۇھىتتا ياشىغاندا پاكىزلەنگەن پاختىدىن كىچىك شارچە ياساپ قۇلاق تۈشۈكىگە تىقىپ قويۇش، قۇلاقنى قالايمىقان كولىماسلىققا ئالاھىدە دىققەت قىلىش كېرەك. ئۇنداق بولمىغاندا يۇقىرىقىدەك يامان ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشتىن سىرت، قۇلاق پەردىسىنىڭ ئوخشىمىغان دەرىجىدە تېشىلىشىنى پەيدا قىلىپ ئوخشىمىغان دەرىجىدە ئاڭلاش سېزىمىنىڭ تۈۋەنلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ھەمدە ھەر خىل قۇلاق جاراھەتلىرى ۋە ئاقىمىسىغا سەۋەب بولىدۇ.

يېمەك-ئىچمەك ۋە يېتىپ قويۇش جەھەتتە زىيادە ئىسسىق-سوغۇق ۋە يەللىك نەرسىلەرنى كۆپلەپ ئىستېمال قىلىشتىن ساقلىنىش، بولۇپمۇ ئەدەس، باقىلا، بادەنجانغا ئوخشاش نەرسىلەردىن كۆپ ئىستېمال قىلماسلىق كېرەك. ئاڭلاش ئىقتىدارىنى ئاۋۇت قىلغۇچى دورىلارنى ئىشلىتىشتىن قاتتىق ساقلىنىش كېرەك. بەك سوغۇق، ئىسسىق جايلاردا يېتىش، قاتتىق قەي قىلىش، ھەددىدىن زىيادە جىنسىي ئالاقە قىلىش، كۆپ مۇنچىغا چۈشۈش، كۆپ ئويۇقسىزلىق قاتارلىقلاردىن ھەزەر ئەيلەش كېرەك. تۇيۇقسىز قاتتىق ۋارقىرىغان ۋە دەھشەتلىك پارتلاشتىن پەيدا بولغان ئاۋازلاردىن ساقلىنىش كېرەك. يىلدا بىرەر قېتىم مۇناسىۋەتلىك ھەب ۋە ئىيارەجلەر بىلەن بەدەننى تازىلاپ تورغاندا قۇلاققا مۇدۇر-چاقا، ئىششىق ۋە جاراھەت پەيدا بولۇشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. قۇلاققا پەيدا بولغان مۇدۇر-چاقىلار مېڭىدىكى ئىششىقلاردىن خەۋەر بېرىدۇ. بۇ چاغدا سىرتقى جەھەتتە شىياۋى ئەيىزنى ئۈزۈم سىركىسىدە ئېرىتىپ قۇلاققا تېمىتىشمۇ ناھايىتى ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ. قويۇقراق ھەسەلدىن شامپچە ياساپ قۇلاققا قويۇش ياكى بادام يېغىنى تېمىتىش قۇلاقنى ئاسراشقا كۆپ پايدىلىق. قۇلاققا تېمىتىلدىغان دورىلار بەك قىزىق ياكى سوغۇق بولماي بەلكى يىلما بولۇش، بەك كۈچلۈك دورىلارنى بىراقلا ئىشلەتمەسلىك كېرەك. ئۇنداق بولمىغاندا مېڭە پەردە ۋە رىمى (مېنىڭگى) نى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

## قۇلاق كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتىكى ئومۇمىي قائىدىلەر

ھەر خىل قۇلاق كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن تونىڭ مزاج يۈزۈلۈشى يەنى



سوئى مزاج (خىلىتلىق ياكى خىلىتسىز)دىن بولغانلىقى ياكى شەكىل تۈزگەرتكەنلىكى يەنى مەرەزى تەركىبىدىن ئىكەنلىكى ياكى پۈتۈنلۈكى بۇزۇلغانلىقى يەنى تەفەررۇقى ئىتتىسالىدىن كېلىپ چىققانلىقىنى ئايرىش كېرەك.

ماددىسىز سوئى مزاجدىن بولغان قۇلاق كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتا ئادەتتە كۆپىنچە، قارىمۇ-قارشى داۋالاش ئۇسۇلىنى قوللىنىش، ئىچكى ۋە تاشقى جەھەتتە يەڭگىل چارىلەرنى قىلىش، يېمەك-ئىچمەكنى رەتتە سېلىش ئاساس قىلىنىدۇ. مەسىلەن، ساددە ئىسسىق ياكى سوغۇقتىن بولغان قۇلاق ئاغرىش، ئادەتتىكى قۇلاق ئېغىرلىقى ۋە گاسلىق، ئىسسىق-سوغۇق بولغان ئاددىي قۇلاق ۋە رەملىرى قاتارلىقلاردا ئىسسىق بولسا سوغۇق، سوغۇق بولسا ئىسسىق دورا ۋە چارىلەر قوللىنىلىدۇ. ماددىلىق سوئى مزاجدىن بولغان قۇلاق كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتا كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى ماددا (خىلىت) نى مۇناسىپ پىشۇرغۇچى (مۇنزىج) دورىلار بىلەن پىشۇرۇپ، تازىلىغۇچى (مۇسھىل) دورىلار بىلەن تازىلاش كېرەك (بۇنىڭدا قۇلاققا يېقىن ئەزا مېڭىنى تازىلاشقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك). مزاج تەڭشەلگەندىن كېيىن ئىچكى ۋە سىرتقى جەھەتتە مەخسۇس دورىلار ئىشلىتىلىدۇ. كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ ھەر خىل قول ئەمەلىيىتى بىلەن داۋالاش ئۇسۇللىرى قوللىنىلىدۇ. يېمەك-ئىچمەك جەھەتتە دىققەت قىلىش بىلەن بىرگە قاتتىق پەرھىز بۇيرۇلىدۇ. مەسىلەن خىلىتلىق قۇلاق ئاغرىقلىرى، ماددىلىق قۇلاق ئېغىرلىقى ۋە گاسلىق، قۇلاق غوڭغۇلداش، مزاجنىڭ ماددىلىق بۇزۇلۇشىدىن بولغان ئېغىر قۇلاق ۋە رەملىرى، خىلىتلىق قۇلاق چاقىسى، قاننىڭ زىيادىلىكىدىن بولغان قۇلاق قاناش قاتارلىقلاردا ئالدى بىلەن كېسەل ماددىسىنى تازىلاپ مزاجنى تەڭشەلگەندىن كېيىن ئاساسىي داۋالىغۇچى دورىلار ئىشلىتىلىدۇ ۋە كېسەللىك ئەھۋالىغا، يەرلىك ئورۇنغا مۇناسىپ داۋالاش ئۇسۇللىرى قوللىنىلىدۇ.

شەكىل ياكى تەركىب تۈزگەرتكەن قۇلاق كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتا سەۋەبچى بولغان ئامىلنى توختىتىش، يوقىتىش ۋە يەرلىك ئورۇنغا چارە قىلىشنى ئاساس قىلىش كېرەك. مەسىلەن، تۇغما ئىچكى ۋە سىرتقى قۇلاق كېسەللىكلىرى، قۇلاققا ھاشارات سۇ ۋە غەيرىي نەرسىلەر كىرىپ كېتىشتىن بولغان قۇلاق ئاغرىش، قۇلاق غوڭغۇلداش، قۇلاق قىچىشىش، قۇلاققا گۆش تۇسۇش، سۆڭەك پەيدا بولۇش، قۇلاق چاقىسى قاتارلىقلار. تۇغما قۇلاق كېسەللىكلىرى كۆپىنچە ھاللاردا ساقايمايدۇ. لېكىن كونكرېت ئەھۋالغا ئاساسەن بەزى دەستىكارلىق ئۇسۇللىرى قوللىنىلىدۇ. قۇلاق يولىدىكى غەيرىي نەرسىلەر ئاساسەن ھەر



خىل مۇناسىپ ئۇسۇللار ئارقىلىق بىر تەرەپ قىلىنىدۇ. تېپىلغاندا پاكىزلەش، كېسىشتەك دەستكارلىق ئۇسۇللىرى قوللىنىلىدۇ. قۇلاق چاقىسى قاتارلىقلارنى داۋالاشتا ئىچكى جەھەتتە دورا ئىشلىتىش بىلەن بىرگە سىرتقى جەھەتتە داۋالاش ئاساس قىلىنىدۇ. چۈنكى قۇلاقنىڭ يۇقىرىقى كېسەللىكلىرىدە ئېيتىپ ئۆتۈلگەن سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن تەركىبىدە مەلۇم دەرىجىدە ئۆزگىرىش بولغان بولسىمۇ پۈتۈنلۈكى بۇزۇلمىغان بولىدۇ.

پۈتۈنلۈكى بۇزۇلغان قۇلاق كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتا ئىچكى جەھەتتە دورا ئىشلىتىشتىن سىرت يەرلىك ئورۇنغا چارە قىلىشنى ئاساس قىلىش كېرەك. مەسىلەن، ھەر خىل سىرتقى زەربىلەردىن بولغان قۇلاق زەخىملىرى، كۆيۈش، توڭلاش، يېرىلىش، قاناش، يىرىڭلىق ئاقما قاتارلىقلار. چۈنكى قۇلاقنىڭ بۇ تۈردىكى كېسەللىكلىرىدە قۇلاقنىڭ ئىچكى-تاشقى ئەزالىرى ھەر خىل دەرىجىدە بۇزۇلغان بولىدۇ. شۇڭا ئۇلارنى داۋالاشتا گۆش ئۈندۈرگۈچى، يىرنىڭ تازىلىغۇچى، جاراھەت پۈتتۈرگۈچى قاتارلىق دورا ۋە ئوسۇل-چارىلەر قوللىنىلىدۇ.

ئەمەلىي نىسبەتتە يۇقىرىقى قۇلاق كېسەللىكلىرىنىڭ نوقۇل بىر خىل تۈردە بولۇشى كۆپ ھاللاردا ئاز كۆرۈلىدۇ. كۆپىنچە بىر قانچە خىل تۈردىكىسى ئارىلاشقان ھالەتتە مۇرەككەپ ھالدا ئۇچرايدۇ. مەسىلەن، شەكىل، تەركىب ئۆزگەرگەن ۋە پۈتۈنلۈكى بۇزۇلغان قۇلاق كېسەللىكلىرىنىڭ بەزىلىرىدە سۈنئىي مزاجلىق ئەھۋاللارمۇ تەڭ كۆرۈلىدۇ. بەزى سۈنئىي مزاجلىق قۇلاق كېسەللىكلىرى تەرەققىي قىلىپ شەكىل، تەركىب ئۆزگەرگەن ۋە پۈتۈنلۈكى بۇزۇلغان قۇلاق كېسەللىكلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. شۇڭا داۋالاشتا ئەمەلىي ئەھۋالغا قاراپ داۋالاش ئوسۇل ۋە چارىلىرى جانلىق قوللىنىلىدۇ. بەزى قۇلاق كېسەللىكلىرى باشقا ئەزالار، مەسىلەن: مېڭە، ئاشقازان قاتارلىقلارنىڭ شېرىكچىلىكىدىن كېلىپ چىقىدۇ. ئۇلارنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن كېسەللىك كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى ئەمەلىي ئەزانى داۋالاشنى ئاساس قىلىش كېرەك.

بەزى قۇلاق كېسەللىكلىرىنى ئىچكى ۋە سىرتقى جەھەتتە دورا ئىشلىتىشتىن سىرت كېسەللىك ئەھۋالغا ئاساسەن زۆرۈر تېپىلغاندا بەلگىلىك تومۇرلاردىن قان ئېلىش، لوڭقا قويۇش ئۇسۇللىرى قوللىنىلىدۇ. مەسىلەن: ئىسسىقتىن بولغان قۇلاق ۋە رەمى قاتارلىقلاردا ئەھۋالغا قاراپ قان ئېلىنىدۇ، قاتارلىقلار.

ھەر خىل قۇلاق كېسەللىكلىرىدە ھەددىدىن تاشقىرى ئاپتاپقا قاقلىنىش، بەك





ئىسسىق مۇنچىغا چۈشۈش، قىزىق ئوتنىڭ يېنىدا ئۇزۇن تۇرۇش، شاماللىق جايلاردا كۆپ ھەرىكەت قىلىش، جىنسىي ئالاقىنى زىيادە قىلىش، ۋاراك-چۇرۇڭ ۋە بەللىك تاماقلارنى كۆپ ئىستېمال قىلىش قاتارلىقلاردىن ساقلىنىش لازىم. پارلىق سۇدا ھورلىنىش بولۇپمۇ ئىسسىق سۇ بىلەن باشنى يۇيۇش كۆپ ساندىكى قۇلاق كېسەللىكلىرىدە مەنشى قىلىنىدۇ. قۇلاققا قاتتىق ئاغرىش پەيدا بولغاندا ئۇنى پەسەيتىش ئۈچۈن تىنچلاندۇرۇپ ئاغرىق پەسەيتكىۈچى، سېزىمنى تۈۋەنلەتكۈچى (مۇخەددىرات) دورىلارنى ئىشلىتىشكە توغرا كېلىدۇ. بۇ خىل دورىلار ئىچىدە شىياھى مامىشا ئەڭ ياخشى. ئۇنى ئىشلىتىشتە ئەڭ ياخشىسى ئازراق ئەپيۇنى سۈتتە ئېرىتىپ قوشۇپ ئىشلەتسە تېخىمۇ ياخشى. لېكىن، ئەپيۇنى ياغدا ئېرىتىپ شىياھقا قوشۇپ ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش لازىم. چۈنكى ياغ قويۇق بولغانلىقتىن ئەپيۇن قۇلاق يولىدا چاپلىشىۋېلىپ دورىنىڭ ئۈنۈمىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ. مۇخەددىراتلارنى بەك كۆپ ۋە ئۇزۇنغىچە ئىشلەتمەسلىك كېرەك. چۈنكى قۇلاق مىزاجىنىڭ ئىسسىقتىن بولغان كېسەللىكلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. قۇلاق ئاغرىشىنى توختىتىش ۋە قۇلاقنى ئېچىشتا ئەپيۇننىڭ كۈلى ئەپيۇننىڭ ئۈزىگە قارىغاندا كۈچلۈكرەك. ئەگەر قۇلاق ئاغرىش بەك قاتتىق بولسا، ئەپيۇنى كۆيدۈرۈپ جۈندى بىدەستۇردىن ئازراق قوشۇپ ئىشلەتسە بولىدۇ. چۈنكى، جۈندى بىدەستۇر ئەپيۇننىڭ ئەكس تەسىرىنى يوقىتىدۇ. ئەگەر، قۇلاق بەك لوقۇلداپ ئاغرىپ كەتسە مۇخەددىراتلارنى ئىشلىتىشنى توختىتىش كېرەك. چۈنكى قۇلاقنىڭ داۋاملىق، قاتتىق ئاغرىشى ياخشى ئەھۋال ئەمەس. قۇلاق مېڭىگە يېقىن بولغاچقا باشقا كېسەللەر بولۇشى مۇمكىن. قۇلاق توسۇلۇشى داۋالاشتا، كونا كالا يېغىنىڭ مەنپەئەتى كۆپ. بىنەپشە ياكى ئاق لەيلىنى قاينىتىپ سۈيىنى ئىنچىكە نەيچە بىلەن قۇلاق يولىغا تېمىتسا ئاغرىق پەسەيتىش رولىنى ئوينايدۇ. ئەگەر، بۇ سۇيۇقلۇققا خەشخاش پوستى قايناتمىسىنى قوشسا تېخىمۇ ياخشى. پىشقان ئانارنىڭ پوستىغا گۈل يېغىنى ئېلىپ قۇلاققا تېمىتسىمۇ بەك پايدىلىق. توخۇ توخۇمنىڭ ئېقىنى قانداقلا سەۋەبتىن بولغان قۇلاق ئاغرىش بولسۇن، گۈل يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تېمىتسا ئوبدان مەنپەئەت قىلىدۇ. شۇمىشا تالقىنى بىلەن زىغىر تالقىنىنى ئارىلاشتۇرۇپ قاينىتىپ قۇلاققا تېمىتسا ھەم قۇلاق ئاغرىقىغا پايدا قىلىدۇ. ئەپيۇن بىلەن زەئەرنى قوشۇپ ھۆل قىلىپ قۇلاققا تېمىتسا قۇلاقنىڭ ئىسسىق ۋە سوغۇقتىن بولغان ئاغرىقلىرىنى توختىتىدۇ. مىسنى قىزىتىپ سوغۇق سۇغا تىققاندىن كېيىن ھورنى قۇلاققا تۇتسا، قۇلاق ئاغرىشىنى پەسەيتىدۇ. ئايال كىشىنىڭ سۈتىنى تېمىتسىمۇ ياكى بۇغداي ئۇنىنى شارابتا قاينىتىپ قۇلاق ئەتراپىغا ھەر سائەتتە بىر قېتىم چاپسىمۇ بولىدۇ. توخۇمنىڭ ئېقى ۋە نىلوفەر يېغى قۇلاق ئاغرىقىنى توختىتىپ، ماددىنى بۇرۇن تەرەپكە چۈشكۈرتۈش يولى بىلەن ياكى ئېغىز تەرەپىگە ئېقىتىش يولى بىلەن ياندۇرىدۇ.



## قۇلاق ئاغرىش

قۇلاق ئاغرىش (ۋە جىئولتۇزنى، دەردى گۆش) ھەر خىل قۇلاق كېسەللىرىدە قۇلاق ساھەسى ئاغرىش بىلەن ئىپادىلىنىدىغان قوشۇمچە ئالامەتكە قارىتىلغان بولۇپ، تۆبىرىدە كۆپ ئۇچرايدۇ.

ئومۇمىي سەۋەبى

قۇلاق ئاغرىشنىڭ سەۋەبلىرىنى يىغىنچاقلىغاندا ئادەتتە تۆۋەنكى تۆت چوڭ دائىرىدىن چىقىپ كەتمەيدۇ:

1. مىزاجنىڭ ماددا (خىلىت) سىز ئۆزگىرىشىنىڭ قۇلاققا يامان تەسىر قىلىشى،
2. مىزاجنىڭ ماددا (خىلىت) لىق ئۆزگىرىشىنىڭ قۇلاققا يامان تەسىر قىلىشى، 3. ھەر خىل ئىچكى تاشقى ئامىللار تەسىرىدىن ئىسسىق ياكى سوغۇق يەل (بۇخار) پەيدا بولۇپ قۇلاققا يامان تەسىر قىلىشى ياكى مېڭىدىكى ئارتۇقچە ماددىلارنىڭ قۇلاققا چۈشۈشى،
4. سىرتقى ئامىللارنىڭ قۇلاققا بولغان يامان تەسىرى، مەسىلەن: ئىسسىق ۋە سوغۇق قۇلاق ئىششىقلىرى، قۇلاققا چىققان ھەر خىل جاراھەت-چاقلارنىڭ قۇلاققا تەسىر قىلىشى ۋە غەيرىي نەرسىلەرنىڭ قۇلاققا كىرىپ كېتىشى قاتارلىقلار تۈپەيلىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

كونكرېت سەۋەبى

1. مىزاجنىڭ ماددا (خىلىت) سىز ئىسسىقتىن ئۆزگىرىشى ياكى ماددا (خىلىت) لىق ئىسسىقتىن ئۆزگىرىپ قان ياكى سەپرا ماددىسىنىڭ ئېشىپ كېتىشىدىن قۇلاق ئاغرىش كېلىپ چىقىدۇ.
2. مىزاجنىڭ ماددا (خىلىت) سىز سوغۇقتىن ئۆزگىرىشى ياكى ماددا (خىلىت) لىق سوغۇقنىڭ ئۆزگىرىپ بەلغەم ياكى سەۋدا ماددىسىنىڭ ئېشىپ كېتىشىدىن قۇلاق ئاغرىش كېلىپ چىقىدۇ.
3. ئاشقازاندىن ئۆرلىگەن بۇخارلار، پار ئارىلاش ئىسسىق ھاۋا قاتارلىقلار قۇلاققا



كېرىپ بەلگە ئايلىنىپ قۇلاق ئاغرىشىنى پەيدا قىلىدۇ. شۇنىڭدەك قىزىق سۇ ياكى ئارشاڭ سۇلىرى قۇلاققا تەسىر قىلىپ قۇلاق ئىچىدە ئىسسىق يەل پەيدا قىلىپ ئاغرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئىسسىق دورىلارنى قۇلاققا كۆپرەك تاشقان ياكى تېمىتقانلىقتىن قۇلاققا ئىسسىق يەل پەيدا بولۇپ قۇلاق ئاغرىش كېلىپ چىقىدۇ.

4. بەدەندە سوغۇق يەلنىڭ ئېشىپ كېتىشى ياكى سوغۇق شامانىڭ زىيادە تەسىرى، سوغۇقلىقنى ئارتۇق سۇنىڭ باشقا كۆپ قۇيۇلۇشى ۋە سوغۇق سۇدا كۆپ چۆمۈلۈش، سوغۇق دورىلارنى قۇلاققا كۆپ تېگىش ۋە تېمىتىش قاتارلىق سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن باشنىڭ ئۇششاق تېرە تۆشۈكلىرى تارىيىپ يەللەر تارقىلالماي قويۇق يەلگە ئايلىنىپ قۇلاق ئاغرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

5. مېڭىدىكى ئارتۇقچە ماددىلار ۋاقتىدا تازىلانمىسا قۇلاققا چۈشۈپ يامان تەسىر پەيدا قىلىپ قۇلاق ئاغرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

6. قۇلاققا يۈز بەرگەن قۇرۇق ئىسسىق خاراكتېرلىك ئىششىق سەۋەبىدىن قۇلاق ئاغرىش كېلىپ چىقىدۇ.

7. قۇلاققا يۈز بەرگەن ھۆل سوغۇق خاراكتېرلىك ئىششىق سەۋەبىدىن قۇلاق ئاغرىش كېلىپ چىقىدۇ.

8. قۇلاققا يۈز بەرگەن ھەر خىل جاراھەت ۋە يىرىڭلىق چاقىلار تۈپەيلىدىن ئوخشىمىغان دەرىجىدە قۇلاق ئاغرىش كېلىپ چىقىدۇ.

9. قۇلاققا قۇرۇت، چۈمۈلە، كۆمۈتغا ئوخشاش كىچىك ھاشاراتلار ۋە ياغاچ پارچىسى، كىچىك ئاشلىق دانلىرى، ئۈنچە-مارجان قاتارلىق نەرسىلەرنىڭ كېرىپ كېتىشى قاتارلىق سەۋەبلەردىن قۇلاق ئاغرىش كېلىپ چىقىدۇ.

10. قۇلاققا سۇ كېرىپ كېتىپ ۋاقتىدا چىقىرىۋېتىلمىسە قۇلاققا ئىششىق پەيدا قىلىپ قۇلاق ئاغرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

11. قۇلاق كىرى بولۇپمۇ يىرىڭلىق ئاجرايمىلار قېتىشقاندىن كېيىن ئۈزلۈكسىز چىقىپ كەتمەي ياكى ئېلىۋېتىلمەي ئۇزۇنغىچە قۇلاق يولىدا تۇرۇپ قالسا قۇلاق يولىنى ئېتىۋېلىش بىلەن بىرگە قۇلاق ئاغرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

12. قۇلاق ساھەسى سىرتقى جەھەتتە زەخمىلىنىش، قۇلاق كۆيۈپ قېلىش ياكى ئۇششۇپ قېلىش، قۇلاققا يۈز بەرگەن كېسەللىكلەر بولۇپمۇ ئۇزۇنغا سوزۇلغان قۇلاق ئېقىش قاتارلىقلار كەلتۈرۈپ چىقارغان قوشۇمچە كېسەللىكلەر، مەسىلەن: قۇلاق سىرتقى ئۆسۈكچىسىنىڭ ۋەزىمى يەنى قۇلاق ئارقا سۆڭەك پەردىسىنىڭ ئاستىغا يىرىڭ يىغىلىش، قۇلاق سېزىم ئەسەبلىرىنىڭ ۋەزىمى، ۋەزىم تومۇرىنىڭ توسۇلۇش







خاراكتېرلىك ۋەرىمى، مېڭە پەردىسىنىڭ قۇلاق مەنبەلىك ۋەرىمى قاتارلىقلاردا شۇ كېسەللىكلەرنىڭ ئۆزىگە خاس ئالامەتلىرىدىن سىرت ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە قۇلاق ئاغرىش پەيدا بولىدۇ.

## ئالامىتى

1. مىزاجىنىڭ ماددا (خىلىت) سىز ئىسسىقتىن ئۆزگىرىشى ياكى ماددا (خىلىت) لىق ئىسسىقنىڭ ئۆزگىرىپ قان ياكى سەپرا ماددىسىنىڭ ئېشىپ كېتىشىدىن بولغان قۇلاق ئاغرىشتا باش، يۈز، كۆزلىرى قىزىق بولىدۇ. قۇلاق ئاغرىش بىلەن بىرگە باش ئاغرىيدۇ. سوغۇق ھاۋا ۋە سوغۇق نەرسىلەر خۇشياقلىدۇ. ياكى ئاغرىق پەسىيدۇ. كۆز ۋە قۇلاق ئەتراپى قىزارغان بولىدۇ. قۇلاققا ئوت كۆيۈۋاتقاندا كەپس قىلىدۇ. قۇلاق ئىچى ئېچىشىپ بىئارام بولىدۇ. قۇلاقتىن يىرنىڭ، كۆزدىن ياش ئاقىدۇ. سەپرادىن بولغانلىرىدا كۆيۈشكەندەك ئاغرىش كۈچلۈك بولىدۇ، ئەمما باش ئېغىر بولمايدۇ. قاندىن بولغانلىرىدا كۆيۈشكەندەك ئاغرىش ئانچە كۈچلۈك بولمايدۇ، ئەمما باش ئېغىرراق بولىدۇ.

2. مىزاجىنىڭ ماددا (خىلىت) سىز سوغۇقتىن ئۆزگىرىشى ياكى ماددا (خىلىت) لىق سوغۇقنىڭ ئۆزگىرىپ بەلغەم ياكى سەۋدا ماددىسىنىڭ ئېشىپ كېتىشىدىن بولغان قۇلاق ئاغرىشتا، قۇلاق ئاغرىش بىلەن بىرگە قۇلاق، باش ئېغىر بولىدۇ. قۇلاققا ھەر خىل ئاۋازلار ئاڭلىنىدۇ. قۇلاق، بۇرۇن تۈشۈكلىرى ھۆل بولىدۇ. قۇلاققا ئېچىشىش ۋە قىزىللىق بولمايدۇ. ئىسسىق ھاۋا ۋە ئىسسىق نەرسىلەر خۇشياقلىدۇ ياكى ئاغرىق پەسىيدۇ، ئويۇق كۆپ بولىدۇ.

3. ئاشقازاندىن ئۆرلىگەن بۇخارلار سەۋەبلىك قۇلاق ئاغرىشتا قۇلاق ئاغرىشتىن سىرت ئاشقازان، قورساق قىسمى ئېسىلپ ئاغرىدۇ. قىزىق سۇ ياكى ئارشاڭ سۇلىرىنىڭ يامان تەسىرى ۋە ئىسسىق دورىلارنى قۇلاققا كۆپ ئىشلىتىشتىن ئىسسىق يەل پەيدا بولۇپ كېلىپ چىققان قۇلاق ئاغرىشتا، قۇلاق ئاغرىشتىن سىرت باش ئاغرىش، يۈز-كۆزلىرى قىزىرىش، كۆپ ئۆسساش قاتارلىق ئالامەتلەر بولىدۇ.

4. بەدەندە سوغۇق يەلنىڭ ئېشىپ كېتىشى ياكى سوغۇق شامالنىڭ زىيادە تەسىرى، سوغۇقلىقى زىيادە سۇنىڭ باشقا كۆپ قۇيۇلۇشى ۋە سوغۇق سۇدا كۆپ چۆمۈلۈش، سوغۇق دورىلارنى قۇلاققا كۆپ ئىشلىتىش تۈپەيلىدىن بولغان قۇلاق ئاغرىشتا، قۇلاق ئاغرىش بىلەن بىرگە باش يەڭگىلىرەك ئاغرىدۇ ھەمدە باش ئېغىر بولىدۇ، قۇلاق غوڭغۇلىدايدۇ. باشقا ئىسسىق سۇ قۇيۇلسا ئاغرىق پەسىيدۇ. بەزى ئاغرىقلاردا كۆڭۈل ئېلىشىش، شۇڭىگە ئېقىشتەك ئالامەتلەرمۇ بولىدۇ.





5. مېڭىدىكى ئارتۇقچە ماددىلار قۇلاققا چۈشۈپ پەيدا بولغان قۇلاق ئاغرىشتا، قۇلاق ئاغرىشتىن سىرت باش ئېغىرلىشىپ ئاغرىدۇ. قۇلاققا ھەر خىل ئاۋازلار ئاڭلىنىدۇ.
6. قۇرۇق ئىسسىق خاراكتېرلىك ئىششىقتىن پەيدا بولغان قۇلاق ئاغرىشتا، قۇلاق قاتتىق لوقۇلداپ ئاغرىدۇ، بېشى ۋە پېشانىسىدا ئېغىرلىق ھېس قىلىدۇ، يۈزى قىزىرىدۇ. قۇلاق تۆشۈكىدىكى ئىششىقتا قۇلاقتىكى ئاغرىش كۈچلۈك بولمايدۇ. ئىششىق ئېغىز ئالغاندا ئاڭلاش قۇۋۋىتىگە تەسىر يەتكۈزمەيدۇ، ئاغرىشىمۇ تەدرىجىي ياخشىلىنىدۇ، باشقا يامان ئاقىۋەتلەرمۇ كېلىپ چىقمايدۇ. لېكىن ئىششىق قۇلاقنىڭ ئىچكى قىسمىدا بولسا، ئېغىرراق كېسەللەرنى، كۆپىنچە سەرسام (مېڭە پەردە ياللۇغى) غا ئوخشاش قوشۇمچە كېسەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئاغرىقنىڭ ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتىمۇ ئاجىزلىشىدۇ. بۇ خىلدىكى قۇلاق ئاغرىشتا داۋاملىق قىزىتما پەيدا بولىدۇ. ۋاقتىدا بىر نەپ قىلمىسا ئاغرىق كۈچىيىپ ئاغرىق ھۇشىدىن كېتىش، ئەقلىدىن ئېزىشتەك ئەھۋاللار كېلىپ چىقىدۇ.
7. ھۆل سوغۇق خاراكتېرلىك ئىششىقتىن پەيدا بولغان قۇلاق ئاغرىشتا، قۇلاق ئانچە قاتتىق ئاغرىمايدۇ، قۇلاق سوغۇق بىلىنىدۇ.
8. قۇلاققا يۈز بەرگەن ھەر خىل جاراھەت ۋە يىرىڭلىق چاقىلاردىن بولغان قۇلاق ئاغرىشتا، ئاغرىقنىڭ قۇلقىدا قىزىرىش، ئىششىش، ئاخىرىدا يىرىڭ يىغىلىشتەك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. قۇلاقتىكى ئاغرىش جاراھەتنىڭ ئېغىر-يەڭگىللىكىگە قاراپ ھەر خىل بولىدۇ.
9. قۇلاققا قۇرۇت، چۆمۈلە، كۆمۈتغا ئوخشاش كىچىك ھاشاراتلار كىرىپ كېتىشتىن بولغان قۇلاق ئاغرىشتا، ئاغرىقنىڭ قۇلقىدا بىرەر نەرسە ماڭغاندەك قىمىرلاش سېزىمى بولىدۇ، قۇلاق قىچىشىدۇ. قۇلاق ئاغرىش ھاشارات مىدىرلىغاندا كۈچىيىدۇ، مىدىرلىمىسا پەسىيدۇ. بەزىدە قۇلاقتىن شۇ ھاشاراتلار ئۈزلۈكسىز چىقىپ كەتسە ئاغرىش توختايدۇ. ياغاچ پارچىسى، كىچىك ئاشلىق دانلىرى، ئۈنچە-مارجان قاتارلىق نەرسىلەر كىرىپ كېتىشتىن كېلىپ چىققان قۇلاق ئاغرىشتا قۇلاق يېقىمىسىزلىنىپ ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە ئاغرىش پەيدا بولىدۇ.
10. قۇلاققا سۇ كىرىپ كېتىشتىن بولغان قۇلاق ئاغرىشتا، سۇغا چۈمۈلگەن ياكى مۇنچىغا چۈشكەن تارىخى بولىدۇ. قۇلاققا سۇ كىرىپ كەتكەندىن كېيىن قۇلاققا ئېغىرلىشىش، غۇڭۇلداش يۈز بېرىپ بارا-بارا ئاغرىش پەيدا بولىدۇ.
11. قۇلاق كىرى بولۇپمۇ يىرىڭلىق ئاجرالمىلار قېتىشقاندىن كېيىن ئۈزلۈكسىز چىقىپ كەتمەي ياكى ئېلۋېتىلمەي ئۈزۈنمىچە قۇلاق يولىدا تۇرۇپ قېلىپ قۇلاق يولىنى ئېتىۋېلىشتىن بىرگە كېلىپ چىققان قۇلاق ئاغرىشتا، دەسلەپكى ۋاقىتلاردا ئاغرىش





بولمايدۇ، بەلكى قۇلاق پۈتۈپ قالغاندەك بولۇپ بارا-بارا قۇلاق ئاڭلاش سىزىمى تۈۋەنلەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئاستا-ئاستا قۇلاق يېقىمىزلىنىپ ئاغرىش كېلىپ چىقىدۇ.

12. قۇلاق ساھەسى سىرتقى جەھەتتە زەخىملىنىش، قۇلاق كۆيۈپ قېلىش ياكى ئۇششۇپ قېلىشتىن كېلىپ چىققان قۇلاق ئاغرىشتا، زەخىملىنىش، كۆيۈپ قېلىش، ئۇششۇپ قېلىش تارىخى بولىدۇ. ھەمدە بۇ كېسەللىكلەرگە مۇناسىپ يەرلىك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. ئەسلىي كېسەللىكلەرنىڭ ئېغىر-يەڭگىللىكىگە ئاساسەن قۇلاق ئاغرىشنىڭ دەرىجىسى ئوخشاشمايدۇ.

باشقا كېسەللىكلەردىن كېلىپ چىققان قۇلاق ئاغرىشتا، شۇ كېسەللىكلەرنىڭ ئۆزىگە خاس ئالامەتلىرى بولغاندىن سىرت، شۇ كېسەللىكلەرنىڭ ئېغىر-يەڭگىللىك دەرىجىسىگە ئاساسەن قۇلاق ئاغرىشنىڭ دەرىجىسىمۇ ئوخشاشمايدۇ.

### داۋاسى

ھەر خىل قۇلاق ئاغرىشلارنى داۋالاشتا تۇنىڭ سەۋەبىگە قارىتا چارە تەدبىر قىلىش تەلەپ قىلىنىدۇ. شۇڭا ئالدى بىلەن سەۋەبىچى ئامىللارنى تۈگىتىش ھەمدە تۇنىڭ خىلىتلىق ياكى خىلىتسىز ئىكەنلىكىنى ئايرىش لازىم. ئەگەر خىلىتلىق بولسا كېسەل ماددىسىنى پىشۇرىدىغان مۇناسىپ مۇنزىج (پىشۇرغۇچى) دورا بېرىش، كېسەل ماددىسى پىشقاندىن كېيىن تۇنى مۇسھىل (سۈرۈپ چىقارغۇچى) دورىلار بىلەن بەدەندىن تازىلاپ چىقىرىش، شۇ ئارقىلىق مىزاجنى تەڭشەپ ئومۇمىي بەدەننىڭ ھالىتىنى ياخشىلاش كېرەك. ئەگەر خىلىتسىز بولسا كېسەل كەلتۈرۈپ چىقارغان ماددا بولمىغاچقا قۇلاق ئاغرىشنى كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى ماددا كەيپىياتقا قارىتا دورا ۋە چارە قىلىش لازىم. مەسلەن، ئىسسىقتىن بولسا سوغۇق دورا، سوغۇقتىن بولسا ئىسسىق دورا ئىشلەتسە بولىدۇ. باشقا ئامىللار تۈپەيلىدىن كېلىپ چىققان قۇلاق ئاغرىشنى داۋالاشتا ئامىللارنى تۈگىتىشنى ئاساس قىلىش، ئىككىلەمچى قۇلاق ئاغرىشتا ئەسلىي كېسەللىكلەرنى داۋالاشنى ئاساس قىلىش كېرەك.

1. ئىسسىقتىن بولغان قۇلاق ئاغرىشنى داۋالاشتا خىلىتلىق بولسا كېسەل ماددىسىنى تازىلاپ بولغاندىن كېيىن، خىلىتسىز بولسا بىۋاسىتە ھالدا قۇلاققا بىنەپشە يېغى، گۈل يېغى، نىلۇفەر يېغى، سۆگەت يوپۇرمىقىنىڭ يېغى، قاپاق ئورۇقىنىڭ يېغى قاتارلىق





سوغۇق تەبىئەتلىك ياغلارنىڭ بىرىنى قۇلاق ۋە بۇرۇنغا تېمىتىش كېرەك. ئاغرىش ئېغىرراق بولسا ئازراق ئەپيۇنى قىز توغقان ئايالنىڭ سۈتىدە ئېرىتىپ قۇلاققا تېمىتىش كېرەك. يۇمغاقسۈت، ھۆل قاپاق، ئوسۇڭ قاتارلىقلارنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش ھەمدە سوغۇقلۇق نەرسىلەر بىلەن ئوزۇقلىنىش لازىم.

2. سوغۇقتىن بولغان قۇلاق ئاغرىشىنى داۋالاشتا خىلىتلىق بولسا ئىيارەجى پەيقەرا، ھەببى قوقىيا، ئىيارەجى لۇغازىيا قاتارلىق دورىلارنى ئىشلىتىش لازىم. بابۇنە، سېرىق چېچەك، مەرزەنجۇش، ئاقسەرھالارنى قاينىتىپ يەرلىك ئورۇنغا ئىسسىق ئۆتكۈزۈپ ماددىلارنى تارقىتىش كېرەك. خىلىتسىز بولسا ماددا تازىلاش ھاجەتسىز. سوزاپ يېغى، ئىنەك پىتى يېغى قاتارلىق ياغلارنى قۇلاق ۋە بۇرۇنغا تېمىتىش كېرەك. ئەگەر كۈچلۈكرەك ئىسسىقلىق قىلىش ھاجەت بولسا، مەزكۇر ياغلارغا ئازراق قۇندۇز قەھرى، فەرفىيۇن قاتارلىقلارنى ئارىلاشتۇرۇپ قۇلاققا تېمىتىش بولىدۇ.

3. ئاشقازاندىن تۈرلىگەن بۇخارلاردىن بولغان قۇلاق ئاغرىشىنى داۋالاشتا ئاشقازاندىكى ئالامەتلەرنى داۋالاش بىلەن بىرگە قۇلاققا مۇناسىپ ياغلارنى تېمىتىش بولىدۇ. ئىسسىق يەلدىن بولغانلارغا ئىسسىق يەلنى تارقاقچۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش كېرەك.

4. سوغۇق يەلدىن بولغان قۇلاق ئاغرىشىنى داۋالاشتا سوغۇق يەلنى تارقاقچۇچى دورىلار ئىشلىتىش كېرەك.

5. مېڭىدىكى ئارتۇقچە ماددىلار قۇلاققا چۈشكەندىن بولغان قۇلاق ئاغرىشىنى داۋالاشتا ھەببى قوقىيا قاتارلىق دورىلار ئارقىلىق مېڭىدىكى ئارتۇقچە ماددىلارنىڭ قۇلاققا چۈشۈشىنى توساش ۋە يوقىتىش، ماددىلارنى تارقاقچۇچى دورىلار قاينىتىلمىسى ئارقىلىق قۇلاققا ئىسسىق ئۆتكۈزۈپ قۇلاقنىڭ ماددىلارنى تارقىتىش كېرەك.

6. قۇرۇق ئىسسىق خاراكتېرلىك ئىششىقتىن بولغان قۇلاق ئاغرىشىنى داۋالاشتا ھۆل سوغۇق تەبىئەتلىك ئىششىق ياندۇرغۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش كېرەك.

7. ھۆل سوغۇق خاراكتېرلىك ئىششىقتىن بولغان قۇلاق ئاغرىشىنى داۋالاشتا قۇرۇق ئىسسىق تەبىئەتلىك ئىششىق ياندۇرغۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش، يەرلىك ئورۇنغا ئىسسىق ئۆتكۈزۈش كېرەك.

8. قۇلاققا يۈز بەرگەن ھەر خىل جاراھەت ۋە يىرىڭلىق چاقلاردىن بولغان قۇلاق ئاغرىشىنى داۋالاشتا سوزاپ يېغى، ئىنەك پىتى يېغى، زىغىر لۇئابى قاتارلىقلارنى قۇلاققا تېمىتىش چاقلار يىرىڭ يىغىپ، پىشىپ يىرىڭ چىقىپ كېتىش بىلەن ئاغرىق پەسىيىدۇ. يىرىڭلارنى تازىلاپ چىقىرىۋەتكەندىن كېيىن جاراھەتلەرنى پۈتتۈرگۈچى، ئىششىق ياندۇرغۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن مەلھىمى ئەببەزنى ئىشلەتسە ئەڭ مۇۋاپىق.



قوغۇشۇن تۇپسى، ئاق مۇم ھەر بىرى بىر ھەسسە، گۈل يېغى ياكى كۈنجۈت يېغى ئىككى ھەسسە.

تەييارلاش: ئالدى بىلەن مۇم ئېرىتىلدۇ، ئاندىن قوغۇشۇن تۇپسىنى ھاۋانچىغا سېلىپ ئۈستىگە ئېرىتىلگەن مۇمدىن ئاز-ئاز قۇيۇپ ھاۋانچىنىڭ دەستى بىلەن سالايە قىلىپ بىر-بىرىگە ئارىلاشتۇرۇپ مەلھەم تەييارلىنىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: لازىم بولغاندا مەلھەمنى گۈل يېغى بىلەن ئېرىتىپ مۇۋاپىق مىقداردا قۇلاققا تېمىتىلدۇ.

ئەگەر جاراھەتنىڭ ئاغرىقى يەنىمۇ توختىمىسا ئەپيۇن گۈلىگە بىر ئاز قۇندۇز قەھرى قوشۇپ گۈل يېغىغا چىلاپ شۇ ياغنى قۇلاققا تېمىتىش كېرەك.

9. قۇلاققا ھاشاراتلار كىرىپ كېتىشتىن بولغان قۇلاق ئاغرىشىنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن قول چىرىقىنىڭ نۇرىنى قۇلاققا چۈشۈرۈپ بېقىش كېرەك. بۇنىڭدا ھاشارات ئۈزلۈكسىز قايىتىپ چىقىدۇ. ئەگەر بۇ ئۇسۇلدا ھاشارات قۇلاقتىن قايىتىپ چىقىمىسا ھاشارات ئۆلتۈرىدىغان دورىلارنى قۇلاق ئىچىگە تېمىتىپ ھاشاراتنى ئۆلتەرگەندىن كېيىن باشقا سۇيۇقلۇق ياكى سۇيۇق دورىلار بىلەن ھاشاراتنى ئېقىتىپ چىقىرىۋېتىش كېرەك. ھاشارات ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ئۈزۈم سىركىسىگە ئازراق سەبرى سېلىپ قۇلاق ئىچىگە تېمىتىپ بولىدۇ. زەيتۇن يېغى، كۆچلۈك ھاراق تېمىتىشىمۇ بولىدۇ.

10. قۇلاققا سۇ كىرىپ كېتىشتىن بولغان قۇلاق ئاغرىشىنى داۋالاشتا ئالدىنى ئېلىشنى ئاساس قىلىش كېرەك. يۇيۇنغاندا بولۇپمۇ سۇغا چۆمۈلگەندە قۇلاققا سۇ كىرىپ كېتىشتىن ساقلىنىش لازىم. ئەگەر قۇلاققا سۇ كىرىپ كەتسە دەرھال سۇدىن چىقىپ باشنى سۇ كىرىپ كەتكەن قۇلاق تەرەپكە سىڭايان قىلىپ سەكرەش كېرەك ياكى ئالقانى قۇلاققا قويۇپ بېسىپ تارتىپ قۇلاق ئىچىدىكى سۇنى شۈمۈرۈپ چىقىرىش كېرەك. قۇلاققا كىرىپ كەتكەن سۇ ۋاقتىدا چىقىرىۋېتىلمەي بارا-بارا قۇلاق ئاغرىشى كەلتۈرۈپ چىقارغان بولسا، قۇلاققا ئىسسىق ئۆتكۈزۈش ۋە ئىسسىق ياغلارنى قۇلاققا تېمىتىش كېرەك.

11. قۇلاق يولىدىكى ئاجرىمىلار تۈپەيلىدىن بولغان قۇلاق ئاغرىشىنى داۋالاشتا قۇلاق كىرى بولۇپمۇ قېتىشىپ قالغان ئاجرىمىلارنى ئېھتىيات بىلەن ئېلىۋېتىشكە چارە قىلىش كېرەك. بۇنىڭدا ئالدى بىلەن قۇلاققا مۇۋاپىق دورىلارنى تېمىتىپ ئاجرىمىلارنى بوشتىش



كېرەك، ئاندىن قۇلاق يولىنى يورۇتۇپ تۇرۇپ قىسقىچ ئارقىلىق ئېھتىيات بىلەن قىسىپ ئېلىۋېتىش كېرەك. تاجىرالىنى ئېلىۋەتكەندىن كېيىنلا قۇلاق يېنىكلەپ قالدۇ. ئەگەر شارائىت بولمىسا قالايمىقان قۇلاقنى كولىماي، مەخسۇس بەش ئەزا كېسەللىرى بۆلۈمىگە ئايرىپ كۆرسىتىش كېرەك.

12. سىرتقى زەخىم ۋە باشقا كېسەللىكلەردىن بولغان قۇلاق ئاغرىشىنى داۋالاشتا ئەسلىي كېسەللىكنى داۋالاش كېرەك. ئەسلىي كېسەللىك ساقايىسا، ئادەتتە قۇلاق ئاغرىشىمۇ تۈزلىكىدىن ياخشى بولۇپ كېتىدۇ.

### دەققەت قىلىشقا تېگىشلىك نىشلار

قۇلاق ئاغرىش يۈز بەرگەندە قۇلاقنى قالايمىقان كولىماسلىق كېرەك. تونداق بولمىغاندا ئېھتىياتسىزلىقتىن قۇلاق پەردىسى تېشىلىپ، قۇلاق ئاغرىش ۋە ئاڭلاش ئىقتىدارى تۈۋەنلەشتەك ئەھۋاللار كېلىپ چىقىدۇ. شۇڭا بۇنىڭغا ئالاھىدە دەققەت قىلىش كېرەك.

## قۇلاق غوڭغۇلداش

قۇلاق غوڭغۇلداش (تەننىن ۋە دەۋۋەي) قۇلاققا ھەر خىل غوڭغۇلدىغان غەيرىي ئاۋازلار ئاڭلانغانلىقىغا قارىتىلغان. ئو، تاشقى ھاۋا بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولماي پەقەت ئىچكى تەرەپتىكى ھاۋا ۋە بۇخارلار ھەرىكىتىدىن قۇلاققا غەيرىي ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ. بۇ ئاۋازلار يالغان ئاۋاز يەنى خىيالىي ئاۋاز سېزىمى دەپ ئاتىلىدۇ. مەزكۇر يالغان ئاۋازنىڭ تېز ۋە ئىنچىكە بولغىنى تەننىن دەپ ئاتىلىدۇ. يۇمشاق ۋە ئاستىراق ئەمما چوڭراق بولغىنى دەۋۋەي دەپ ئاتىلىدۇ. ئاڭلاش خىزمىتىدىكى غەيرىي نورماللىق ئادەتتە ئۈچ خىل دەرىجىدە بولىدۇ:

1. بۇزۇلۇش ياكى پۈتۈنلەي يوقىلىش يەنى بوتلان دەرىجىسى: بۇنىڭدا قۇلاق ھېچقانداق بىر ئاۋازنى ئاڭلىيالمىدۇ. بۇ ئادەتتە گاسلىقتىن ئىبارەت.
2. كەملىك ياكى يېتەرسىزلىك يەنى تۇقسان دەرىجىسى: بۇنىڭدا قۇلاق تۈۋەن ئاۋازلارنى ۋە يىراقتىكى ئاۋازلارنى ئاڭلىيالمىدۇ. بۇ ئادەتتە قۇلاق ئېغىرلىشىپ قېلىش يەنى ئاڭلاش ئىقتىدارىنىڭ تۈۋەنلەپ كېتىشىدىن ئىبارەت.





3. تەشۈش دەرىجىسى: بۇنىڭدا قولاققا يالغان ۋە ئەمەلىيەتتە يوق غەيرىي ئاۋازلار ئاڭلىنىدۇ. بۇ ئادەتتىكى قولاق غوڭغۇلداشتىن ئىبارەت.

### سەۋەبى

قولاق غوڭغۇلداشنىڭ ئاساسىي سەۋەبى چوڭ جەھەتتە 4 تۈرگە بۆلۈنىدۇ. بەزى تۈرلىرى بىر قانچە كىچىك خىللارغا ئايرىلىدۇ:

1. قولاقنىڭ ئاڭلاش ھېسسىي قۇۋۋىتى بەك كۈچىيىپ تۈتكۈرلىشىپ كەتكەنلىكتىن قولاق غوڭغۇلداش كېلىپ چىقىدۇ.

2. قولاقنىڭ ئاڭلاش ھېسسىي قۇۋۋىتى بەك ئاجىزلاشقانلىقتىن قولاق غوڭغۇلداش كېلىپ چىقىدۇ.

(1) ھەزىم بۇزۇلغانلىقتىن بەدەن ئاجىزلىغان ياكى باشقا ئېغىر كېسەللىكلەردىن ئەمدىلا ياخشىلانغان دەۋرلەردە ئاڭلاش قۇۋۋىتى بەك ئاجىزلاپ قولاق غوڭغۇلداش كېلىپ چىقىدۇ.

(2) بەدەندە قۇرۇقلۇق بەك ئاشقان ياكى ئاغرىق ئاچ قالغاندا ئىنسان تەبىئىي ئوزۇقلىنىش ئۈچۈن ئىلاجىسىز ھالدا بەدەندىكى شەبەنەمگە ئوخشاش تارقاق ھۆلۈكلەرگە يۈزلىنىپ ئۇلارنى تارقىتىدۇ، ھەرىكەتلەندۈرىدۇ. نەتىجىدە ئۇلاردىن چىققان بۇخارلار ھەرىكەتلىنىدۇ. باش ماددىدىن، ئاڭلاش سېزىملىرى يېمەكلىكلەرنىڭ تەسىرىدىن خالى بولغاچقا ئاڭلاش قۇۋۋىتى مەزكۇر بۇخارلارنىڭ ھەرىكىتىنى غوڭغۇلدىغان ئاۋازدا سېزىدۇ.

3. مېڭىدىكى بۇخارلارنىڭ تەسىرىدىن قولاق غوڭغۇلداش كېلىپ چىقىدۇ.

(1) مېڭە ساھەسىگە ئارتۇق ماددا يىغىلىپ ئۈنىڭدىن قويۇق يەل ياكى بۇخار ئاجرىلىپ چىقىدۇ. ئاڭلاش قۇۋۋىتى بۇ ھەرىكەتنى غوڭغۇلدىغان ئاۋاز ھالىتىدە سېزىدۇ.

(2) مېڭىدىكى ئارتۇق ماددىلار قولاققا قۇيۇلۇپ قولاق ئىچكى تۈشۈكىدىكى ھاۋانى سىقىدۇ. ھاۋا توسۇلۇپ ئاڭلاش قۇۋۋىتىگە گۈڭرىگەن سېزىم بېرىدۇ. ماددىنىڭ قويۇلۇشى قانچە داۋاملاشسا، قولاقنىڭ غوڭغۇلداش شۇنچە داۋاملىشىدۇ.

(3) مىزاجنىڭ ئىسسىققا ئۆزگىرىشى، ئاغرىقنىڭ ئىچى تىتىلداپ روھىي جەھەتتە بىشارام بولۇشى قاتارلىقلار خىلىتلارنى قاينىتىپ بۇخارلارنى قوزغىيدۇ، ئاڭلاش قۇۋۋىتى ئۇنى غوڭغۇلدىغان ھالەتتە سېزىدۇ.

(4) بۇخارلارنى قوزغاپ مېڭە تەرەپكە چىقىرىدىغان دورىلارنى، مەسىلەن: قارىمۇچ قاتارلىق دورىلارنى كۆپلەپ ئىچىش ياكى بۇخارلارنى قوزغاپ، قولاق ئىچىدىكى





جسم تورغان ھاۋانى ھەرىكەتلەندۈرگۈچى يېمەكلىكلەرنى، مەسلەن: سامساق، كۈدە (جۈسەي) قاتارلىقلارنى كۆپ ئىستېمال قىلىشتىن ئاڭلاش قۇۋۋىتى بۇخار ۋە ھاۋالارنىڭ ھەرىكىتىنى غوڭغۇلىدىغان ھالەتتە ھېس قىلىدۇ.

4. قۇلاقنىڭ چاقىلاردىن ئاققان يىرىنىڭ ۋە سېرىق سۇلار قۇلاق ئىچىگە يىغىلىپ يامان تەسىر قىلغانلىقتىن ياكى قۇلاققا كىرىۋالغان ھاشاراتلارنىڭ ھەرىكىتىدىن قۇلاق غوڭغۇلداش كېلىپ چىقىدۇ.

### ئالامىتى

قۇلاقنىڭ كۆرۈنۈشىدە چوڭ تۈزگىرىش بولمايدۇ، لېكىن قۇلاق غوڭغۇلدايدۇ. ئېغىر بولسا ئادەتتىكى ئەھۋال ئاستىدىمۇ قۇلاقنىڭ غوڭغۇلىدىغانلىقى ئېنىق بىلىنىدۇ. يەڭگىل بولسا ئادەتتە بىلىنمەيدۇ. تىنچ شارائىتتا ياكى كېچىدە ئويقۇدىن ئويغىنىپ كەتكەندە قۇلاق غوڭغۇلىدىغانلىقى بىلىنىدۇ.

1. ئاڭلاش قۇۋۋىتىنىڭ بەك كۈچىيىپ كەتكەنلىكىدىن بولغان قۇلاق غوڭغۇلداشتا، قۇلاقنىڭ ئاڭلاش قۇۋۋىتى كۈچلۈك ھەمدە سېزىمى تۈتكۈر بولىدۇ. بەدەن ساغلام بولۇپ باشقا ھېچقانداق كېسەللىك بولمايدۇ. قۇلاق غوڭغۇلداش قورساق ئاچ ۋاقتلاردا پەسىيدۇ ياكى ياخشىلىنىپ قالىدۇ. كۈچلۈك تاماقلارنى يەپ بەك تويۇتۇپ كەتكەندە كۈچىيىپ كېتىدۇ.

2. ئاڭلاش قۇۋۋىتىنىڭ بەك ئاجىزلىشىپ كەتكەنلىكىدىن بولغان قۇلاق غوڭغۇلداشتا، ئەكسىچە ئاڭلاش قۇۋۋىتى تۈۋەن بولىدۇ، قورساق توق ۋاقتلاردا قۇلاق غوڭغۇلداش پەسىيدۇ ياكى ياخشىلىنىپ قالىدۇ، ئاچ قالغاندا ياكى ئوزۇقلىنىش ياخشى بولمىغاندا كۈچىيىپ كېتىدۇ. (1) ئاغرىقتا ھەزىم بۇزۇلغان، بەدەن ئاجىزلاشقان ياكى باشقا كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولغانلىق تارىخى ۋە ئۆسكەن مۇناسىپ ھالدىكى ئالامەتلەر بولىدۇ.

(2) بەدەندە قۇرۇقلۇق بەك ئاشقان، ئوزۇقلىنىش ناچارلاشقانغا دائىر ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. قۇرۇقلۇق ئاشقان، قورساق ئاچ قالغان ۋاقتلاردا قۇلاق غوڭغۇلداش ئېغىرلىشىدۇ.

3. مېڭىدىكى بۇخارلارنىڭ تەسىرىدىن بولغان قۇلاق غوڭغۇلداشتا:

(1) مېڭە ساھەسىگە ئارتۇق ماددا يىغىلىپ قالغاچقا باش ئېغىرلىشىدۇ. قويۇق يەل ياكى بۇخارلار تۈپەيلىدىن قۇلاق چىڭقىلىدۇ.

(2) مېڭىدىكى ئارتۇق ماددىلار قۇلاققا قۇيۇلۇپ قۇلاق ئىچىكى تۈشۈكىدىكى ھاۋانى سىققاچقا قۇلاق بىئارام بولىدۇ. قۇلاق سوزۇلغاندەك بىلىنىدۇ، باش ئېغىرلىشىدۇ. ماددىنىڭ قۇيۇلۇشى قانچە كۆپ بولسا ۋە داۋاملاشسا، قۇلاقنىڭ غوڭغۇلداش شۇنچە







كۈچلۈك بولىدۇ ۋە داۋاملىشىدۇ.

3) مزاجنىڭ ئىسسىققا تۈزگىرىشى، بىمارنىڭ ئىچى تىتىلداپ روھىي جەھەتتە بىشارام بولۇشى قاتارلىقلارنىڭ خىلىتلارنى قاينىتىپ، بۇخارلارنى قوزغىغانلىقىدىن كېلىپ چىققان قۇلاق غوڭغۇلداشتا ئىسسىق ئالامەتلەر ۋە روھىي ئالامەتلەر بولىدۇ. بەزىدە تەپنىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىدىكى ئالامەتلەر زاھىر بولىدۇ.

4) بۇخارلارنى قوزغاپ مېڭىگە چىقىدىغان قارىمۇچقا ئوخشاش دورىلارنى كۆپ ئىسچىش ياكى بۇخارلارنى قوزغاپىدىغان، قۇلاقتىكى جىم تۇرغان ھاۋانى ھەرىكەتلەندۈرىدىغان سامساق، كۈدىگە ئوخشاش يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلىشتىن بولغان قۇلاق غوڭغۇلداشتا بۇ نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلغانلىق تارىخى بولىدۇ. بۇ نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلىشنى توختاتسا قۇلاق غوڭغۇلداش توختاپ قالىدۇ ياكى ئۇزۇنغا بارماي يوقىلىپ كېتىدۇ.

4. قۇلاقتىكى چاقىلاردىن ئاققان يىرىڭ ۋە سېرىق سۇلار قۇلاق ئىچىگە يىغىلىپ يامان تەسىر قىلغانلىقتىن بولغان قۇلاق غوڭغۇلداشتا قۇلاققا چاقا چىقىش، يىرىڭ ۋە سېرىق سۇ ئېقىش بىلەن بىرگە قۇلاققا ئاغرىش، ئىشىشىش قىزىرىش، ئالامەتلىرى بولىدۇ. قۇلاقتىكى ھاشاراتلار ھەرىكىتىدىن بولغان قۇلاق غوڭغۇلداشتا ھاشاراتلار ھەرىكىتىدىن قۇلاق غوڭغۇلدايدۇ ھەم ئاغرىيدۇ.

#### داۋاسى

كېسەللىك ئەھۋالىغا ئاساسەن ئاڭلاش سېزىمىنى تۈۋەنلىتىش ياكى كۈچەيتىش، مزاجنى تەڭشەش، مېڭىدىن ئارتۇق ماددىلارنى تازىلاش، بۇخارلارنى تارقىتىش ھەمدە سەۋەبلەرگە قارىتا چارە قىلىش لازىم.

1. ئاڭلاش قۇۋۋىتى بەك كۈچىيىپ كەتكەنلىكتىن بولغان قۇلاق غوڭغۇلداشنى داۋالاشتا ئاڭلاش سېزىمىنى تۈۋەنلىتىش ئۈچۈن گۈل يېغى بىلەن سىركىنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ بىرلەشتۈرۈپ، سۇس ئوتتا سىركە ئۈچۈپ كېتىپ ياغ قالغىچە قاينىتىپ ئاندىن ئۇنىڭغا قۇندۇز قەھرى ياكى ئەپيۇندىن 0.1 گرام قوشۇپ قۇلاققا تېمىتىش كېرەك. مېڭىنى ھۆللەشتۈرۈش، تىنچلاندۇرۇپ ئوخلىتىشتەك چارە ئۇسۇللارنى قوللىنىش، مزاجنى ھۆللەشتۈرگۈچى خۇشبۇي ياخشى تاماقلار ۋە قوي، كالا پاقالچاقلىرى بىلەن ئوزۇقلىنىش كېرەك.

2. ئاڭلاش قۇۋۋىتىنىڭ بەك ئاجىزلىشىپ كەتكەنلىكىدىن بولغان قۇلاق غوڭغۇلداشنى داۋالاشتا ئاڭلاش سېزىمىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن قايسى ماددا غالىب كەلگەنلىكىنى



ئېنىقلاپ تەكشۈپ نورماللاشتۇرۇش، مېگنى قۇۋۋەتلەپ ھېسسى كۈچنى ئاشۇرۇش كېرەك.

بۇنىڭ ئۈچۈن داۋائىلمىشكى، مەئجۇنى تۇجاھ قاتارلىق دورىلارنى ئىچكۈزۈش؛ بادام يېغى، گۈل يېغىنى باراۋەر مىقداردىكى سىركە بىلەن قاينىتىپ، يىلما پىتى ئەتىگەن ئاخشامدا قۇلاققا تېمىتىش كېرەك. تۇخۇم سېرىقى، پاققان گۆشى، شورپىسى ۋە باشقا ئوزۇقلۇق قىممىتى ياخشى نەرسىلەرگە دارچىن، قەلەمفۇر قاتارلىق خۇشپۇراق دورىلار سېلىپ ئىستېمال قىلىش، قوي، كالا پاقالچاقلىرى بىلەن ئوزۇقلىنىش كېرەك.

1) ھەزىم بۇزۇلغان، بەدەن ئاجىزلاشقان ياكى باشقا كېسەللىكلەردىن بولغان قۇلاق غوڭغۇلداشنى داۋالاشتا ھەزىمى كۈچەيتكۈچى، بەدەننى قۇۋۋەتلىگۈچى ياكى شۇ كېسەللىكلەرگە مۇناسىپ داۋالاش تۈسۈللىرى ۋە دورىلىرىنى قوللىنىشنى ئاساس قىلىش كېرەك.

2) بەدەندە قۇرۇقلۇق بەك ئاشقان ۋە ئوزۇقلىنىشنىڭ ناچارلىشىشىدىن بولغان قۇلاق غوڭغۇلداشنى داۋالاشتا بەدەنگە ھۆللۈك يەتكۈزگۈچى دورا ۋە ئۆسۈملۈكلەرنى قوللىنىش، ئوزۇقلىنىشنى كۈچەيتىش لازىم. شورپىلىق ئاتاملارنى ۋە قوي، كالا پاقالچاقلىرىنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش كېرەك.

3) مېگىدىكى بۇخارلارنىڭ تەسىرىدىن بولغان قۇلاق غوڭغۇلداشنى داۋالاشتا بۇخارلارنىڭ كېلىپ چىقىشىنى توسۇش، بۇخارلارنى تارقىتىشتەك ئۆسۈل-چارىلەر ۋە دورىلارنى قوللىنىش، ئاساسەن مېگنى تازىلاش كېرەك.

1) مېگىگە يىغىلىپ قالغان ئارتۇق ماددىلارنى تازىلىغۇچى دورا ۋە ئۆسۈل-چارىلەرنى قوللىنىش كېرەك.

2) مېگىدىكى ئارتۇق ماددىلارنىڭ قۇلاققا قۇيۇلۇشىنى توسقۇچى دورا ۋە ئۆسۈل-چارىلەرنى قوللىنىش كېرەك.

3) مىزاجىنى سوۋۇتقۇچى، ئاغرىقنى روھىي جەھەتتە تىنچلاندۇرغۇچى دورا ۋە ئۆسۈل-چارىلەرنى قوللىنىش كېرەك. تەپتىن بولغانلىرىدا قىزىتما قايتۇرۇش كېرەك.

4) بۇخارلارنى قوزغاپ مېگىگە چىقارغۇچى دورىلاردىن قارىمۇچ قاتارلىقلارنى، يېمەكلىكلەردىن سامساق، كۈدە قاتارلىقلارنى ئىستېمال قىلماسلىق بىلەن بىرگە ئۇلارنىڭ تۈزەتكۈچىسىنى ئىشلىتىش كېرەك. قارىمۇچنىڭ تۈزەتكۈچىسى سوغۇق ياغلار، كۈدەنىڭ تۈزەتكۈچىسى يۇمىغاقسۈت، ھۆل كاسىن قاتارلىقلاردۇر.

4. قۇلاقتىكى چاقىلاردىن ئاققان يىرىڭ ۋە سېرىق سۇلاردىن بولغان قۇلاق غوڭغۇلداشنى يارا ئىششىقنى ياندۇرغۇچى، قىزىرىش ۋە ئاغرىشنى يوقىتقۇچى، يىرىڭ



تازىلىغۇچى دورا ۋە تۆسۈل-چارىلەرنى قوللىنىش كېرەك. قۇلاقتىكى ھاشاراتلاردىن كېلىپ چىققان قۇلاق غوڭغۇلداشنى دوۋالاشتا ھاشاراتلارنى ئېھتىيات بىلەن قىسقۇچتا قىسىپ ئېلىۋېتىش كېرەك. ئالغىلى بولمىسا ھاشارات تۆلتۈرگۈچى دورىلار بىلەن ھاشاراتنى ئۆلتۈرگەندىن كېيىن سۇيۇقلۇقلار ياكى سۇيۇق دورىلار بىلەن ھاشاراتنى ئېقىتىپ چىقىرىۋېتىش كېرەك.

## قۇلاق ئېغىرلىق ۋە گاسلىق

قۇلاق ئېغىرلىق ۋە گاسلىق (تەرەش، ۋە قەر-بۇتلا تۈسسەمى) ھەر خىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن نورمال ئاۋازلارنى يېرىم ياكى پۈتۈنلەي ئاڭلىيالماسلىققا قارىتىلغان. ئاۋازلارنى يېرىم ياكى ئېنىق ئاڭلىيالماسلىق قۇلاق ئېغىرلىق، پۈتۈنلەي ئاڭلىيالماسلىق گاسلىق دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ تۇغما ۋە تۇغۇلغاندىن كېيىن پەيدا بولغاندىن ئىبارەت 2 تۈرگە بۆلۈنىدۇ. ئۇنىڭ سەۋەبلىرى تۆۋەندىكىدەك بىر قانچە خىل بولىدۇ:

1. بىرىنچىسى: ھامىلە ئانا قورسىقىدىلا ئاڭلاش قۇۋۋىتى يوق بولغان بولىدۇ. شۇڭا تۇغۇلغاندىلا گاس تۇغۇلىدۇ. ئىككىنچىسى: ھامىلە قۇلقىنىڭ تۈسۈپ تەرەققىي قىلىشى تۇغۇلۇشتىن بۇرۇن توختاپ قالغان ياكى قۇلاق تۈشۈكى تۇغما پۈتەي بولغان بولىدۇ. شۇڭا بۇنىڭدىمۇ تۇغۇلغاندىلا گاس تۇغۇلىدۇ.

يۇقىرىقىلار كۆپىنچە يېقىن تۇغقانلار نىكاھلىنىش، ھامىلدارلىق مەزگىلدە ئانا بەزى كېسەللەر بىلەن يۇقۇملىنىش ياكى بەزى دورىلارنى ئىشلىتىش قاتارلىق سەۋەبلەردىن كېلىپ چىقىدۇ.

2. ياش چوڭىيىپ ياشانغانلىقتىن قۇۋۋەت ئاجىزلىشىپ مزاج قۇرۇق سوغۇقلۇققا مايىللىشىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە قۇرۇقلۇق ۋە سوغۇقلۇقنىڭ زىيادە تېگىشى بىلەن مزاج قۇرۇق سوغۇققا ئۆزگىرىپ تەبىئىي ھالدا قۇلاققا تەسىر قىلغانلىقتىن گاسلىق كېلىپ چىقىدۇ.

3. قۇلاقنىڭ ئاڭلاش قۇۋۋىتى (قۇۋۋەتى سامىئە) ۋە سېزىم ئەسەبلىرى يىقىلىش، سىرتتىن بىر نەرسە تېگىش، زەخمىلىنىش سەۋەبىدىن بۇزۇلۇش قۇلاق ئېغىرلىقى ياكى گاسلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

4. كېزىككە ئوخشاش قىزىتمىلىق كېسەللىكلەردە بۆھران يۈز بېرىپ كېسەللىك





ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىسە سەپرا مېڭىگە تۈرلەپ گاسلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

5. ئىچكى ياكى تاشقى ئامىللارنىڭ تەسىرى بىلەن ئۆز ئېتىدالىدىكى ئىسسىق-سوغۇق، ھۆل-قۇرۇق مىزاجنىڭ. بۇزۇلۇشى قۇلاقنىڭ ئاڭلاش ئەزالىرى (ئالەتلىرى) گە تەسىر قىلسا گاسلىقنى پەيدا قىلىدۇ. بۇنىڭدا: مىزاجنىڭ ئىسسىق ياكى قۇرۇقتىن ئۆزگىرىشى ئاڭلاش پەردىلىرىنىڭ ھۆللۈكىنى قۇرۇتۇپ ئاڭلاش قۇۋۋەتلىرىنىڭ ئۇلارغا دېگۈدەك تۆتەلمەسلىكىنى ياكى ئاڭلاش سېزىمىنىڭ تۆتۈشكە توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ. شۇ سەۋەبتىن ئاڭلاش ئاجىزلايدۇ ياكى ئاڭلىيالمىدۇ. مىزاجنىڭ سوغۇق ئۆزگىرىشى قۇلاقنىڭ ئاڭلاش پەردىسىنى قېلىنلاشتۇرۇپ ھەتتا قاتتىقلاشتۇرۇپ قويدۇ.

مىزاجنىڭ ھۆل ئۆزگىرىشى ئاڭلاش پەردىسىنى يوشاشتۇرۇپ، ئاڭلاش ئەسەبلىرىنى ھەر خىل دەرىجىدە سۇسلاشتۇرۇپ قويدۇ.

6. قويۇق ۋە خام خىلىتلار سېزىم ئەسەبلىرىگە قويۇلغانلىقتىن روھىي نەفسانى ئۆيەرگە تۆتەلمەي، قۇلاقنىڭ ئېغىرلىق ياكى گاسلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

7. قۇلاق تۆشۈكىگە توسالغۇ پەيدا بولۇپ، ئاڭلاش ئەسەبلىرىگە ئاۋاز دولقۇنىنى ئۆتكۈزمەيدۇ. شۇ سەۋەبتىن قۇلاق ئېغىرلىق ياكى گاسلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. مەزكۇر توسالغۇنىڭ ئۈچ خىل مەنبەسى بار:

بىرىنچى: قۇلاقتا كىرلەر كۆپلەپ يىغىلىپ قېلىپ قۇلاق تۆشۈكىنى ئېتىۋالىدۇ. ئىككىنچى، ئۇششاق غەيرىي نەرسىلەر يەنى توپا-قۇم، تۆلۈك ھاشارات، ئۇششاق تۇرۇق قاتارلىقلار قۇلاق تۆشۈكىنى ئېتىۋالىدۇ. ئۈچىنچى، قۇلاقتىكى يىرىڭلىق چاقا ساقىيىپ پۈتكەندىن كېيىن قېتىشقان يىرىڭلار قۇلاق تۆشۈكىنى توسۇۋالىدۇ ياكى قۇلاق تۆشۈكىدە ئارتۇق گۆش ئۈنۈپ قېلىپ، سۆڭەك بەز پەيدا بولۇپ قېلىپ قۇلاق تۆشۈكىنى ئېتىۋالىدۇ.

8. بەزى دورىلارنىڭ زەھەرلىشىدىنمۇ قۇلاق ئېغىرلىق ۋە گاسلىق كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭدا ئەپپون، نەشە قاتارلىقلارنىڭ ئاڭلاش سېزىم ئەسەبلىرىنى زەھەرلەشتە ئالاھىدە رولى بار.

### ئالامىتى

1. توغما گاسلىقتا بوۋاق توغۇلۇپ 3 ئايدىن كېيىنمۇ ئاۋاز چىققان تەرەپكە بېشىنى بۇراپ قاراشتەك ئىسكاسلار بولمايدۇ. بالا بارغانسېرى چوڭلاپ سۆزلەيدىغان ۋاقتى





كەلگەندە قۇلاق ئاڭلىمىغاچقا تاۋۇشلارنىڭ قانداق چىقىرىشىنى بىلمەيدۇ. دېمەك، توغما گاس تۇغۇلغانلاردا گاجىلىق بىللە كۆرۈلىدۇ.

2. ياشانغانلىقتىن بولغان گاسلىقتا قۇلاق ئېغىرلىشىش ۋە گاسلىق تەدرىجىي پەيدا بولىدۇ. ياش چوڭايغانسىرى ۋە بەدەن ئاجىزلاشقانسىرى يۇقىرى ئاۋازدا ياكى يېقىن كېلىپ گەپ قىلسا ئاڭلىيالايدۇ. تاۋۇشلارنى تەلەپپۇز قىلىشمۇ تۇتۇقلىشىدۇ. ياشانغانلاردا قۇرۇق سوغۇق ئالامەتلەر روشەنرەك كۆرۈلىدۇ.

3. ئەسەب خاراكتېرلىك گاسلىقتا سىرتقى جەھەتتە زەخمىلەنگەنلىك تارىخى بولىدۇ. بەزىلەردە دەسلەپكى مەزگىللەردە قۇلاق ئېغىرلىق كۆرۈلۈپ كېيىن تەدرىجىي گاسلىق پەيدا بولىشى مۇمكىن. ئاڭلاش ئەزالىرى گەرچە نورمال بولسىمۇ ئاڭلاش ئەسەبلىرىنىڭ خىزمىتى پۈتۈنلەي كاردىن چىققاچقا ۋە ھەر قانداق ئاۋازنى چورت ئاڭلىمىغاچقا ئاۋازنى ئاڭلاشقا ئىتىلىش ھەرىكەتلىرى بولمايدۇ. بەزى تاغرىقلار قارشى تەرەپنىڭ ئاۋاز ھەرىكىتىگە قاراپ قىياسەن چۈشەنگەندەك قىلىپ جاۋاب قايتۇرىدۇ.

4. قىزىتمىلىق كېسەللەردىن بولغان گاسلىقتا كېزىككە ئوخشاش قىزىتمىلىق كېسەللىكلەر بىلەن كېسەللەنگەنلىك تارىخى بولىدۇ. سەپرا ماددىسىنىڭ مېڭىگە تۈرلىگەنلىكىدىن كېلىپ چىققان ئىسسىق ئالامەتلەر بولىدۇ.

5. مىزاجنىڭ ئۆزگىرىشى ئىسسىقتىن بولغان قۇلاق ئېغىرلىق ياكى گاسلىقتا بەدەندە ئىسسىقلىق ئالامەتلەر بولۇش بىلەن بىرگە قۇلاق ۋە قۇلاقنىڭ ئەتراپى داۋاملىق قىزىشقاندا، ئېچىشقاندا، ئىسسىقلىق زىيان قىلىدۇ. ئاپتاپ قىزىغاندا كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىرلىشىدۇ.

مىزاجنىڭ ئۆزگىرىشى قۇرۇقلۇقتىن بولسا قۇلاق ئېغىرلىق ياكى گاسلىقتا كېسەللىكتىن ئىلگىرى ئەزالارنى قۇرۇتقۇچى سەۋەبلەر يۈز بەرگەن بولىدۇ. مەسىلەن، ئېغىر جىسمانىي ئىشلارنى كۆپ، ئۇزۇن مۇددەت قىلىش، تولا ئاچ قېلىش، ئويۇقۇسزلىق قاتارلىقلار. قۇلاق ئىچى چوڭقۇر بىر يەردە تاغرىش بولۇشتىن باشقا كۆزدىمۇ تاغرىش بولىدۇ. بەدەن تۇرۇقلۇقىدا باشلايدۇ. ھۆلۈكتىن ھوزۇرلىنىدۇ.

مىزاجنىڭ ئۆزگىرىشى سوغۇقتىن بولغان قۇلاق ئېغىرلىق ياكى گاسلىقتا بەدەندە سوغۇقلۇق ئاشقان ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. سوغۇق ھاۋا ۋە سوغۇق نەرسىلەر زىيان قىلىدۇ. كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىرلىشىدۇ. تاغرىق ئىسسىقتىن ھوزۇرلىنىدۇ.

مىزاجنىڭ ئۆزگىرىشى ھۆلۈكتىن بولغان قۇلاق ئېغىرلىق ياكى گاسلىقتا بەدەندە ھۆلۈك ئاشقان ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. ھۆلچىلىك ۋە ھۆلۈك كۆپەيتكۈچى نەرسىلەر زىيان قىلىدۇ. يەنى، قار، يامغۇردا قالسا، مۇنچىغا كۆپ چۈشسە، ھۆلۈك مېۋە-چېۋىلەرنى





كۆپلەپ ئىستېمال قىلسا قۇلاق ئېغىرلىق ياكى گاسلىق تېخىمۇ ئېغىرلىشىدۇ. قۇرغاق پەسىل ۋە قۇرۇق نەرسىلەر پايدا قىلىدۇ.

6. قويۇق، خام خىلىتلارنىڭ ئاڭلاش ئەسەبلىرىگە قويۇلۇشىدىن بولغان قۇلاق ئېغىرلىق ياكى گاسلىقتا باش ئېغىر بولىدۇ. باشنى قويسا باش ئېغىرلىشىپ كۆچىسىدۇ. قۇلاقتا كۆيىگەندەك سېزىم بولماي بەلكى قۇلاق گۈكۈرىگەن سېزىم بولىدۇ. قىزىق نەرسىلەر مەنپەئەت قىلىدۇ.

7. قۇلاق توسۇلغانلىقتىن بولغان قۇلاق ئېغىرلىق ياكى گاسلىقتا قۇلاق پۈتۈپ قالغاندەك بىلىنىدۇ. قۇلاققا غەيرىي نەرسىلەر كىرىپ كەتكەن ياكى قۇلاقتا يىرىڭلىق چاقا چىققانلىق تارىخى بولىدۇ. قۇلاق يولىنى توسىغان نەرسىلەرنىڭ كۆپ-ئازلىقى، چوڭ-كىچىكلىكىگە قاراپ قۇلاق ئېغىرلىقىنىڭ دەرىجىسىمۇ ئوخشىمايدۇ.

8. دورىلارنىڭ زەھەرلىشىدىن بولغان قۇلاق ئېغىرلىق ياكى گاسلىقتا زەھەرلىك دورا ۋە نەرسىلەرنى ئىشلەتكەنلىك، بولۇپمۇ ئەيۈن، نەشە قاتارلىق نەرسىلەرنى ئىشلەتكەنلىك تارىخى بولىدۇ.

#### داۋاسى

تۇغما گاسلىق، ياشانغانلىقتىن بولغان ۋە ئاڭلاش ئەسەبلىرىنىڭ يۇزۇلۇشىدىن بولغان گاسلىقنى داۋالاشنىڭ ياخشى چارىلىرى يوق.

مىزاج ئۆزگىرىشىدىن بولغان قۇلاق ئېغىرلىق ياكى گاسلىقنى داۋالاشتا مىزاجنىڭ تۆت خىل كەيپىياتقا قارىتا مۇناسىپ داۋالاش ئۇسۇل-چارىلىرىنى قوللىنىش كېرەك. بۇنىڭدا ئالدى بىلەن قايسى سەۋەبتىن بولغانلىقىنى ئېنىقلاپ كېسەللىك ماددىسىنى سۈرۈپ چىقىرىش ۋە مېڭىنى تازىلاش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن مەتبۇخى ھەلىيە، ئىيارەجلەرنى بېرىپ ماددا سۈرۈپ چىقىرىلىدۇ. مىزاجنى تەڭشەش ئۈچۈن مېكيان گۆشى ئىستېمال قىلىش بىلەن بىرگە ئىچىشكە دىنار شەرىپىنى بېرىش كېرەك. ئۇنىڭدىن كېيىن سەۋەبلەرگە ئاساسەن كونكرېت تەدبىرلەرنى قوللانسا بولىدۇ. باشقا خىلدىكىلىرىگە تۆۋەندىكى ئۇسۇللارنى تاللاپ قوللىنىش كېرەك.

1. ئانار بىلەن داۋالاش (دەۋائى رۇمان)

ئاچچىق ئانار بىر دانە، سىركە 16 گرام، كۈندۈر 3 گرام.

ئانارنىڭ كىندىكىسىدىن تېشىپ دانىلىرى ۋە ئىچىدىكى تىرىپلىرى پۈتۈنلەي ئېلىپ تاشلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن ئانار دانىلىرىنى سىقىپ، سۈزۈپ سۈيىنى ئانار





ئىچىگە قويۇپ ئۈستىدىن سىرگە قوشۇپ، ئۈستىگە سالاھە قىلىنغان كۆندۈر سېلىنىدۇ. ئانارنى چوڭ ئۈستىدە بىردەم قويۇپ قىزىتىپلا ئېلىپ ئىچىدىكى سۈيىدىن قۇلاق ئىچىگە تامغۇزۇلىدۇ.

2. 10 گرام سامساقنى يەنجىپ، ئوڭا بىر دانە قوي تۈتى ئارىلاشتۇرۇپ بادام يېغى، ياڭاق يېغى، خاسنىڭ يېغى ياكى زىغىر يېغىغا قوشۇپ قۇلاققا تېمىتىش كېرەك.

3. سېرىق چېچەك، سوزاينىڭ يېغىنى بىلەن ھالدا قۇلاققا تېمىتىش، ياۋا بېدە، غار دەرىخىنىڭ ياپىرىقى، مەرزەنجۇش، بەرەنجاسف، سەتتەر، بابۇنلار قاينىتىلغان سۇلىرى بىلەن گەدەننىڭ ئارقىسىغا، قۇلاقنىڭ تۈۋىلىرىگە ئىسسىق تۈتكۈزۈش، سوزاپ، سەتتەر، بەھمەنلەرنى سىرگە، زەيتۇن يېغى بىلەن پىشۇرۇپ، ئاپتاپقا قويۇپ ئاپتۇۋا ئاغزىغا ۋە رەنكىنى دۈم كۆمۈرۈپ، چىڭ يېقىپ ۋە رەنكىنىڭ نەيچىسىنى قۇلاققا تۇتۇپ ھورنى قۇلاققا ئېلىش لازىم.

4. بىر تۇخۇمنىڭ ئېقىغا تەڭ مىقداردىكى ئايال سۈتىگە 10 گرام كالىنىڭ تۈتىنى قوشۇپ قۇلاققا تېمىتىش كېرەك.

5. قاپاق چېچىكىدىن 10 گرامنى يەنجىپ 20 گرام كۈنجۈت يېغى، 6 گرام رەۋەن، 3 گرام تاغ تۆچكىسىنىڭ تۈتى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئاز-ئازدىن تېمىتىش بولىدۇ.

6. كونا سېرىق مايغا بىلان يېغىنى ئارىلاشتۇرۇپ قۇلاققا تېمىتىش بولىدۇ.

7. سامساقنى قاينىتىپ سۈزۈپ، سۈيىنى قۇلاققا تامغۇزۇش پايىدا قىلىدۇ. ئامۇت تۇرۇقى يېغىنى تامغۇزۇش، ئاچچىق تۇرۇپ سۈيىنى ھەسەل بىلەن قاينىتىپ تامغۇزۇشنىڭ ئوبدان تۈنۈمى بار. قاپاق چېچىكىنى كۈنجۈت يېغىدا ئېزىپ تېمىتىش قۇلاق ئېچىلىدۇ.

8. چۈمۈلە يېغى ياكى كۈچۈلە يېغىنى تامغۇزۇش بولىدۇ.

چۈمۈلە يېغىنى تەييارلاش ئۇسۇلى: 100 م ل كۈنجۈت يېغى ياكى زەيتۇن يېغىغا 15—10 گرام قارا چۈمۈلنى سېلىپ 40 كۈنگىچە تومۇز ئاپتاپتا قويۇپ چۈمۈلە يېغى تەييارلىنىدۇ.

9. بابۇنە، ئىكىلىملىك، سەتتەر، بىنەپشە، چىڭسەيلەرنى قاينىتىپ تۈنىگەن چىققان ھورغا قۇلاقنى تەرلىگىچە تۇتۇش لازىم.

10. قۇلاق ئىچىگە گۆش ياكى سۆگەل پەيدا بولغان بولسا كېسىپ ئېلىۋېتىش كېرەك. ئەگەر ئۇلار قۇلاقنىڭ ئىچىكى تەرىپىدە، چوڭقۇردا بولسا ئىچىگە ئەسۋاب بىلەن بىر ئىلاج قىلىپ كېسىش لازىم. كېسىپ ئېلىۋەتكەندىن كېيىن پىلتىكۈچ تەييارلاپ زاك ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش جاراھەت پۈتۈرمەيدىغان نەرسىلەرگە مەزكۇر پىلتىكۈچنى تەككۈزۈپ قۇلاققا سېلىپ قويسا قالدۇق يىلتىزلىرىنى بەپ گۆش ياكى سۆگەللەرنى قايتا





تۈنمەيدىغان قىلىدۇ. ئەگەر ھەر قانداق ئوسۇل بىلەنمۇ كېشىش مۇمكىن بولمىسا قۇلاقنى ئاق توغرىغۇ، ئىسسىق سۇ بىلەن يۇيۇپ، ئاندىن سودا بىلەن قىزىل زەرنىخنى يۇمشاق ئېزىپ سىركە بىلەن خېمىر قىلىپ شۇ بەرگە قويسا ئارتۇق گۆشنى يەپ تۈگىتىدۇ. ئارتۇق گۆشلەرنى تۈگەتكەندىن كېيىن جاراھەتنى داۋالاش، جاراھەتنى پۈتتۈرگۈچى دورىلارنى ئىشلىتىش لازىم.

11. قۇلاق ئىچىدىكى كىرلەر توسالغۇ پەيدا قىلىپ ئاڭلاشقا تەرسىر يەتكۈزگەن بولسا، كىرنى تازىلاش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن ھەر كۈنى ئاخشىمى ئوخلاشتىن ئىلگىرى قۇلاق ئىچىگە كۈنجۈت يېغى، گۈل يېغى ياكى بادام يېغىدىن بىرنى تامغۇزۇپ، ئەنسى قۇلاقنى قايناقسۇ ھورىغا ياكى مۇنچا ھورىغا تۇتسا يۇمشىغان كىرلەرنى ئاسانلا تازىلەۋەتكىلى بولىدۇ.

زاغۇن ئورۇقى، ئاق توغرىغۇلارنى سوقۇپ سىركىدە خېمىر قىلىپ پىلتىكۈچ بىلەن قۇلاققا سېلىپ قويۇپ 3 كۈندىن كېيىن ئېلىۋېتىپ قۇلاقنى تازىلىسا كىرلەرنى ئاسان ئېلىۋەتكىلى بولىدۇ.


## قۇلاق قىچىشىش

قۇلاق قىچىشىش (ھىككە تۇلتۇزنى، خارىشى گۆش) بەزى ئىچكى-تاشقى سە-  
ۋەبلەر تۈپەيلىدىن قۇلاقنىڭ ئۈزلۈكسىز قىچىشىپ بىشارام قىلغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

تاشقى سەۋەبلەردىن قۇلاق تازىلىقى ياخشى بولماسلىق، يەللىك نەرسىلەرنى كۆپ ئىستېمال قىلىش ۋە قۇلاق ئىچى ئىشىشىش، توششاق مۇدۈر چىقىش قاتارلىقلار ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ بەل (بۇخار) لارغا ئايلىنىپ قۇلاققا يامان تەسىر قىلغانلىقتىن قۇلاق قىچىشىش كېلىپ چىقىدۇ.

ئىچكى سەۋەبلەردىن ئاساسلىقى بەزى كىشىلەردە نورمالسىز بەلغەم قۇلاققا يامان







تەسىر قىلغانلىقتىن قۇلاق قىچىشىش كېلىپ چىقىدۇ.

### ئالامىتى

قۇلاق قىچىشىدۇ، ئەمما ئاڭلاش ئىقتىدارى نورمال بولىدۇ. قۇلاق قىچىشىش، قۇلاق ئىچى ئىششىقى، قۇلاق ئىچىگە مۇدۇر چىقىشتەك كېسەللەرنىڭ تەسىرىدىن بولسا قىچىشىش دائىم بىر خىلدا بولىدۇ. يەل (بۇخار) لاردىن بولسا يەللىك نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلغاندا ۋە قۇلاق تازىلىقى ياخشى بولمىغاندا كۆچىيىدۇ.

### داۋاسى

مەيلى قايسى سەۋەبتىن بولمىسۇن ئوخشاشلا ئىيارەجى پەيقەرا، ئىرىفېلى كەشنىزلەر بېرىلىدۇ.

سىرتتىن ئاچچىق بادام يېغى ياكى شاپتۇل مېغىزى يېغى، گۈللۈك ئەمەننى سىركە بىلەن قاينىتىپ سۈزۈپ قۇلاققا تېمىتىش كېرەك ياكى گۈللۈك ئەمەننى سىركە بىلەن قاينىتىپ سۈزۈپ گۈل يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ قۇلاق يولىغا تېمىتىسۇمۇ بولىدۇ. شۇمىشنى ئايال كىشىنىڭ سۈتىدە قاينىتىپ تەمى چىققاندا يىلما يېتى قۇلاققا تېمىتسا ياكى ئۇنى ھەسەل بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ قۇلاققا سالسا كۆپ مەنپەئەت قىلىدۇ. سەبىرنى گۈل يېغى ياكى ياسمەن يېغى بىلەن، ھوزۇز (روسۇت) نى ئايال كىشىنىڭ سۈتى بىلەن قاينىتىپ بىرئاز تۇرغۇزغاندىن كېيىن يىلما يېتى تېمىتىش كېرەك.

بالىلارنىڭ قۇلقى يەلدىن قىچىشىسا سوغۇقتىن بولغان قۇلاق ئاغرىقىنى داۋالاشتا قوللانغان ئۆسۈل-چارىلەرنى قوللانسا بولىدۇ. ئەگەر بۇۋاق بالىلاردىكى قۇلاق قىچىشىش ئانا سۈتىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن كېلىپ چىققان قىزىما سەۋەبىدىن بولغان بولسا، تۇرۇپنى پاكىزلەپ ئېزىپ سىركەدە تۇرغۇزۇپ گۈل يېغى بىلەن تاكى سۈيى قالمىغىچە قاينىتىپ يېغى قالغاندا تىرىپلىرىنى سۈزۈپ ئېلىۋېتىپ قۇلاققا تېمىتسا بولىدۇ. ئادەتتە دائىم قۇلاق تازىلىقىغا دىققەت قىلىش ھەمدە يەللىك نەرسىلەرنى كۆپ ئىستېمال قىلماسلىق كېرەك.



## قۇلاق ۋەرەملىرى

قۇلاق ۋەرەملىرى (ئەۋرامۇلتۇزنى، ئاماسھايى گۆش) قۇلاقنىڭ ئىچكى ياكى تاشقى تەرەپلىرىدىكى بولۇپمۇ قۇلاق تۈۋىدىكى يۇمشاق بەزلەرنىڭ ۋەرەملىنىشىگە قارىتىلغان بولۇپ، بۇ ۋەرەملەر يامان تەسىر ۋە خەۋپ-خەتەرگە ئىگە. قۇلاق تۈزى سەزگۈر ئەزا بولۇپلا قالماي، بەلكى ئۇنىڭ تۈۋەندىكى يۇمشاق بەزلەرنىڭ مېگە ۋە سېزىم ئەزالىرى بىلەن مۇناسىۋىتى ناھايىتى زىچ بولغاچقا ئاسانلا مېگىگە يامراپ سەرسام ۋە ئەقلىنىڭ ئېلىشىشىنى پەيدا قىلدۇ ھەتتا بەزىدە ئۆلۈم خەۋپمۇ كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

### سەۋەبى

ھەر خىل ئىچكى، تاشقى ئامىللار قۇلاققا يامان تەسىر قىلغانلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ. ئىچكى جەھەتتە كۆپىنچە بەدەندىكى 4 خىلنىڭ بىرەرسىدە غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىش پەيدا بولۇپ قۇلاققا يامان تەسىر قىلىپ ئوقۇنەت پەيدا قىلغانلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ.

تاشقى جەھەتتە كۆپىنچە يىرىڭلاشقۇچى جەراسىملارنىڭ ھەر خىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن قۇلاققا كىرىپ كېتىشى، بالىلار قۇسقاندا قۇسۇق ماددىلىرىنىڭ قۇلاققا كىرىپ كېتىشى، قۇلاققا بىر نەرسە تېگىپ كېتىش ياكى تۇششاق مۇدۇر چىقىش قاتارلىق سەۋەبلەردىن قۇلاق ۋەرەملىرىدە كېلىپ چىقىدۇ.

### ئالامىتى

ۋەرەم قاندىن بولسا قۇلاق تۈۋى قىزىرىپ، چىڭقالغاندەك قادىلىپ باش بىلەن قوشۇلۇپ ئاغرىيدۇ. قۇلاق ئەتراپىنى تۇتۇپ كۆرگەندە قىزىق بىلىنىدۇ. بەزىدە قۇلاقنىڭ نورمال ئاڭلىشىغا تەسىر يېتىدۇ. تىل تېنى ۋە سۈيۈدۈكى قىزىل بولىدۇ. تومۇرى كۆچلۈك سوقىدۇ.

ۋەرەم بەلغەمدىن بولسا يۇقىرىدىكى ئالامەتلەرنىڭ تەتۈرىسىچە بەلگىلەر



كۆرۈلىدۇ. گەرچە ۋەرمەلەنگەن قۇلاقتا ئېغىرلىق بولسىمۇ، قۇلاق تۈۋى ئاق، يۇمشاق كېلىدۇ. قىزىللىق ئازراق، ئاغرىقمۇ بوشراق بولىدۇ. بەزىدە تەرەققىي قىلسا قۇلاقتىن يىرنىڭ ئاقدۇ. تىل تېنى ۋە سۈيدۈك قىزارمايدۇ، تومۇرى بوش، ئاستا سالىدۇ. سەپرادىن بولسا قۇلاق ئەتراپى كۆيۈشكەندەك ئېچىشىپ ئاغرىيدۇ، ئېغىرلىق بولمايدۇ. تىل تېنى قىزىل، سۈيدۈكى سارغۇچ كېلىدۇ. تومۇرى تېز سوقىدۇ. سەۋدادىن بولسا ئېشىش ئېغىر بولۇپ قاتتىقراق بېلىنىدۇ، ئاغرىق ئازراق بولىدۇ. قۇلاق ئەتراپى كۆكۈش، تۇتۇقراق كېلىدۇ.

### داۋاسى

مەزكۇر كېسەللىكنىڭ ھەممە خىلىتلاردىن بولغانلىرىدا زۆرۈرىيەتكە قاراپ سۈرگە ئارقىلىق بەدەننى تازىلاش، ئاندىن كېيىن ئاغرىقنى پەسەيتىپ ئىششىقنى ياندۇرغۇچى ھۆل ئىسسىق نەرسىلەرنى تېگىش لازىم. ئىششىق ئېغىز ئالماي تارقاپ كېتىش ئېھتىمالى بولسا گىلى ئەرمىنى، ھوزۇز، ئاق سەندەل قاتارلىقلارنى يۇمشاق سوقۇپ تۇخۇم ئېقى بىلەن چېپىش كېرەك. ئەگەر ئېغىز ئېلىش ئېھتىمالى بولسا ئېغىز ئالدىرغۇچى مەلھەملەرنى تېگىش لازىم. لېكىن قاتۇرغۇچى نەرسىلەرنى ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش لازىم. چۈنكى ماددىنى قاتۇرغۇچى نەرسىلەر ئىشلىتىلسە ئوقۇنەتلەر رەئىس ئەزا بولغان مېگە تەرەپكە تۇتۇپ كېتىش خەۋىپى بار.

قۇلاق تۈۋىدىكى ئىششىقلارغا تېگىلىدىغان دورىلار: سېرىق چېچەك تۇرۇقى، بابۇنە، زىغىرلارنى ياغ ۋە ئاق موم بىلەن ئېلىشتۇرۇپ يىلماق ھالدا تېگىش لازىم. كەرەم (كالىلەك بەسەي) ياپرىقىنى سېرىق ياغدا پىشۇرۇپ تاغسىمۇ شۇ تەسىرنى بېرىدۇ. ئىششىق قاتتىق بولۇپ ئاغرىسا، تارقاققۇچى زىمادلارنى ئىشلىتىش، خام ياكى داكنى قايناقسۇغا چىلاپ بەدەن كۆيمىگۈدەك ھالدا ئىششىققا قويۇش لازىم. ئەگەر ئىششىق سەۋدا مەنبەلىك بولسا، باشلىنىش ۋاقتىدا سوغۇق نەرسىلەرنى، مەسلەن: كاقۇر مەلھىمى، ئىت ئۈزۈمىنىڭ سۈيى قاتارلىقلارنى ئىشلەتسە بولىدۇ. ئاق سەندەل كۆك يۇمغاقسۇت سۈيى بىلەن چېپىلىدۇ.

ئىسسىقتىن بولسا، ئەمەلىي ئەھۋالغا قاراپ زۆرۈر تېپىلغاندا ئازراق قان ئالسا بولىدۇ ياكى قاننى پەسەيتكۈچى دورىلارنى، مەسلەن: ھەببە بىنەپشە، مەتبۇخى شاھتەررە، ئىتريفېلى كەشىز قاتارلىق دورىلارنى ئىشلىتىش كېرەك. قۇلاقتىكى ئاغرىق بەك كۈچلۈك بولسا كۆكنار يېغى، گۈل يېغى، سوزاپ يېغى، ئايال





سۈتى قاتارلىقلاردىن بىرنى تامغۇزسا بولىدۇ.

سوغۇقتىن بولسا سوغۇقلۇقنى تەڭشىگۈچى دورىلارنى ئىشلىتىش لازىم. مەسلەن: ھەببى ئىيارەج، ئىترىفېلى كەبىر قاتارلىقلاردىن بېرىش، سىرتتىن سۆسەن يېغى، ئاچچىق بادام يېغى قاتارلىقلارنى قۇلاققا تېمىتىش، مەرزەنجۇش، رۇمىادىيان، سېرىق چېچەكلەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ قاينىتىپ ھورىغا قۇلاقنى تۇتۇش، تۇز، كېپەك قاتارلىق نەرسىلەرنى قىزىتىپ قۇلاققا ئىسسىق تۇتكۈزۈش لازىم.

قۇلاقتىن يىرنىڭ ئېقىپ توختىمىسا تۆۋەندىكى چارىلەرنى قىلىش كېرەك:

1. كالا تۇتىدىن ئىككى ھەسسە، ھەسەلدىن بىر ھەسسە ئېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ قۇلاق ئىچىگە پىلتىكۈچ بىلەن سۈركىسە بولىدۇ. سۈركەشتىن بۇرۇن شاكىراب سۇ (تۇز سۈيى) گە چىلانغان پىلتىكۈچ بىلەن يىرنى تازىلىۋېتىش لازىم.

2. بادام يېغى تېمىتىمۇ بولىدۇ.

3. پىيازنى چاناپ داكىغا ئېلىپ مىجىپ چىققان سۈيىگە تۇخۇم ئېقى قوشۇپ قۇلاققا تېمىسا بولىدۇ.

4. بەش گرام مامرانچىنى 50 م ل سۇدا قاينىتىپ تەمىنى چىقىرىپ سۈزۈپ يىلماڭ ھالدا قۇلاققا تېمىتىمۇ بولىدۇ.

5. ساپ ھەسەلنى پىلتىكۈچكە تەككۈزۈپ قۇلاق ئىچىگە سۈركەپ قويسىمۇ ئاغرىق توختايدۇ.

6. كۈدىنى مىجىپ سۈيىنى چىقىرىپ گۈل يېغىغا ئارىلاشتۇرۇپ قۇلاققا تامغۇزسىمۇ بولىدۇ. كېسەل ئەھۋالى ۋە مىزاجىغا قاراپ مۇۋاپىق يېمەك-ئىچمەكلەرنى ئىستېمال قىلىش كېرەك.

## قۇلاق يىرنىڭلىق چاقىسى

قۇلاق چاقىسى (قۇرۇھۇلشۇزى، بوسۇرى گۆش) قۇلاق ئىچىگە ۋە قۇلاق توشۇكى ئەتراپىغا يىرنىڭلىق چاقا چىققانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

بەدەندىكى 4 خىلنىڭ بىرەرسىدە غەيرى تەبىئىي تۈزگىرىش پەيدا بولۇپ،





قۇلاققا يامان تەسىر كۆرسەتكەنلىكتىن قۇلاق ئىچى ياكى قۇلاق تۆشۈكى ئەتراپىغا بىرىكىلىق چاقا چىقىدۇ.

بىرەر جايدىن يىقىلىش، بىرەر نەرسە تېگىش، چاقا پەيدا قىلغۇچى بەزى يېمەكلىك ياكى دورىلارنى ئىستېمال قىلىش قاتارلىق سەۋەبلەردىن جاراھەت ۋە ئىششىقلار جەراسملىنىپ ياكى مۇدۇر چىقىپ ئوقۇنەتلىنىپ ئاخىرى چاقىغا ئايلىنىدۇ.

### ئالامىتى

قۇلاق ئىچى ۋە تۆشۈكى ئەتراپىغا ئوخشاش بولمىغان چوڭ-كىچىكلىكتە چاقا چىقىدۇ. چاقا ئەتراپى ئىششىش، چىڭقىلىپ ئاغرىش-قىزىرىش سىرت قايسى خىلتنىڭ ئۆزگىرىشىدىن بولغان بولسا شۇنىڭغا خاس ئالامەتلەر بولىدۇ. چاقىنىڭ بەزىلىرى بارا-بارا قېتىشىپ قاقاچ باغلاپ چۈشۈپ تۈگەيدۇ، بەزىلىرى ئۇزۇن ۋاقىت داۋاملىشىپ ئاقىمغا ئايلىنىدۇ.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن مىزاجنى تەڭشەش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن كېسەل ماددىسىنى پىشۇرۇپ، تازىلىغاندىن كېيىن ئىششىق ۋە ئاغرىق پەسەيتكۈچى چارلەرنى قىلىش كېرەك.

ئەگەر سېرىق سۇ كۆپرەك ئاقسا 20 گرام موزنى كۈچلۈكرەك روھى شاراب (ئىسپىرت) قا بىر ھەپتە چىلاپ، ئاندىن موزنى سۈزۈۋېتىپ، ئىسپىرتى بىر ئاز ئىسسىتىپ قۇلاققا كۈنىگە ئىككى قېتىم تېمىتىش كېرەك.

قويۇق يىرىك چىقسا كۆكنار گۈلگە بىر ئاز قۇندۇز قەھرى قوشۇپ، گۈل يېغىغا چىلاپ شۇ ياغنى قۇلاققا تېمىتىش لازىم. مەرھىمى مەرارە (ھايۋانات ئۆتىدە ياسالغان مەلھەم) ئىشلىتىلسمۇ پايدا قىلىدۇ.

ئەگەر سىرتقى زەخىمدىن بولسا ۋاقتىدا چارە قىلىپ چاقىنىڭ يامانلىشىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. يېمەكلىك ياكى دورىلار تەسىرىدىن بولغان بولسا بۇ خىل نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلىشنى دەرھال توختىتىش بىلەن بىرگە چاقىغا ئامال قىلىش كېرەك.



## قۇلاق ئاقمىسى

قۇلاق ئاقمىسى (ناسۇرۇلتۇزنى) قۇلاق ئىچىگە ھەر خىل يىرىڭلىق چاقىلار چىقىپ ساقايماي تۇزۇنغا سوزۇلۇپ يىرىڭ، سېرىق سۇ ئېقىپ تۇرغانلىقىغا قارىتىلغان. ئۇ ئادەتتە ئوتتۇرا قۇلاق ۋەرىمى (ۋەرەمۇلتۇزنى) دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

سە ۋەبى

ئىچكى، تاشقى ئامىللارنىڭ تەسىرىدە بىرەر خىلنىڭ غالىب كېلىشى، بەدەننىڭ ئاجىزلىشىشى تۈپەيلىدىن جەراسىملار قۇلاقتا ئوقۇنەت پەيدا قىلىپ قۇلاق ئىچىدە ھەر خىل ئىششىق ۋە يىرىڭلىق چاقىلارنى پەيدا قىلىدۇ. بۇلار تۇزۇنغىچە ساقايىمسا ئاخىرى ئاقمىغا ئايلىنىدۇ.

مەزكۇر كېسەل سۈت ئېمىۋاتقان بوۋاق بالىلاردا كۆپرەك ئۇچرايدۇ. بالىلارنى ئېمىتىش جەريانىدا سۈت ۋە بالىنىڭ قۇسۇقلىرى قۇلاققا كىرىپ كەتسە ياكى بالىلارنى يۇيۇندۇرغاندا قۇلاققا سۇ كىرىپ كەتسە مەزكۇر كېسەلنىڭ پەيدا بولۇشىغا سەۋەب بولۇشى مۇمكىن.

بۇرۇن ۋە تاماق ساھەسىدىكى ۋەرەملەرنى ۋاقتىدا بىر تەرەپ قىلمىسا قۇلاققا يامراپ مەزكۇر كېسەلنىڭ كېلىپ چىقىشىغا سەۋەب بولىدۇ. ئۆتكۈر ياكى تېز پەيدا بولىدىغان قۇلاق ۋەرىمى ياكى يىرىڭلىق جاراھەتلەرنى ئۆز ۋاقتىدا داۋالىمىسا قۇلاق ئاقمىسىغا ئايلىنىپ كېتىدۇ.

ئالامىتى

ئۆتكۈر قۇلاق ۋەرىمى بولغاندا پۈتۈن بەدەن قىزىش، ھالسىزلىنىش، قۇلاق قاتتىق ئاغرىش بىلەن بىللە باش ئاغرىش، ئىشتىھا تۇتۇلۇش، بەزىلەردە گال-تاماق قىسمى يېقىمىسىزلىنىش، بادامچە بەزىلەر ئىششىپ ئاغرىشلارمۇ يۈز بېرىدۇ. ئاڭلاش سېزىمى نۆۋەنلەپ قۇلاق غوڭغۇلداش، قۇلاققا سۇ كىرىۋالغاندەك بىلىنىش قاتارلىق ئالامەتلەر



كۆرۈلدى. ئۆتكۈر دەۋرىدە قۇلاقتىن يىرىك ئاقمايدۇ، پەقەت سېرىق سۇ ئېقىشى مۇمكىن. يۇقىرىقى ئەھۋاللارغا قارىتا تولۇق چارە قىلىپ داۋالىمىغاندا ئارىدىن 1-2 ئاي ئۆتكەندىن كېيىن سوزۇلما قۇلاق ئېقىشقا ياكى سوزۇلما ئوتتۇرا قۇلاق ۋە رەمگە ئۆزگىرىدۇ. سوزۇلما قۇلاق ئېقىش ئۆزۈنغا سوزۇلدىغان كېسەللىك بولۇپ، قۇلاقتىن سېسىق پۇرايدىغان سېرىق سۇ، يىرىك ئېقىپ تۇرىدۇ. بەزىدە ئوقۇنەتلىنىپ ئىشىشىدۇ. كېسەل كىشىنىڭ روھىي كەيپىياتىغا دەخلى يەتكۈزۈپلا قالماي، بەلكى ئاڭلاش كۈچىنى تەدرىجىي تۈۋەنلىتىدۇ، بەزىدە قۇلاق چىڭقىلىپ ئاغرىدۇ. قۇلاق ساھەسى مېڭگە يېقىن بولغاچقا، قۇلاقتىكى ئوقۇنەت، جەراسىملار يۇقىرىغا تۈرلەپ مېڭە پەردىلىرىنى ۋە رەمەندۈرۈپ، ھاياتقا خەۋپ يەتكۈزىدىغان مېڭە قېيى ۋەرىمى (سەرسام) ياكى مېڭە ئۆز ماددىسىنىڭ ۋەرىمى، قۇلاق سىرتقى ئۆسۈكچىسىنىڭ ۋەرىمى، قۇلاق سېزىم ئەسەبلىرىنىڭ ۋەرىمى، قۇلاق ئارقا سۆڭەك پەردىسىنىڭ ئاستىغا يىرىك يىغىلىش، ۋەرىد (ۋېنا) تومۇرى توسۇلۇپ ۋە رەملىنىش قاتارلىق ئېغىر كېسەللەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ئاققان يىرىكنىڭ رەڭگى سارغۇچ قان ئارىلاش، يېشىل شىلمىسىمان كەلسە كېسەلنىڭ ئەمدى باشلانغانلىقىنى، سېسىق، قارامتۇل ياكى سۈزۈك ئاق كەلسە كونا رەملىنى بىلدۈرىدۇ. شۇڭا قۇلاق ئېقىشقا سەل قارىماي يېڭى باشلانغان جىددىي دەۋرىدە ئەستايىدىل، تولۇق داۋالاپ ساقايتىش، ئونىڭ سوزۇلما خاراكتېرىگە ئايلىنىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم.

### داۋاسى

مېڭە ۋە قۇلاقتىن توسالغۇلىرىنى ئېچىش، بەدەن قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇپ جەراسىملارنى تۈگىتىش ئۈچۈن ھەبىي ئىيارەج، ھەبىي قوقيا، مەئجۇنى چۆپچىنى، ھەبىي كىرىت قاتارلىق دورىلارنى كېسەلنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا قاراپ ئىچىشكە بېرىش لازىم. قۇلاق ئىچى. قىزىرىپ ئىشىشىپ قالغاندا ئاق لەيلى گۈلى، سەپشە، كاسىن يوپۇرمىقى، كۆك يۇمىقاسۇت، ئەنگۈرى شىفا (ئىت ئۈزۈمى) يوپۇرمىقىنى سوقۇپ، 8 گرام گىلى ئەرمىنى قوشۇپ قۇلاققا چېپىش لازىم. كاقۇرنى زەيتۇن ياكى كۈنجۈت يېغىدا ئېرىتىپ تامغۇزسىمۇ بولىدۇ. قۇلاققا دورا تېمىتىشتىن بۇرۇن سۇس شاكىراب سۇ (تۈز سۈيى) غا چىلانغان پىلىكۈچ بىلەن يىرىكنى نازىلئۇپتىش لازىم. يىرىك تازىلاش ئۈچۈن يەنە ئەزەرۈت ياكى مەدەستانلارنى باراۋەر مىقداردىكى ھەسەل بىلەن بىرلەشتۈرۈپ





قۇلاققا سېلىش ياكى ساپ ھەسەلنى پىلىتىۋېتىشكە تەككۈزۈپ قۇلاق ئىچىگە سۈركەش كېرەك. مەلھىمى مېرىمۇ ياخشى تەسىر كۆرسىتىدۇ.

قۇلاقتىن يېرىك ئېقىپ توختىمىسا كالا تۆتىدىن ئىككى ھەسسە، ھەسەلدىن بىر ھەسسە ئېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ قۇلاق ئىچىگە پىلىتىۋېتىش بىلەن سۈرتۈش لازىم. قۇلاق يولىنى تۇز سۈيى بىلەن تازىلاپ، موزنى سوقۇپ ئەگلەكتىن تۆتكۈزۈپ، قومۇش نەيچىگە موز تالقىنى ئېلىپ قۇلاق ئىچىگە كۈندە ئىككى قېتىم پۈركەشمۇ ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

يۇقىرىقىدەك داۋالاش ئۈنۈم بەرمىسە ۋاقىتنى تۆتكۈزۈۋەتمەي جەراسىمغا قارشى دورىلارنى ئىشلىتىش كېرەك.

دېققەت قىلىدىغان ئىشلار

قۇلاقنى قالايمىقان كولمىسىلىق، قالايمىقان دورا تېمىتىمىسىلىق، قۇلاققا سۇ، سۈت، قۇسۇق ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش نەرسىلەرنىڭ كىرىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش، قۇلاقنىڭ تازىلىقىغا دېققەت قىلىش قاتارلىقلار سوزۇلما خاراكتېرلىك قۇلاق ئېقىش كېسەللىكى ۋە ئۇنىڭ قوشۇمچە كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.

## قۇلاق قاناش

قۇلاق قاناش (ئىنسىجارۇلئوزىنى) ھەر خىل ئىچكى-تاشقى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن قۇلاق تۈشۈكىدىن قان كەلگەنلىكىگە قارىتىلغان.

سەۋەبى

بۇ كېسەل ئاساسەن تۆۋەندىكىدەك بىر قانچە خىل سەۋەبلەردىن بولىدۇ:

1. ئادەمنىڭ تەبىئىيىتى كېسەللىككە قارشى كۈرەش قىلغاندا يەنى بەدەندە بۆھران يۈز بەرگەندە بۇرۇن قانغاندەك قۇلاقمۇ قانايدۇ.
2. قان بەك زىيادە بولۇپ تومۇر تولۇپ كەتكەنلىكتىن ياكى بەدەن كۈچلۈك سىرتقى







زەربىگە ئۇچرىغانلىقتىن بولۇپمۇ باش قىسمىغا بىر نەرسە تەككەنلىكتىن قۇلاق ئىچىدىكى بىرەر تومۇر يېرىلىپ ياكى تۇنىڭ ئاغزى ئېچىلىپ قۇلاق قاناش يۈز بېرىدۇ. 3. زەھەرلىك يىلان چاققان ياكى چايان چاققان سەۋەبتىن قۇلاق قانايدۇ. بولۇپمۇ كۆزەينەكلىك يىلاندەك زەھەرلىك يىلانلار چاققاندا تۇنىڭ زەھىرى ئادەمنىڭ قېنىنى سۇيۇلدۇرۇپ (ئېرىتىپ) بەدەندىكى بارلىق تۇششاق تۈشۈكلەردىن قان چىقىپ قۇلاق قاناشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

قۇلاق سىرتقى قاتتىق زەربىلەر تۈپەيلىدىن قانسى يۇقىرىدا سۆزلەنگەن قۇلاق قاناش تۈرىگە كىرمەيدۇ. بۇ كۆپىنچە ھاللاردا تۆلۈم خەۋپىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

### ئالامىتى

1. بۇھراندىن بولغان قۇلاق قاناشتا بۇھراننى كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى كېسەللىكلەرگە مۇناسىپ ھالدىكى ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.
2. قاننىڭ زىيادىلىكىدىن بولغان قۇلاق قاناشتا قاننىڭ تولۇپ-تاشقانلىقىغا ئائىت بىر قاتار نەپەسلىك كۆرۈلىدۇ. سىرتقى زەربىدىن بولغان قۇلاق قاناشتا روشەن ھالدا سىرتقى جەھەتتىن زەخملىنىش تارىخى بولىدۇ.
3. زەھەرلىك يىلان ۋە چايان چاققاندىن بولغان قۇلاق قاناشتا بۇ نەرسىلەر چاققانلىق تارىخى بولۇش بىلەن بىرگە بەدەندە ھاشارات چاققان ئىز بولىدۇ. ئاغرىقتا قۇلاق قاناشتىن ئىلگىرى زەھەرلەنگەنلىكتىن كېلىپ چىققان كۆڭلى ئاينىش، بەدەن تويۇشۇش، قۇسۇش ۋە ھۇشسىزلىنىشتەك بىر قاتار ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

### داۋاسى

1. بۇھراندىن بولغان قۇلاق قاناشنى داۋالاشتا، ئاغرىقنىڭ تېنى ئاجىز بولمىسىلا قاننى توختاتمىسىمۇ بولىدۇ. چۈنكى قاناش بىلەن بۇھران. كەلتۈرۈپ چىقارغان كېسەللىك بەھگىللىشىدۇ. بۇ خىل قۇلاق قاناشنىڭ ھەتتا بەدەننى باشقا چوڭ ئاپەتلەردىن ساقلاش رولىمۇ بولىدۇ.
2. قاننىڭ زىيادىلىكىدىن بولغان قۇلاق قاناشنى داۋالاشتا قاننىڭ زىيادىلىكىنى پەسەيتىش، قاننى سۇۋۇتۇشقا دائىر ئۆسۈل-چارە ۋە دورىلارنى قوللىنىش كېرەك. سىرتقى زەخمىدىن بولغان قۇلاق قاناشنى داۋالاشتا دەرھال قاننى توختىتىشقا ئامال قىلىش كېرەك.





3. زەھەرلىك يىلان ۋە چايان چاققاندىن بولغان قۇلاق قاناشنى داۋالاشتا دەرھال زەھەر قايتۇرۇش، جىددىي قۇتقۇزۇش چارىلىرىنى قىلىش كېرەك. ئومۇمىي جەھەتتە داۋالاشتا ئالدى بىلەن سەۋەبى تېپىپ قاناشنى توسۇش، ئاندىن قاننى توختىتىش ئۈچۈن مىزاجنىڭ ئىسسىق-سوغۇقلۇقىنى كۆزدە تۇتۇپ قان توختاتقۇچى دورىلارنى قۇلاققا تېمىتىش كېرەك. مەسىلەن: كېسەلدە قىزىتما بولۇپ مىزاجى ئىسسىق بولسا، موزنى سىركىدە قاينىتىپ سىركىگە بىر ئاز كافۇر قوشۇپ قۇلاققا تېمىتىش كېرەك. پاقا يوپۇرمىقى سۈيى ۋە سېمىز ئوت سۈيىگە مامىشا، ئاقاقىيالارنى قوشۇپ تېمىتىش شۇ تەسىرنى بېرىدۇ. تەلۋە ئانارنى پۈتۈن ھالدا سىركىدە قاينىتىپ، پىشقاندا ئانارنى ئېلىپ سۈيىنى سىقىپ، شۇ سۇدىن بىر قانچە تامچە قۇلاققا تېمىتىلسا قاننى توختىتىدۇ. كېسەلنىڭ مىزاجى ئىسسىق بولمىسا كۈدە سۈيىنى سىركە بىلەن قاينىتىپ تېمىتىلىدۇ. مۆتىدىل قىلىشنى خالىسا كۈدە سۈيىگە بىر ئاز كافۇر قوشۇلىدۇ. كافۇردىن، ئۇقۇتتىن كىچىكرەك ئېلىپ ئۇنىڭغا بىر گرام زەمچە قوشۇپ قۇلاققا پىلتىكۈچ ئارقىلىق كىرگۈزۈش ياكى جىغان مۇنچىقىنى قاينىتىپ سۈيىنى قۇلاققا تېمىتىش ئارقىلىق قان توختىتىشقا بولىدۇ. ئەگەر يۇقىرىقى ئۇسۇللار ئۈنۈم بەرمىسە دەستكارى ئۇسۇلنى قوللىنىش لازىم.

### قۇلاقنىڭ ئاۋازدىن قېچىشى

قۇلاقنىڭ ئاۋازدىن قېچىشى (ھەربۇلئۇزى، نازاكەتى گۆش) قۇلاقنىڭ ھەر خىل كۈچلۈك ئاۋازلارنى ئاڭلاشتىن قاچىدىغان بولۇپ قېشىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

مېڭە ھەر خىل ئىچكى تاشقى ئامىللارنىڭ تەسىرىدىن ئاجىزلىشىپ، قۇلاق ھەر خىل كۈچلۈك ئاۋازلارنى ئاڭلاشتىن قاچىدىغان بولۇپ قالىدۇ.

داۋاسى

مېڭىنى كۈچەيتىش تەسىرىگە ئىگە ھەر خىل ئىترىفېل ۋە خېمىر دورىلارنى





ئىستېمال قىلىش كېرەك. بۇرۇنغا پۇرۇتۇلىدىغان، تېمىلىدىغان ياكى مېڭىنى كۈچەيتىدىغان باشقا ئۇسۇل چارلەرنى قوللانسا بولىدۇ. مېڭە ئاجىزلىقى ۋە باش ئاغرىقى كېسەللىرىدە كۆرسىتىلگەن ئۇسۇل - چارلەرنى ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

### قۇلاققا سۇ كىرىپ كېتىش

قۇلاق ئىسچىگە سۇ كىرىپ كېتىش (دوخۇلى مائە فلتۇزنى، دەرئامە دەنى ئاب دەرگۈش) سۇ ئۈزۈش، باش يۇيۇش، مۇنچىدا يۇيۇتۇش جەريانىدا ئېھتىياتسىزلىقتىن قۇلاق يولىغا سۇ كىرىپ كەتكەنلىكىگە قارىتىلغان.

سەۋەبى

سۇ ئۈزۈش، باش يۇيۇش، مۇنچىغا چۈشۈپ يۇيۇتۇش ۋاقتلىرىدا تۇيۇقسىز قۇلاققا سۇ كىرىپ كېتىدۇ.

ئالامىتى

قۇلاققا سۇ كىرىپ كەتكەنلىكى ئۆزىگە ئېنىق مەلۇم بولىدۇ. قۇلاق ئېغىرلىشىپ ئازراق ئاغرىيدۇ. خۇددى قۇلاققا پاختا تىقىپ ئالغاندەك سېزىلىپ نورمال ئاۋازلارنى ئاڭلىيالمىدۇ ياكى بوش ئاڭلايدۇ. بەزى كىشىلەردە كىرىپ كەتكەن سۇ چىقماي تۇرۇپ قېلىپ قۇلاق ئىششىقلىرىنى پەيدا قىلىشى مۇمكىن.

داۋاسى

قۇلاققا كىرىپ كەتكەن سۇنى چىقىرىۋېتىش ئۈچۈن ۋاقتىدا چارە قىلىش كېرەك. ئالقانىنى سۇ كىرىپ كەتكەن قۇلاققا قويۇپ باشنى شۇ تەرەپكە قىسايىتىپ ھەرىكەتلەندۈرۈش ياكى سەكرەش كېرەك. قۇرۇق پاختىنى پىلىتىكۈچ قىلىپ قۇلاق ئىسچىگە سېلىپ، سىلىق





ھەرىكەتلەندۈرۈپ سۇنى پاختىغا شۇمۇرتۇش كېرەك.  
چۈشكۈرتكۈچى دورىلارنى بۇرۇنغا تارتىپ چۈشكۈرتۈش ئارقىلىق  
چىقىرىۋەتكىلىمۇ بولىدۇ.

### قۇلاققا ھاشارات كىرىپ كېتىش

قۇلاق ئىچىگە ھاشارات كىرىپ كېتىش (دوخۇلى ھەۋام فىلتۇزى، دەر ئامەدەنى ھەشر دەرگۈش) قۇلاقنىڭ تۈشۈكىگە قۇرت، پاشا، چۈمۈلە قاتارلىق نەرسىلەرنىڭ كىرىپ كېتىپ قۇلاققا يېقىمسىزلىق ياكى ئاغرىش كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقىغا قارىتىلغان.

#### سەۋەبى

قۇلاققا ئادەتتىكى ۋاقىتلاردا بولۇپمۇ يېزا-قىشلاقلاردا، ھاشاراتلار كۆپ جايلاردا، تۇخلاپ قالغاندا ھاشاراتلار قۇلاق ئىچىگە تۈمىلەپ ياكى تۇچۇپ كىرىپ كېتىدۇ.

#### ئالامىتى

قۇلاق ئىچىدە ھاشاراتنىڭ مىدىرلىغانلىقى ئېنىق بىلىنىدۇ. ئاغرىقلارغا قۇلاق يېقىمسىزلىنىش ھەتتا قۇلاق ئاغرىشتەك سېزىملارنى كەلتۈرۈپ بېرىدۇ. بەزىدە نورمال ئاۋازلارنى تولۇق ئاڭلاشقا تەسىر كۆرسىتىدۇ.

#### داۋاسى

قۇلاق ئىچىدىكى ھاشارات ئەگەر كۆزىگە كۆرۈنمىسە ئېھتىيات بىلەن قىسقىچتا قىسىپ ئېلىۋەتسە بولىدۇ. ئەگەر ھاشارات ئىچىدىرەك بولۇپ كۆرۈنمىسە ھەمدە ئالغىلىمۇ بولمىسا ھاشارات ئۆلتۈرگۈچى دورىلارنى ئىشلىتىپ ھاشاراتنى ئۆلتۈرگەندىن كېيىن سۇيۇقلۇقلار ۋە سۇيۇقلۇق دورىلار بىلەن ھاشاراتنى ئېقىتىپ چىقىرىۋېتىش ياكى بەزى ئۆسۈل-چارىلەر قوللىنىش ئارقىلىق چىقىرىۋېتىش كېرەك. ھاشارات ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ئاق





توغرىغۇنى قىزىق سۇدا ئېرىتىپ %5 ئىك تەييارلاپ قۇلاققا تېمىتىش ياكى ھۆل ئەپسەنتىن، شەھىمى ھەنزەل، شاپتۇللارنىڭ يوپۇرمىقىنىڭ سۈيى ياكى شاپتۇل يوپۇرمىقىنىڭ قاينىتىلغان سۈيىدىن قايسى بىرى بولمىسۇن، شۇنى قۇلاققا تېمىتىش كېرەك. ئۆلگەن ھاشاراتنى چىقىرىش ئۈچۈن سۇيۇقلۇقلار بىلەن ئېقىتىپ چىقىرىشتىن سىرت يۇڭدىن پىلىتكوچ تەييارلاپ ئېرىتىلگەن شاپتۇل يىلىمى ياكى ھەسەل بىلەن ھۆل قىلىپ قۇلاق ئىچىگە سېلىپ قويسا ئۆلگەن ھاشارات پىلىتكوچكە چاپلىشىپ چىقىپ كېتىدۇ. بۇ ئۇسۇل چارىلەردىن باشقا، يەنە ھاشارات قۇلاققا كىرىپ كەتكەندىن بولغان قۇلاق ئاغرىشىنى داۋالاشتا قوللانغان ھاشارات ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇنى چىقىرىش ئۇسۇل-چارە، دورىلىرىنى ئىشلەتمىسۇ بولىدۇ.

## قۇلاق زەخىملىنىش

قۇلاق زەخىملىنىش (زەربە تۆلتۈزۈنى، زەربە ئى گۆش) ھەر خىل تاشقى زەربىلەر تۈپەيلىدىن قۇلاق سۇپرىسىنىڭ قاتلانغان، سۇنغان، زەخىملىنىگەن ياكى يىرتىلغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

قۇلاق سۇپرىسى گەرچە ناھايىتى يۇقىرى دەرىجىدە ئەۋرىشىمچانلىققا ئىگە بولسىمۇ، لېكىن قۇلاقنى قاتتىق تولغاش، تاياق ياكى شاپلاققا ئوخشاش زەربىلەر قاتتىق تېگىش، قاتتىق سوقۇلۇش-يىقىلىش ياكى ئىغ تېگىش قاتارلىق سەۋەبلەردىن قۇلاق سۇپرىسى ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە زەخىملىنىدۇ يەنى قۇلاق سۇپرىسى يىرتىلىدۇ ۋە قۇلاق كۆمۈرچىكى سۇندۇ ھەتتا ئېزىلىپ كېتىدۇ.

ئالامىتى

قۇلاق سۇپرىسى كۆمۈرچەكتىن تۈزۈلگەن بولۇپ مۇسكوللار ناھايىتى ئاز، قان تۆمۈرلەر ناھايىتى كۆپ بولىدۇ. شۇڭا زەخىملىنىش ئىششىش، قىزىرىش، كۆكرىش، ئاغرىش،



قاناشتەك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

ئادەتتىكىدەك قاتتىق زەربىگە ئۇچرىغانلىرىدا گەرچە تېرە بۇزۇلمىسىمۇ، ئەمما تېرە ئاستىدىن قان چىقىپ قۇلاق سۇپىسىدا قىزىرىش، ئىشىشىش، قاناش ئېغىر بولسا كۆكرىش، قۇلاققا ئازراقلا بىر نەرسە تەگسە ئاغرىشتەك ئەھۋاللارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. تىغ تېگىپ زەخمىلەنسە جاراھەت ئېغىزى رەتلىك، جاراھەت قىرىدىكى تېرە قورۇلغان بولىدۇ. باشقا نەرسىلەردىن زەخمىلەنسە جاراھەت ئېغىزى رەتسىز بولىدۇ ھەمدە كۆمۈرچەكلەر تۇۋۇلغان، سۇنغان بولىدۇ.

قاتتىق كۈچ تۈپەيلىدىن قۇلاق سۇپىسى يۇلۇنغان بولسا، يۇقىرىدىن تۆۋەنگە ياكى تۆۋەندىن يۇقىرىغا مەلۇم دەرىجىدە يىرتىلغان بولىدۇ. يۇقىرىدىن تۆۋەنگە يىرتىلغانلىرى كۆپرەك ئۇچرايدۇ.

#### داۋاسى

قۇلاق زەخمىلىنىپ تېرىسى بۇزۇلمىغانلىرىغا يەرلىك ئورۇننى پاكىز تازىلاش بىلەن بىرگە قاناشنى توختىتىش، ئىشىشىق ياندۇرۇش چارىلىرىنى قىلىش، يۇقۇملىنىپ جاراھەتكە ئايلىنىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك.

قۇلاق يىرتىلغانلىرىغا قان توختاتقۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش بىلەن بىرگە چاپلاشتۇرغۇچى مەلھەملەر بىلەن چاپلاش، غاز قانتى قويۇپ تۇراقلاشتۇرۇش كېرەك.

قۇلاق كۆمۈرچەكلىرى سۇنغانلىرىغا سەبرى، مۇرمەككى، مۇغاس، ئاقاقىيا، راتىيانەج، خېنىلەرنى سوقۇپ خېمىر قىلىپ قۇلاقنىڭ سۇنغان تەرىپىگە تېگىش كېرەك. شۇنداق قىلغاندا كۆمۈرچەكنى قاتۇرۇپ ئەزانى ئۆزىنىڭ ئەسلىي ھالىتىگە كەلتۈرەلەيدۇ. ئەگەر قۇلاق ئىچىدىن تاشقى تەرەپكە قاتلىنىپ سۇنغان بولسا مەزكۇر دورىلارنى تاشقى تەرەپكە تېگىش لازىم. ئەگەر قۇلاق ئىچكى تەرەپكە سۇنغان بولسا دورىلارنى ئىچكى تەرەپكە تېگىش لازىم.

ئەگەر قۇلاق سۇنۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا جاراھەتلىنىپ قىسىملىرى بىر-بىرىدىن ئايرالغان بولسا ئۇ ھالەتتە دورىلارنى ئىچكى ۋە تاشقى ھەر ئىككى تەرەپتىن تېگىش لازىم. قۇلاق سۇنۇپ سۇنغان جايدىن قان چىقىش دەرىجىسىگە يەتكەن بولسا سۇنغان جاينى ۋاقىتتا تېگىپ، جاراھەتنى پۈتتۈرۈش ئۈچۈن سىقىچ، قىنەپ، زىفت، ئاق موملارنى تۈردەك يېغى قوشۇپ مەلھەم قىلىپ چېپىش لازىم. بۇ مەلھەم قۇلاققا ئوخشاش كۆمۈرچەك خاراكىتىرلىك ئەزالار ئۈچۈن ئىشلىتىلدىغان شۇ خىلدىكى دورىلار بولۇشى



لازىم. قۇلاق سۇپرىسى سۇنۇپ قان توختىمىسا قان توختىتىش چارىسىنى قىلىش كېرەك.

## قۇلاق كەينى يېرىلىش

قۇلاق كەينى يېرىلىش (تەرقىدە نى بىخى گۆش، شىقاي ئەسلۇلتوزنى) قۇلاقنىڭ كەينى يېرىلىپ، چاقىغا ئايلانغان كېسەلگە قارىتىلغان بولۇپ، كۆپىنچە بالىلاردا ئوچرايدۇ.

سەۋەبى

كېچىك بالىلارنىڭ تېرىسى نېپىز، نازۇك بولغاچقا كۆپ قۇسۇش، تەرلەش قاتارلىق ئامىللار تۈپەيلىدىن قۇلاق كەينى يۇقۇملىنىپ (ئوقۇنەتلىنىپ) قىزىرىش، قىچىشىش، سولۇشۇش، يېرىلىشلار كېلىپ چىقىدۇ. يېرىلغان جايدىن داۋاملىق سېرىق سۇ چىقىپ ئەتراپقا كېڭىيىپ چاقىغا ئايلىنىدۇ.

ئالامىتى

قۇلاق سۇپرىسىنىڭ كەينىدە دەسلەپتلا قىزىرىش، قىچىشىش، ئوششاق مۇدۈرلەر پەيدا بولۇپ قاشلاش، سۈركىلىش نەتىجىسىدە سېرىق سۇ چىقىپ كېڭىيىپ سېرىق چاقىغا ئايلىنىدۇ. بەزىدە چاقلار ھەتتا قۇلاق كەينىدىن يۈز ۋە باش ساھەلىرىگىچە تارقىلىپ، قىچىشىش بارغانسېرى كۈچىيدۇ.

داۋاسى

دەسلەپتە ئىككى تاغاقنىڭ ئوتتۇرىسى ۋە قۇلاقنىڭ تۈۋىنى يەڭگىل تىلىپ قاتىدە بويىچە لوڭقا قويۇش ھەمدە ماددىنىڭ ئۆتكۈرلۈكىنى پەسەيتىش ئۈچۈن شۇ جاينى ئايال سۈتى بىلەن يۇيۇش كېرەك.

قۇلاق كەينى تازىلاش ئۈچۈن 10 گرام مامرانچىنى 100 گرام سۇ بىلەن يېرىمى





قالقچە قاينىتىپ پاختىنى چىلاپ تازىلاش كېرەك.  
قۇلاق كەينىدىكى بۇ جاراھەتنى قۇرۇشتۇرۇپ ساقايتىش ئۈچۈن مەدەستانى يۇمشاق  
سوقۇپ سېپىپ ياكى سۇقۇقى سۇنۇننى يۇمشاق سوقۇپ سېپىش كېرەك. بەزىدە ئوز  
ئانىسىنىڭ سۈتىنى سۈرۈپ قويسىمۇ ياخشى بولۇپ قالىدۇ.

## قۇلاق كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدىغان بىر قىسىم دورىلار

### قۇلاق ئىلتىھابى (ياللۇغى) غا پايدا قىلىدىغان دورىلار

ئەنگۈرى شىفا (ئىت ئۈزۈمى) نىڭ پىشقان مېۋە سۈيىگە باراۋەر مىقداردا گۈل يېغى  
قوشۇپ، بىر ئاز ئىسسىتىپ قۇلاق ئىچىگە تېمىتىلىدۇ ۋە سىرتىدىن ياغلىنىدۇ.  
زىغىر ئۇرۇقى 15 گرام، ئەنگۈرى شىفانىڭ پىشقان مېۋىسى 10 گرام، كۆك  
يۇمغاقسۈت 15 گرام، ھەممىسىنى بىرلەشتۈرۈپ قۇلاق تۈۋىگە زىماد قىلىنىدۇ.  
تۇرۇپ يېغىنى ئىسسىتىپ قۇلاق ئىچىگە تېمىتىش كېرەك.

### داۋائى چىركى گۆش

تەركىبى: تەنكار 3 گرام، لىمۇن سۈيى ياكى كۆك يۇمغاقسۈت سۈيى 10 گرام.  
تەييارلىنىشى: تەنكارنى كۈشتە قىلىپ لىمۇن ياكى يۇمغاقسۈت سۈيى بىلەن مەلھەم  
قىلىپ قۇلاق ئىچى ياغلىنىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: قۇلاق ئىچىدىكى يىرىڭلارنى تازىلايدۇ.

### داۋائى تەننىن

تەركىبى: زەنجىبىل 8.1 گرام، خەشىخاش ئورۇقى 8.9 گرام، بادام مېغىزى 13.5  
گرام، نىشاستە 27 گرام، ئاق شېكەر 18.9 گرام، كالا سۈتى 500 گرام.







تەييارلىنىشى: دورىلارنى يۇمشاق سۇقۇپ، سۈت، شېكەر بىلەن بىرلەشتۈرۈپ بوش ئوتتا قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: بىمارغا مۇسەھل بېرىپ تەنقىيە قىلىپ بولغاندىن كېيىن كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا 30 گرامدىن ئىستېمال قىلدۇرۇلىدۇ. سىرتتىن رەۋغىنى پەجەل، رەۋغىنى گۈل بىلەن قۇلاق ياغلىنىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: قۇلاق غوڭغۇلداشنى داۋالايدۇ.

### رەۋغىنى مۇسەككىن

تەركىبى: گۈل يېغى 27 گرام، بادام يېغى 13.5 گرام، كونا سىركە 8.1 گرام.  
تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنىڭ ھەممىسىنى بىرلەشتۈرۈپ تۈزىگە لايىق قاچىغا قۇيۇپ، يۇمشاق ئوت بىلەن 5—10 مىنۇت قاينىتىپ داكىدا سۈزۈگەندىن كېيىن شىشە ساقلاپ قويۇلىدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: لازىم بولغاندا بىر ئاز ئىسسىتىپ قۇلاق ئىچىگە تېمىلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: قۇلاق ئاغرىشىنى پەسەيتىدۇ.

### قۇلاق ئىششىقىنى ياندۇرىدىغان تىللا

تەركىبى: ئاق سەندەل، قىزىل سەندەل، مامىشا، گىلى ئەرمىنى، ھوزۇز، قوغۇشۇن ئۆپسى، كاسىن تۇرۇقى، تاباشىر، كافۇر ھەر بىرى 13.5 گرامدىن.  
تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، يىپەك ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ھۆل يۇمغاقسۇت سۈيى، ئەنگۈرى شىفا سۈيى ياكى ھۆل كاسىن سۈيىدە خېمىر قىلىپ، چىلان تۇرۇقى چوڭلۇقىدا شىياف ياساپ ساقلىنىدۇ.  
ئىشلىتىشى: لازىم بولغاندا قايناقسۇدا ئېرىتىپ قۇلاق تۈۋىگە چېپىلىدۇ.

### پەتلە ئى زەھرىگاۋ (كالا ئۆتى پىلتىكۈچىسى)

تەركىبى: كالىنىڭ ئۆتى بىر دانە، ھەسەل 15 گرام، ئەنزەرۇت 5 گرام.  
تەييارلىنىشى: ئەنزەرۇتنى يۇمشاق سالاپە قىلىپ ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ، ئۈستىگە كالىنىڭ يېڭى ئۆتىنى تۆكۈپ، ئۇزۇن ۋاقىت قوچۇپ تەييارلىنىدۇ.





خۇسۇسىيىتى: قۇلاقنىڭ بىرىڭلىق ئاقمىسىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: ھەر خىل سەۋەبتىن قۇلقىدىن يىرنىڭ ئاقىدىغان كىشىلەرگە  
پاكىزە پاختا بىلەن ياسالغان پىلتىكۈچنى مەزكۇر دورىغا مىلاپ قۇلاق ئىچىگە سېلىپ  
قويۇلىدۇ. ھەر تۆت سائەتتە بىر قېتىم ئالماشتۇرۇلىدۇ.

### قە تۇرى زەھرى گۆسپەند (قوي ئۆتى تامچىسى)

تەركىبى: سامساق 50 گرام، قوي ئۆتى بىر دانە.  
تەييارلىنىشى: 50 گرام سامساقنى 100 م ل سۇدا پۇشۇرۇپ، سىقىپ سۈيىنى  
سۈزۈپ، ئۈستىگە قوينىڭ يېڭى ئۆتىنى قۇيۇپ شىشىدە ساقلاپ قويۇلىدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: لازىم بولغاندا سەل ئىسسىتپ قۇلاق ئىچىگە تېمىتىلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: ھەر خىل سەۋەبتىن بولغان قۇلاقتىن يىرنىڭ ئېقىشلارغا مەنپەئەت  
قىلىدۇ.

### قە تۇرى سەمىي (قۇلاق تېمىتىلما دورىسى)

تەركىبى: ھۆل سوزاپ سۈيى، ھۆل مەزەنجۇش سۈيى ھەر بىرى 18.9 م ل دىن، بابۇنە  
يېغى 40.5 م ل، پەرفىيۇن يېغى 13.5 م ل، رەۋغىنى پەجەل 13.5 م ل، قۇندۇز قەھرى  
بىر گرام.  
تەييارلىنىشى: قۇندۇز قەھرىنى يۇمشاق سالايە قىلغاندىن كېيىن يۇقىرىقى  
دورىلارنىڭ ھەممىسى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، يۇمشاق ئوتتا 5 مىنۇت قاينىتىپ سۈزۈپ  
شىشىدە ساقلاپ قويۇلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: قۇلاق گاسلىقىنى داۋالايدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: ھەر خىل سەۋەبتىن بولغان قۇلاق ئېغىرلىقى ۋە گاسلىقلارنى داۋالاش  
ئۈچۈن سەل ئىسسىتپ قۇلاق ئىچىگە كۈندە ئىككى قېتىم تېمىتىلىدۇ.

### قە تۇرى رەۋغىنى گۈل

تەركىبى: گۈل يېغى 18.9 گرام، بادام يېغى 13.5 گرام، سىركە 27 گرام.  
تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى بىرلەشتۈرۈپ، يۇمشاق ئوتتا بەش مىنۇت





ئەتراپىدا قاينىتىپ، سۈزۈپ، شىشىدە ساقلاپ قويۇلدى.  
خۇسۇسىيىتى: قۇلاق ئىشىشىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: لازىم بولغاندا بىرئار ئىسسىتىپ قۇلاققا تېمىتىلىدۇ.

### ئەرقى نانىخا

تەركىبى: نانىخا بىر كىلو، سۇ 5 لىتر.  
تەييارلىنىشى: دورىنى سۇغا سېلىپ يۇمشاق ئوتتا قاينىتىپ پار سۈيى تامچىلىتىپ چۈشۈرۈلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: قۇلاق ئاغرىقى، قۇلاق ئېغىرلىق، كۆز ئاغرىقى، پالەچ، قول تىرەش، پەينىڭ سۇسلۇقى قاتارلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

### مەلھىمى مىسىرى

تەركىبى: سىركە 21 گرام، ھەسەل 24 گرام، زەنكار 6 گرام.  
تەييارلىنىشى: ھەسەل، سىركىلەرنى قاينىتىپ قىيام قىلىپ ئۈستىدىن سوقۇلغان زەنكارنى سېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: قۇلاقنىڭ جاراھىتىنى داۋالايدۇ.

### قە تۈرى كەرەم

تەركىبى: شاپتۇل غازىگىنىنىڭ شىرىسى، پىننە ياپرىقىنىڭ شىرىسى مەلۇم مىقداردا.  
تەييارلىنىشى: دورىلارنى ئارىلاشتۇرۇپ قۇلاققا تېمىتىلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: قۇلاقنى قۇرۇتنى چۈشۈرىدۇ.

### قە تۈرى ۋە جىۋىلئۆزىنى ھار

تەركىبى: گۈل يېغى 18 گرام، تاتلىق بادام يېغى 15 گرام، سىركە 30 گرام.  
تەييارلىنىشى: دورىلارنى ئارىلاشتۇرۇپ، ياغ قىسمى قالغىچە قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.





قۇلاققا تېمىتىلىدۇ.

خۇسۇسىيىتى: ئىسسىقتىن بولغان قۇلاق ئاغرىقىنى داۋالايدۇ.

### قە تۇرى ۋە جىئولوژىنى بارىد

تەركىبى: سوزاپ سۈيى، رەيھان سۈيى ھەر بىرى 21 گرام، بابۇنە يېغى 45 گرام، پەرىپىۋن يېغى 6 گرام، كونا ھاراق 60 گرام.

تەييارلىنىشى: دورىلارنى ئارىلاشتۇرۇپ، سۈيى تۈگەپ يېغى قالغىچە قاينىتىپ تەييارلاپ قۇلاققا تېمىتىلىدۇ.

خۇسۇسىيىتى: سوغۇقتىن بولغان قۇلاق ئاغرىقىنى داۋالايدۇ.

### قە تۇرى خۇبىسۇلھە دىد

تەركىبى: سىركە ۋە تۆمۈر كۈيۈندىسى مەلۇم مىقداردا.

تەييارلىنىشى: تۆمۈر كۈيۈندىسىنى سىركىگە بىر ئاي چىلاپ، تۆمۈر كۈيۈندىسى سۈزۈۋېتىلىپ قالغان قىسمى قۇلاققا تېمىتىلىدۇ.

خۇسۇسىيىتى: قۇلاقنىڭ كونا جاراھەتلىرىنى داۋالايدۇ.

### قە تۇرى جالىئۇس

تەركىبى: ئانار، كىچىك بالا سۈيىدۈكى مۇۋاپىق مىقداردا.

تەييارلىنىشى: ئانارنى تېشىپ ئىچىدىكى دانىچە ۋە گۆشلىرىنى ئېلىۋېتىپ، تونى بالا سۈيىدۈكى بىلەن توشقۇزۇپ، تۆشۈكنى ئېتىپ ئوتتا كۆمۈپ قىزىتىپ تەييارلاپ، قۇلاققا تېمىتىلىدۇ.

خۇسۇسىيىتى: قۇلاقنى يىرىك ۋە كىرلەردىن تازىلايدۇ. ئاغرىق پەسەيتىدۇ.

### قە تۇرى ئەسەم

تەركىبى: كۆندۈر، زەئفەر، قۇندۇز قەھرى، ئاق خەربەق ھەر بىرى 9 گرام، گىل

ئەرمىنى، توغرىغۇ ھەر بىرى 6 گرام، ھاراق 6 گرام.





تەييارلىنىشى: دورىلار ھاراقتا ئېرىتىلىپ قۇلاققا تېمىتىلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: قۇلاق ئاڭلاش خىزمىتىنىڭ ناچارلىشىشى، پاشلىق ۋە قۇلاق  
غۇڭۇلداشلىرىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

### رەۋغىنى كۈندۈر

تەركىبى: كۈندۈر 15 گرام، سەبرى، مورمەككى، مەستكى، قۇندۇز قەھرى، روسۇت  
(ھوزۇز)، كالا تۆتى ھەر بىرى 3 گرام، ئاچچىق بادام يېغى 60 گرام، كونا مۇسەللەس 120  
گرام.

تەييارلىنىشى: دورىلار تالقىنىنى ئارىلاشتۇرۇپ سۇ قىسمى تۈگەپ ياغ قىسمى  
قالغىچە قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: سوغۇقتىن بولغان قۇلاق ئاغرىقىنى داۋالايدۇ.

### رەۋغىنى تۇرۇپ (دەۋغىنى پەجەل)

تەركىبى: تۇرۇپ سۈيى 1500 م لىتر، كۈنجۈت يېغى 500 م لىتر.  
تەييارلىنىشى: سۈيى تۈگەپ ياغ قىسمى قالغىچە قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: سوغۇقتىن بولغان قۇلاق ئاغرىقىنى داۋالايدۇ.

### پەتلى مەرۋى

تەركىبى: مەرۋى (كۈنۈچە) تۇرۇقى، ئەزەرۇت تەڭ مىقداردا.  
تەييارلىنىشى: ھەسەل بىلەن يۇغۇرۇپ پىلتىكۈچنى دورىغا مىلاپ قۇلاققا  
تېمىتىلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: قۇلاق ئاغرىقىنى پەسەيتىپ، يىرىڭنى توختىتىدۇ.





## بۇرۇن كېسەللىكلىرى

بۇرۇن پارسچە بىنى، ئەرەبچە ئەنف دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ ئادەم بەدىنىدىكى تاشقى بەش سەزگۈ (ھەۋاسى خەمسە زاھىرى) ئەزانىڭ بىرى. ئۇنىڭ ئاساسلىق ۋەزىپىسى تەبىئەت دۇنياسىدىكى ھەر خىل پۇراقلىرىنى ئۆزىدىكى پۇراش كۈچى (قۇۋۋەتى ساممە) ئارقىلىق ئەينى بويىچە سېزىپ، چوڭ مېڭە ئالدىنقى قىسمىدىكى ئورتاق ھېس قىلىش (ھېسى مۇشتەرەك) ئورنىغا يەتكۈزۈپ نورمال پۇراش سېزىمىنى بارلىققا كەلتۈرۈشتىن ئىبارەت. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ئۇ، ئىنسانلارنى نەپەسلىنىش ئۈچۈن ۋاستە يول بىلەن تەمىنلەش، ئاۋازنى جاراڭلىق قىلىش ۋە يۈزگە زىننەت بېرىش رولىنى ئوينايدۇ. بۇرۇننىڭ پۇراش خىزمىتى نورمال بولغاندىلا ئىنسانلار ھەر خىل پۇراقلىرىنى توغرا ھېس قىلالايدۇ. بۇرۇننىڭ تۈزۈلۈشى نورمال ۋە كېسەللىكلەردىن خالى بولغاندىلا ئىنسانلار مەلۇم مەندە ئېيتقاندا نورمال نەپەسلىنىش، ئاۋازى جاراڭلىق بولۇشتەك ئىمكانىيەتلەرگە ئىگە بولالايدۇ. شۇڭا تىبابىتىمىز بۇرۇننىڭ سىرتى ۋە ئىچكى قىسمىدا يۈز بەرگەن كېسەللىكلىرى ھەمدە ئۇلاردىكى مىزاجلىق، مىزاجسىز ئۆزگىرىشلەر ۋە سىرتقى زەخمىدىن بولغان كېسەللىكلەرنىڭ سەۋەبى، ئالامىتى، داۋاسى (ئىچكى ۋە تاشقى داۋاسى، دەستكارلىق ئۇسۇللىرى)، پەرھىزى، ئوزۇقلىنىشى قاتارلىقلارنى ئۆزىگە خاس مىللىي ئۇسۇلغا بايان قىلىدۇ.

بۇرۇن كېسەللىكلەرنى توغرا تەشخىس قىلىش ھەمدە ئۇلارنى توغرا داۋالاپ بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن بۇرۇننىڭ تۈزۈلۈشىنى ياخشى ئىگىلەش كېرەك.

## بۇرۇننىڭ تۈزۈلۈشى

بۇرۇن ئادەم بەدىنىدىكى تاشقى بەش سەزگۈنىڭ بىرى بولغان پۇراش كۈچى





(قۇۋۋە ئى شاممە) نىڭ خىزمىتىنى ئەمەلگە ئاشۇرغۇچى مەخسۇس ئەزادۇر. ئۇ پۇراش خىزمىتىنى بېجىرىشتىن سىرت نەپەسلىنىش ۋە ئاۋازنىڭ جاراڭلىق چىقىشىغا ياردەم بېرىشتەك روللارغا ئىگە.

بۇرۇن — سىرتقى بۇرۇن ۋە ئىچكى بۇرۇن يەنى بۇرۇن بوشلۇقىدىن تەركىب تاپقان.

### سىرتقى بۇرۇن

بۇرۇننىڭ شەكلى ئۈچبۇرجەك بولۇپ، بۇرنىڭ ئوتتۇرىسىغا كالىپۇكىنىڭ ئۈستىگە جايلاشقان. ئۇنىڭ ئۈستۈنكى تەرىپى تارراق بولۇپ، پېشانغا تۇتىشىدۇ. تۆۋەنكى تەرىپى كەڭرەك بولۇپ، ئۇنىڭدا ئىككى تۈشۈك بولىدۇ. بۇرۇننىڭ ئۈستۈنكى يېرىمى سۆڭەك، تۆۋەنكى يېرىمى كۆمۈرچەكتىن تۈزۈلگەن بولىدۇ. بۇرۇننىڭ ئىككى تۈشۈكى ئوتتۇرىسىدا بۇرۇننى ئوڭ ۋە سول ئىككىگە بۆلۈپ تۇرغۇچى بىر دىۋار ياكى تام بار بولۇپ، ئۇ بۆلگۈچى كۆمۈرچەك (غوزرۇقى فاسىل) دەپ ئاتىلىدۇ. بۇرۇن تۈشۈكلىرىنىڭ ئىچكى تەرىپىدە تۈكلەر بولۇپ، نەپەسلەنگەندە چاڭ-توزان قاتارلىقلارنى توساپ قېلىش رولىنى ئوينايدۇ. بۇرۇننىڭ سىرتى ئىككى يان قىسمى ئۈستى تەرەپتە بىرلىشىپ بۇرۇن قىرىنى ھاسىل قىلىدۇ ھەمدە ئالدى تەرەپتە بىر دۆڭچە ھاسىل قىلىپ ئاخىرلىشىدۇ. بۇ بۇرۇن ئۈچى دەپ ئاتىلىدۇ.

بۇرۇندا 3 سۆڭەك يەنى ئىككى يان سۆڭەك ۋە بىر ئوتتۇرا پاسىل سۆڭەك بولىدۇ. بۇ سۆڭەكلەرنىڭ يۇقىرى تەرىپى تار ئەمما قېلىن، تۆۋەن تەرىپى كەڭ ئەمما نېپىز بولغاچقا سىرتقى زەخمىگە ئۇچرىغاندا تۆۋەن تەرىپى ئاسانلا سۇنىدۇ ياكى جايىدىن يۆتكىلىپ كېتىدۇ.

بەش كۆمۈرچەك يەنى، ئىككى يۇقىرىقى يان كۆمۈرچەك (غوزرۇقى جانىبە ئى ئەلا)، ئىككى تۆۋەنكى يان كۆمۈرچەك (غوزرۇقى جانىبە ئى سۇفلا) بولىدۇ. بۇ ئىككى كۆمۈرچەك بۇرۇن ئىككى تۈشۈكىنىڭ ئۈستىدە بولۇپ، ئۇلار قاناتسىمان كۆمۈرچەكلەر ( غوزرۇقى جە ناھىيە) دەپمۇ ئاتىلىدۇ. يەنە بىرى ئوتتۇرىدىكى ئايرىغۇچى كۆمۈرچەك (غوزرۇقى فاسىل) بولۇپ، بۇ بەش كۆمۈرچەك مەزمۇت ۋە قېلىن كەلگەن بىر يېلىق پەردە (غىشائى غوزرۇقى) ئارقىلىق بۇرۇننىڭ سۆڭەكلىرى بىلەن تۇتۇشۇپ تۇرىدۇ. بۇرۇننىڭ ئىچكى تەرىپىنى ئەستەزلەپ تۇرىدىغان بەلغەمسىمان پەردە (غىشائى مۇخاتى) تاشقى جەھەتتە بۇرۇن تۈشۈكىنىڭ گىرۋەكلىرىگە بۇرۇن تېرىسى ئارقىلىق، ئىچكى جەھەتتە بۇرۇن غارى





(بۇرۇن بوشلۇقى) نىڭ ئەستەرسىمان پەردىسى ئارقىلىق تۇتۇشۇپ تۇرىدۇ. سىرتقى بۇرۇندىكى ۋە رىيد تومۇر (كۆك تومۇر) لار يۈز قىسمىدىكى كۆك تومۇرلار ئارقىلىق مېڭىگە تۇتۇشىدۇ. يۈزدىكى كۆك تومۇرلارنىڭ قاپاقلىرى بولمىغاچقا قان ئېقىمى يۇقىرى- تۆۋەن ئېقىپ تۇرىدۇ. شۇڭا بۇرۇندىكى جاراھەتلەرنى قول بىلەن قالايمىقان سىقىپ ئوقۇنەتلەندۈرۈپ قويۇلسا، ئوقۇنەتلەر مېڭە ئىچىگە كىرىپ كېتىپ يامان ئاقۇەتلەرنى پەيدا قىلىشى ھەتتا ئۆلۈم خەۋپىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن.

### ئىچكى بۇرۇن

ئىچكى بۇرۇن — بۇرۇن غارى ياكى بۇرۇن بوشلۇقى (جەۋقۇلەنقى) دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ يۈزنىڭ ئوتتۇرا سىزىقىغا، تاماقنىڭ ئۈستى قىسمىغا جايلاشقان بولۇپ، ئوتتۇرا پاسىل ئارقىلىق ئوڭ ۋە سولغا بۆلۈنۈپ تۇرغان ئىككى بوشلۇقتىن ئىبارەت. بۇرۇن تۆشۈكنىڭ ئالدى قىسمى ئىچىدىكى تېرە بىلەن قاپلانغان جايدا بۇرۇن تۈكلىرى، ماي ۋە تەر بەزىلىرى بولۇپ ئاسانلا چاقا پەيدا بولىدۇ. بۇرۇن بوشلۇقلىرىنىڭ ئىككىسىدىلا ئىچكى جەھەتتە يۇقىرى ۋە تۆۋەندە ئىككىدىن تۆشۈك بولۇپ، يۇقىرىدىكى ئىككىسى يۈز بىلەن تۆۋەندىكى ئىككىسى يۇتقۇنچاق بىلەن تۇتۇشىدۇ. 1. ياش كانالچىسى (مەجرەددەمى) ئارقىلىق كۆز تويى بوشلۇقى بىلەن تۇتۇشىدۇ. 2. تاماق يۇقىرى كانالچىسى (مەجرائى ھەنەكى مۇقەددەم) ئارقىلىق ئېغىز بوشلۇقى بىلەن تۇتۇشىدۇ. 3. بۇرۇن تۆشۈكلۈك سۆڭىكىنىڭ تۆشۈكى (سوققى مېسقات) ئارقىلىق باش سۆڭىكى بوشلۇقى بىلەن تۇتۇشىدۇ. 4. تاماقنىڭ قوزۇقسىمان تۆشۈك ئارقىلىق قوزۇقسىمان بوشلۇق بىلەن تۇتۇشىدۇ. بۇرۇن بوشلۇقلىرى 15 سۆڭەكنىڭ بىرىكىشىدىن تۈزۈلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈچى باش سۆڭەك، 12 سى يۈز سۆڭەكتىن ئىبارەت. بۇرۇننىڭ ھەر بىر بوشلۇقىدا بىردىن مېھراب ۋە بىرقانچىدىن دىۋارلار بولىدۇ.

بۇرۇن بوشلۇقى مېھرابلىرى ئۈزۈنچاق ۋە تار كېلىدۇ. تۆشۈكسىمان قىسمىنىڭ يان تەرىپى چوڭقۇر، ئوتتۇرىسى كەڭ، ئىككى يېشى تار كېلىدۇ. ھەر بىر بوشلۇقنىڭ ئىچكى دىۋارى يەنى ئىنچىكە نېپىز كەلگەن ئوتتۇرا دىۋارى بۇرۇننىڭ ئىككى بوشلۇقىنى بىر- بىرىدىن ئايرىپ تۇرغان بولۇپ، بەزى كىشىلەردە بىر تۆشۈك بولغاچقا بۇ ئىككى بوشلۇق بىر- بىرى بىلەن قوشۇلۇپ تۇرىدۇ. بۇرۇننىڭ سىرتقى دىۋارىنىڭ ئىچكى







سەتەدە 3 ئۇزۇن نەيچە بولۇپ، ئۇلار 3 تال سۆڭەكسىمان قاتلاملار ئوتتۇرىسىدا بولىدۇ. بۇلارنىڭ ئىچىدە يۇقىرى قاتلامدىكى نەيچە ھەممىدىن كىچىك بولىدۇ. ئوتتۇرا قاتلامدىكى نەيچىدە ئىككى تۈشۈك بولىدۇ. ئاستىنقى قاتلامدىكى نەيچە بۇرۇن سىرتقى دىۋارىنىڭ ئۇزۇنلۇقى بىلەن تەڭ بولىدۇ. بۇ نەيچىنىڭ ئالدى تەرىپىدە ياش نەيچىسى (مەجرە دەمى) نىڭ ئاستىنقى تۈشۈكى جايلاشقان بولىدۇ. بۇ تۈشۈك ئارقىلىق كۆزنىڭ ياش سۇيۇقلۇقى بۇرۇن تەرەپكە سىزىپ چۈشىدۇ.

بۇرۇن بوشلۇقىنىڭ ئىچىنى ئەستەرلەپ تۇرىدىغان شىلمىشىق پوتلىسىمان پەردە (غىشائى مۇخاتى) ئۆز ئاستىدىكى سۆڭەك ۋە كۆمۈرچەكلەر پەردىسى بىلەن ناھايىتى ياخشى تۇتۇشۇپ تۇرغان بولىدۇ.

1. ئۇنىڭ يۇقىرىقى تەرىپى بۇرۇننىڭ يۇقىرىقى تۈشۈكچىلىرى ئارقىلىق تېرە بىلەن، 2. بۇرۇننىڭ تۆۋەنكى تۈشۈكلىرى ئارقىلىق بۇتقۇنچاقنىڭ پۇتلىسىمان پەردىسى بىلەن، 3. ياش نەيچىلىرى ئارقىلىق كۆزنىڭ قاپقىدىكى ئەستەر پەردە (تەبەقە ئى مۇلتەھەمە) بىلەن، 4. يۇتقۇنچاق ۋە باشقا تۈشۈكلەر ئارقىلىق پىشانە ۋە باشقا سۆڭەك بوشلۇقلىرى تۇتۇشۇپ تۇرىدۇ. شۇڭا بۇرۇندا ئىششىق يۈز بەرگەندە مۇشۇ پەردە ئارقىلىق شۇنىڭغا ئالاقىدار بولغان ئورۇنلاردا ئەكس تەسىر پەيدا قىلىدۇ. مەسىلەن: زۇكام يۈز بەرگەندە باش ئاغرىش، بۇرۇندىن سۇ، كۆزدىن ياش ئېقىشتەك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ ھەتتا بۇرۇن ئىششىقى مېگە پەردە ئىششىقلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

بۇرۇن بوشلۇقىدا تۆۋەندىكىدەك ئەسەب (نېرۋا) لار بار: 1. پۇراش ئەسەبى (ئەسەبى شاممە) نىڭ يىپىچىلىرى بۇرۇن ئوتتۇرا پاسىلىنىڭ يۇقىرىقى قىسمىدىكى سۈزگۈچى سۆڭەك (ئەزىمى مىسفات) نىڭ بۆلۈتمىسى قىسمى ۋە يۇقىرى ئوتتۇرا سەتەگە تارقالغان. 2. كۆز ئەسەبى (ئەسەبى ئەينىيە) نىڭ كۆرۈش شاخچىلىرى بۇرۇن پاسىلىنىڭ يۇقىرىقى ۋە ئالدىنقى بۆلىكى ھەم بۇرۇن بوشلۇقىنىڭ سىرتقى دىۋارىغا تارقالغان. 3. ئۈستۈن تاماق ئەسەبى (ئەسەبى پەككى ئەلا) نىڭ بىرقانچە تارماقلىرى تۆۋەنكى بوشلۇقتىكى چىگىش سۆڭەك (ئەزىمى مۇلتەۋى ئەسەبى) دائىرىسىگە تارقالغان. 4. بۇرۇن پەردە ئەسەبى (ئەسەبۇلخەيشۇمى) ۋە باشقا ئەسەب شاخچىلىرى بۇرۇن پاسىلىنىڭ يۇقىرى ۋە ئوتتۇرا قىسمىغا تارقالغان. 5. بۇرۇن ۋە تاماق ئەسەب شاخچىلىرى (ئەسەبۇلئەنقى ۋە ئەسەبۇلئەنكى) بۇرۇن ئوتتۇرا قىسمىغا تارقالغان ۋە باشقىلار.

ئىنسانلار پۇراش كۈچىنىڭ رولى ئارقىلىقلا نەرسىلەرنىڭ پۇرىقىنى سېزەلەيدۇ. مەزكۇر قۇۋۋەت پەقەت بۇرۇننىڭ ئىچىدىكى يۇقىرىقى قىسمىدىلا بولىدۇ. بۇرۇن بوشلۇقىنىڭ ئىچكى سەتەپنى پوتلىسىمان پەردە (غىشائى مۇخاتى) ئەستەرلەپ تۇرغان بولۇپ،





بۇنىڭدا پۇراش ئەسەبلىرىنىڭ شاخچىلىرى بۇرۇننىڭ تۆشۈكلۈك سۆڭىكى يەنى سۈزگۈچى سۆڭەكنىڭ تۆشۈكلىرىگە كېلىپ يېىلغان بولىدۇ. ئىنسانلار ئاۋازنى ھاۋانىڭ ۋاستىسى ئارقىلىق ئاڭلىغانغا ئوخشاش پۇراشنىمۇ ھاۋانىڭ ۋاستىسى بىلەن پۇرايدۇ. چۈنكى، ھاۋاغا خۇشبۇي ياكى بەدبۇي ماددىلارنىڭ زەررىچىلىرى تارقالغان بولىدۇ. زەررىچىلەر نەپەس ئارقىلىق پۇراش كۈچىنىڭ ئەسەب شاخچىلىرىغا تۇرۇلغاندىن كېيىن ئۆز كەيپىياتدا ئۇلارغا مەخسۇس بىر خىل تەسىر قوزغايدۇ. دە، بۇ تەسىر مېڭىگە يېتىپ بىرىپ سەزگۈ ھاسىل قىلىدۇ يەنى، ئەسلىي ماددىنىڭ پۇراق سىزىمىنى پەيدا قىلىدۇ. شۇڭا ئىنسانلار بىرەر نەرسىنىڭ ھىدىنى ئوبدانراق بىلمەكچى بولسا كۆپىنچە ھاللاردا شۇ نەرسىگە بۇرۇننى يېقىنراق ئەكىلىدۇ ياكى كۆچەپرەك نەپەس ئالىدۇ. بۇ، ھاۋاغا تارقالغان ھىدىنىڭ پۇراش ئەسەب شاخچىلىرىغا ئوبدانراق تۇرۇلۇشى ئۈچۈندۇر.

بۇرۇن بوشلۇقىنىڭ ھەممە قىسىملىرىدا يەنە سېزىش كۈچى (قۇۋۋەتى لامىسە) دەپ ئاتىلىدىغان بىر خىل قۇۋۋەت بار بولۇپ، ئۇ سوغۇق-ئىسسىق، غىدىقلىنىش-قىچىشىش، ئاغرىش ۋە بۇرۇن تۆشۈكلىرىگە بولغان بىسىملارنى سېزىشتەك رولغا ئىگە بەزى. ھاللاردا پۇراش كۈچى (قۇۋۋەتى شاممە) ئۆز رولىنى يوقاتسىمۇ سېزىش كۈچى (قۇۋۋەتى لامىسە) ئۆز رولىنى يوقاتمايدۇ.

پۇراش كۈچى بارلىق ھايۋانلاردا ئوخشاش بولمايدۇ. گۆشخور ھايۋانلارنىڭ ھايۋانى ماددىلاردىن چىققان پۇراقلارنى سېزىش كۈچى يۇقىرى، ئۆسۈملۈك ماددىلاردىن چىققان پۇراقلارنى سېزىش كۈچى تۆۋەن بولىدۇ. ئەكسىچە ئوتخور ھايۋانلارنىڭ ھايۋانى ماددىلاردىن چىققان پۇراقلارنى سېزىش كۈچى تۆۋەن، ئۆسۈملۈك ماددىلاردىن چىققان پۇراقلارنى سېزىش كۈچى يۇقىرى بولىدۇ. ئىنسانلاردا گەرچە بۇ خىل پۇراش سېزىمىدىكى خاسلىق تۆۋەن بولسىمۇ، لېكىن ھەرخىل پۇراقلارنى پەرق ئېتىش جەھەتتىكى قابىلىتى يەنىلا خېلى دەرىجىدە ئۈستۈن ئورۇندا تۇرىدۇ. پۇراش كۈچى (قۇۋۋەتى شاممە) دىكى بۇ خىل ئوخشاشماسلىق پۇراش نېرۋىسىنىڭ مېڭىدىن ئورتاق ھېس قىلىش ئورنىنىڭ تۈزۈلۈش جەھەتتىكى ئوخشاشماسلىقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. چۈنكى ئىنسانلار ئالىي دەرىجىلىك ھايۋانلاردۇر. ئىنسانلارغا پۇراقلارنىڭ خۇشبۇي ياكى بەدبۇي سېزىلىشى نىسپىي ھالەتتە بولىدۇ. ئوخشىمىغان كىشىلەردە كۆرۈش كۈچى ۋە ئاڭلاش كۈچى ئوخشىمىغاندەك پۇراش كۈچىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. ئادەم بەدىنىدە ئىچكى پۇراش كۈچى (قۇۋۋەتى شاممە) دەپ ئاتىلىدىغان يەنە بىر خىل قۇۋۋەتمۇ بار. بۇنىڭدا گەرچە سىرتقى دۇنيادا ھېچقانداق پۇراق بولمىسىمۇ، ئىنسان بىر خىل پۇراق بارلىقىنى ھېس قىلىدۇ. بۇ پۇراش ئەسەبلىرىگە بىرەر ئىچكى سەۋەبىنىڭ تەسىر قىلغانلىقىنى





كۆرسىتىپ بېرىدۇ. بۇ ئەھۋال گەرچە ئەسەبى مىزاج (نېرۋا مىزاج) كىشىلەردە كۆپ ئۇچرىسىمۇ، غەيرىي نورمال ئەھۋال ئاستىدا بەزىدە ئادەتتىكى كىشىلەردىمۇ بۇ خىل ئىچكى پۇراق سېزىمى بولىدۇ، مەسلەن: مەلۇم بىر كىشى ھەر دائىم بىر خىل سېسىق پۇراق بارلىقىنى ھېس قىلغان، ئۆلگەندىن كېيىن بۇرۇن ۋە مېڭىسىنى يېرىپ تەكشۈرگەندە ئالدىنقى مېڭە ئىككى ئولۇش قىسمىنىڭ دەل ئوتتۇرىسىدا خانازىر خا- راكىپلىك تۈسە بارلىقى بايقالغان. دېمەك مەزكۇر تۈسىدىكى ئوقۇنەتلىك سېسىق ماددى- لار مەزكۇر كىشىگە ئىچكى پۇراق كۈچى ئارقىلىق ھەر دائىم سېسىق سېزىم بەرگەن.

### تۇغما پۇراق سېزىم ئاجىزلىقى

تۇغما پۇراق سېزىم ئاجىزلىقى (مەۋلۇدۇلمخەشەمى) پۇراق سېزىمىنىڭ تۇغما ئاجىزلىقى ياكى پۈتۈنلەي بولماسلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

ھامىلدارلىق مەزگىلىدە ئاندا مەلۇم يۇقۇملۇق كېسەلنىڭ بولۇشى ياكى بەزى كېسەللىك ماددىلارنىڭ يېتىشمەسلىكى قاتارلىقلار تۈپەيلىدىن بوۋاقنىڭ پۇراق سېزىم ئەسەبلىرى تولۇق تەرەققىي قىلالماي نەرسىلەرنىڭ پۇرىقىنى پۈتۈنلەي ياكى يېرىم ھالەتتە سېزەلمەس بولۇپ تۇغۇلۇپ قالىدۇ.

ئالامىتى

بالىلارنىڭ ھەر خىل پۇراقلىرىنى تولۇق ياكى يېرىم سېزەلمەيدىغان ھالەتتە تۇغۇلغانلىقى كېيىن تەدرىجىي ھالدا بىلىنىدۇ.

داۋاسى

كېسەللىك ئەھۋالى يېڭى ۋە بەشىگىلەرەك بولسا پۇراق سېزىمىنى ئەسلىگە





كەلتۈرۈش ياكى ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئىيارە جى قەيقەرا، مەئجۇنى مەسها قاتارلىق دورىلارنى بالىنىڭ يېشىغا قاراپ بىر مەزگىل بەرسە پۇراش سېزىمى تەدرىجىي ھالدا ئەسلىگە كېلىپ ياخشىلىنىپ قېلىشى مۇمكىن.

ئەگەر كېسەللىك تارىخى ئوزۇن، كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىرراق بولسا داۋالاش ئۈنۈم بەرمەيدۇ.

## ئىككىلەمچى پۇراش سېزىم ئاجىزلىقى

ئىككىلەمچى پۇراش سېزىم ئاجىزلىقى (ئەرەزۇلخەشەمى) تۇغۇلۇشتا ساق تۇغۇلۇپ كېيىن ھەر خىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن بۇرۇننىڭ پۇراش سېزىمى ئاجىزلاشقانلىقى ياكى پۈتۈنلەي يوقالغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

سەۋەبلىرى تۆۋەندىكىدەك بىرقانچە خىل بولىدۇ.

1. بۇرۇن ئىچىگە بەزىسمان ئارتۇقچە گۆش تۈسۈپ، يەنى ھەر خىل چوڭلۇقتىكى بۇرۇن بەۋاسىرى (بەۋاسىرۇلشەفى) پەيدا بولۇپ، پۇراش سېزىمىنىڭ ئوخشىمىغان دەرىجىدە ئاجىزلىشىشى ياكى پۈتۈنلەي يوقىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

2. بۇرۇن ئىچىگە ئۈسە پەيدا بولۇپ نەپەس يولىنى توسۇپ پۇراش سېزىمىنىڭ يوقىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

3. شىلىمىشۇق ۋە قويۇق خىللىتلار بۇرۇن يۇقىرىسىدىكى غەلۋىرسمان سۈزگۈچ سۆڭەكنىڭ تۆشۈكلىرىگە چاپلىشىپ قالسا، ھاۋانىڭ تۆتۈشىگە دەخلى قىلىدۇ. بۇ سۆڭەك قاڭشارغا جايلاشقان بىر خىل شالاڭ سۆڭەك بولۇپ، بۇلۇتقا ئوخشاش نۇرغۇن تۆشۈكلىرى بار. مەزكۇر تۆشۈكلەر ئارقىلىق ھاۋا ۋە پۇراقلار يۇقىرىغا يېتىپ بارىدۇ. مېڭىدىن كېلىدىغان ھۆلدىكلەرمۇ يەنە شۇ ھۆكۈنەك تۆشۈكلەر ئارقىلىق سىزىپ چىقىدۇ. مەزكۇر سۆڭەك تۆشۈكلىرىنىڭ ئەگرى-بۇگرى بولۇشى سىرتتىن سۈمۈرۈلگەن ھاۋا ۋە پۇراقلارنى سەزگۈ ئەزالىرىغا بىردىنلا ئېلىپ بارماستىن، بەلكى تەڭشەلگەن ھالەتتە ئېلىپ بارىدۇ. ئەگەر شىلىمىشۇق ۋە قويۇق خىللىتلار مەزكۇر



تۆشۈكلەرنى توسۇالسا بۇرۇن پۇراش سېزىمىنىڭ ھەر خىل دەرىجىدە ئاجىزلىشىشى ياكى يوقلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

4. ئاتىشەك (سېفىلس) كېسەللىكى تۈپەيلىدىن بۇرۇننىڭ كۆمۈرچەكلىرى، سۆڭەكلىرى ۋە يۇمشاق توقۇلمىلىرى بۇزۇلۇپ، قاڭشار ئولتۇرۇشۇپ كەتكەنلىكتىن بۇرۇننىڭ پۇراش سېزىمى قىسمەن ئاجىزلىشىدۇ ياكى پۈتۈنلەي يوقىلىدۇ.

5. مېڭىنىڭ ئالدى تەرىپىدىكى ئوڭ-سول ئىككى قىسمىدا ياكى پۇراق سېزىمىنى ھاسىل قىلىش مەركىزى بولغان قىسمىدا مزاج تۈزگىرىشى يۈز بەرگەنلىكتىن پۇراش سېزىمىنىڭ ئاجىزلىشىشى ياكى پۈتۈنلەي يوقىلىشى كېلىپ چىقىدۇ. بۇنداق خەشەم ھەقىقىي خەشەم بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

بۇنىڭدا مزاجنىڭ ئىسسىقتىن بۇزۇلۇشى كۆپىنچە ھاللاردا ئىلگىرى ئىسسىقلىق چارىلەرنى كۆپ ۋە زىيادە قوللانغانلىقتىن بولىدۇ.

مزاجنىڭ سوغۇقتىن بۇزۇلۇشى كۆپىنچە ھاللاردا ئىلگىرى سوغۇقلۇق چارىلەرنى كۆپ ۋە زىيادە قوللانغانلىقتىن بولىدۇ.

مزاجنىڭ قۇرۇقلۇقتىن بۇزۇلۇشى كۆپىنچە ھاللاردا ئىلگىرى قۇرۇتقۇچى چارىلەرنى كۆپ ۋە زىيادە قوللانغانلىقتىن ياكى سەرسام ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش قىزىتمىلىق كېسەللىكلەردىن كېلىپ چىقىدۇ.

مزاجنىڭ ھۆلۈكتىن بۇزۇلۇشى كۆپىنچە ھاللاردا ئىلگىرى ھۆللەشتۈرگۈچى چارىلەرنى كۆپ ۋە زىيادە قوللانغانلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ.

## ئالامىتى

1. بۇرۇن بەۋاسىرىدىن بولغان خەشەمدە بەۋاسىر ئوخشىمىغان دەرىجىدە بۇرۇن تۆشۈكىنى توسىغان بولۇپ پۇراش سېزىمىنىڭ ئاجىزلىشىشىمۇ شۇڭا مۇناسىپ ھالدا ھەر خىل دەرىجىدە بولىدۇ. بىمار دائىم دىمىقىنى قاقىدۇ، دىمىقىدا سۆزلەيدۇ. ئېغىز ئارقىلىق نەپەس ئالىدۇ. بۇرۇن بەۋاسىرىنىڭ بەزىلىرى ئاقۇش رەڭدە، بەزىلىرى قىزغۇچ رەڭدە بولىدۇ. بەزىلىرىدە ئاغرىش ۋە زەرداب ئېقىش ئەھۋاللىرى بولىدۇ. بەزىلىرى ئۇزىراپ بۇرۇندىن تاكى گالغىچە سوزۇلۇپ، بۇرۇن تۆشۈكىنى پۈتۈنلەي قاپلاپ كېتىشىمۇ مۇمكىن.

2. بۇرۇن تۆشمىسىدىن بولغان خەشەمدە بۇرۇن بەۋاسىرىغا ئوخشاشلا بىمار بۇرۇن ئىچىدە بىرنەرسە قاپلىشىپ قالغاندەك ھېس قىلىدۇ، دىمىقىدا سۆزلەيدۇ، ئېغىز ئارقىلىق



نەپەس ئالدىۇ ۋە شۇنىڭغا مۇناسىپ ھالدا پۇراش سىزىمى ئاجزلايدۇ ياكى يوقلىدۇ. تۆسىمنىڭ تۈزى يۇمشاق، ھەجىمى چوڭراق بولۇپ تۇرغۇن ئىنچىكە تومۇرلىرى بولىدۇ. شۇڭا «بەسپايەچ» دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇلار بەزىدە يىرىڭلىق يارىغا ئايلىنىپ زەرداب ۋە ھۆلۈكلەر ئاقدۇ. ھەتتا سەرتان (راك) غا ئايلىنىپ بۇرۇننىڭ شەكلىنى بۇزىدۇ.

بۇرۇندىكى تۆسىمنىڭ راققا ئايلانغانلىقىنىڭ ئالامىتى شۇكى، ئۇ قاتتىقلىشىدۇ، تېز يوغىنايدۇ، شۇ جايدىكى تومۇزلار كۆكرىپ كېتىدۇ، تارتىشىدۇ. كېسەل كىشى قاپاقنىڭ ئىچكى تەرىپىدە سوزۇلغاندەك بىر خىل سىزىم بارلىقىنى ھېس قىلىدۇ.

3. شىلىشىق ۋە قويۇق خىلىتلارنىڭ بۇرۇن غەلۋىرىسىمان سۈزگۈچ سۆڭەك تۆشۈكلىرىنى توسغانلىقتىن بولغان خەشەمدە بۇرۇننىڭ تۆشۈكلىرى كۆرۈنۈشتە گەرچە ئوچۇق بولسىمۇ توسالغۇ بۇرۇننىڭ يۇقىرىقى قىسمىدا بولغاچقا مېڭىدىن كەلگەن ئارتۇق ھۆلۈكلەر بۇرۇندىن ئاقماق بولۇپ قالىدۇ. ئاغرىق دىمقىدا سۆزلەيدۇ. ئاغرىق دىمقىدا سۆزلىسە كېسەلنىڭ بۇرۇن يولىدا؛ دىمقىدا سۆزلىمىسە بۇرۇننىڭ يۇقىرى قىسمىدا يەنى مېڭىدە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

4. ئاتشەك (سېغىلىس) كېسىلى تۈپەيلىدىن بولغان خەشەمدە بۇرۇن شەكلىنىڭ بۇزۇلغانلىقى ۋە قاڭشارنىڭ ئولتۇرۇشۇپ كەتكەنلىكىنى قاراپلا بىلگىلى بولىدۇ. تەپسىلىي تەكشۈرگەندە بۇرۇن كۆمۈرچەكلىرى، سۆڭەكلىرى ۋە يۇمشاق توقۇلمىلىرىنىڭ بۇزۇلغانلىقىنى بايقىغىلى بولىدۇ.

5. مېڭىدىكى پۇراق سىزىمىنى ھاسىل قىلىش مەركىزىنىڭ مزاجى ئۆزگىرىشىدىن بولغان خەشەمدە بىمارنىڭ تاۋۇش چىقىرىش ئەھۋالىدا غەيرىي ئۆزگىرىش بولمايدۇ.

مىزاجىنىڭ ئىسسىقتىن بۇزۇلۇشى خىلت (ماددا) لىق بولسا، بۇرۇندىن پىششىق ھۆلۈكلەر كېلىدۇ.

مىزاجىنىڭ سوغۇقتىن بۇزۇلۇشى خىلت (ماددا) لىق بولسا، مېڭىنىڭ ئوزۇقلۇقلارنى جەلپ قىلىش ۋە تاشلاندىقۇقلارنى چىقىرىۋېتىشكە كۈچى يەتمىگەنلىكتىن مېڭىدىن كەلگەن ھۆلۈك ئاز بولىدۇ. بۇرۇندىن خام ھۆلۈكلەر (پوتلا) ئاز كېلىدۇ. ھەمدە بىمار پىشانە ساھەسىدە ئېغىرلىق بارلىقىنى ھېس قىلىدۇ.

مىزاجىنىڭ قۇرۇقلۇقتىن بۇزۇلغانلىقىدىن بولغان خەشەمدە سەرسام ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش قىزىتمىلىق كېسەللەرگە گىرىپتار بولغانلىق تارىخى بولۇشتىن سىرت بەدەندە قۇرۇقلۇق ئاشقان ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

مىزاجىنىڭ ھۆلۈكتىن بۇزۇلغانلىقىدىن بولغان خەشەمدە ھۆلۈك ئېشىپ كەتكەن



داۋاسى

1. بۇرۇن بەۋاسىرىدىن بولغان خەشەمنى داۋالاشتا ئەگەر بەۋاسىرنىڭ رەڭگى ئاقۇش بولۇپ، ئاغرىمىسا داۋالاش ئوڭايراق؛ قىزغۇچ رەڭدە بولۇپ رەڭگى بۇزۇق، ئاغرىيدىغان بولسا داۋالاش تەسەرەك بولىدۇ. بولۇپمۇ زەرداب ئاقىدىغان دەرىجىگە يەتكىنىنى داۋالاش قىيىن.

مۇناسىپ ئورۇنلارغا لوڭقا قويۇش، ئاندىن ئىچىشكە ھەيى ئىيارەج بېرىپ ئىچىشنى تازىلاش، زەنكار، شاخارلاردىن باراۋەر مىقداردا ئېلىپ سىركە بىلەن مەلھەم ياساپ، پىلتىكۈچ ئارقىلىق ئارتۇق گۆش بار جايغا تىقىپ قويۇش لازىم. لېكىن ئىچكى ئەزالارنى بۇزۇق ماددىلاردىن تازىلاشتىن ئىلگىرى بۇرۇنغا ئۆتكۈر تەسىرلىك دورىلارنى ئىشلەتمەسلىك كېرەك. يۇقىرىقى دورىلار ئۈنۈم بەرمىسە مىس دېتى، ئاق زاك، قىزىل زەرىنخەلەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ سىركە بىلەن مەلھەم قىلىپ بۇرۇن ئىچىگە تىقىپ قويسا، خۇددى تىغ بىلەن كېسىپ داۋالغاندەك ئۈنۈم بېرىدۇ. ئەگەر بۇ دورىلار بىلەنمۇ ساقايىمىسا دەستىكارلىق تۈسۈلى بىلەن داۋالاش لازىم.

2. بۇرۇن ئۆسمىسىدىن بولغان خەشەمنى داۋالاشتا ئاۋۋال مۇۋاپىق كۆمۈلەر، ئىيارەجلەر ئارقىلىق مېڭىنى تازىلاش، ئاندىن ئۆسمىنى يۇمشىتىش ئۈچۈن ھۇزۇز، مۇر-مەككى، ھۆل زۇفا، زەيتۇن يېغىنىڭ دۇغى، مەدەستانلارنى باراۋەر مىقداردا ھاجەتكە لايىق ئېلىپ، ھۆلە ياكى زىغىر شىرىسى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ مەلھەم قىلىپ چېپىلىدۇ. ئۆسمە يۇمشىغاندىن كېيىن نەشتەر بىلەن تىلىپ قان چىقىرىلىدۇ ياكى زۇلۇك قۇرۇتى قويۇلىدۇ. ئەمما مەزكۇر ئۆسمە سەرتانغا ئايلانغان بولسا تىغ ئىشلەتمەسلىك، شۇنىڭدەك گۆشخۇر، ئۆتكۈر دورىلارنىمۇ ئىشلەتمەسلىك لازىم. چۈنكى سەرتان ئۆسمىسى جاراھەتلەنسە پۈتۈپ ساقىيىشى قىيىن بولۇپلا قالماي ئەكسىچە تېخىمۇ تېز تەرەققىي قىلىدۇ. ھەتتا قاتتىق ئاغرىپ مېڭە پەردىسىگە تەسىر كۆرسىتىپ ئۆلۈم ھادىسىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. پەقەت سەرتان ئۆسمىسىنىڭ قاتتىقلىقىنى پەسەيتىش ئۈچۈن مۇۋاپىق مىقداردىكى زىغىر، كۈنۈچە (بىر خىل رەيھان) ئورۇقنىڭ شىرىسىنى چىقىرىپ مۇۋاپىق مىقداردا كۈنجۈت يېغى، ئاق موم ئېلىپ مومنى ئالدى بىلەن كۈنجۈت يېغىدا ئېرىتىپ، ئاندىن باشقا دورىلارنى ياخشى ئارىلاشتۇرۇپ قىرۋى تەييارلاپ، شۇ قىرۋىنى داۋاملىق ئىشلىتىش كېرەك. يەنە مەنچۈنى ئۇچاھ ۋە مەتبۇخى ئەقىمۇن قاتارلىقلارنى ئەھۋالغا قاراپ بېرىش

لازىم.

3. بۇرۇن غەلبىرىسىمان سۈزگۈچى سۆڭەك تۆشۈكلىرىنىڭ توسۇلغانلىقىدىن بولغان خەشەمنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن خىلىنى يۇمشىتىش، مېڭىنى تازىلاش لازىم. ئاندىن سىياھدان، پۇدەنە، شەھىمى ھەزەل قاتارلىق خىلىتلارنى يۇمشاتقۇچى دورىلارنى بەككە ھالدا ياكى بىرلەشتۈرۈپ بۇرۇنغا تېمىتىش، يەنە خىلىنى يۇمشاتقۇچى دورىلارنى قاينىتىپ بۇرۇنغا ئېلىش (نوتۇل قىلىش) لازىم.

ئەگەر، بۇرۇنغا تېمىتىدىغان دورىنى تېخىمۇ ئىچكىرىگە يەتكۈزۈش لازىم بولسا، زۆرۈر كەلگەندە تۆۋەندىكى ئۆسۈلدىن پايدىلىنىش مۇمكىن: كېسەل كىشى ئاغزىغا لىق سۇ ئېلىپ، بېشىنى ئارقىغا ئېلىپ ئولتۇرىدۇ. دورا تېمىتىلغاندىن كېيىن ئىلاجى بار چوڭقۇرراق نەپەس ئالىدۇ. بۇنىڭ بىلەن دورا دېگەن جايغا يېتىپ بارالايدۇ.

4. ئاتشەك (سەلسەلە) تىن بولغان خەشەمنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن بۇزۇق خىلىتلارنى تازىلاش ئۈچۈن مۇزىچ دورا بېرىلىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن سوقا چىلان، يەر باغرى ئوت، قارا ھەلىيە، ئاق ۋە قىزىل سەندەل، قۇرۇق خېنە، قەسبۇزەرىرە، تۆشۈدۈرلەرنىڭ ھەر بىرىدىن 18 گرام ئېلىپ چالا سوقۇپ بىر كېچە قايناقسۇغا چىلاپ تېتىقنى چىقىرىپ تەمى تەڭشەلگۈدەك ھەسەل قوشۇپ ئىچكۈزۈلىدۇ. ئاندىن كېيىن سىمابتىن ياسالغان كۈچلۈك دورىلار ئىشلىتىلىدۇ.

1) ھەببى سىماب: بۇنى كېسەل كىشىنىڭ ياش قۇرامىغا قاراپ بىر قېتىمدا 10 كۇمۇلاچتىن ئىچىشكە قەدەر يەتكۈزۈلىدۇ. لېكىن شۇنىڭغا دىققەت قىلىش لازىمكى، سىماب ۋە ئۇنىڭ كۈشتىلىرىدىن ياسالغان دورىلار زەھەرلىك بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇلارنى ئىشلىتىش مىقدارىغا قاتتىق دىققەت قىلىش لازىم. تەجرىبىلەرگە قارىغاندا سىمابلىق دورىلار چىشقا زىيان يەتكۈزىدۇ. شۇڭا ئۇلارنى ئىشلەتكەندە ئېغىز ئىچىنىڭ تازىلىقىغا ئادەتتىكىدىن تاشقىرى ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىش كېرەك.

2) مەئجۇنى چۆپچىنى: ھەر كۈنى ئەتىگەن-ئاخىشامدا 10 گرامدىن ئىستېمال قىلىنىدۇ.

3) ھەببى كىرىت: ئون ياشتىن يۇقىرىلارغا 7 تالدىن 10 تالغىچە، بالىلارغا مۇۋاپىق مىقداردا تازىلاپ بېرىلىدۇ.

سىرتتىن چىپىش ئۈچۈن مەلھىمى چۆپچىنى، مەلھىمى شىگرىپ ئىشلەتسە بولىدۇ. جاراھەت يۇمشاپ ئېغىز ئالغاندىن كېيىن سۇفۇفى سىماب سېپىپ بېرىلسە ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى.

ئىچىش ئۈچۈن يەنە ئەرىقى چۆپچىنى كۈندە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 300





مىللىتلەردىن؛ ئەرقى شەھەر رەزىنى كۈندە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 50 مىللىتلەردىن ئىچسە بولىدۇ.

5. مېگىدىكى پۇراق سېزىمىنى ھاسىل قىلىش مەركىزىنىڭ مىزاجى ئۆزگىرىشىدىن بولغان خەشەمنى داۋالاشتا مىزاج خىلىت (ماددا) سىز ئۆزگەرگەن بولسا، مىزاجنى ئوڭلاشقا ئائىت مۇناسىپ تۈسۈل-چارە ۋە دورىلارنى قوللانسا بولىدۇ. مىزاج خىلىت (ماددا) لىق ئۆزگەرگەن بولسا، ئالدى بىلەن ماددىنى پىشۇرغۇچى، تازىلىغۇچى دورىلارنى ئىشلەتكەندىن كېيىن مىزاجنى تەڭشىگۈچى دورىلارنى ئىشلىتىش لازىم.

### پۇراق قۇۋۋىتى بۇزۇلۇش

پۇراق قۇۋۋىتى بۇزۇلۇش (فەسادۇششەمى) پۇراق سېزىمىنىڭ ئاجىزلىشىشى ياكى پۈتۈنلەي يوقالغانلىقىغا قارىتىلماي، بەلكى پۇراق قۇۋۋىتىنىڭ تەبىئىي ھالەتتىن ئۆزگىرىپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان. تۆت ئادەتتە ئۈچ خىل ھالەتتە ئۇچرايدۇ.

1. بۇرۇننىڭ پۇراق قۇۋۋىتى ھەممە پۇراقنى بىر خىللا ھېس قىلىدۇ.
2. بىر خىل پۇراقلىق نەرسىنى كېسەل كىشى ئىككى خىل ھېس قىلىدۇ.
3. بۇرۇن پەقەت سېسىق ياكى خۇشپۇراق نەرسىلەرنىلا سېزىدۇ. ئۇلارنى پەرقلەندۈرۈپ ياكى ئايرىپ سېزەلمەيدۇ.

سەۋەبى

1. بۇرۇن پۇراق قۇۋۋىتى ھەممە پۇراقنى بىر خىللا ھېس قىلىشتىكى سەۋەب:

بىرىنچى، مېگىنىڭ ئالدىنقى قىسمىدا مىزاج ئۆزگىرىشى يۈز بەرگەنلىكتىن مىزاج ئىسسىق، قۇرۇق ۋە سوغۇق، ھۆلۈكتىن ئۆزگىرىپ پۇراق قۇۋۋىتى بۇزۇلۇپ ھەممە پۇراقلارنى بىر خىللا ھېس قىلىدۇ.

ئىككىنچى، مېگىنىڭ ئالدىنقى قىسمىدا ناچار خىلىت ئورۇنلاشقان بولۇپ، توننىڭ مىقدارى كۆپەيگەن ياكى كۈچلۈك بۇزۇق كەپسىياتقا ئۆزگەرگەنلىكتىن پۇراق قۇۋۋىتى داۋاملىق شۇ خىلىتقا خاس بىر خىل پۇراقنىلا سېزىدۇ.





بۇنداق بولۇشتىكى سەۋەب شۇكى مەزكۇر خىلىنىڭ مېڭىدىكى پۇراش مەركىزىگە يېقىن بولغانلىقى ھەمدە بۇ مەركەزنىڭ شۇ پۇراققا كۆنۈپ قالغانلىقىدىن بولىدۇ.

2. بىر خىل پۇراقلىق نەرسىنى كېسەل كىشى ئىككى خىل ھېس قىلىشنىڭ سەۋەبى شۇكى، مېڭىنىڭ ئالدىنقى قىسمىدىكى ئورتاق سېزىم (ھىسسى مۇشتەرەك) قوبۇل قىلىش ئورنىدا خىلىت (ماددا) لىق مىزاج بۇزۇلۇشى پەيدا بولغانلىقتىن پۇراش قۇۋۋىتى بىر خىل پۇراقنى ئىككى خىل سېزىدۇ.

3. بۇرۇننىڭ خۇش پۇراق نەرسىلەرنى ھېس قىلماي، بەلكى پەقەت سېسىق پۇراقلىق نەرسىلەرنىلا ھېس قىلىشىدىكى سەۋەب شۇكى، مېڭىنىڭ پۇراق سېزىش مەركىزىدە قان ياكى بەلغەم خاراكتېرلىك تەبىئىي تاتلىق ماددىلار يىغىلىپ قالغانلىقتىن پۇراش قۇۋۋىتى خۇش پۇراققا كۆنۈپ قالىدۇ. دە، پۇراش قۇۋۋىتىنىڭ ئەكسىچە پۇراقنى قوبۇل قىلىش خۇسۇسىيىتى تۈپەيلىدىن خۇشپۇي نەرسىلەرنى سەزمەي سېسىق پۇراقلارنىلا سېزىدۇ.

بۇرۇننىڭ سېسىق نەرسىلەرنى ھېس قىلماي، بەلكى خۇش پۇراق نەرسىلەرنىلا ھېس قىلىشىدىكى سەۋەب شۇكى، مېڭىنىڭ ئالدىنقى قىسمى ۋە ئىككى تەرەپتىكى پۇراق سېزىش مەركىزى بولغان ئىككى تۈسۈكچىدە بۇزۇلغان سېسىق خىلىت (ماددا) پەيدا بولۇش ياكى بۇرۇن ئىچىدە يىرىڭلىق، ئوقۇنەتلىك چاقا پەيدا بولۇشتىن پۇراش قۇۋۋىتى سېسىق پۇراققا كۆنۈپ قالىدۇ. دە، پۇراش قۇۋۋىتىنىڭ ئۆزى كۆنگەن پۇراقنىڭ ئەكسىنى سېزىشتىن ئىبارەت خۇسۇسىيىتى تۈپەيلىدىن سېسىق نەرسىلەرنى سەزمەي خۇش پۇراق نەرسىلەرنىلا سېزىدۇ.

### ئالامىتى

1. بۇرۇننىڭ پۇراش قۇۋۋىتى ھەممە پۇراقلارنى بىر خىللا ھېس قىلىشتا مېڭىنىڭ ئالدىنقى قىسمىدا مىزاج ئۆزگىرىشى يۈز بەرگەنلىكتىن تۆۋەندىكى ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ: بىرىنچى، مىزاج ئىسسىق ياكى قۇرۇققا ئۆزگەرسە، پۇراش قۇۋۋىتى بۇزۇلۇپ كېسەل كىشى داۋاملىق ئەمەلىيەتتە يوق ياخشى، يامان پۇراقلارنى بىر خىللا ھېس قىلىدۇ. كۆپىنچە، سېسىق پۇراقلارنى ياقتۇرۇپ خۇش بۇي نەرسىلەردىن نەپرەتلىنىدۇ.

مىزاج سوغۇق ۋە ھۆللىۈككە ئۆزگەرسە، مېڭە ئاجىزلىشىپ پۇراش قۇۋۋىتى ئۆزگىرىدۇ، كېسەل كىشى پەقەت بىر خىل پۇراقنى يەنى خۇش پۇراق ياكى سېسىق





پۇراقلارنىلا ھېس قىلدۇ. لېكىن ئەمەلىيەتتە بۇنداق پۇراقلار بولمىغان بولىدۇ. ئىككىنچى، مېڭە ئالدىنقى قىسمىدا ئورۇنلاشقان ناچار خىلىنىڭ مىقدارى ئاز، يامان كەيپىياتقا ئۆزگىرىشى ئاجىزراق بولسا، ئادەتتە مەزكۇر خىلىنىڭ پۇرىقى سېزىلمەيدۇ. مىقدارى كۆپ، يامان كەيپىياتقا ئۆزگىرىشى كۈچلۈكرەك بولسا، سىرتقى جەھەتتىكى پۇراقلار قانداق بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر پۇراش قۇۋۋىتى پەقەت شۇ خىلىت پۇراقىنىلا سېزىدۇ.

خىلىت بۇرۇنغا قارىمۇچ، سۇنبۇل پۇرىغاندەك بىلىنسە، خىلىنىڭ ئىسسىق ئىكەنلىكىنى، سېسىق بىلىنسە، خىلىنىڭ بۇزۇق ھەمدە ماددىنىڭ سېسىق ئىكەنلىكىنى، ھۆلۈككە مايىل زەي پۇراق بىلىنسە، خىلىنىڭ سوغۇق ئىكەنلىكىنى؛ ئاچچىق پۇراق بىلىنسە، سەۋدا خىلىتىدىن ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

2. بىر خىل پۇراقلىق نەرسىلەرنى ئىككى خىل ھېس قىلىشتا كېسەل كىشى دەسلەپتە بىر خىل نەرسىنى خۇش پۇراقلىق ھېس قىلسا، قايتا پۇرىغاندا سېسىق ھېس قىلىدۇ. كېسەل كىشى دىمىقى دائىم چىڭقىلىپ بۇرنى پۈتۈپ قالغاندەك ھېس قىلدۇ.

3. خۇش پۇراق نەرسىلەرنى ھېس قىلماي، سېسىق نەرسىنىلا ھېس قىلىشتا كېسەل كىشىنىڭ بۇرنى سېسىق پۇراقلارنىلا سېزىدۇ.

سېسىق پۇراقلىق نەرسىلەرنى ھېس قىلماي، خۇش پۇراق نەرسىلەرنىلا ھېس قىلىشتا كېسەل كىشىنىڭ بۇرنى خۇش پۇراق نەرسىلەرنىڭ ھىدىنىلا سېزىدۇ.

#### داۋاسى

1. مېڭىنىڭ ئالدىنقى قىسمى مىزاجىنىڭ 4 خىل كەيپىياتتىكى ئۆزگىرىشلىرىگە ئاساسەن مۇناسىپ ھالدىكى تۆسۈل-چارە ۋە دورىلارنى ئىشلىتىش ئارقىلىق مىزاجنى ئوڭلاشقا تىرىشىش كېرەك. ئادەتتە مىزاج تەڭشەلسىلا بۇرۇننىڭ ھەممە پۇراقتى بىر خىللا ھېس قىلىش ئەھۋالى ئۈزلۈكسىز ياخشىلىنىپ قالىدۇ.

مېڭىنىڭ ئالدىنقى قىسمىدا ناچار خىلىتلار ئورۇنلاشقاندىن بولغان ھەر خىل پۇراقلارنى بىر خىللا سېزىشنى داۋالاشتا، شۇ خىلىتلارغا مۇناسىپ دورىلار ئارقىلىق مېڭىنى تازىلاش ھەمدە بادام يېغى، بىتەپشە يېغى، قاپاق مېغىزى يېغى قاتارلىقلارنىڭ بىرنى داۋاملىق ھالدا بۇرۇنغا تېمىتىش كېرەك.

2. بىر خىل پۇراقتى ئىككى خىل ھېس قىلىشنى داۋالاشتا، ئالدى بىلەن مېڭىنىڭ





ئورتاق سېزىم قوبۇل قىلىش ئورنىدا ماددىلىق مىزاج ئۆزگىرىشى پەيدا قىلغان خىلىتىنىڭ تۈرىنى ئايرىپ، مۇناسىپ مۇنزىج ۋە مۇسەھل دورىلار بېرىلىدۇ. ئىيارەج فەيقەرا، ھەببى قوقىيا، مەئجۇنى نۇجاھ، ماتۇلئۇسۇل قاتارلىقلار تاللاپ ئىشلىتىلىدۇ. بەزى چۈشكۈرتكۈچى دورىلار بىلەن چۈشكۈرتۈش كېرەك. ئىپار، قەلەمفۇر، سىياھدان، سامساققا ئوخشاش ئۆتكۈر پۇراقلىق دورىلار پۇراشقا بېرىلىدۇ.

3. بۇرۇننىڭ پەقەت سېسىق ياكى خۇش پۇراق نەرسىلەرنىلا سېزىدىغان بولۇپ قالغانلىقىنى داۋالاشمۇ ئالدى بىلەن مېڭىنى كېسەل ماددىلىرىدىن تازىلاش كېرەك. قۇندۇز قەھرى، سەكبىتەج، مۇرمەككى، جاۋشىر، سامساق، كۈندۈش قاتارلىق ئىسسىق تەبىئەتلىك ياكى سېسىق پۇراقلىق دورىلارنى كېسەل ئەھۋالىغا قاراپ تاللاپ پۇرۇتۇش، بۇرۇنغا تېمىتىش كېرەك.

پۇراش قۇۋۋىتىنىڭ بۇزۇلۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ھەمدە كېيىن پەيدا بولۇپ قوشۇلۇپ كەلگەن مىزاج ئۆزگىرىشلىرى ئەگەر مۇستەھكەم ئورۇنلاشمىغان مەزگىللەردە يۇقىرىقى داۋالاش ئۇسۇلىنى قوللانسا ئۈنۈمى خېلى ياخشى. ئەمما قوشۇلۇپ كەلگەن مىزاج مۇستەھكەم ئورۇنلىشىپ قالغان بولسا، بۇ ئۇسۇل-چارىلەر دېگۈدەك ئۈنۈم بەرمەسلىكى مۇمكىن.

## بۇرۇن قۇرۇش

بۇرۇن قۇرۇش (جەفافۇلئەنفى) بۇرۇن ئىچىدە ھېچقانداق چاقا، مۇدۈر بولماي ۋە باشقا ئالاھىدە كېسەللىك بەلگىسى كۆرۈلمەي تۇرۇپلا بۇرۇن ئۇزۇنغىچە كۆپ قۇرۇپ نەم بولماسلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

1. بەدەندە يۇقىرى ھارارەتلىك قىزىتما يەنى قىزىل، كېزىك، تەب قاتارلىق ئۆتكۈر كېسەللىكلەر بولغاندا بۇرۇندىكى ھۆللۈك قۇرۇپ بۇرۇن قۇرۇش پەيدا بولىدۇ.
2. ئۇزۇن داۋاملىشىدىغان سىل (تەبىي دىقق)دا بەدەن تەدرىجىي قۇرۇش نەتىجىسىدە بۇرۇن قۇرۇش كېلىپ چىقىدۇ. زۇكام ۋە ئاتشەكتىنمۇ بۇرۇن قۇرۇلىدۇ.





3. بۇرۇننىڭ دىماقتىكى تۆشۈكىگە شىلمىش خىلىت چاپلىشىپ، تاشقى تەرەپتىن تارتىلغان ھاۋانىڭ ھارارىتى بىلەن شۇ جايدا قۇرۇپ قېتىپ قالىدۇ ياكى دىماقتا ۋەرەم سادىر بولۇپ، بۇرۇن يولى توسۇلۇپ قالىدۇ. مېڭىدىن چۈشىدىغان ھۆلۈكلەر توختاپ قېلىپ بۇرۇندا قورغاقلىشىش يۈز بېرىدۇ.

4. كۆپ سۇيۇقلۇق يوقىتىش، مەسىلەن: كۆپ ئىچى سۈرۈش، ھەر خىل ناسۇرلار ياكى ھەر خىل قويۇق خىلىتلارنىڭ تەسىرىدىن ھاۋا يوللىرى، سۇيۇقلۇق ئالمىشىش يوللىرى توسۇلۇپ قېلىشتىن بۇرۇن قۇرۇيدۇ.

### ئالامىتى

ھارارەتلىك ئۆتكۈر كېسەللىكلەردىن بولغان بۇرۇن قاناشتا ئومۇمىي بەدەندە سەپرا خىلىتنىڭ غالبلىقىغا مەنسۇپ بەلگىلەر كۆرۈلىدۇ.

سىلدىن، قۇرۇقلۇقتىن بولغان بۇرۇن قۇرۇشتا ئومۇمىي بەدەن ئورۇقلاش، ئويۇسۇزلىق، قورغاقلىشىش، چۈشتىن كېيىن ئىككى مەڭزى قىزىرىشتەك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. تومۇرى ئىنچىكە، تېز سالىدۇ.

### داۋاسى

ھارارەتلىك ئۆتكۈر كېسەللىكلەردىن بولغان بۇرۇن قاناشنى داۋالاشتا ئەسلىي كېسەللىكنى داۋالاش كېرەك. ئەسلىي كېسەللىك ساقايىسا ھارارەت قايتسا بۇرۇن قۇرۇش ئۈزلۈكسىز ساقىيىپ كېتىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن ھارارەت چۈشۈرگۈچى دورىلارنى ئىچكۈزۈش، سوغۇق تەبىئەتلىك ياغلارنى بۇرۇنغا تېمىتىش، پىشانغا مۇناسىپ زىماد ۋە تىللارنى تېگىش ياكى چېپىش كېرەك. شەرىپىنى نىيەلۈشتە داۋاملىق ئىچكۈزۈش، قىز توغقان ئايال سۈتىگە بادام يېغى ئارىلاشتۇرۇپ بۇرۇنغا تېمىتىش، پىشانغا ئاق سەندەل، ئارپا ئونى، ئۇسۇڭ ئۇرۇقى، سېمىز ئوت ئۇرۇقى ۋە كاۋا قىرمىسىنى ئىسبەغۇل شىرسى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تاڭسا بولىدۇ. ھۆللەشتۈرگۈچى سوغۇقلۇق تاماقلارنى يېگۈزۈش كېرەك.

سىل (تەبىئىي دىق) دىن بولغان بۇرۇن قۇرۇشنى داۋالاشتا سىلنى داۋالاش، زۇكام ۋە ئاتشەكتىن بۇرۇن قۇرسا زۇكامنى داۋالاش، ئاتشەككە قارشى تەدبىر قوللىنىش بىلەن بىرگە بۇرۇنغا ھۆل تەبىئەتلىك ياغلارنى تېمىتىش كېرەك.

بۇرۇن يولىغا خىلىت چاپلىشىۋالغاندىن بولغان بۇرۇن قۇرۇشنى داۋالاشتا، بۇرۇنغا





مۇناسىپ ياغلارنى تېمىتىش، ھۆللەشتۈرگۈچى دورىلارنى ئىچكۈزۈش ئارقىلىق خىلىت يۇمىشىتىلىپ، ئاندىن بۇرۇننى چايقايدىغان نوتۇل دورىلار ياردىمى ئارقىلىق ماددىلارنى چىقىرىپ تاشلاش كېرەك.

سۇيۇقلۇق يوقىتىش بولغان بۇرۇن قۇرۇشنى داۋالاشتا ئىچى سۈرۈشنى داۋالاش، ئاقما (ناسۇر) كېسەللىكلەرنى داۋالاش كېرەك.

قويۇق خىلىتلارنىڭ تەسىرى تۈپەيلىدىن ھاۋا يوللىرى، سۇيۇقلۇق ئالمىشىش يوللىرى توسۇلۇپ پەيدا بولغان بۇرۇن قۇرۇشنى داۋالاشتا، مزاجنى ھۆللەشتۈرۈش، توسالغۇلارنى ئېچىش كېرەك. ھەر خىل مېۋىلەر سۈيى، ئۈزۈم سۈيى، ئارپا، بۇغداي، گۈرۈچ، گۆش قاتارلىقلار بىلەن يارما ئاش قىلىپ بېرىش؛ پات-پات قىزىق سۇدا يۇيۇنۇش، بادام يېغى، گۈل يېغى، سېنەپشە يېغى بىلەن بۇرۇن ۋە چېكىنى ياغلاش كېرەك.

### بۇرۇن قىچىشىش

بۇرۇن قىچىشىش (ھىككە تۈكئەنقى، خارىشى بىسىنى) بۇرۇن ئىچى ئۈزلۈكسىز قىچىشىپ، غىدىقلانغانلىقىغا ھەمدە شۇ تەسىردىن كۆزدىن ياش، بۇرۇندىن سۇ ئاققانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

1. ئىچكى-تاشقى ئامىللار تۈپەيلىدىن سەپرا ياكى سەۋدا ماددىسى غالىب كېلىپ ئۆتكۈر ئىسسىقلىق بۇرۇن ئىچى شىللىق پەردىلىرىگە يامان تەسىر كۆرسەتكەنلىكىدىن بۇرۇن قىچىشىدۇ.
2. يەللەرنىڭ مېگە ۋە چېكە تومۇرلىرىدا توختاپ قالغانلىقى، بۇرۇننىڭ يەرلىك ئورنىدا يەلنىڭ تەسىرىدىن قىچىشىش، قىزىرىش، قىسمەن چاقىلار چىقىش قاتارلىقلار يۈز بەرگەنلىكى تۈپەيلىدىن بۇرۇن قىچىشىش كېلىپ چىقىدۇ.
3. تازىلىق قائىدىلىرىگە رىئايە قىلماي، بۇرۇن تۈكلىرىنى يۇلۇش ياكى قىرقىش سەۋەبىدىن تۈكلەر يىرىكىلىشىپ بۇرۇن ئىچىنى غىدىقلاپ بۇرۇن





قىچىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

4. بەزىدە زۇكامنىڭ نەزلى سۈيى بۇرۇن ئىچى شىللىق پەردىلىرىدە توختاپ قېلىپ ئوقۇنەت ھاسىل قىلغانلىقى تۈپەيلىدىن تەدرىجىي ھالدا بۇرۇننىڭ قىچىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بەزى كىشىلەردە بۇرۇن ئىچىگە تۇششاق مۇدۈرلەر چىقىپ ساقايغاندىن كېيىنمۇ ئاسارتى ئۆزۈنغا سوزۇلۇپ بەلگە ئايلانغانلىقتىن بۇرۇن قىچىشىغا سەۋەب بولىدۇ. بەزى كىشىلەردە ئاتشەك (سېلىس) كېسىلى تەسىرى تۈپەيلىدىن بۇرۇن ئىچى قىزىپ قىچىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

### ئالامىتى

1. سەپرا ياكى سەۋادىن بولغان بۇرۇن قىچىشىدا شۇ خىللىقلارغا خاس ئالامەتلەردىن سىرت ئىسسىقلىق تاماقلارنى كۆپ يېسە ياكى قۇرغاق ھاۋاغا چىقسا بۇرۇن ئىچىنىڭ غىدىقلىنىشى ۋە قىچىشى كۈچەيگەنلىكى بىلىنىدۇ. كۆزدىن ياش، بۇرۇندىن سۇ ئاقىدۇ. چىققان ياش ۋە سۇيۇقلۇقلار ئىسسىق ھەم ئېچىشتۈرۈپ كېلىدۇ.
2. بۇرۇنغا جاراھەتلەر چىقىدۇ. قۇرغاق ھاۋا، ئىسسىق تاماقلار تەسىر قىلىشىمۇ قىچىشىدۇ. بەزىدە بۇرۇن قىزىرىدۇ. چاقا كۆپ چىقىپ بۇرۇن كۆپ قىچىشىمۇ ياش ۋە بۇرۇندىن ئانچە كۆپ سۇيۇقلۇق ئاقمايدۇ.
3. بىماردا بۇرۇن تۈكلىرىنى يۇلىدىغان ۋە قىرقىدىغان ئادەت بولىدۇ. ئومۇمىي بەدەن ۋە بۇرۇندا بۇرۇن قىچىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان باشقا ئەھۋاللار بولمايدۇ.
4. بىماردا دائىم زۇكام بولۇپ نەزلى سۇلىرىنىڭ بۇرۇنغا يامان تەسىر قىلغانلىقى ۋە ئاتشەك (سېلىس) كە گىرىپتار بولغانلىقى تارىخى بولىدۇ.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن سەۋەبىنى ئېنىقلاپ تۇنىڭغا قارىتا داۋالاش ئېلىپ بېرىش كېرەك.

1. سەپرا ۋە سەۋادىن بولغانلىرىدا مەزكۇر خىللىقلارنى پىشۇرۇپ، تازىلاش ۋە تەكشۈش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن ئىچكى تەرەپتىن مەتبۇخى شاھتەررە، مەتبۇخى ئەفتمۇن، ھەببى شاھتەررە، ئىترىفېلى كەشنىز قاتارلىق دورىلارنى ئىشلەتكەندىن كېيىن ھەببى كىرىت، مەئجۇنى چۆبچىنى قاتارلىق دورىلارنى ئەھۋالغا قاراپ تاللاپ ئىشلىتىش كېرەك. ئىسسىق تاماقلار ۋە بەلنى قوزغىغۇچى نەرسىلەردىن ساقلىنىشقا دىققەت قىلىش لازىم.





2. بەللەرنىڭ مېڭە ۋە بەرلىك ئورۇندا توختاپ قالغانلىرىغا ۋە چاقىلاردىن بولغانلىرىغا بەللەرنى تارقاقچى ۋە باسقۇچى، چاقىلارنى ياندۇرغۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن ئىچكى جەھەتتىن ھەببى قوقيا، ھەببى كىبرىت قاتارلىق دورىلارنى، سىرتتىن مەلھىمى كىبرىت، رەۋغنى ۋەرد قاتارلىقلارنى ئىشلەتسە بولىدۇ. سىرتتىن گۈل يېغى بىلەن سىركىنى قوشۇپ بىر ئاز قاينىتىپ، بۇرۇننى ياغلاش لازىم.

3. بۇرۇن تازىلىقىغا رىئايە قىلىش، بۇرۇن تۈكلىرىنى يۇلماسلىق، قىرغىماسلىق كېرەك. بۇ، بۇرۇن تۈكلىرىنىڭ توسۇشقا پايدىلىق. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇرۇن تۈكلىرىنى يۇلماسلىق ۋە قىرغىماسلىق ھەققىدە تەشۋىقاتنى ياخشى ئېلىپ بېرىش كېرەك.

4. زۇكامنى ۋاقتىدا ئاكتىپ داۋالاش لازىم.

### بۇرۇن ئېچىشىش

بۇرۇن ئېچىشىش (ھىرقە تۈلەنقى) بۇرۇننىڭ ھەر خىل ئىچكى-تاشقى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ئېچىشقانلىقى ھەتتا كۆيۈشكەندەك بولغانلىقىغا قارىتىلغان.

#### سەۋەبى

1. مىزاجنىڭ تەبىئىي ھالەتتىن غەيرىي تەبىئىي ھالەتكە ئۆزگىرىپ بۇرۇنغا يامان تەسىر كۆرسەتكەنلىكىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭدا مىزاجنىڭ ئىسسىقتىن بۇزۇلۇشى ئاساسىي سەۋەب بولىدۇ.

2. بۇرۇن مىزاجى ئىنتايىن ئۆتكۈر ئىسسىقلىقنىڭ تەسىرىدىن بۇزۇلۇپ بۇرۇن ئېچىشىش، كۆيۈشۈش كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭدا ھارارەت مېڭىگە قاراپ تۈرلىگەن بولىدۇ.

3. زۇكام بولغاندىمۇ سۇيۇقلۇقلار بۇرۇندىن ئېقىپ بۇرۇننى ئېچىشتۈرىدۇ، بۇنىڭدا ئۆتكۈر خىلىتلار مېڭىگە يىغىلىپ قالىدۇ-دە، سىرتقى مۇھىتنىڭ تەسىرىدە باش تېرىسىدىكى مەسام (تۆشۈك) لەر توسۇلۇپ قېلىپ، بۇزۇق ئارتۇق ماددىلار







تەتۈرگە ياندۇ. شۇنىڭ بىلەن بۇرۇن يولدا ئېچىشش يۈز بېرىدۇ. بۇلاردىن باشقا يەنە، بۇرۇنغا بۇرۇننى غىدىقلىغۇچى دورىلارنى تېمىتىش، بۇرۇنغا تۇيۇقسىز سوغۇق ھاۋا تەسىر قىلىش قاتارلىقلار سەۋەبىدىنمۇ بۇرۇن ئېچىشىدۇ. ئۆتكۈر ئىسسىق بۇخاراتنىڭ مېڭىگە يۆتكىلىپ يامان تەسىر قىلغانلىقىنىڭ ئىپادىسى. چۈنكى بۇ خىل بۇخارات بۇزۇق بۇخاراتتۇر.

### ئالامىتى

1. مىزاجنىڭ ئىسسىقتىن بۇزۇلغانلىقىغا دائىر ئالامەتلەر كۆرۈلۈشتىن سىرت بۇرۇن دائىم ئېچىشىدۇ ھەتتا كۆيۈشكەندەك بولىدۇ. كۆزدىن ياش ئاقىدۇ.
2. يۇقىرىدىكى ئالامەتلەردىن سىرت بۇرۇندا ئىششىق ۋە ياللوغلىنىش بولىدۇ. قىزىشقاندا بىلىنىدۇ.
3. زۇكامنىڭ ئالامەتلىرى بولىدۇ. بۇرۇنغا بۇرۇننى غىدىقلىغۇچى دورا تېمىتىقان ۋە دائىم سوغۇق ھاۋاغا ئۇچراشقانلىقى تارىخى بولىدۇ.

### داۋاسى

1. پاكىز رەختنى سەندەل چىلىغان قىزىل گۈل ئەرىقىدە ھۆل قىلىپ بۇرۇننى سۈرتۈش، بۇرۇنغا گۈل يېغىنىنى نىيلۇفەر يېغىنى ياكى ئەرىقى گۈل بىلەن بىرلىكتە تېمىتىش ياكى قاپاق يېغىنى قىز تۇغقان ئايال سۈتى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تېمىتىش كېرەك، سەندەل، گۈل ئەرىقى، نىيلۇفەر، كافۇرلارنى بۇرۇنغا پۇرۇتۇش كېرەك.
2. بۇرۇننىڭ مىزاجىنى تەكشۈشكە ئامال قىلىش، يەنى سوۋۇتقۇچى، ھارارەتنى پەسەيتكۈچى دورىلارنى ئىشلىتىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن گۈل يېغىغا نىيلۇفەر يېغىنى ياكى ئەرىقى گۈل قوشۇپ بۇرۇنغا تېمىتىلىدۇ. سەندەلنى گۈل ئەرىقىگە چىلاپ تەمى چىقىرىلغان دورا سۇيۇقلۇقىدا پاكىز رەختنى ھۆل قىلىپ بۇرۇنغا قويۇش كېرەك. ئەگەر ھارارەت مېڭىگە قاراپ ئۆرلىگەن بولسا قاپاق ئورۇقى مېغىزى سېلىنغان نىيلۇفەر يېغىنى ياكى گۈل ئەرىقى قوشۇلغان گۈل يېغىنى بۇرۇنغا تېمىتىش كېرەك. يەككە دورىلاردىن سەندەل، كافۇر، نىيلۇفەر، قاپاق ئۆسۈملۈكىنىڭ گۈلى، خەشخاش قاتارلىقلارنىڭ قايسىسى تېپىلسا شۇنى پۇرۇتۇش كېرەك.
3. زۇكامنى ئاكتىپ داۋالاپ ساقايتىش كېرەك. زۇكام ساقايسا بۇرۇن ئېچىشىشمۇ



تۈزلىكىدىن ياخشىلىنىپ قالىدۇ.

بۇرۇنغا بۇرۇننى غىدىقلىغۇچى دورىلارنى تېمىتىشتىن ساقلىنىش كېرەك. سوغۇق ھاۋانىڭ تەسىرىدىن بولغان بۇرۇن ئېچىشىنى داۋالاشتا يېمەك-ئىچمەك ئارقىلىق مىزاجنى تەڭشەش كېرەك. ئەگەر بەدەن بەرداشلىق بېرەلسە ئارتۇق ماددىلارنى تازىلاش ئۈچۈن ئىستىفراغ قىلىش كېرەك. ئەگەر بەدەن ئاجىز بولسا ياكى بەدەننى تازىلاشقا شارائىت بولمىسا تۈرۈك سۈيىنى ئىچكۈزۈش ھەمدە ئۇنى تەدرىجىي ئاشۇرۇش كېرەك. بۇ مېڭە ۋە جىگەرنىڭ مىزاجىمۇ ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.

### كۆپ چۈشكۈرۈش

كۆپ چۈشكۈرۈش (ئوتاس) ھەر خىل ئىچكى-تاشقى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ئارقا-ئارقىدىن توختىماي چۈشكۈرگەنلىكىگە ياكى ئۇنىڭ ئۇزۇن مۇددەت داۋاملاشقانلىقىغا قارىتىلغان. بەزىلەردە كۆپ چۈشكۈرۈش بىر-ئىككى ئاي، ھەتتا بەش ئالتە ئاي داۋاملىشىشىمۇ مۇمكىن.

چۈشكۈرۈش ئەسلىدە مېڭىنى ھەر خىل يېقىمىز ماددىلارنىڭ تەسىرىدىن ساقلايدىغان بىر خىل تەبىئىي مۇداپىئە پائالىيىتىدىن ئىبارەت بولسىمۇ، لېكىن ئۇ ھەددىدىن زىيادە كۆپ بولسا ۋە ئۇزاق داۋاملاشسا، ئەكسىچە بەزىبىر زىيانلارنىمۇ كەلتۈرىدۇ مەسىلەن: ئېغىر دەرىجىدە بۇرۇن قاناش، تەپ ۋە باشقا قىزىتمىلىق كېسەللەردە بىمارنىڭ قۇۋۋىتىنى ئاجىزلاشتۇرۇشلارغا سەۋەب بولىدۇ. شۇڭا ئادەتتە، زۇكام ۋە تەپنىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىدە كۆپ چۈشكۈرۈش ياخشى ئەمەس، دەپ قارىلىدۇ.

سەۋەبى

كۆپ چۈشكۈرۈش ئىچكى ياكى تاشقى ئامىللارنىڭ تەسىرىدىن كېلىپ چىقىدۇ. مەسىلەن: ئىچكى ياكى تاشقى ئامىللار تۈپەيلىدىن مېڭىگە بىرەر مۇخالىپلىق يەتسە، مېڭە ئۇنى دەپنى قىلىش (يوقىتىش) ئۈچۈن چۈشكۈرىدۇ ياكى بۇرۇن ئىچى سوزۇلما خاراكىتىرىلىك ۋە رەمىدە بىمار چاڭ-توزان، غىدىقلىغۇچى



پۇراقلارغا يولۇققاندا توختىسماي چۈشكۈرۈشكە مەجبۇر بولىدۇ، بەزى كىشىلەردە بۇرۇن ئىچىدىكى قىل تومۇرلاردا سۇددە (توسالغۇ) پەيدا بولۇپ ئوقۇنە تلىنىش نەتىجىسىدە كۆپ چۈشكۈرۈش كېلىپ چىقىدۇ.

### ئالامىتى

بۇرۇن ئىچى قىچىشىپ، داۋاملىق غىدىقلىنىپ ئارقا-ئارقىدىن چۈشكۈرىدۇ. بۇرۇندىن سۇ ئاقىدۇ، چۈشكۈرۈش سەل توختىغاندا بۇرۇن ئىچى قۇرۇپ، قىزىرىپ، ئىچىشىدۇ. گەرچە زۇكامغا ئوخشاش ئالامەتلەر بولسىمۇ، قىزىش، باش ئاغرىش قاتارلىقلار بولمايدۇ.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن سەۋەبىنى ئېنىقلاش، مېڭىگە يامان تەسىر كۆرسىتىۋاتقان ماددىنى تېپىپ سۈرۈپ چىقىرىشقا ئامال قىلىش كېرەك.

ئادەتتە ھەببى ئىيارەج، ھەببى رەۋەن، ھەببى بىنەپشە، مەتبۇخى ھەلىلە، مەتبۇخى شاھتەررە، شەرىبىتى بىنەپشە، شەرىبىتى خەشخاش قاتارلىقلارنى زۆرۈرىيەتكە قاراپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

كۆپ چۈشكۈرۈشكە بۇرۇن ۋەرەمى سەۋەب بولغان بولسا، ئاز مىقداردىكى مامىرانچىنىنى سۇدا قاينىتىپ بۇرۇنغا ئېلىش ۋە باشقا چارىلەر بىلەن بۇرۇن ئىچىدىكى ۋەرەمنى داۋالاش لازىم.

خۇش بۇي ياغلاردىن گۈل يېغى، بىلىسان يېغى، بىنەپشە يېغى، سۆگەت يېغىدىن قايسى بىرى بولسا شۇنى بۇرۇنغا تېمىتىش، ئاز مىقداردىكى ئەپيۇننى كۈندە بىر قېتىم پۇرىتىش كېرەك. باشقا يىلمان سۇ قۇيۇش، يۇقىرىدىكى ياغلاردىن بىرنى قۇلاققا تېمىتىش، قۇلاق يۇمشىقىنى ئوۋۇلاش، قىزىق ئاتىلا ئىچىش، گەدەنگە يۇمشاق ياستۇق قويۇپ بويۇن ساھەلىرىنى تۆۋەت بىلەن ئوۋۇلاپ بېرىش، كۆرپىدە يېتىپ ئۇيان-بۇيان دۇملاشقا بۇيرۇش چارىلىرىنىڭمۇ بەلگىلىك دەرىجىدە مەنپەئەتى بار. كېسەل كىشىنى قاتتىق ئويلىنىش، مۇھىم ئىشلارغا جىددىي مەشغۇل بولۇش، ئالما پۇراشتىن ساقلىنىشقا دەۋەت قىلىش كېرەك. چۈنكى بۇ ئامىللار چۈشكۈرۈشنى كۈچەيتىپ قويىدۇ. چاڭ-توزانلار، غىدىقلىغۇچى پۇراقلار ۋە





بەدبۇي ھىدىلاردىن ساقلىنىشنىڭ كۆپ چۈشكۈرۈشنى تازايتىشقا بەلگىلىك دەرىجىدە ياردىمى بار.

كىچىك بالا كۆپ چۈشكۈرسە قوي بۆرىكىنى ئوتتا كاۋاپ قىلىپ، تامغان سۈيىنى بالىنىڭ بۇرغىغا تېمىتىش ياكى سۈركەش كېرەك.

### ئەسكەرتىش

كۆپ چۈشكۈرۈش مېڭىسىدە ھارارەت بار كىشىلەرگە پايدىلىق ئەمەس. كۆكرىكىدە ماددا كۆپ، بۇرنى كۆپ قاتنايدىغان كىشىلەرگە زەرەر قىلىدۇ.

تۆۋەندىكى ئۈچ خىل كىشىگە چۈشكۈرۈش پايدىلىق بولۇپ ھېسابلىنىدۇ:

1. بېشىدا ئازراق بۇخار ياكى يەل بار، يەڭگىل دەرىجىدە خىلىت بار كىشىلەرگە چۈشكۈرۈش پايدىلىق.

2. مېڭىدە ماددا بولۇپ مەزكۇر ماددا پىشقان كىشىلەرگە چۈشكۈرۈش مەنپەئەت قىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن زۇكامنىڭ ئاخىرقى مەزگىللىرىدىكى چۈشكۈرۈش ياخشى، دەپ قارىلىدۇ.

ئەگەر ماددا كۆپ ۋە قويۇق بولۇپ مەزكۇر ماددا پىشقان بولسىمۇ بىمار چۈشكۈرمىسە مېڭە ئاجىزلاپ كەتكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

3. تۇغۇت ئۈستىدىكى يەنى تۇغۇتقان ئاياللار چۈشكۈرسە بالىنى ۋە ھەمىرىنى ھەيدەپ چىقىرىشقا ياردىمى بولىدۇ.

## بۇرۇن سېسىق پۇراش

بۇرۇن سېسىق پۇراش (بەخىرۇلكەنفى) بەزى كىشىلەر تىنغاندا بۇرۇندىن سېسىق پۇراق چىققانلىقىغا قارىتىلغان بولۇپ، ئوتتۇرا ياشلىق كىشىلەردە كۆپرەك ئۇچرايدۇ.

سەۋەبى

پىشمىغان بەلغەم ماددىسى ياكى غەيرىي تەبىئىي خۇن بۇرۇن ئىچىدىكى قان





تومۇرلىرىدا ۋە شىللىق پەردىلىرىدە توختاپ قېلىپ، ئوقۇنەت ھاسىل قىلىش بىلەن تەدرىجىي ھالدا دىماقتىن سېسىق پۇراق كېلىشكە سەۋەبچى بولىدۇ. بەزى كىشىلەردە بۇرۇن ئىچىگە بوۋاسىر پەيدا بولۇپ ياكى ھەر خىل چاقىلار چىقىپ ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ ئوقۇنەت ھاسىل قىلىش بىلەن دىماق سېسىق پۇرايدۇ. بەزى كىشىلەردە ئاتشەك كېسىلىنىڭ يېلى بۇرۇن ئىچىگە تەسىر كۆرسىتىش بىلەن بىرگە ئۇزۇنغا سوزۇلسا، تەدرىجىي ھالدا سېسىق پۇراشقا سەۋەبچى بولىدۇ. بەزى كىشىلەردە چاشقان يارىسى، ئۆپكە سىلى قاتارلىق كېسەللەرنىڭ بۇخارلىرى تىنق يوللىرى ئارقىلىق سىرتقا چىقىپ سېسىق پۇراشنى كەلتۈرىدۇ.

### ئالامىتى

بىمار تىنغاندا بۇرۇندىن سېسىق پۇراق چىقىدۇ. ئەمما كۆپىنچە ھاللاردا ئۆزىگە بىلىنمەي ئەتراپىدىكى كىشىلەرگە ئاسانلا سېزىلىدۇ. بىمارنىڭ بۇرۇن ئىچى قۇرۇپ، دىمىقى چىڭقىلىپ تىنقى بىر نەرسە توسالغاندەك سىقىلىپ چىقىدۇ. بەزى كىشىلەرنىڭ بۇرۇن ئىچىگە ئازراق چاقا چىقىپ، بۇرۇن سىرتقا ئۇششاق مۇدۇرلەر پەيدا بولۇپ قىزىرىپ قالىدۇ.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن سەۋەبىنى ۋە ئوقۇنەت پەيدا قىلغان خىلىنى ئېنىقلاش كېرەك. خىلىتىن بولغان بولسا ئۇنى پىشۇرۇش، تازىلاش ئارقىلىق نورماللاشتۇرۇش كېرەك. پىشۇرۇپ تازىلاش، تەكشۈش ئۈچۈن مەتبۇخى ئەفتمۇن، ھەببى ئىبارەج، جەۋارىش مىشكى، سىركەنجىپىن بۇزۇرى قاتارلىق دورىلارنى بېرىش ھەمدە ئۇزۇن مۇددەت شارابى رەبھان ئىستېمال قىلدۇرۇش لازىم.

سىرتىدىن سۇنىيۇل، قەلەمفۇر، قىزىل گۈللەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، بۇرۇنغا تارتىش ياكى ئازراق پاختىدىن پىلتىككۈچ ياساپ توخۇم ئېقىغا چىلاپ ئۇنى مەزكۇر دورىلارغا يۇقتۇرۇپ ئەتكەن، ئاخشامدا بۇرۇنغا تىقىپ قويۇش كېرەك. شارابى رەبھان بىلەن بۇرۇننى چايقاش ياكى رەبھان، سۇنىيۇل، سەئىدى كوفى، ئۇدى ھىندى، ئاق سەندەل قاتارلىق دورىلارنى يەككە ھالەتتە ياكى ھەممىسىنى بىرلەشتۈرۈپ سۇدا قاينىتىپ، سۈزۈپ سۈيى بىلەن كۈندە ئۈچ قېتىم بۇرۇننى چايقاش ياكى بۇ دورىلارنىڭ قاينىتىلغان





ھورغا بۇرۇننى قايتا-قايتا تۈتۈپ تەرلىتىش كېرەك. تۈنۈگۈندىن باشقا بىلسان يېغى، زەيتۇن يېغى، گۈل يېغى قاتارلىق ياغلارغا ئاز مىقداردا كافۇر قوشۇپ ئەتىگەن ئاخشامدا بۇرۇننى ياغلاش كېرەك.

### بۇرۇن كۆپۈشۈش

بۇرۇننىڭ كۆپۈشۈپ قېلىشى (ئىستىفاخۇكە نفى) كىچىك بالىلار بۇرۇننىڭ بەزىدە كۆپۈشۈپ يوغىناپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان بولۇپ، بۇرۇندا چىكىلىش ۋە ئازراق تاغرىش سېزىمى بولغاچقا بىمار بالا بىئارام بولۇپ جىدەلخورراق بولۇپ قالىدۇ.

#### داۋاسى

كېسەللىك كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى سەۋەبلەرنى ئېنىقلاشقا تىرىشىش ۋە شۇنىڭغا قارىتا چارە تەدبىر قىلىش لازىم. ئەگەر، بۇرۇندا بەزىگە ئوخشاش نەرسە بولسا ئاكتىپ داۋالاش كېرەك. بولمىسا يامان ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ئەگەر، بىمار سۈت ئېمىۋاتقان كىچىك بالا بولسا ئانىسىنىڭ يېمەك-ئىچكىگە قاتتىق پەرھىز بەلگىلەپ بېرىش كېرەك. ئەگەر، ئىستىفراغ قىلىشقا ھاجەت چۈشسە بەدەننى ئىستىفراغ قىلىش كېرەك.

قىچىنى سوقۇپ ياخشىغا ملەپ بۇرۇندا قىچىشىش سېزىمى پەيدا بولغىچە بۇرۇن تۈشۈكىگە تىنقىپ بېرىش كېرەك. ئەگەر، بۇرۇن كۆپۈشۈش ئېغىرراق بولۇپ ئىششىق دەرىجىسىگە يەتكەن بولسا ئىششىق ياندۇرغۇچى مەلھەملەرنى سۈرتۈش كېرەك.

### بۇرۇن قورۇلۇش

بۇرۇننىڭ قورۇلۇپ قېلىشى (ئىستىقبازۇكە نفى) نەپەس ئالغاندا بۇرۇن تۆشۈك





قاناتلىرىنىڭ ئىچىگە تارتىشىپ قورۇلۇپ قالىدىغانلىقىغا قارىتىلغان. مەزكۇر كېسەللىك تولراق كىچىك بالىلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ.



سەۋەبى

مەزكۇر كېسەللىك كۆپىنچە پۈتۈن بەدەن بولۇپمۇ مېڭىنىڭ مزاجى بۇزۇلۇپ بۇرۇنغا تەسىر قىلغانلىقتىن بۇرۇن قاناتلىرى بوشاپ بىمار نەپەس ئېلىش بىلەنلا بۇرۇن قاناتلىرى قورۇلۇپ قالىدۇ.

ئالامىتى

مەزكۇر كېسەللىك چوڭلارغا قارىغاندا كىچىك بالىلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ. گەرچە بۇرۇندا باشقا غەيرىيلىك بولمىسىمۇ نەپەس ئالغاندا بۇرۇن قاناتلىرى نەپەس بىلەن تەڭلا تارتىلىپ قورۇلۇپ قالىدۇ. گەرچە تۇنجۇقۇپ قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقارمىسىمۇ دىمىقتۇرۇپ بىمارنى بىئارام قىلىدۇ. نەپەس چىقارغاندا بۇرۇن يەنە ئەسلىگە كېلىپ قالىدۇ.

داۋاسى

سۈت ئېمۇۋاتقان بالا بولسا بېشىغا دائىم ئانىسىنىڭ سۈتىنى سېغىش كېرەك. يېڭى سېغىلغان سۈتنى ئۇيۇتۇپ بېشىغا چاپلاپ، ئۈستىگە ئىسبە غۇل يوپۇرمىقىنى يېپىپ قويۇش كېرەك. بۇرۇنغا بىنەپشە يېغى تېمىتىش، باش ساھەسىنى خەشخاش سۈيى بىلەن يۇيۇش كېرەك. ئانىسى ئىسسىقلىق پەيدا قىلغۇچى يېمەك-ئىچمەكلەردىن پەرھىز تۇتۇشى، بۇنىڭ ئۈچۈن ئارپا تۈندىن قىلىنغان تاماقلارنى ئىستېمال قىلىش لازىم.

## بۇرۇن ۋە رەملىرى

بۇرۇن ۋە رەملىرى (ئىلتىھابۇلئەنفى، ئەۋرامۇلئەنفى، ۋە رەمى بېنى) بۇرۇن





ئىچىدىكى نېپىز پەردىنىڭ ۋەرەملىشى (ئىششىشى) گە قارىتىلغان بولۇپ، ئۆتكۈر خاراكتېرلىك بۇرۇن ۋەرمى (ۋەرەمى بىنى ھار) ۋە سوزۇلما خاراكتېرلىك بۇرۇن ۋەرەمى (ۋەرەمى بىنى مۇزەن) دەپ ئىككىگە ئايرىلىدۇ. كېيىنكىسى دائىم تەكرارلىنىپ، ئۆزۈنغا سوزۇلىدۇ.

### سەۋەبى

سەۋەبى بىر قەدەر كۆپ بولۇپ، ئومۇمەن ھەر خىل ئىچكى - تاشقى ئامىللارنىڭ بۇرۇنغا يامان تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئىچكى جەھەتتە، خىلىتلارنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشى، ئەجدادلاردىن مىراس قېلىشى، يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر بولۇپمۇ زۇكام، قىزىل قاتارلىق كېسەللىكلەر بىلەن ئاغرىش، ھارارەت ۋە ھۆلۈكلەرنىڭ ئۈستۈمۈت ئۆزگىرىشى، دائىم قەۋزىيەت بولىدىغان يۈرەك ۋە بۆرەك كېسىلى بار كىشىلەرنىڭ بۇرۇن ئىچى دائىم قىزىرىپ قانغا تولۇشى قاتارلىق سەۋەبلەردىن بۇرۇن ياللۇغى كېلىپ چىقىدۇ.

تاشقى جەھەتتە، تۇرمۇش شارائىتى ۋە كەسپى خىزمەتلەر تۈپەيلىدىن بۇرۇنغا دائىم ئىس - تۈتەك، چاڭ - توزان، ئاشلىق (كۆپىنچە بۇغداي) چاڭلىرى، ئوت - چۆپ، يۇڭ - تېرە، گۈل - چېچەك چاڭلىرى ۋە خامان سورۇش ياكى تۆگمەندە ئون قاچىلاش جەريانىدا پەيدا بولغان چاڭلار كىرگەنلىكتىن مىزاج خىلىتسىز ئۆزگىرىپ ھەمدە بۇرۇن شىللىق پەردىلىرى يامان تەسىرگە ئۇچراپ ئىلتىھابلىنىپ بۇرۇن ياللۇغى كېلىپ چىقىدۇ. ياكى بۇرۇن ۋەرەملەنگەندىن كېيىن ئۆز ۋاقتىدا توغرا ۋە ئىزچىل داۋالانماي سوزۇلما ھالەتكە ئۆتۈپ قالغاندا سوغۇق ھاۋا ياكى يۇقىرىقى ئامىللارغا قايتا يولۇقسا بۇرۇن ئىچى قىچىشىپ، بۇرۇندىن سۇ، كۆزدىن ياش ئېقىپ چۈشكۈرۈپ بۇرۇن ۋەرەمى قايتا قوزغىلىدۇ.

### ئالامىتى

بۇرۇن ۋەرەملىرىنىڭ قايسى خاراكتېرىدىكىسىدە بولمىسۇن بۇرۇن پۈتۈش ياكى بۇرۇندىن سۇيۇقلۇق كېلىش ئاساسىي ئالامەت بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

ئۆتكۈر خاراكتېرلىك بۇرۇن ۋەرەمىدە بۇرۇندىن توختىماي سۇيۇقلۇق كېلىش ئاساسىي ئالامەت بولۇشتىن سىرت بۇرۇن پۈتۈش، باش ئاغرىش، بەدەن قىزىش، بۇراش سېزىمى تۆۋەنلەش قاتارلىق ئالامەتلەر قوشۇلۇپ كېلىدۇ.







سوزۇلما خاراكتېرلىك بۇرۇن ۋە رەمىدە ئۇزۇن مۇددەت بۇرۇن پۈتۈش ئاساسىي ئالامەت بولۇشتىن سىرت بۇرۇندىن سۇيۇقلۇق كېلىش، پۇراش سېزىمى تۆۋەنلەش قاتارلىق ئالامەتلەر قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

بۇرۇن ۋە رەمىلەرنىڭ يۇقىرىقى ئىككى خىلدىلا خىلىت ئۆزگەرگەنلىك ياكى مزاجنىڭ خىلىتسىز (ماددىسىن) ئۆزگەرگەنلىكىگە ئائىت بولغان ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. سوغۇق ئۆتۈش، رەسمىي زۇكام، باشقا يۇقۇملۇق كېسەللىكلەردىن سادىر بولغانلىرىدا بۇرۇن ئىچى قىزىرىدۇ، قىچىشىدۇ، ئاغرىدۇ. ھەتتا پۈتۈن بەدەن قىزىرىدۇ. دىماق پۈتۈپ تۇرىدۇ، ئوخلىغاندا ئېغىرلىشىدۇ. قايسى تەرەپنى بېسىپ ياتسا شۇ تەرەپ بۇرۇن تۆشۈكى پۈتۈپ قالىدۇ. باش چىڭقىلىدۇ، چۈشكۈرىدۇ. بۇرۇن ئىچى تەكشۈرۈلسە بۇرۇن شىللىق پەردىلىرى قىزارغان بولىدۇ. بۇرۇن ۋە رەمىلىرى ئۇزاق داۋاملاشسا بۇرۇننىڭ پۇراش ئىقتىدارىغا دەخلى يېتىدۇ.

#### داۋاسى

ئالدى بىلەن سەۋەبىنى ئېنىقلاش، ئەگەر خىلىتلەرنىڭ غەيرى تەبىئىي ئۆزگىرىشلىرى ياكى مزاج ئۆزگىرىشى سەۋەبىچى بولغان بولسا، ئۇلارنى تۈزىتىش، تەڭشەش تەدبىرلىرىنى قىلىش لازىم. تۇرمۇشقا، كەسپكە باغلىنىشلىق سەۋەبلەردىن بولسا، بىمارغا مۇمكىن قەدەر كەسپنى ئالماشتۇرۇشنى تەۋسىيە قىلىش، تۇرمۇشتىكى تەسىر قىلغۇچى ئامىللاردىن ساقلىنىش ياكى يىراقلىشىش لازىملىقىنى تاپلاش كېرەك. مۇھىم چارىلەرنىڭ بىرى بەدەننى چېنىقتۇرۇپ تەبىئەتنى (بەدەننىڭ قارشىلىق كۈچىنى) كۈچەيتىشكە ئېتىبار بېرىشتىن ئىبارەت. شۇڭا بىمارلارغا مۇۋاپىق تەنھەرىكەت قىلىش ۋە جىسمانىي ئەمگەك قىلىپ بەدەننى چېنىقتۇرۇش ھەققىدە تەۋسىيە قىلىش لازىم.

مەشجۇنى ئازراقى، ھەببىي ئازراقى قاتارلىق دورىلار بەدەندىكى سەسكىنىش (ھەسسالىق) نى تۆۋەنلىتىشكە ياردەم بېرىدۇ. ئىبارەجى فەيقەرا، ھەببىي قوقيا، ھەببىي شىفا، مەتبۇخى ھەلىلە، ئەرقى ئەنگۈرى شىفا (ئىت ئۈزۈمى) لاردىن بىرنى ياكى ئىككىسىنى تاللاپ بىمارنىڭ ئىچىشىگە بېرىش لازىم. بۇرۇن ئىچىگە گۈل يېغى، بىنەپشە يېغىنى سىركىگە قوشۇپ ياغلىسىمۇ، تېمىسىمۇ بولىدۇ.





## بۇرۇن قاناش

بۇرۇن قاناش (رۇئاف) كۆپىنچە ئۇشتۇمتۇت قانغانلىقىغا قارىتىلغان بولۇپ، بەزىلىرى ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ تەكرار داۋاملىشىدۇ.

### سەۋەبى

1. ئۆتكۈر قىزىتمىلىق كېسەللىكلەر، مەسلەن: قارا كېزىك، سەرسام (مېڭە پەردە ياللىغى)، زاتىرىيە، قىزىل، بوغما، ئېغىر زۇكام قاتارلىق كېسەللەرنىڭ بۆھران كۈنلىرىدە تەبىئەت (بەدەننىڭ قارشىلىق كۈچى) كۈچلۈك كېلىپ كېسەلنى يەڭگەنلىكتىن بۇرۇن قانايدۇ. ئىسسىق (ئاپتاپ) تۆتۈشتىنمۇ بۇرۇن قاناش كېلىپ چىقىدۇ.

2. ئومۇمىي بەدەندە ئىچكى-تاشقى ئامىللارنىڭ تەسىرىدىن سەپرا ماددىسى غالىب كېلىپ قاننى سۇيۇلدۇرۇپ، بۇرۇن ئىچىدىكى توششاق قان تومۇرلارنىڭ يېرىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقتىن بۇرۇن قانايدۇ.

3. مېڭىنىڭ تېگىدىكى قان تومۇرلىرى چىڭقىلىپ يېرىلىش، ئۈزۈلۈشتىن بۇرۇن قانايدۇ.

بۇنىڭدىن باشقا بەزى كىشىلەردە بۇرۇنغا بىر نەرسە تېگىش، يىقىلىش تۈپەيلىدىن بۇرۇننىڭ ئىچىدىكى تومۇرلار زەخمىلىنىپ بۇرۇن قانايدۇ.

زەھەرلىك يىلانلار چاققاندىمۇ قان سۇيۇلۇپ بۇرۇن قاناش كېلىپ چىقىدۇ. جىگەر قاتارلىق قان ھاسىل قىلغۇچى ئەزالارنىڭ خىزمىتى ناچارلاشقاندا، بۆرەك كېسەللىكلىرىدە، قان تومۇرلىرىنىڭ خىزمىتى ناچار كىشىلەر يۈگۈرگەندە ۋە سەكرىگەندىمۇ بۇرۇن قانايدۇ.

بۇرۇننى بارماق بىلەن كولاپ توششاق تومۇرلارنى زەخمىلەندۈرۈپ قويسىمۇ بۇرۇن قانايدۇ. پىشانە ئاستىدىكى سۆڭەك سۇنغاندىمۇ بۇرۇن قاناشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن.



## ئالامىتى

ئۆتكۈر يۇقىرى قىزىتمىلىق كېسەللىكلەرنىڭ بۆھران كۈنلىرىدە يۈز بەرگەن بۇرۇن قاناشتا بۇرۇن ئۇشتۇمۇت قاناپ قويۇق قارامتۇل قان كېلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بىماردا تەرلەش، ئىچى سۈرۈش، قىزىتما چۈشۈشتەك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

بۇرۇن قانسىغان مەزگىللەردە كېزىك، قاتتىق زۇكام، ئاپتاپ تۆتۈش قاتارلىق سەۋەبلەر كۆرۈلسە ئۆزىگە خاس بەلگىلىرى كۆرۈلىدۇ. مەسىلەن، بەدەن قىزىش، باش ئاغرىش كۆڭۈل ئېلىشىش قاتارلىقلار.

2. سەپرا ماددىسىنىڭ غالىبلىقىدىن بولغان بۇرۇن قاناشتا سەپرا غالىبلىقىنىڭ ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. بۇرۇندىن چىققان قان سۇيۇق، سۇس قىزىل رەڭدە بولۇپ، قان تەسلىكتە توختايدۇ. قاناش ئۇزۇنغا سوزۇلۇش ياكى ئادەتكە ئايلىنىپ قېلىشتەك ئەھۋاللار كۆرۈلىدۇ. چىرايى سارغۇچ، تىل گېزى سېرىق، نومۇرى تېز، ئىنچىكە بولىدۇ.

3. مېڭە قان تومۇرلىرىنىڭ يېرىلىشىدىن بولغان بۇرۇن قاناشتا ئاۋۋال باش قاتتىق ئاغرىيدۇ. يۈزى، كۆزى قىزىرىدۇ. بۇرۇندىن چىققان قان جىرتىلداپ چىقىدۇ. چىققان قان سۇيۇق، ساپ قىزىل رەڭدە بولىدۇ. پات-پات قانايدۇ، چىققان قان ئىسسىق بولسا شەريان تومۇرىنىڭ يېرىلغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.

بىرەر ھادىسە سەۋەبىدىن زەخىمىلەنگەنلىكتىن بولغان بۇرۇن قاناشتا باش ئايلىنىش، سەكتە، سۇبات كېسەللىكلەردىكىگە ئوخشاش مېڭە چالغۇتۇش، مېڭە خىزمىتى يۈزۈلۈش ئالامەتلىرىمۇ قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

زەھەرلىك يىلان چاققاندىن بولغان بۇرۇن قاناشتا زەھەرلىك يىلان چاققانلىق تارىخى بولىدۇ ھەمدە زەھەرلىك يىلان چاققاندا كۆرۈلىدىغان ئالامەتلەر قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

قان ھاسىل قىلغۇچى ئەزالارنىڭ خىزمىتى ئاجىزلاشقاندىن بولغان بۇرۇن قاناشتا ئىلگىرى شۇ ئەزالار خىزمىتى ئاجىزلاشقانغا دائىر ئالامەتلەر بولغان بولىدۇ ۋە باشقىلار.

## داۋاسى

1. بۆھراننىڭ تەسىرىدىن بۇرۇن قانغاندا قاننى توختىتىشقا چارە قىلمىسىمۇ ئۈزلۈكسىز توختايدۇ ياكى قايتا تەكرارلانمايدۇ. بۇ خىلدىكى بۇرۇن قاناش بۆھراننى كەلتۈرۈپ كېسەللىكلەرگە كۆپىنچە ھاللاردا پايدىلىق بولۇپلا قالماستىن، بەلكى نومۇردىن قان

ئېلىشنىڭ رولىنى ئوينىشى مۇمكىن. لېكىن قاناش بەك ئېغىر دەرىجىدە بولسا مۇۋاپىق چارە قىلىش لازىم.

2. سەپرا ماددىسىنىڭ ئېشىپ كەتكەنلىكىدىن بولغان بۇرۇن قاناشنى داۋالاشتا قاننىڭ تېزلىكى ۋە سەپرانىڭ ئۆتكۈرلۈكىنى پەسەيتىپ نورماللاشتۇرۇش ئۈچۈن دەرھال باشنى سوغۇق سۇ بىلەن يۇيۇش، باشمالتاق بىلەن يۇقىرىقى كالىپۇكنىڭ دەل ئوتتۇرىسىنى بېسىش، يۇقىرى بىلەكنى بوغۇش، ئىككى قۇلاقنى ئۇۋۇلاش، ئىككى پۇتنى ئىسسىق سۇغا چىلاش لازىم ھەمدە چىلان شەرىپتى، نىلۋەھەر شەرىپتى، زىرىشك شەرىپتى، مەتبۇخى ھەلىيلە، مەتبۇخى شاھتەررە، رىباس شەرىپتى قاتارلىقلارنى كېسەلنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا قاراپ بېرىش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىرگە قەغەزنى كۆيدۈرۈپ كۆلنى كۆك يۇمىغاقسۇت سۈيى ياكى ئاياللارنىڭ سۈتى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ بۇرۇنغا سېلىش لازىم.

10 گرام زەمچىنى سوقۇپ 100 گرام سىركە بىلەن قاپنىتىپ يېرىمى قالغاندا سۈزۈپ بۇرۇنغا تېمىتىش لازىم.

سىرتتىن گىلى ئەرمىنى 3 گرام، نىشاستە 3 گرام، كافۇردىن 1 گرام ئېلىپ يۇمشاق ئېزىپ، سىركىگە ئارىلاشتۇرۇپ، بۇرۇنغا تېمىتىلىدۇ ياكى پىلتىكۈچ ياساپ ئۇنى تۇخۇم ئېقىغا مېلەپ ئاندىن يۇقىرىقى تالقانلارنى يۇقتۇرۇپ بۇرۇننىڭ ئىچىگە سېلىنىدۇ. سەندەل، كافۇرلارنى گۈلاپتا سۈرۈپ ياكى ئېزىپ پىشانغا چېپىش مۇمكىن.

بادرۇج (تاغ رەيھىنى) نىڭ سۈيىنى بۇرۇنغا تېمىتىش قاننى توختىتىش رولىنى ئوينايدۇ. باش ئارقىسىدىكى چوڭقۇرچاققا لوڭقا قويۇشنىڭمۇ بۇرۇن قاناشنى توختىتىش ئۈچۈن پايدىسى بار. بەزىدە ئوڭ بۇرۇن توشۇكى قانسا جىگەر ساھەسىگە، سول بۇرۇن توشۇكى قانسا تال ساھەسىگە لوڭقا قويىش مۇمكىن.

كېسەلنىڭ يېشىنى ئېگىزەك قويۇپ ئوڭدىنغا ياتقۇزۇپ، باش ۋە قاننىڭ سوغۇق سۇغا چىلانغان لۆڭگە قويۇپ، پات-پات پەڭگۈشلەپ تۇرۇش لازىم.

ئەگەر بۇرۇن قاناش ياخشى بولماي تۇرۇنغا سوزۇلسا، قۇرسى كەھرىبا، شەرىپتى ئەنجىياھار بېرىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن گىلى ئەرمىنى، نىشاستىدىن باراۋەر ئېلىپ بىر ئاز كافۇر قوشۇپ سىركە بىلەن خېمىر قىلىپ، چېكىگە بىر قانچە قېتىم تېگىش كېرەك.

3. مېگە تومۇرلىرى يېرىلىشتىن بولغان بۇرۇن قاناشنى داۋالاشتا زاك، زەنگار ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش كۆيدۈرگۈچى، قۇرۇتقۇچى دورىلار ئىشلىتىلسە، بۇرۇن ئىچىدە چاقا پەيدا قىلىپ قاننى توختىتىدۇ. لېكىن بۇنداق دورىلارنى ئىشلىتىشتە بەك ئېھتىيات قىلىش

لازم. چۈنكى ئۇلار قۇرۇق چاقا پەيدا قىلىدۇ. مەزكۇر چاقىلار سويۇلۇپ كەتسە تېخىمۇ كۆپرەك قاناشقا سەۋەبچى بولۇشى مۇمكىن.

موزا، يۇمغاقسۇت تۇرۇقى، تۈگمەن تۈزۈندىسى، كۈندۈر، سەبرى، خونسيياۋشان، زەمچە قاتارلىق دورىلارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، تالقان تەييارلاپ لازىم بولغاندا پاختىنى تۇخۇم ئېقىغا چىلاپ تالقانىنى يۇقۇرۇپ بۇرۇن تۆشۈكىگە قاپلاپ قويسىمۇ بولىدۇ. بەزىدە مەزكۇر تالقانىنى نەيچە ئارقىلىق بۇرۇن ئىچىگە پۈركىسىمۇ قان توختىتىش رولىنى ئوينايدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە كېسەل كىشىنى جىم ياتقۇزۇپ ئارام ئالدۇرۇش، پىشانىسىغا مۇز تېگىش، باشقا سوغۇق سۇ قۇيۇش كېرەك.

ئەگەر بۇرۇن قاناش ئادەتكە ئايلىنىپ پات-پات قانايدىغان بولۇپ قالسا، قاننى قويۇلدۇرىدىغان يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلدۇرۇش، قۇرسى كەھربا، شەرىپتى ئەنجىباھار، شەرىپتى خەشخاش، شەرىپتى ھەببۇلكاسلارنى ئىستېمال قىلدۇرۇپ قاننىڭ قويۇقلىشىشىغا ئاساس يارىتىش كېرەك.

ئومۇمەن، بۇرۇن قاناش دورىلار بىلەن توختىمىسا ۋە جىق قان چىقىپ كېتىش ئېھتىمالى بولسا، بىلەكنى قولتۇقتىن، چوڭ يوتىنى يېرىقتىن چىڭ بوغۇپ قويۇش كېرەك. بۇنىڭ بىلەن بەدەندىكى قان بوغۇلغان تەرەپكە تارتىلىپ بۇرۇن قاناشنىڭ توختىشىغا چوڭ ياردىمى بولىدۇ. لېكىن قولىنى قولتۇقتىن، يوتىنى يېرىقتىن بوغقاندا قالغان جايلارنى ئوچۇق قالدۇرۇش كېرەك. ئەگەر ئۇنداق قىلماي قول ۋە يوتىنىڭ ھەممە جايلىرىنى ماتا بىلەن يۆگەپ تاشلىسا قول، پۇت ئۇچلىرىدىكى قاننى سىقىپ ئومۇمىي بەدەندە ئايلىنىدىغان قان مىقدارىنى كۆپەيتىپ قويدۇ. بۇنداق قىلىش خاتا بولۇپلا قالماي، بەلكى بۇرۇن قاناشنى توختىتىشقا ئىنتايىن پايدىسىز. يەنە شۇنىڭغىمۇ دىققەت قىلىش كېرەككى، بوغۇلغان جاينى پات-پات بوشتىپ تەكرار بوغۇپ تۇرۇشقا دىققەت قىلىش كېرەك. ئۇنداق بولمىغاندا پۇت-قول ئۇچلىرىغا قان يېتىشمەي گۆشلەرگە زىيان يەتكۈزىدۇ.

## بۇرۇن ئىچى تۆشۈك مۇدۈرى

بۇرۇن ئىچىگە تۆشۈك مۇدۈر چىقىش (بۇسۇرۇلكەننى) بۇرۇن ئىچىگە باشقا ئەزالاردا پەيدا بولغانغا ئوخشاش تۆشۈك مۇدۈرلەر پەيدا بولغانلىقىغا قارىتىلغان.

## سەۋەبى

بىرەر خىلىتىنىڭ غەيرىي تەبىئىي تۈزگىرىشى تۈپەيلىدىن بۇزۇلغان ئارتۇقچە ماددىلار بۇرۇنغا يامان تەسىر قىلىپ، بۇرۇن ئىچىگە مۇدۇر چىقىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. مۇدۇرلەرنىڭ يۇمشاق بولغانلىرى ئىچكى ھارارەت تۈپەيلىدىن قېتىشىدۇ. بەزى كىشىلەردە دائىم بۇزۇق ھاۋادا نەپەس ئالغانلىقتىن بۇرۇن ئىچى جەراسمىلىنىپ تۇقۇنەتلىنىپ تۇششاق مۇدۇرلەر پەيدا بولىدۇ.

## ئالامىتى

مۇدۇرلەر ئىسسىقلىقتىن بولسا مۇدۇرنىڭ رەڭگى قىزىل بولىدۇ. كۆيۈشۈپ، قىزىپ لوقۇلداپ ئاغرىيدۇ. بەزىدە بۇرۇن قىزىرىپ ئىشىشىدۇ. نەپەسلىنىش سەل دەخلىگە ئۇچراش بىلەن بىرگە بۇرۇندىن كېلىدىغان سۇيۇقلۇقلارمۇ دەخلىگە ئۇچرايدۇ ياكى ئازىيدۇ. قىزىتما بولىدۇ. تومۇرى تېز كۈچلۈك سالىدۇ. سۈيدۈكى قىزىل كېلىدۇ. ئەگەر مۇدۇرلەر سوغۇقتىن بولسا، قىزىش ئانچە ئېغىر بولمايدۇ. ئىشىشى كۆرۈنەرلىك بولىدۇ. بۇرۇندىن سۇ ئاقىدۇ. تومۇرى چوڭ بوش سالىدۇ، سۈيدۈكىمۇ ئانچە سارغايمايدۇ. ھەمدە سوغۇقتىن بولغان ئىشىشىققا دائىر ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

## داۋاسى

قايسى ماددىدىن بولغان بولسا، شۇ ماددىنى مۇناسىپ دورىلار بىلەن پىشۇرۇش، تازىلاش ئارقىلىق مىزاجنى تەڭشەش كېرەك ھەمدە مامىرانچىدىن ئازراق مىقداردا ئېلىپ قاينىتىپ بۇرۇننى چايقاش، بۇرۇن ئىچىگە گۈل يېغى تېمىتىش، مەلھىمى ئەببەز، رەۋغىنى ۋەرد، مەلھىمى نۇر قاتارلىق دورىلارنى كېسەل ئەھۋالغا قاراپ ئىشلىتىش لازىم.

لۇڭگىنى قايناقسۇغا بېسىپ قىزىق پېتى بۇرۇنغا ئىسسىق تۆتكۈزۈش، ئىسسىق سۇ بىلەن بۇرۇننى چايقاش لازىم. بۇرۇندىكى مۇدۇرلەرنى قول بىلەن ھەرگىزمۇ قالايمىقان سىقىمىسى كېرەك. ئۇنداق بولمىغاندا جەراسىملار تۇقۇنەتلىنىپ قان نومۇرلار ئارقىلىق رەئىس ئەزا مېڭىگە تارقاپ ناھايىتى ئېغىر ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ

## بۇرۇن جاراھىتى

بۇرۇن جاراھىتى (قۇرۇھۈكە نەفى) بۇرۇن ئىچىگە ھەر خىل چاقىلار چىقىپ جاراھەتكە ئايلانغانلىقىغا قارىتىلغان. ئۇ ئادەتتە بۇرۇننىڭ قۇرۇق جاراھىتى ۋە يىرىڭلىق جاراھىتى دەپ ئىككى خىل بولىدۇ.

سەۋەبى

بۇرۇن جاراھەتلىرى بەدەندىكى خىلتلارنىڭ غەيرىي تەبىئىيلىكىگە ئۆزگىرىپ، بۇرۇنغا يامان تەسىر قىلىپ ئۇقۇنەت ھاسىل قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭدا بۇرۇننىڭ قۇرۇق جاراھىتىنى كۆپىنچە ھاللاردا كۆيگەن سەۋدا ماددىسى، بەزى ھاللاردا قاننىڭ غالىبلىقى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇرۇننىڭ يىرىڭلىق جاراھىتىنى كۆپىنچە ھاللاردا بەلغەم ماددىسىنىڭ بۇزۇلغانلىقى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

بۇلاردىن باشقا يەنە بۇرۇننى تولا كولاپ جەراسمىلاندىرۇش ۋە ئاتشەك كېسىلى قاتارلىق كېسەللەرگە گىرىپتار بولۇشتىنمۇ بۇرۇن ئىچىگە جاراھەت پەيدا بولىدۇ. بەزى كىشىلەردە بۇرۇن ئىچىدىكى ئىششىقلار ۋە توششاق مۇدۈرلەر ئۇزۇنغا سوزۇلۇش نەتىجىسىدە تەدرىجىي ھالدا جاراھەتكە ئايلنىدۇ.

ئالامىتى

دەسلەپكى مەزگىللەردە بۇرۇندا ئىششىشىش، ئاغرىش، قىزىشلار بولىدۇ. بۇرۇننىڭ قۇرۇق جاراھىتىدا كۆيگەن سەۋدانىڭ ئالامەتلىرىدىن سىرت بۇرۇن قۇرۇيدۇ، قىزىرىدۇ، بۇرۇن قىچىشىپ ئاغرىپ قاتتىق بىشارام قىلىدۇ. بۇرۇننىڭ ھۆل جاراھىتىدا گەرچە بۇرۇن قۇرۇش، قىزىرىش ئالامەتلىرى كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە بولمىسىمۇ كېسەللىك ئەھۋالى كۈچەيگەن مەزگىلدە چاقىلار ئېغىز ئېلىپ يىرىڭ چىقىشتەك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

ئالدى بىلەن كېسەللىك كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى سەۋەبچى ئامىلىنى تۈگىتىش، غەيرىي تەبىئىيلىككە تۈزگەن رەگن خىلىنى تەكشۈش لازىم. ئاندىن كېيىن ئومۇمىي جەھەتتە مۇرەككەپ دورىلاردىن ھەببى ئىبارەت، ھەببى كىرىت، مەئجۇنى چۈبچىنى، مەتبۇخى ھەلىلە، ھەببى شىفا قاتارلىقلارنى بۇرۇن جاراھىتىنىڭ تۈرىگە قاراپ مۇناسىپ ھالدا تاللاپ ئىشلىتىش كېرەك.

1. بۇرۇننىڭ قۇرۇق جاراھىتىنى داۋالاشتا مۇۋاپىق تېپىلسا دەسلەپتە باسىلىق تومۇردىن، 3-4 كۈندىن كېيىن فىفال تومۇردىن قان ئېلىشنى ئويلاشقا بولىدۇ. قان ئېلىپ بىر ھەپتىدىن كېيىن ماتۇلجىنىنى شاھتەررە شەرىپتىگە ئارىلاشتۇرۇپ ئىچكۈزۈش ياكى ھەببە لاجۋەرد، سۇفۇفى لاجۋەردلەرنىڭ بىرىنى پۈتۈن بەدەن ۋە مېڭە تەنقىيە بولغىچە ئىستېمال قىلدۇرۇش كېرەك. ئەگەر، بىمار بالا ئېمىتۋاتقان ئايال كىشى بولسا تەنقىيىدىن كېيىن سۈتىنى ساغسا داۋاغا ناھايىتى ياخشى ياردىمى بولىدۇ. تەرەنجىبىدىن 40 گرام ئېلىپ 40 گرام شەرىپتى بىنەپشىگە ئارىلاشتۇرۇپ ئىچكۈزۈش ياكى ماش قايناتمىسىغا نۇقۇت سېلىپ ئىچكۈزۈش كېرەك. بۇرۇننى بىنەپشە يېغى، قاپاق يېغى ياكى مېكىيان توخۇننىڭ يېغى بىلەن مايلاپ يۇمشىتىپ تۇرۇش ۋە دائىم ئىسسىق سۇ بىلەن بۇرۇننى چايقاش، يۇيۇش كېرەك. تازىلانغان مۇم، بىنەپشە يېغى، بادام يېغى، كالا پاقالچىقىنىڭ يىلىكىنىڭ ھەر بىرىدىن بىر ھەسسە ئېلىپ، مۇم ۋە يىلىكىنى ياغلاردا ئېرىتىپ، ئوڭا ئازراق مىقداردىكى بېھى لۇئابى ۋە كەترانى ياخشى ئارىلاشتۇرۇپ كۈندە بىر نەچچە قېتىم تېمىتىش كېرەك. بەزىدە مەزكۇر دورىغا ئىسبەغۇل شىرىسى (لۇئابى) ۋە ئاق لەيلى شىرىسى قوشۇۋەتسىمۇ بولىدۇ. بۇرۇنغا بېھى تۇرۇقىنىڭ مەلھىمىنى سۈرسىمۇ بولىدۇ. كالا پاقالچىقىنىڭ يىلىكىدىن بىر ھەسسە، بىنەپشە يېغى ۋە بادام يېغىدىن ئىككى ھەسسە، كەترادىن ئۈچ ھەسسە، ياسمەن يېغىدىن ئازراق ئېلىپ مەلھەم ياساپ بۇرۇنغا سۈرسىمۇ ياكى بۇ تۈسۈمگە كەترا بىلەن تەڭ مىقداردا گۈل خېتىمى قوشۇپ ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ. مۇم، گۈل يېغى. مېكىيان يېغى، بېھى لۇئابىلارنى ئىشلەتسىمۇ كۆپ پايدىلىق. ئاق سەندەل، ھۇزۇزلارنى گۈل ئەرقى، سېمىز ئوت سۈيى، گۈل ياغلىرى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ چاپسا بۇرۇننىڭ قۇرۇق جاراھىتىگە بەك ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ. ھەسەلنى سىركىگە ئارىلاشتۇرۇپ بۇرۇنغا كىرگۈزسە بۇرۇن قۇرۇق جاراھىتىنى يوقىتىدۇ. بىنەپشە يېغى، گۈل يېغىنىڭ ھەر بىرىدىن 6 گرام، ئاق مۇمىدىن 12 گرام، كالا پاقالچىقى





يىلىكى، توخۇ يېغىنىڭ ھەر بىرىدىن 7 گرام، مەدەستاندىن 9 گرام ئېلىپ مەلھەم ياساپ بۇرۇنغا سۈرتىسىمۇ بولىدۇ. ئاخشىمى توخۇ يېغى بىلەن بۇرۇننى مايلاپ، ئەتسى ئىسبە غۇل لۇئابى ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش لۇئابىلار بىلەن بۇرۇننى چايقىسىمۇ بولىدۇ. يالغۇز گۈل يېغىنى سۈرتۈپ بەرسىمۇ ئوبدان مەنپەئەت قىلىدۇ. تۆۋەنكى مەلھەملەرمۇ ئوبدان پايدا قىلىدۇ:

سېرىق مۇم 6 گرام، گۈل يېغى 36 گرام، بادام يېغى 15 گرام، ئىسبە غۇل لۇئابى، رەيھان لۇئابى، ئاق لەيلى تۇرۇقى لۇئابى ھەر بىرىدىن 3 گرام، كەترا 2 گرام، مەزكۇر دورىلاردىن قاندا بويىچە مەلھەم ياساپ ئىشلىتىلىدۇ.

ھەلىلە زەرد 3 گرام، توخۇ يېغى 9 گرام، ئاق مۇم 12 گرام، قاپاق يېغى، گۈل يېغى ھەر بىرى 6 گرام، كەترا 3 گرام، مەزكۇر دورىلاردىن قاندا بويىچە مەلھەم ياساپ چاپىدۇ.

قەلەي كۆشتىسى 8 گرام، مەدەستان 4 گرام، گۈل يېغى 30 گرام، مۇم 8 گرام، مۇمنى گۈل يېغىدا ئېرىتىپ باشقا دورىلارغا مۇۋاپىق مىقداردا مېكيان يېغى قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

بۇرۇن قۇرۇق جاراھىتىدا ئەگەر كېسەل ماددىسى بەك كۈچلۈك بولمىسا يېھى تۇرۇقىنىڭ مەلھىمى ناھايىتى ياخشى داۋادۇر.

قۇرۇق بىنەپشىنى سۇدا قاينىتىپ شىرە ھالەتكە كەلتۈرگەندىن كېيىن يېھى تۇرۇقى شىرىسىدىن 4 گرام، گۈل يېغى 4 گرام، ئاق مۇمدىن 2 گرام ئېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ يىلىم ھالەتكە كەلگىچە قايناتقاندىن كېيىن جاراھەتكە چاپىدۇ.

مۇم ۋە ئۇنىڭ يېرىم مىقدارىغا تەڭ كېلىدىغان كالا باقالچىقى يىلىكىنى نىلۇفەر يېغى ياكى كۈنچۈت يېغىدا ئەڭ ياخشىسى گۈل يېغىدا ئېرىتىپ زىماد قىلىنىسىمۇ ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ. مۇمنى گۈل يېغىدا ئېرىتىپ سېرىق ھەلىلە ياكى موزنى ئارىلاشتۇرۇپ چاپىسىمۇ بولىدۇ. بۇرۇندىن قان ئالغاندىن كېيىن قىيىق تومۇرىدىن ئېلىش ۋە ئىچنى سۈرگۈزۈش پايدىلىق.

يۇقىرىقى دورىلارنى ئىشلەتكەندە يېمەك-ئىچمەكنى ئىسلاھ قىلىش، گۆش ئىستېمال قىلماسلىق، چوڭ تەرەتنى يۇمشىتىپ تۇرۇش، تۆتكۈر ئىسسىق يەلنىڭ پەيدا بولۇشىنى چەكلەش ۋە ئۇنىڭ يۇقىرى تۈرلىشىنى توساش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن يېھى، ئالما، قۇرۇق يۇمغاقسۈت قاتارلىقلارنى شېكەر بىلەن ئىستېمال قىلىش، مۇناسىپ يېمەك-ئىچمەكلىكلەر بىلەن بەدەننى تەنقىيە ۋە ئىسلاھ قىلىش لازىم.

ئەگەر، قاننىڭ غالىبلىقىدىن بولغان بۇرۇن قۇرۇق جاراھىتى بولسا، مۇۋاپىق تېپىلغاندا قىيىق تومۇرىدىن قان ئېلىش، لوڭقا قويۇش ئارقىلىق بەدەننى ئىسلاھ قىلىش كېرەك.





ئەگەر، بەدەن ھەر خىل سۇيۇقلۇق ماددىلار تۈپەيلىدىن توشۇقلۇق ھالەتتە بولسا، مۇناسىپ مەتبۇخ، ئىبارەج ۋە ئىترىفىلار بىلەن بەدەننى ئىستىفراغ قىلىش لازىم.

2. بۇرۇننىڭ يىرىڭلىق جاراھىتىنى داۋالاشتا مۇۋاپىق تىپىلسا ئالدى بىلەن سەرارۇ تومۇرىدىن قان ئېلىش ھەمدە لوڭقا قويۇش كېرەك. ئۈنۈمدىن كېيىن باش ساھەسى، مېڭە ۋە پۈتۈن بەدەننى تەنقىيە قىلىش ئۈچۈن ھەببى ئىبارەجى ۋە ھەببى قوبىيا ئىچكۈزۈش ھەمدە قىچا، سىرگەنجىن بوزورنى ئارىلاشتۇرۇپ ياكى سۇنپۇل تىپ، سەئىدى كۆفى، قەلەمفۇرلارنى گۈل ئەرقىدە قاينىتىپ غەر-غەر قىلىش كېرەك. مەلھىمى سەفىدىنى ئىشلەتسە ھەم مەدەستاننى گۈل يېغىغا ئارىلاشتۇرۇپ بۇرۇنغا سۈرتسە بولىدۇ. قەلەي كۈشتىسى، مەدەستان، كۈمۈش ۋەرەق، كۆيدۈرۈپ ئۆلتۈرۈلگەن قوغۇشۇننى تەڭ مىقداردا ئېلىپ گۈل يېغىدا ئېرىتىپ شامچە ياساپ بۇرۇنغا قويۇش كۆپ پايدا قىلىدۇ. بۇ تەجرىبىدىن ئۆتكەندۇر. بۇ نۇسخىغا مۇم قوشىمۇ بولىدۇ. مەدەستان، مۇرمەككىنىڭ ھەر بىرىدىن 4 گرام، قەلەي كۈشتىسى، مۇملارنىڭ ھەر بىرىدىن 8 گرام، گۈل يېغىدىن 25 گرام ئېلىپ، مەلھەم ياساپ مېكىيان يېغى بىلەن بۇرۇنغا سۈرتۈش كېرەك. ھۇزۇز، مەدەستانلارنى ئەرقى گۈلدە ئېرىتىپ بۇرۇننىڭ ئىچىگە چاپىمۇ بولىدۇ. موزا، سېرىق ھەلىلە پوستىنى گۈل يېغى ياكى توخۇ يېغىغا چىلاپ بۇرۇنغا تېمىتىمۇ بولىدۇ. مامىرانچىنىنىڭ قاينىتىلغان سۈيى بىلەن بۇرۇننى يۇيۇش، مەلھىمى شىگرىپ، ئاچچىق بادام يېغى قاتارلىقلار بىلەن بۇرۇندىكى چاقىلارنى ياغلاش لازىم.

ھۆكۈملىرىمىزنىڭ تەلىماتلىرىغا ئاساسلانغاندا: دەسلەپتە گۈل يېغى ياكى مېكىيان يېغىنى مۇم بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلىتىش بىلەنمۇ مەزكۇر كېسەللىكنى ساقايتقىلى بولىدۇ. ئۈنۈمدىن كۆچلۈكرەك دورا لازىم بولسا مەلھىمى سەفىداب ئىشلەتسە بولىدۇ. ئەگەر، كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىرلاشسا قەلەي كۈشتىسىدىن 300 گرام، مەدەستاندىن 40 گرام، قوغۇشۇن پوقىدىن 40 گرام ئېلىپ ئوڭا 50 گرام ھاراق ئارىلاشتۇرۇپ مەلھەم ياساپ چاپىمۇ بولىدۇ. مەيۇلتاس يېغىغا سىرگىنى ئارىلاشتۇرۇپ تېمىتىمۇ بولىدۇ.

ئەگەر، بۇرۇن يىرىڭلىق جاراھىتى سوزۇلما خاراكتېرىگە ئايلىنىپ، داۋاملىق ئېغىرلاشسا مەدەستاندىن 15 گرام، ھۆل سوزاپتىن 15 گرام، زەمچىدىن 8 گرام ئېلىپ، ئۇلارغا ھەيۇلتاس يېغى ئارىلاشتۇرۇپ ھەم سىرگە قوشۇپ مەلھەم ياساپ ئىشلەتسە بولىدۇ. ئەگەر بۇ نۇسخىنىڭمۇ كۈچى يەتمىسە بۇنىڭدىنمۇ كۆچلۈكرەك بولغان تۆۋەنكى نۇسخىنى ئىشلەتسە بولىدۇ:

زاج سىياھ، قەلەند، مۇرمەككىلەرنىڭ ھەر بىرىدىن 7 ھەسسە، قىلىدىيىس 6 ھەسسە، شەب يەمانى، زىراۋەندى مۇدەھرەج، موزا، تەبىشى مىسلارنىڭ ھەر بىرىدىن 4





ھەسسە، كۈندۈر 1.5 ھەسسە ئېلىپ سوقۇپ 300 گرام سىركە بىلەن مىس قازاندا قاينىتىپ قويۇلغاندا شامچە ياساپ بۇرۇنغا قويسا بولىدۇ. ھەر بىر دورىنىڭ مىقدارىنى ئېھتىياجغا قاراپ ئازايتىش ياكى كۆپەيتىشكە بولىدۇ.

## بۇرۇن بەۋاسىرى

بۇرۇن بەۋاسىرى (بەۋاسىرۇلشەنفى، بەۋاسىرى بىيىنى) بۇرۇن ئىچىگە چوڭ-كىچىكلىكى ئوخشىمىغان ھالدا ئارتۇقچە گۆش تۈسۈپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

ئىچكى ۋە تاشقى ئامىللارنىڭ يامان تەسىرىدىن بەزى بۇزۇق يەل، قويۇق ماددىلار ۋە بۇزۇق خىلىتلارنىڭ بۇرۇن ئىچىكى قان تومۇرلىرىدا ۋە يەرلىك ئورۇندا يىغىلىپ قالغانلىقى تۈپەيلىدىن تەدرىجىي گۆش پەيدا بولۇپ قالىدۇ. بەزى كىشىلەردە سۆڭەك شەكلىدە كىچىك بەز پەيدا بولۇپ ئاخىرى تۈسە گۆشكە ئايلىنىدۇ. تومۇمەن قىلىپ ئېيتقاندا، بۇرۇن بەۋاسىرى كۆپىنچە ھاللاردا نورمال بولمىغان سەۋدا ماددىسىنىڭ بۇرۇنغا يامان تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامىتى

دەسلەپتە بۇرۇن ئىچىگە كىچىك پۇرچاقتەك مۇدۈر پەيدا بولىدۇ، نەپەسلىنىشكە دەخلى يەتكۈزمىسىمۇ يەڭگىل دەرىجىدە نەپەس ئېلىش توسالغۇغا ئۇچرىغاندەك سېزىم پەيدا بولىدۇ. ئاغرىش، قىزىرىش، قىچىشىشلار بولمايدۇ. كېيىن تەدرىجىي ھالدا چوڭلاپ بۇرۇن تۆشۈكىنى توسۇپ قويدۇ. ئۇنىڭ تۈۋى ئىنچىكە، رەڭگى ئاقۇشراق بولىدۇ، ئاغرىمايدۇ. بەزىلىرىنىڭ رەڭگى قىزغۇچ ياكى قوڭۇر رەڭدە بولۇپ، سېسىق پۇرايدۇ ۋە قان، زەرداب كېلىدۇ. بۇخىلى يامانراق بولۇپ ئۇزۇنغا سوزۇلسا بۇرۇن ئاقمىسى ياكى بۇرۇن سەرتانغا ئايلىنىپ قېلىشى مۇمكىن.

داۋاسى





ئالدى بىلەن مەزكۇر كېسەللىكنى كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى خىلنى ئېنىقلاپ كېسەل ماددىسىنى پىشۇرغۇچى ۋە تازىلىغۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن دورىلاردىن مەتبۇخى ھەلىلە، مەتبۇخى شاھتەررە، ئىيارەجى قەيقەرا، ھەببى مۇقەل، ئىتريفىلى كەشىنز، شەرىتى تۇتۇپ، شەرىتى بىنەپشە، ئەرىقى ئەنگۇرشفا، ئەرىقى گاۋزە بان قاتارلىق دورىلارنى كېسەلنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا قاراپ ئىشلىتىش كېرەك.

سىرتىدىن مەلھىمى زەنگار بىلەن بۇرۇن ئىچىنى ياغلاش، شىياڧى مامىشا ۋە زەنگارلارنى بەۋاسىر ئۈستىگە سۈركەش كېرەك. ئانار پوستىنى يانچىپ سۇ بىلەن خېمىر قىلىپ شامچە ياساپ بۇرۇنغا سېلىپ قويسۇمۇ ئوبدان مەنپەئەت قىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا سېرىق زاكىتىن 2 گرام، زەنگاردىن يېرىم گرام، تۇشۇدۇردىن بىر گرام، مۇر-مەككىدىن بىر گرام، قىزىل زەرىنخىن يېرىم گرام، ھەسەلدىن 15 گرام ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ، بۇرۇن بەۋاسىرىنى كۈندە ياغلاپ بەرسە خېلى ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا زاكىتىن ئۈچ گرام، توغرىغۇددىن ئۈچ گرام ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ 200 گرام قايناقسۇدا ئېرىتىپ، ھەر كۈنى بەۋاسىر بار بۇرۇننى چايقاپ ياكى يۇيۇپ بەرسە ياخشى تەسىر بېرىدۇ. ئەگەر بۇ چارىلەر بىلەن ياخشىلانمىسا دەستكارلىق ئۇسۇلىنى قوللىنىپ كېسىپ ئېلىۋېتىش لازىم. كونا گۆش، كالا گۆشى قاتارلىق زىيانلىق نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىش، ھاۋاسى يامان، بۇسۇلۇق، چاڭ-توزانلىق جايلاردىن ساقلىنىش لازىم. قىش كۈنلىرى ماسكا تاقاش پايدىلىق.

### ئاقمۇتى

بەزىلىرىنى ۋاقتىدا كۆرسىتىپ ئېنىقلاپ داۋالاتمىسا ياكى داۋالاش مۇۋاپىق بولمىسا، ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ ئېغىرلىشىپ، سەرتانغا ئايلىنىشى مۇمكىن. سەرتان خاراكىتىنى ئالغان بۇرۇن بەۋاسىرى تەرەققىياتى تېز بولۇش، بۇرۇن قۇرغاقلىشىش ۋە بەۋاسىر قاتتىق بولۇش، قاتتىق ئاغرىق پەيدا قىلىشتەك ئالاھىدىلىكلەرگە ئىگە. شۇڭا مەزكۇر كېسەلگە سەل قارىماي، بالدۇر كۆرۈنۈپ ئاكتىپ داۋالاش كېرەك.

### بۇرۇن يولىغا توسالغۇ پەيدا بولۇش

بۇرۇن يولىغا توسالغۇ پەيدا بولۇش (سۇددە ئۆلخەيشومى) بۇرۇن يولىغا ھەر ئىخىل



### سەۋەبى

بۇرۇن يوللىرىغا قويۇق شىلمىشىق خىلىت پەيدا بولغانلىقى، بۇرۇن بەۋاسىرىدەك ئارتۇق گۆش تۈسكەنلىكى ۋە بۇرۇن قۇرۇق جاراھىتىدەك چاقىلار پەيدا بولۇپ قاقاچ تۇتقانلىقى تۈپەيلىدىن بۇرۇندىن گالغا ياكى گالدىن بۇرۇنغا بارىدىغان سۇيۇقلۇقلارنىڭ بەلگىلىك دەرىجىدە توسۇلۇپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بەزىدە توغما سەۋەبلەردىنمۇ بۇرۇن توسۇلۇش كېلىپ چىقىدۇ.

### ئالامىتى

بۇرۇندا توسالغۇ بارلىقى بىمارنىڭ ئۆزىگە خېلى روشەن ھالدا سېزىلىدۇ. سۆزلىگەندە ئاۋاز ئېنىق چىقمايدۇ. توسالغۇ سەۋەبىدىن بۇرۇن چىقىندىلىرى راۋان چىقماستىن بولۇپ قالىدۇ. بەزىدە قۇلاق غوڭغۇلاشقا قوشۇلۇپ كېلىدۇ. تەكشۈرگەندە بۇرۇن بوشلۇقىدا قويۇق شىلمىشىق خىلىت، تۈسكەن گۆش ۋە چاقىلاردىن پەيدا بولغان قاقاچلارنىڭ بارلىقىنى بىلگىلى بولىدۇ.

### داۋاسى

بۇرۇن يولى شىلمىشىق خىلىتىن توسالغاننى داۋالاشتا ئالدى بىلەن بەلغەم مۇنزىجىنى بەرگەندىن كېيىن مۇسھل بېرىپ بەدەننى تازىلاش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن مۇناسىپ ھەب ۋە ئىيارەجلەر ئىشلىتىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ئەدەستىن 4 گرام، جۈندى بىدەستۇردىن 2 گرام، ئەپيۇن، زەئفەر، ئىپارلارنىڭ ھەر بىرىدىن 0.25 گرام، مۇرمەككىدىن 2 گرام ئېلىپ سوقۇپ مەرزەنجۇش ئارىلاشتۇرۇپ قۇلاققا تېمىتىسا بولىدۇ. ئەگەر توسالغۇ پەيدا قىلغان خىلىت قويۇق بولسا ئالدى بىلەن مەتبۇخى ئەقىمۇن بىلەن بەدەننى ئىككى قېتىم تازىلاش ھەمدە ئىككى قېتىملىق تازىلاش ۋاقتى مۇۋاپىق بېكىتىلىشى كېرەك. مۇۋاپىقراق تەنقىيە قىلىش ئۈچۈن ھەببى قوقىيا، ھەببى ئىيارەج، ھەببى سەبىلەرنى بەرگەن ياخشىراق. بۇلارنىڭ ئىچىدە ھەببى سەبىرى ئوبدانراق تۇرۇر. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە قۇرۇق يېشىل ئۈزۈم، ئاققەرەھا، قىچىلاردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ



سۇغا چىلاپ تەمنى چىقىرىپ مەزكۇر سۇيۇقلۇقتا بۇرۇننى چايقاش كېرەك. مۇنچىغا چۈشۈپ باش ساھەسىگە ئىسسىق سۇ چۈشۈرۈپ بېرىش كېرەك. ئەگەر توسالغۇ پەيدا قىلغان خىلىت يەتتىكى بولسا زەئەفەر پۇراپ چۈشكۈرۈش ھەمدە يەللىك ، شىرنىلىك تاماقلاردىن پەرھىز قىلىش كېرەك. ئەگەر ماددا شىرنىلىك قويۇق ماددا بولسا دېڭىز سۈيى ياكى تۇزلۇق كۆل سۈيىنى قاينىتىپ ھورنى بۇرۇنغا تۇتسا بولىدۇ. بۇ قويۇق خىلىتنى سۇيۇقلاشتۇرىدۇ. ئەگەر بۇرۇننى دورا سۈيى پارىغا تۇتقاندىن كېيىن ماددا سۇيۇقلىنىپ كۆكرەك تەرەپكە كېتىپ قېلىپ يۆتەل پەيدا قىلسا شەرىپتى خەشخاش، شەرىپتى چىلان قاتارلىقلارنى يۆتەل يوقالغىچە ئىستېمال قىلسا بولىدۇ. بۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بۇرۇننى تازىلاش ۋە چۈشكۈرتۈشنى داۋاملىق ماسلاشتۇرۇپ ئېلىپ بېرىش كېرەك. چۈنكى شەرىپتى خەشخاش ماددىنى قويۇقلاشتۇرۇپ قويغان بولسا چۈشكۈرۈش ئارقىلىق ماددىنى چىقىرىۋەتكىلى بولىدۇ. بۇ خىل ئۇسۇلنى قوللانغاندا تېۋىپ چوقۇم داۋالاش تەرتىپىنى ياخشى ئىگىلىشى لازىم. لېكىن بۇ ئۇسۇلنى داۋاملىق قوللانسا ئىككىلەمچى خاراكتېرلىك بۇرۇن قاناش ۋە باش ئاغرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. چۈنكى قويۇق ماددىلار بار ۋاقىتتا چۈشكۈرتۈلسە قان تومۇرلارنىڭ يېرىلىپ كېتىش ئېھتىمالى بولىدۇ.

ئۆسمە گۆشتىن بولغان بۇرۇن توسۇلۇشنى داۋالاشتا ئەگەر گۆش يامان سۈپەتلىك (سەرتان—راك) بولسا قىرىپ ئېلىۋەتمەسلىك كېرەك. ياخشى سۈپەتلىك بولسا ئېلىۋەتسە بولىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن پاكىزە چاچ بىلەن ئۆسمە گۆشنىڭ تۆۋىدىن بوغۇپ قويسا، ئۆسمە گۆش ئۈزلۈكسىز چۈشۈپ كېتىدۇ ياكى پاكىزلەنگەن تىغ بىلەن ئېلىۋەتسىمۇ بولىدۇ. قان توختىتىش ئۈچۈن سىركىگە تۈزنى ئارىلاشتۇرۇپ تېمىتىش كېرەك. ئۇنىڭدىن كېيىن سىركە، ئانارگۈلى، كۈندۈر، مۇرداسەنگە (مەدەستان) قاتارلىقلاردىن مەلھەم تەييارلاپ چىپش كېرەك. سۇ تېگىپ قېلىشتىن ساقلىنىش ھەمدە قويۇق (غەلىز) تاماقلاردىن پەرھىز قىلىش كېرەك. ئەگەر مۇۋاپىق تېپىلسا ئۆسمە گۆشنى ئېلىۋېتىشتىن ئىلگىرى قىيغال تومۇرىدىن قان ئالسا بولىدۇ. لېكىن گۆش يېگۈچى دورىلارنى ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش كېرەك. چۈنكى مېڭىنىڭ مزاجى بەزىدە بەزى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ئىسسىققا تۈزگەرگەندە مەزكۇر دورىلار بۇرۇنغا ئىشلىتىلسە مېڭىگە يامان تەسىر قىلىپ مېڭە پەردە ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن.

بۇرۇن قۇرۇق جاراھىتى قاقاچلىرىدىن بولغان بۇرۇن توسۇلۇشنى داۋالاشتا بۇرۇن قۇرۇق جاراھىتىدىكى داۋالاش ئۇسۇللىرى قوللىنىلسا بولىدۇ.

بۇرۇن يولىدىكى توسالغۇ تۇغما خاراكتېرلىك بولسا يەنى بۇرۇن يولى تۇغما تار بولسا، بۇرۇندىن چىقىپ تۇرۇشقا تېگىشلىك سۇيۇقلۇقلار نورمال چىقىپ كېتەلمەيدۇ. ئۇنى





داۋالاش ئۈچۈن ئىبارەج. بىلەن مېڭىنى تازىلاپ تۇرۇش، ھەر دائىم قويۇق (غەلىز) تاماقلاردىن پەرھىز تۇتۇش، تاماقتىن كېيىنلا جىنسىي ئالاقە قىلىشتىن ھەزەر ئەيلەش كېرەك ھەمدە روھىي ھالەت كۆترەڭگۈ، تەبىئەت ياخشى ۋاقىتلاردا ئىستىفراغ قىلىش لازىم. ئەگەر مەزكۇر كېسەللىك كىچىك بالىلاردا يۈز بەرسە ئانا سۈتىنىڭ قويۇقلۇقىدىن پەيدا بولغان قويۇق ھۆللۈكتىن كېلىپ چىقىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن داۋالاشتا ئانا سۈتىنى ئىسلاھ قىلىش، ئانىنى قويۇق تاماقلاردىن پەرھىز قىلدۇرۇش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بالىنىڭ بېشىغا ئىسسىق سۇ قويماسلىق، بالىنىڭ بۇرنىنى سۇنىڭ ھورىغا تۇتماسلىق لازىم. ھەمدە بۇلاردىن ئىلگىرى بالىنى چۈشكۈرتۈش، بالىنىڭ بېشىنى ياغلاش توغرا ئەمەس.

## بۇرۇن راكى

بۇرۇن راكى (سەرتانۇكە نەفى، سەرتانى بېيىنى) بۇرۇن ئىچى ياكى سىرتىغا ئۇزاق داۋاملاشقۇچى تۆسمە گۆش ياكى بەز پەيدا بولۇپ، تەدرىجىي ھالدا يامان سۈپەتلىككە ئايلانغانلىقىغا قارىتىلغان.

### سەۋەبى

بۇزۇلغان سەۋدا ماددىسىنىڭ بۇرۇن ئىچىگە يامان تەسىر كۆرسەتكەنلىكى تۈپەيلىدىن ئىششىق ياكى تۆسمە گۆش پەيدا بولۇپ، داۋالانسىمۇ ياخشىلانماستىن ئۇزۇنغا سوزۇلۇش بىلەن ئاخىرى راققا ئايلىنىپ قالىدۇ.

### ئالامىتى

دەسلەپكى مەزگىللەردە بۇرۇن ئىچىگە بەز ياكى گۆشكە ئوخشاش مۈنەك پەيدا بولغانلىقى بىلىنىدۇ. بۇرۇن نەپەس يوللىرى قىسمەن ياكى پۈتۈن توسۇلغانلىقتىن ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە نەپەس ئېلىش دەخلىگە ئۇچرىغانلىقى بىلىنىدۇ. بەزى كىشىلەردە بۇ مۈنەك چوڭىيىپ بۇرۇن سىرتىغا كۆتىرىلىپ چىققانلىقى مەلۇم بولىدۇ. لېكىن قىچىشىش، ئاغرىش، قىزىرىش، بىرىك ياكى زەرداب چىقىش قاتارلىق





تالامەتلەر بولمايدۇ. بۇرۇن بەۋاسىرى ياكى بۇرۇن ئاقمىسى (ناسۇرى) بىلەن بۇرۇن سەرتانىنىڭ تالامەتلىرى روشەن پەرقلەرگە ئىگە.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن سەۋەبىنى ئېنىقلاش كېرەك. بۇزۇق سەۋدانى تازىلاش ئۈچۈن ھەببى ئىبارەج، ھەببى قوقيا، مەتبۇخى ئەفتمۇن، مەتبۇخى شاھتەررە قاتارلىق دورىلارنى كېسەلنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا قاراپ بېرىش، سىرتتىن مەلھىمى ئاقاقىيانى ئىشلىتىش كېرەك.

### مەلھىمى ئاقاقىيا

ئاقاقىيا 3 گرام، زاك، زەرنىخ ھەر بىرى 1 گرام، زەنگار 2 گرام، نۆشۈدۈر 2 گرام، زەمچە 1 گرام، ئاق موم 15 گرام، رەۋغىنى ۋەرد 5 گرام، ھەسەل 15 گرام. مەزكۇر دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تاسقاپ، ھەسەل، موملارنى قانداق بولسىمۇ ئېرىتىپ، سوقۇلغان دورىلار بىلەن ئوبدان ئارىلاشتۇرۇپ مەلھەم قىلىپ سەرتانىنىڭ ئەتراپىنى ياغلاش كېرەك.

ھەببى كىرىت، ھەببى سىماب، مەئجۇنى ئەفئا (ئوق يىلان مەئجۇنى) قاتارلىق كۈچلۈك دورىلارنى ئېھتىياجغا قاراپ ئىشلەتسە بولىدۇ. قەدىمكى ھۆكۈمالارنىڭ ئېيتىشىچە: بۇ كېسەللىكنى دەستكارى ئۆسۈلدا داۋالاش ئۈنۈملۈك چارىدۇر. لېكىن تىغ تەككەندىن كېيىن تېخىمۇ ئەۋج ئېلىپ كېتىش ئېھتىمالى بار. شۇڭا ئۆسۈمنى كېسىپ تاشلىغاندىن كېيىن ئىلاجى بار ئۆسۈم ئورنىنى داغلاش شەرت.

### بۇرۇندا غەيرىي نەرسىلەر تۇرۇپ قېلىش

بۇرۇندا بىرەر نەرسىنىڭ تۇرۇپ قېلىشى (ئېھتىباسۇششەئى فىكئەئى، بەند شۇدەئى چىزى دەرىيىنى) يېمەكلىك ئىستېمال قىلغاندا بەدەندە پەيدا بولغان غەيرىي تەبىئىي پائالىيەتلەر تۈپەيلىدىن تاماق پارچىلىرىنىڭ بۇرۇن يولىغا كىرىپ قالغانلىقىغا







قارشىلغان. بۇ كۆپىنچە ھاللاردا بالىلاردا تولاراق ئۇچرايدۇ.

سەۋەبى

يېمەكلىك ئىستېمال قىلغاندا تۇيۇقسىز يۆتەلگەن، كۈلگەن ۋە چۈشكۈرگەندە تاماقنىڭ پۈركۈلۈپ كېتىشىدىن ئېھتىيات قىلىپ ئېغىزنى زورمۇ-زورغا يۇمۇۋېلىشتىن تاماق پارچىلىرى بۇرۇن يولىغا كىرىپ كېتىدۇ.

ئالامىتى

بۇرۇن يولىغا ئىچكى تەرەپتىن يات بىر نەرسىنىڭ كىرىپ قالغانلىقى ئېنىق سېزىلىدۇ. كۆپىنچە ھاللاردا يات نەرسە يا چىقىپ كەتمەي يا كىرىپ كەتمەي بىمارنىڭ بۇرۇن يولىنى يېقىمسىزلاندۇرۇپ بۇرۇننى كولاشقا مەجبۇر قىلىدۇ. ۋاقتىدا ئامال قىلىپ يات نەرسە چىقىرىۋېتىلمىسە يېمەك پارچىلىرى بۇرۇن يولىدا تۇرۇپ قېلىپ يۇزۇلىدۇ ۋە نەزلە زۇكام پەيدا قىلىدۇ.

داۋاسى

ھەر خىل ياغلارغا مۇننى ئېرىتىپ ئارىلاشتۇرۇپ بۇرۇن ئىچىنى مايلاش ياكى بۇرۇن ئىچىگە تېمىتىش كېرەك. كۆپ چۈشكۈرۈش كېسەللىكىنى داۋالاشتا قوللانغان دورىلارنى بۇرۇنغا بۇرۇتۇپ چۈشكۈرتۈش، چۈشكەرگەندە ئېغىزنى ئېتىۋېلىش كېرەك. ئادەتتە كۆپىنچە ھاللاردا بۇ ئۇسۇل بىلەنلا يات نەرسىلەر چىقىپ كېتىدۇ. ئەگەر بۇ تەدبىر بىلەن ياخشىلانمىسا بالىنى ئوڭدا ياتقۇزۇپ ئوخلىتىپ بالىنىڭ ئېغىزىنى چىڭ تۇتۇۋېلىپ ئالدى بىلەن بىر بۇرۇن تۇشۇكىدىن كېيىن، يەنە بىر بۇرۇن تۇشۇكىدىن قاتتىق پۈدەش كېرەك. ئەگەر بۇ ئۇسۇلدىمۇ يات نەرسە چىقىپ كەتمىسە مەخسۇس سايىمان ئارقىلىق يات نەرسىلەرنى ئېلىۋېتىشكە ئامال قىلىش كېرەك.

## بۇرۇن ئېزىلىش

بۇرۇننىڭ ئېزىلىپ كېتىشى (رەززۇلەنفى) ھەر خىل سىرتقى زەخمى ۋە بەزى





كېسەللىكلەردىن كېلىپ چىققان بۇرۇن سۆڭەك ۋە كۆمۈرچەكلەرنىڭ بۇزۇلغانلىقىغا قارىتىلغان.

### سەۋەبى

ھەر خىل سىرتقى زەخمىلەر يەنى ئۇرۇلۇش، سوقۇلۇش ۋە يىقىلىش تۈپەيلىدىن بۇرۇن سۆڭەكلىرىنىڭ سۇتۇشى، كۆمۈرچەكلەرنىڭ يىرتىلىشى ھەتتا ئېزىلىپ كېتىشى كېلىپ چىقىدۇ.

جوزام كېسەللىكىنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدە كېسەل كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى خىللىقلارنىڭ ئۆتكۈرلۈكىدىن بۇرۇن شەكلى بۇزۇلۇپ كېتىدۇ.

### ئالامىتى

يەڭگىلىرىدە بۇرۇن سەزمەس بولۇپ پالە چىلىنىدۇ. بۇرۇن كۆمۈرچەكلىرى يىرتىلىدۇ. قىزىرىش، ئىششىش، ئاغرىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. ئېغىرلىرىدا بۇرۇن سىرت كۆمۈرچەكلىرى زەخمىلىنىشتىن بۇرۇن سۆڭەكلىرى سۇنىدۇ. بۇرۇن ئېزىلىپ شەكلى بۇزۇلىدۇ. داۋالانىپ 10 كۈنگىچە ياخشىلىنىش ئالامەتلىرى كۆرۈلمىسە بۇرۇننىڭ ئەسلىي شەكلىگە كېلىپ ساقىيىشى تەسكە توختايدۇ.

### داۋاسى

بۇرۇندىكى زەخمىلىنىش يەڭگىلەرەك بولسا مۇلايىملىق بىلەن ئامال قىلىپ ئاستا تۈزەپ قويۇش كېرەك. سەبرى، مۇغاس، ئاقاقىيا، مۇرمەككى قاتارلىقلاردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ پاقا يوپۇرمىقى سۈيدە ئېرىتىپ قەغەزگە سۈرتۈپ بۇرۇنغا چاپلاپ قويسا بولىدۇ. ئەگەر زەخمىلىنىش ئېغىرراق بولسا ياللۇغ پەيدا بولۇشى مۇمكىن. شۇڭا دەرھال قىيىل تومۇرىدىن قان ئېلىش ۋە تەبىئەتنى يۇمشىتىش ھەمدە قويۇق غەلىز تاماقلاردىن پەرھىز تۇتۇش كېرەك. مېڭە مزاجىنىڭ نورماللىقى ۋە قۇۋۋىتىنى ساقلاش ھەمدە ئۆتكۈر خاراكتېرلىك سەرسام كېسەللىكى كېلىپ چىقىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، باش ساھەسىگە سوغۇق تەبىئەتلىك زىمادلارنى چاپلاش كېرەك. بۇرۇننى توغرىلاپ تەبىئىي ھالىتىگە كەلتۈرۈشكە ئامال قىلىش، ئاقاقىيا، مۇغاس قاتارلىقلارنى سوقۇپ سۈيىنى





چىقىرىپ نەيچە بىلەن بۇرۇنغا پۈركەش كېرەك. ئاندىن كېيىن سەبرە، ماش، مۇرمەككى زەئفەرلەردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ گىل ئەرمىنى، گىل رۇمى، خىتى، لادەن، ئەدەسلەر بىلەن قوشۇپ يۇلغۇن يوپۇرمىقى سۈيدە ئېرىتىپ بۇرۇنغا تېمىتىش كېرەك.

## بۇرۇن كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدىغان بىر قىسىم دورىلار

### پەتلە رۇتاب (1-نۇسخا)

تەركىبى: ئانارگۈلى، تۈگمەن تۈزۈندىسى، موزا ھەر بىرى 4 گرام، ئەپيۇن 1 گرام.

تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلار يۇمشاق سالايە قىلىپ شىشە ساقلاپ قويۇلدى.

ئىشلىتىلىشى: لازىم بولغاندا پىلىتىكۈچنى تۇخۇم ئېقىغا ملەپ، يۇقىرىقى دورىلارنى يۇقتۇرۇپ قاناۋاتقان بۇرۇنغا تىقىپ قويۇلدى.

### پەتلە رۇتاب (2-نۇسخا)

تەركىبى: قەغەز كۈلى، تۇخۇم شاكلىنىك كۈلى، ئاقاقىيا، ئانار پوستى ھەر بىرى 5.4 گرام.

تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلار يۇمشاق سالايە قىلىپ شىشە ساقلاپ قويۇلدى.

ئىشلىتىلىشى: لازىم بولغاندا پاكىز پاختىدا پىلىتىكۈچ ياساپ تۇخۇم ئېقىغا ملەپ يۇقىرىقى دورىلارنى يۇقتۇرۇپ قاناۋاتقان بۇرۇنغا سېلىپ قويۇلدى.

### پەتلە رۇتاب (3-نۇسخا)

تەركىبى: كۆيدۈرۈلگەن موزا، قەغەز كۈلى، كۆيدۈرۈلگەن زەمچە ھەر بىرى





16.2 گرام، كافور 3 گرام.

تەبىيارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلار يۇمشاق سالاىە قىلىنىپ، شىشىدە ساقلاپ قويۇلدى.

ئىشلىتىلىشى: لازىم بولغاندا پاكىز پاختىدا يىلتىكۈچ ياساپ تۇخۇم ئېقىغا مەلەپ يۇقىرىقى دورىلارغا تەككۈزۈپ قاناۋاتقان بۇرۇنغا سېلىپ قويۇلدى.

#### پەتلە رۇئاب (4-نۇسخا)

تەركىبى: ئاچچىق ئانار پوستى 5.4 گرام. قەسبۇس زەررە، بۇزۇرلەنجى 4 گرام، قەلەمفۇر، كۆيدۈرۈلگەن زەمچە ھەر بىرى 2.7 گرام.

تەبىيارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلار قائىدە بويىچە يۇمشاق سالاىە قىلىنىپ شىشىدە ساقلاپ قويۇلدى.

ئىشلىتىلىشى: يىلتىكۈچنى تۇخۇم ئېقىغا مەلەپ، مەزكۇر دورىدىن يۇقتۇرغاندىن كېيىن بۇرۇنغا سېلىپ قويۇلدى.

#### نۇفۇخى رۇئاب (1-نۇسخا)

تەركىبى: ھۇزۇزى مەككى 7 گرام، يىپەك رەخت بىر پارچە، قەغەز كۆلى 7 گرام. تەبىيارلىنىشى: ھۇزۇزىنى يۈگەلگۈدەك يىپەك رەختكە يۈگەپ، كۆيدۈرۈپ يۇمشاق سالاىە قىلىپ، يىپەك ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ قەغەز كۆلىنى قوشۇپ ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن ساقلاپ قويۇلدى.

ئىشلىتىلىشى: لازىم بولغاندا قانغان ئورۇنغا باسسا بولىدۇ.

#### نۇفۇخى رۇئاب (2-نۇسخا)

تەركىبى: ئۆلتۈرۈلگەن ئاھاك 10 گرام، كۆيدۈرۈلگەن موزا كۆلى 5 گرام، نەغەز كۆلى 5 گرام.

تەبىيارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى قائىدىلىك سالاىە قىلىپ شىشىدە ساقلاپ قويۇلدى.

ئىشلىتىلىشى: لازىم بولغاندا بۇرۇن ئىچىگە پۈركۈلدى.





## پۇراش سېزىمىنى ئاشۇرىدىغان دورىلار

كېسەل كىشىنىڭ مزاجىغا قاراپ مۇنزىچ، مۇسەھل بېرىپ تازىلاپ بولغاندىن كېيىن، ھەببى ئىيارە جى فەيقەرا، ئىتريفېلى كەبىر، مەئجۇنى چۆبچىن، شەرىپتى ئۆستىخۇددۇس، ماڭكەسەل قاتارلىق دورىلار كېسەلنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا قاراپ بېرىلىدۇ. سىرتتىن تۆۋەندىكى تېمىلىدىغان دورىلار ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن: كۈندۈش، قۇندۇز قەھرى، زەئفەر، سىياھدان، زەردچۈبە، ئاققەرەھا قاتارلىق دورىلارنىڭ قايسى بىرسى تېپىلسا 15 گراممچە ئېلىپ 60 مىللىلىتىر سىركىدە قاينىتىپ سۈزۈپ شىشەدە ساقلاپ قويۇپ، لازىم بولغاندا ئەتكەن ئاخشىمى بۇرۇن ئىچىگە تېمىلىدۇ.

## بۇرۇن ۋە رەملىرىنى ياندۇرىدىغان دورىلار

مەتبۇخى ھەلىلە، مەتبۇخى ئەقىمۇن، ئەرقى ئەنگۈرشىفا، ھەببى بىنەپشە، ئىتريفېلى كەشنىزى، ئەرقى شاھتەررە قاتارلىق دورىلار ئىشلىتىلىدۇ. سىرتتىن گۈل يېغى، بىنەپشە يېغى، نىيلۇفەر يېغى، بادام يېغى قاتارلىقلارغا تەڭ مىقداردا سىركە ئارىلاشتۇرۇپ بۇرۇن ئىچى ياغلىنىدۇ.

## بۇرۇن ئىچى چاقا-جاراھەتلىرىگە مەنپەئەت قىلىدىغان دورىلار

كېرىت، زەرىنخ، ئۆشۈدۈر، موزا، شىگرىپ، بۇزۇرۇلبەنجى، دانىكار، قوغۇشۇن كۆشتىسى، ئەزەرۇت، سىماب كۆشتىسى زەمچە قاتارلىق قۇرۇتقۇچى دورىلاردىن بىرنى قوي يېغى ياكى ئۆسۈملۈك ياغلىرى بىلەن بىللە مۇۋاپىق مىقداردا مەلھەم قىلىپ بۇرۇن ئىچى





ياغلىنىدۇ.

ئۇنىڭدىن باشقا كۆز كېسەللىكىدە سۆزلەنگەن شىياڧى ئەيەز، شىياڧى ئەسۋەد، شىياڧى مامىشا قاتارلىق شىياڧىلارنى مەخسۇس دورا قاچىسىدا سۈرۈپ ئېرتىپ بۇرۇن ئىچىگە چاپسىمۇ بولىدۇ.

### نۆتۈلى سۇددە ئى بىيىنى (1-نۇسخا)

تەركىبى: لادەن، يۇلغۇن ياغىچى، سىياھدانلارنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىنىدۇ.  
تەييارلىنىشى: دورىلارنى چالا سوقۇپ 500 مىللىلىتر سۇ قۇيۇپ مەخسۇس قاچىدا قاينىتىپ ھورى دىماققا ئېلىنىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: دىماغ پۈتۈشكە مەنپەئەت قىلىدۇ.

### نۆتۈلى سۇددە ئى بىيىنى (2-نۇسخا)

تەركىبى: بۇغداي كېپىكى 50 گرام، بۇمغاقسۇت تۇرۇقى 30 گرام، سامساق بىر باش.  
تەييارلىنىشى: بۇمغاقسۇت تۇرۇقىنى چالا سوقۇپ، سامساقنى ئېزىپ كېپەك بىلەن بىرلەشتۈرۈپ 500 مىللىلىتر سۇدا قاينىتىپ ھورى دىماققا ئېلىنىدۇ.



## ئېغىز بوشلۇقى كېسەللىكلىرى

ئېغىز بوشلۇقى—كالپۇك، تىل، چىش، تاڭكلاي، گالدىن تەركىب تاپىدۇ. تۇتىل قاتارلىق ئەزالىرى ئارقىلىق ئادەم بەدىنىدىكى تاشقى بەش سەزگۈنىڭ بىرى بولغان تېشى قۇۋۋىتى (قۇۋۋە ئى زائىقە) نىڭ خىزمىتىنى ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ. بۇنىڭدىن تاشقىرى كالپۇك ئارقىلىق نەرسىلەرنى شوراش، چىشىنى ئاسراش، چىش ئارقىلىق نەرسىلەرنى ئۈزۈش، كېسىش، چايناش، گال ئارقىلىق يۇتۇشتەك ۋە زىپىلەرنى تۇتەيدۇ. ئېغىز بوشلۇقىدىكى بۇ ئەزالارنىڭ ھەممىسى ئىنسانلارنىڭ ئاۋاز چىقىرىش، سۆزلەش، ئاۋۇشلارنى توغرا، تولۇق تەلەپپۇز قىلىش قاتارلىق پائالىيەتلىرىدە ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدۇ. بۇ ئەزالارنىڭ بىرەرسىدە غەيرىي نورمال ئەھۋال كۆرۈلسە يۇقىرىقى خىزمەت ۋە پائالىيەتلەرنىڭ نورمال ئېلىپ بېرىلىشىغا ئوخشىمىغان دەرىجىدە ئۇقسان يەتكۈزىدۇ. ئېغىز نەپەسلىنىشتىكى ئىشكۈر. ئېغىز بوشلۇقىدىكى ئەزالارنىڭ خىزمەت، پائالىيەتلىرى نورمال بولغاندىلا ئىنسانلار يېمەك-ئىچمەكلىكلەرنى شوراش، ئۈزۈش، كېسىش، چايناش، يۇتۇش ھەمدە ئەڭ مۇھىم بولغان توغرا تەم سېزىش ۋە نورمال سۆزلەش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولالايدۇ ھەمدە مەلۇم مەندە ئىيتقاندا بەلگىلىك دەرىجىدە نەپەسلىنىش ئورنىغا ئىگە بولالايدۇ. شۇڭا تىبابىتىمىز باشقا ئەزالارغا ئوخشاشلا ئېغىز بوشلۇقى ئەزالىرىدىكى كېسەللىكلەرگە، يەنى ئۇلاردىكى مىزاجلىق، مىزاجسىز ئۆزگىرىشلەر ۋە سىرتقى زەخمىدىن بولغان كېسەللىكلەرنىڭ سەۋەبى، ئالامىتى، داۋاسى (ئىچكى ۋە تاشقى داۋاسى، دەستكارلىق تۈسۈللىرى)، پەرھىزى، ئوزۇقلىنىش قاتارلىقلارنى ئۆزىگە خاس مىللىي ئالاھىدىلىكلىرى بويىچە بىرقەدەر تەپسىلىي بايان قىلىدۇ.

ئېغىز بوشلۇقى كېسەللىكلىرى بىلەن توتۇشۇش ۋە ئۇلارنى توغرا داۋالاپ بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن تۇنىڭدىكى ئەزالار يەنى كالپۇك، تىل، چىش، گال قاتارلىقلارنىڭ تۈزۈلۈشى ۋە خىزمىتى بىلەن ئوبدان توتۇشۇشقا توغرا كېلىدۇ.

## ئېغىز بوشلۇقىدىكى ئەزالارنىڭ تۈزۈلۈشى

ئېغىز ئەرەبچە «فەم» دەپ ئاتىلىدۇ. ئېغىز بوشلۇقى—كالبۇك (لەب) لەردىن شەكىللەنگەن ئېغىز تۈشۈكىدىن باشلاپ تىل تۈۋىدىكى گالغىچە بولغان بوشلۇققا قارىتىلغان بولۇپ، ئۇ ئاستىقى، ئۈستۈنكى كالبۇكلار (شەفەتەين)، تىل (لسان)، چىشلار (ئەسنان)، تاڭلاي (ھەنەك)، گال (ھەلق) قاتارلىق ئەزالاردىن تەشكىل تاپىدۇ. بۇلاردىن تاشقىرى يەنە، ئۈنۈڭدا شۈلگەي بەزلىرى (غۇددەئى ئەرىقىيە)، بادامچە بەز (لەۋزەتەين) ۋە باشقىلار بولىدۇ.

ئېغىز بوشلۇقىنىڭ ئۈستى تەرىپىدە ئۈستۈنكى چىشلار، تاڭلاي ۋە يۇقىرىقى ئىگەك، ئاستى تەرىپىدە تۆۋەنكى چىشلار، تىل ۋە ئاستىقى ئىگەك بولىدۇ. ئېغىز بوشلۇقىنى ئەستەرلەپ تۇرغان بەلغەمسىمان پەردە (غىشائى مۇخاتى) ئالدى تەرەپتە كالبۇك، ئارقا تەرەپتە گال شىلىمىشىق پەردىسى بىلەن تۇتىشىدۇ. بۇ پەردىلەر نورمال ئەھۋال ئاستىدا قىزىلگۈل رەڭگىدە بولىدۇ. گال ئوزۇقلۇق ۋە ھاۋا كىرىدىغان يوللۇر.

ئېغىز ئۆز بوشلۇقىدىكى ئەزالىرى ئارقىلىق ئېمىش، شوراش، تەم سېزىش، چاپناش، يۇتۇش بولۇپمۇ ئىنسانلارغا خاس بولغان سۆزلەشتەك مۇھىم خىزمەتلەرنى تۆتەيدۇ.

### كالبۇك

كالبۇك پارسچە «لەب» ئەرەبچە «شەفەت» دەپ ئاتىلىدۇ. كالبۇك—ئاستىقى ۋە ئۈستۈنكى لەيلەردىن تۈزۈلگەن بولۇپ، سىرتقى تەرىپى تىرە، ئىچكى تەرىپى بەلغەمسىمان پەردىدىن تۈزۈلگەن. ئۈنۈڭدا مۇسكول، تومۇر، ئەسەب (نېرۋا)، چېتىشتۈرغۈچى پەردە. مايلىق پەردە ۋە كىچىك بەزلەر بولىدۇ. ھەر بىر لەب ئىچكى سەنئى ئوتتۇرىسىدىكى بەلغەمسىمان چاندىر ئارقىلىق چىش مىلكىلىرى بىلەن تۇتىشىدۇ. كالبۇكلار ئېغىزنى شەكىللەندۈرۈپ يۈز شەكلىنى تۈزەشتىن سىرت ئېمىش، شوراش ۋە چىشلارنى مۇھاپىزەت قىلىشتەك خىزمەتلەرنى تۆتەيدۇ.





## تل

تل پارسچە «زەبان»، ئەرەبچە «لسان» دەپ ئاتىلىدۇ. ئو سىرتقى بەش سەزگۈ (ھەۋاسى خەمسە زاھىرى) نىڭ بىرى بولغان تېتىش كۆچى (قۇۋۋەتى زائىقە)، نىڭ خىزمىتىنى بېجىرگۈچى مەخسۇس ئەزادۇر. بۇنىڭدىن باشقا يەنە چايناش، يۇتۇش، شوراش بولۇپمۇ سۆزلەشتە ئالاھىدە رول ئوينايدۇ. تل بولمىسا سۆزلىگىلى بولمايدۇ.

تل—تل تېنى، تل ئوستى ۋە تل تۈۋىدىن تەركىب تاپىدۇ. تل تۈۋى بىر قانچە مۇسكۇللار ئارقىلىق مۇناسىۋەتلىك سۆڭەككە، بەلغەمسىمان پەردىنىڭ 3 چەمبىرى ئارقىلىق مۇناسىۋەتلىك كۆمۈرچەككە تۇتىشىدۇ. تل يانلىرىدىن باشلانغان بەلغەمسىمان پەردە چىش مۇلۈكلىرىنى ئەستەرلەيدۇ. تل ئاستىدا بىر چىتىق بولۇپ، ئو تل يۈگىنى دەپ ئاتىلىدۇ. تل بۇ يۈگەن ئارقىلىق ئاستى ئىگەككە يىلتىزلىنىدۇ.

تل ئوستىنى بەلغەمسىمان پەردە ئىھاتە قىلغان بولۇپ، ئو ئىچكى، تاشقى 2 قەۋەتتىن تۈزۈلگەن. سىرتقى قەۋەتنى نېرىگە ئوخشاش بولغاچقا تل قىچىشىش (ھىككە توللىسانى)، تل يېرىلىش (تەشەققە قۇللىسانى) تەك كېسەللىكلەر كۆرۈلىدۇ. ئىچكى قەۋەتتە تومۇر ۋە نېرۋىلار تارقالغان بولىدۇ.

تل ئوستىدىكى بەلغەمسىمان پەردىدە 3 خىل ئۆسۈكچە بولىدۇ:

1. چوڭ ئۆسۈكچىلەر يەنى خەندەكسىمان ئۆسۈكچە (ھولەيماتى مۇخەندەقە) لەر تىلنىڭ ئارقا قىسمىغا تارقالغان بولۇپ، سانى ئاز، ئەتراپىدا خەندەك ياكى كانالچىلار بولغان بولىدۇ. شۇڭا خەندەكسىمان ئۆسۈكچىلەر دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇ ئۆسۈكچىلەردە تەم سىزىش كۆچى توپلانغان بولىدۇ.

2. موگۇسىمان ئۆسۈكچە (ھولەيماتى فوتىبىيە) ئاساسەن تىلنىڭ ئىككى يېنى ۋە ئوچىغا جايلاشقان بولۇپ، شەكلى موگۇغا ئوخشايدۇ، سانى كۆپ، رەڭگى قىزىل بولىدۇ.

3. يېسىمان ئۆسۈكچە (ھولەيماتى خەيتىيە) تىلنىڭ ھەممە قىسىملىرىغا تارقالغان بولۇپ، تىلغا ئوخشاش ئىنچىكە، ئۇزۇن كېلىدۇ، سانى ناھايىتى كۆپ بولىدۇ. بۇ ئۆسۈكچىلەر تەم سىزىش ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى ئاساسلىق ئېغىز بوشلۇقىنىڭ تازىلىقى ئۈچۈن خىزمەت قىلىدۇ.

تىلدا تۆۋەندىكىدەك 3 خىل ئەسەب بولىدۇ:

1. مېڭىدىن چىققان تەم سىزىش ئەسەب شاخچىلىرى تل ئوچى ۋە ئونىڭ يان قىسىملىرىدا ئاياغلىشىدۇ. بۇ ئەسەبلەر ئادەتتىكى سەزگۈ ئەسەبلەر بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

2. تل ۋە گال ئەسەبلىرى تىلنىڭ تۈۋى تەرىپى ۋە ئونىڭ ئىككى يان تەرىپىدىكى





بەلغە مەسمان پەردە ۋە چوڭ ئۆسۈكچىلەر يەنى خەندە كەسيمان ئۆسۈكچىلەرگە تارقالغان بولۇپ، تېتىش قۇۋۋىتى ئاساسلىق مۇشۇ ئۆسۈكچىلەردە بولىدۇ.

3. تىل ئاستى ئەسەبلىرى تىلىنىڭ مۇسكۇللىرىغا تارقالغان بولۇپ، تىلىنىڭ ھەرىكەتلىنىشىنى باشقۇرىدۇ.

يۇقىرىدا سۆزلەنگەن ئالدىنقى ئىككى ئەسەبدە تۇچراشقان نەرسىنى سېزىش كۈچى (قۇۋۋەتى لامسە) ۋە تېتىش كۈچى (قۇۋۋەتى زائىقە) نىڭ ئىككىسىلا بولىدۇ، كېيىنكى ئەسەبدە پەقەت ھەرىكەتلىنىدىغان ئۆسۈكچى كۈچ (قۇۋۋەتى مۇھەررىكە) لا بولىدۇ.

تىلىنىڭ ئارقا تەرەپ ئوتتۇرا قىسمىدا كىچىك تىل بار، ئۇ گالنىڭ يۇقىرى تەرىپىدىكى يۇمشاق تاڭلايدىن ساڭگىلاپ تۇرغان ئۆسۈكچە گۆش بولۇپ، نەپەسلىنىشتىن كىرگەن ھاۋانى ساپلاشتۇرۇپ چاڭ-توزانلارنى سۈزۈپ قېلىش، كىچىك بالىلاردا سۈت ئېمىش، ئاۋاز چىقىرىشقا ياردەم بېرىشتەك خىزمەتلەرنى ئۆتەيدۇ.

تىلىدا يۇقىرىدا سۆزلەنگەن ھەر خىل ئۆسۈكچىلەردىن شەكىللەنگەن تەم سېزىش چېچەكلىرى بولىدۇ. ئۇلارغا تېتىش كۈچى (قۇۋۋەتى زائىقە) يەنى تەم سېزىش ئەسەبلىرىنىڭ شاخچىلىرى تارقالغان بولىدۇ. ھەر خىل تەملەر ئۇلار بىلەن تۇچراشقاندىن كېيىن سەزگۈ ئەسەب (ئەسەبى ھىسسى) ئارقىلىق مېڭىدىكى ئورتاق ھېس قىلىش (ھىسسى مۇشتەرەك) ئورنىغا يېتىپ بېرىپ تەم سېزىمنى بارلىققا كەلتۈرىدۇ. تەمىنىڭ ئوبدان سېزىلىشى ئۈچۈن ماددا ئېرىگەن ياكى ئېغىزدا ئېرىيدىغان بولۇشى لازىم. ئۇنداق بولمىغاندا تەم سېزىمى بولمايدۇ. ئەمما تۇچراشقان نەرسىنى سېزىش كۈچى (قۇۋۋەتى لامسە) ئۆز رولىنى يەنىلا يوقاتمىغان بولىدۇ. شۇڭا تىل ياكى گال قۇرۇپ قالسا بىر نەرسىنىڭ تەمىنى سەزگۈلى بولمايدۇ. تېتىش كۈچى بىلەن پۇراش كۈچى ئادەتتە ئۆزئارا ماسلاشقان بولىدۇ. ئادەم بەدىنىدە يەنە ئىچكى تەم سېزىش كۈچى (قۇۋۋەتى زائىقە) ئىككىسى (ئەسەبى زائىقە) غا ئىچكى سەۋەبلەرنىڭ تەسىر كۆرسەتكەنلىكىدىن بولىدۇ. مەسىلەن، بەزى غەيرىي نورمال ئەھۋاللار ئاستىدا تىل سىرتقى نەرسىلەرنىڭ تەسىرىگە تۇچرىمايمۇ ئېغىزدا ئاچچىق ياكى تاتلىق تەملەر سېزىمى پەيدا بولۇپ قالىدۇ.

تىل تېمىنىڭ رەڭگى، تىل ئۈستىدىكى گەزىلەرنىڭ نېپىز-قېلىنلىقى ۋە ئۇلارنىڭ رەڭگى ھەمدە تىلىنىڭ ھەرىكىتى قاتارلىقلار ئادەم بەدىنىنىڭ ساقلىق-ساقسىزلىق ھالىتىدىن بىۋاسىتە بىشارەت بېرىدۇ. شۇڭا ئۇلار تەشخىس ئىلمىدە مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.





## چىش

چىش ئەرەبچە «ئەسنان» دەپ ئاتىلىدۇ. ئىنسانلار ھاياتىدا ئىككى قېتىم چىش چىقىدۇ. بىرىنچى قېتىمدا سۈت چىشى يەنى بوۋاق چىشى، ئىككىنچى قېتىمدا دائىملىق چىش يەنى تۆمۈرلۈك چىش چىقىدۇ.

### سۈت چىشى

سۈت چىشى بوۋاق چىشى دەپمۇ ئاتىلىدۇ، چۈنكى ئۇ بالا تۇغۇلۇپ 6-8 ئاي بولغاندا چىقىشقا باشلاپ ئىككى يېرىم ياشقا كىرگىچە ئاستىقى ۋە ئۈستۈنكى ئىككىگە كە 10 دىن جەمئىي 20 دانە چىقىدۇ. ئاستىقى ئىككىگە سۈت چىشلىرى ئۈستۈنكى ئىككىگە چىشلىرىغا قارىغاندا بالدۇرراق چىقىدۇ.

سۈت چىشلىرى ئوتتۇرا سۈت چىشى، يان سۈت چىشى ۋە ئېزىق سۈت چىشلىرىغا ئايرىلىدۇ. ئوتتۇرا سۈت چىشى بالا 7-6 ئايلىق بولغاندا ئاستى-ئۈستىدە 4 تىن 8 دانە چىقىدۇ. يان سۈت چىشى 14-12 ئايلىق بولغاندا 2 دىن 4 دانە چىقىدۇ. ئاخىرى 4 تىن 8 دانە ئېزىق سۈت چىشى چىقىدۇ، 6 ياشقا توشقاندىن كېيىن سۈت چىشلىرى چۈشۈشكە باشلاپ 13-12 ياشقا كىرگىچە دائىملىق چىشلار چىقىپ بولىدۇ.

### دائىملىق چىش

دائىملىق چىش تۆمۈرلۈك چىش دەپمۇ ئاتىلىدۇ. چۈنكى ئۇ ئادەم قېرىغانغا قەدەر ئاساسىي جەھەتتىن مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ، سانى ئادەتتە 32 تال بولىدۇ. ئايرىم كىشىلەردە دائىملىق ئەقىل چىشىدىن 2 تال ياكى 1 تالدىن چىقماي قېلىپ چىشلىرىنىڭ سانى 30 ياكى 28 تال بولۇپمۇ قالىدۇ.

دائىملىق چىشلار دائىملىق ئوتتۇرا چىش، دائىملىق يان چىش، دائىملىق ئېزىق چىش ۋە دائىملىق ئەقىل چىشلارغا ئايرىلىدۇ. دائىملىق ئوتتۇرا چىش 4 تىن 8 تال، دائىملىق يان چىش 2 دىن 4 تال، دائىملىق ئېزىق چىش 8 دىن 12 تال، دائىملىق ئەقىل چىش 2 دىن 4 تال جەمئىي 32 تال چىقىدۇ.

چىشنىڭ تۈزى چىش تۈجى، چىش بوينى ۋە چىش تۈزى (يىلتىزى) دىن ئىبارەت





3 قىسىمغا بۆلۈندۇ. چىش ئوچى ئېغىزدىن كۆرۈنۈپ توردۇ، چىش يىلتىزى ئىگەك سۆڭەك ئويمانلىرىغا پېتىپ تۇرغاچقا كۆرۈنمەيدۇ. چىش ئوچى بىلەن چىش تۈۋىگىچە بولغان ئارىلىق چىش بويى دەپ ئاتىلىدۇ. ئوتتۇرا چىشلاردا بىردىن يىلتىز، يان چىشلاردا 2 دىن يىلتىز، ئېزىق چىشلاردا 2 دىن 5 كىچە يىلتىز بولىدۇ. چىشلار يېمەكلىكلەرنى ئوزۇش، چاپناش ھەمدە ئېزىپ تۇلارنى ھەزىم قىلىشقا لايىقلاشتۇرۇش، ئېغىزدىكى شۆلگەيلەرنى توختىتىش ۋە كونترول قىلىشتەك رولغا ئىگە. شۇنىڭ بىلەن بىرگە گەپ قىلغاندا سۆزلەرنىڭ تولۇق ۋە توغرا چىقىشىغا ياردەم بېرىدۇ. ئادەمگە زىننەت كىرگۈزىدۇ. شۇڭا چىشلارنى ئوبدان مۇھاپىزەت قىلىش، تاماقتىن كېيىن، توخلاشتىن بۇرۇن چىشنى پاكىز يۇيۇش، شاكىراپ تۇز سۈيى بىلەن ئېغىزنى چايقاش، ئەڭ ياخشىسى چىش مەلھىمىنى چىش چوتكىسىغا يۇقتۇرۇپ چوتكىلاشنى ئادەت قىلىش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىرگە چىشلارنى بەك سوغۇق ۋە قىزىق، بەك ئاچچىق ۋە چۈچمەل يېمەك-ئىچمەكلىكلەردىن ھەمدە تۇننىڭ بىلەن قاتتىق نەرسىلەرنى چىشلەشتىن ساقلاش كېرەك.

ئەجدادلىرىمىز مېسۋاك بىلەن چىشنى تازىلاش ياكى مەخسۇس چىش تالقان (سۇنۇن) لىرى بىلەن چىشنى مۇھاپىزەت قىلىش ۋە ئاسراشتەك ئېسىل تازىلىق ئەنئەنىلىرىگە ئىگە.

### گال

گال پارسچە «ھەلق» دەپ ئاتىلىدۇ. تۇننىڭ ئالدى تەرىپىنىڭ ئۈستى يۇمشاق ۋە قاتتىق تاڭلاي بىلەن، ئاستى تەرىپىنىڭ كەينى كاناي ۋە تاماق يولى بىلەن، ئاستى تەرىپىنىڭ ئالدى تىل تۈۋى بىلەن تۇتىشىدۇ. تۆمۈر مېھراب شەكىلدە بولۇپ، مېھراب ئوتتۇرىدا كىچىك تىل يەنى ئەقىل تىلى بولىدۇ. تاڭلايلار ۋە گالنىڭ سىرتقى يۈزىنى بەلغەمىسمان پەردە ئەستەزلىگەن بولىدۇ. كىچىك تىل يىلتىزنىڭ ئىككى يېنىدا مۇسكۇللۇق ھەمدە پەردە بىلەن ئەستەزلىگەن ئىككى مېھرابىسمان چېتىق بولۇپ، گال ئالدى ۋە ئارقا تۈۋرۈكلىرى دەپ ئاتىلىدۇ. ئالدىدىكىسى تىل تاڭلاي مېھرابى، كەينىدىكى گال تاڭلاي مېھرابى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇ ئىككى مېھراب ئارىلىقىدا بىردىن ئىككى بەز بولىدۇ. مەزكۇر بەزلەرنىڭ شەكلى بادامغا ئوخشاشقاچا بادامىسمان بەزلەر (لەۋزە تەيىن) دەپ ئاتىلىدۇ. تۇلاردا 15—12 دانە چېكىتسىمان تۆشۈكلەر بولۇپ، تۆشۈكلەر كەينىدە شۆلگەيسىمان سۇيۇقلۇقلارغا تولغان خالىتچاقىلار بولىدۇ. بۇ بەزلەرنىڭ ئارقا تەرىپى قۇلاق كانالىسىنىڭ ئېغىزى بىلەن تۇتىشىدۇ. شۇڭا بۇ بەزلەر ۋەرەملەنگەن كۆپىنچە كىشىلەردە قۇلاق ئېغىرلىشىپ






پۈتۈپ قالغاندەك سېزىم پەيدا بولىدۇ. ئېغىز بوشلۇقىدا يەنە شۆلگەي بەزلىرى، تىل ئاستى بېزى، ئىگەك ئاستى بېزى قاتارلىقلار بولىدۇ.

گالنىڭ ئالدى قىسمى مەلۇم مەندە ئېيتقاندا يۇتقۇنچاقتىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇنىڭدا ئاۋاز پەردىسى بولىدۇ. ئۇ پارسچە مېزمار دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ ئاۋاز پەيدا قىلىشتىكى ئەڭ مۇھىم ئەزا بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئۇنىڭ ئالدى تەرىپىدە كاناي يولى، كەينى تەرىپىدە تاماق يولى يەنى قىزىلىشۇڭگەچ بولىدۇ. كاناي بىر قانچە ئونلىغان بېرىم ھالقا شەكىلدىكى كۆمۈرچەكلەردىن تەشكىل تاپقان بولۇپ، ئاستى كاناي شاخچىلىرى ئارقىلىق ئۆپكە بىلەن تۇتىشىدۇ. ئۇنىڭ يۇقىرىقى قىسمىدا بىر ئۆسۈكچە بولۇپ، ئۇ بۇغدىيەك دەپ ئاتىلىدۇ. بۇغدىيەك كاناي بوشلۇقىنى كاناي ئالدىنقى دالنى، كاناي قېرىنچىسى، ئاۋاز ئاستىقى رايونىدىن ئىبارەت ئۈچ قىسىمغا بۆلۈنىدۇ. كاناي نەپەس ئېلىشنى تەڭشەش، ئاۋاز چىقىرىش، يۇتقان نەرسىلەرنىڭ نەپەس يولىغا كىرىپ كېتىشىنى توسۇش، كۆچەش قاتارلىق ھەرىكەتلەرگە ياردەم بېرىشتەك خىزمەتلەرنى تۆتەيدۇ.

تاماق يولى يەنى قىزىلىشۇڭگەچ كاناي ئارقىدىن ئاستى تەرەپكە قاراپ مېڭىپ ئومۇرتقا ئالدىدىكى تۈشۈكتىن ئۆتۈپ 10-ئومۇرتقىنىڭ ئۆدۈلىدىكى ئاشقازاننىڭ يۇقىرى قىسمىدا ئاياغلىشىدۇ. قىزىلىشۇڭگەچ 3 قەۋەتتىن تۈزۈلگەن بولۇپ، سىرتقى قەۋىتى مۇسكۇل يىپىچىلىرىدىن، ئوتتۇرا قەۋىتى خانلىق پەردىدىن، ئىچكى قاتلىمى بەلغەمسىمان پەردىدىن تۈزۈلگەن. ئۇنىڭ ئىچكى ۋە ئوتتۇرا قەۋەتلىرىدە نۇرغۇنلىغان بەزلەر بولۇپ، ئۇلار شىلىمىشىق سۇيۇقلۇق ئىشلەپچىقىرىپ قىزىلىشۇڭگەچنى نەمدەپ سىلىقلاشتۇرۇپ تۇرۇدۇ. يۇتقۇنچاقتىن يۇتۇلغان يېمەك-ئىچمەكلىكلەر قىزىلىشۇڭگەچ ئارقىلىق ئاشقازانغا بارىدۇ.



ئېغىز بوشلۇقىنىڭ تۈزۈلۈشى





## كالپۇك قۇرۇش، يېرىلىش ۋە قاسراقلىشىش

كالپۇك قۇرۇش، يېرىلىش ۋە قاسراقلىشىش (جۇفانۇششە فەتى، تەشەققە- قۇششە فەتى، تەقەششۇرۇششە فەتى) قۇرۇقلۇقنىڭ غالبلىقىدىن بەگىلەرەك بولسا كالپۇك قۇرۇغانلىقىغا، ئېغىر بولسا كالپۇك يېرىلىپ قاسراقلىشىپ سويۇلغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

گەرچە كالپۇكتىكى بۇ 3 خىل غەيرىي نورمال ئەھۋالنىڭ سەۋەبى چوڭ جەھەتتە قۇرۇقلۇقنىڭ ئېشىپ كېتىپ كالپۇكقا تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىققان بولسىمۇ كونكرېتى جەھەتتە ئېيتقاندا تۆۋەندىكىدەك بىر قانچە خىل سەۋەبتىن پەيدا بولىدۇ:

1. مېڭىگە زىيادە قۇرۇقلۇق پەيدا بولۇپ، ئۇنىڭ تەسىرى ئەسەبلەر ئارقىلىق كالپۇكقا كېلىپ ئورۇنلىشىدۇ. بۇ خىلدىكىسىدە كالپۇك يېرىلىشتىن ئىلگىرى ئويۇسۇزلىققا ئوخشاش مېڭىدە قۇرۇقلۇق ئېشىپ كەتكەنلىك ئالامەتلەر بولىدۇ.
2. كۆيىگەن خىللىقلار ئاشقازانغا يىغىلىدۇ، ئۇنىڭ بۇخارلىرى كالپۇكقا ئورۇنلىشىپ كالپۇك يېرىلىدۇ، قاسراقلىشىدۇ.
3. قىزىتمىلىق كېزىك (تەبىئى مۇھرىقە) تەبەددىكى قۇرۇقلۇق ۋە ھارارەت تۈپەيلىدىن كالپۇك قۇرۇيدۇ، يېرىلىدۇ، ھەتتا قاسراقلىشىپ سويۇلىدۇ.

بەلغەم خۇسۇسىيەتلىك چاپلىشاڭغۇ خىلىت كالپۇكقا چاپلىشىپ يۇقىرىدىكى ھارارەتتە قۇرۇپ كالپۇك قۇرۇشنى پەيدا قىلىدۇ، ئاندىن يېرىلىدۇ. بەزىدە قاسراقلىشىپ بەلغەمىسمان پەردە چۈشۈشى مۇمكىن.

يەنە كۆپ قان يوقاتقان، ئېغىر ئىچى سۈرگەندىمۇ بۇ خىل ئەھۋاللار ئوچرايدۇ.

ئالامىتى

ئەتسىياز، كۆز بەسىللىرىدە كۆپرەك ئوچرايدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىرگە قىزىتمىلىق





كېسەللىكلەر بىلەن ئاغرىغانلار، ئۇزاق مۇددەت ئىچى سۈرۈپ بەدىنىدە ھۆلۈك ئازايغانلار ۋە سىل كېسىلىگە ئوخشاش سوزۇلما خوراتقۇچى كېسەللىكلەر بىلەن ئاغرىغانلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ.

دەسلەپتە ئېغىز قۇرۇشتەك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ، كېسەل كىشى ئىختىيارسىز ھالدا تىلى بىلەن كالىپۇكىنى يالاپ نەملەپ تۇرۇشقا مەجبۇر بولىدۇ، كېيىنچە كالىپۇك يېرىلىدۇ. قانايىدۇ، قاسراقلىشىپ سويۇلىدۇ، ئاغرىدۇ.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن بەدەندىكى قۇرۇقلۇق ئاشقان سەۋەبلەرنى ئېنىقلاش، كېزىك، سىل، قان يوقىتىش، ئىچ سۈرۈشتەك كېسەللىكلەر بولسا ئۇلارنى ۋاقتىدا داۋالاش، قۇرۇقلۇقنى قايتۇرۇپ، بەدەننى ھۆللەشتۈرگۈچى ئۆسۈل-چارىلەر ۋە دورىلارنى ئىشلىتىش لازىم.

ماتۇلجۇبىنى ئىچسە ۋە ئۇنى كالىپۇكقا سۈرسە ناھايىتى ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ. سىرتقى جەھەتتە قىز تۇغقان ئايال سۈتى بىلەن پات-پات كالىپۇكى نەمدەش؛ تەرخەمەك كۆپۈكى، بىنەپشە يېغى بىلەن تەييارلانغان قىرۇتى (موملۇق ياغ) بىلەن كالىپۇكى ياغلاش؛ موزا، قەلەي كۇشتىسى، نىشاستىلەرنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، توخۇ يېغىغا ئارىلاشتۇرۇپ كالىپۇكقا چېپىش؛ ئىسبەغۇل شىرىسى (لوتايى) نى ئەرنى گۈل بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ سۈرۈش ياكى يېھى تۇرۇقى، ئاق لەيلى تۇرۇقى، زىغىرلاردىن بىرىنىڭ شىرىسىنى چىقىرىپ كالىپۇكقا سۈرۈش؛ قاپاق يېغى، ئۆسۈك يېغى، خەشخاش ياغلىرىنىڭ بىرى بىلەن كالىپۇكىنى ياغلاش كېرەك. كېسەللىك ماددىسىنى يۇقىرىدىن تۈۋەنگە تارتىش ئۈچۈن بىنەپشە يېغىنى كىندىككە سۈركەش لازىم.

چاپىدىغان ھەر قانداق دورىنى كالىپۇكقا چاپقاندىن كېيىن توخۇ توخۇمىنىڭ ئىچىدىكى ئاق پەردىسىنى دورا ئۈستىدىن چاپلاپ قويسا ھەم دورىنى ھەم يېرىلغان، سويۇلغان جايىنى سىرتقى تەسىرلەردىن ساقلايدۇ.

ئوزۇقلىنىشتا كالا-پاقالچاق ئىستېمال قىلىش ۋە شۇرپىسىنى ئىچىش، ئاچچىق-چۈچۈك، ئۆتكۈر تەسىرلىك تۈرلۈك تاماقلارنى يېمەسلىك، تاماقتى قىزىق پېتى ئىستېمال قىلماسلىق، شامالغا چىقىشتىن ساقلىنىش لازىم.





## كالبۇك ئاقىرىش

كالبۇك ئاقىرىپ قېلىش (سەفېدى لەب، بەيازۇششە فەتى) بەدەننىڭ باشقا جايلىرىدا بەرەس (ئاق كېسەل) پەيدا بولماي تۇرۇپ مەلۇم سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن خاس كالبۇكنىڭلا ئاقىرىپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

ئاساسىي سەۋەبى بەلغەمدىن بولىدۇ. قاننىڭ ئۆزگىرىشى، يەرلىك ئورۇننىڭ ھارارىتى كېمىيىپ كېتىشى تۈپەيلىدىن خام بەلغەم خۇسۇسىيەتلىك ھۆلۈك ئېشىپ يەرلىك ئورۇندا تۇرۇپ قېلىپ كالبۇك ئاقىرىشى پەيدا قىلىدۇ. ھۆلۈك ئېشىپ كەتكەنلىكتىن ئۆزگەرتكۈچى قۇۋۋەت ئاجىزلىشىپ ئوزۇقلۇقلارنى ئەزالارنىڭ مۇناسىپ ھالدىكى رەڭگىگە ئۆزگەرتەلمەيۋاتقان مەزگىللەردە ئەگەر مەلۇم سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن كالبۇكتا قاپارتما ھاسىل بولۇش، سۇ كۆتىرىش، بىر قەۋەت تېرە تاشلاشتەك ئەھۋاللار كۆرۈلسە كالبۇكنىڭ تېگىدىن ئاقىرىپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

دېمەك، كالبۇكنىڭ ئاقىرىپ قېلىشى قاننىڭ ئۆزگىرىشى، بەلغەم خىلىتىنىڭ ئارتىشى ۋە باشقۇرغۇچى ئەزالارنىڭ قۇۋۋىتى ئاجىزلىشىشى تۈپەيلىدىن يۈز بېرىدۇ. قىزىتمىلىق كېسەللىكلەرنىڭ بۇھران يۈز بەرگەن مەزگىلدە قان، سەپرا سەۋەبىدىن كالبۇكقا قوقاققا ئوخشاش نەرسىلەر چىققاندىمۇ كالبۇك ئاقىرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ئالامىتى

كالبۇكتىكى ئاقلىق روشەن بولۇپ بىر قاراشتىلا بىلگىلى بولىدۇ، سەل پارقراق كېلىدۇ. ياكى دەسلەپتە كالبۇكتا سۇ كۆتىرىپ ئازراق جاراھەت پەيدا بولۇپ، ئاخىرىدا قاقچىلىنىپ ساقايغاندىن كېيىن يەرلىك ئورۇننىڭ ئاقىرىپ قالغانلىقىنى ئېنىق كۆرگىلى







بولدۇ. ئاق ساق تېرگە قارىغاندا روشەن ھالدا پەرقلىق بولدى.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن تەرتىپ بويىچە بەلغەم ماددىسىنى سۈرۈپ چىقىرىش ئۈچۈن ئىبارەج فەيىقەرا بېرىلىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن ئىتريپىلى كەبىر، ئىتريپىلى ھەمان قاتارلىقلار بېرىلىدۇ.

تەبىئىي ھارارەتنى ئويغىتىش، بەلغەم خۇسۇسىيەتلىك خىلىتىنى يۇمشىتىش ئۈچۈن سۈنبۇل، گۈلخەيرى، ياسمەن، زەئفەر قاتارلىقلارنىڭ يېغىنى بۇرۇنغا تېمىتىش؛ سىياھدان، قەلەمفۇر، زەيتۇن قاتارلىقلارنىڭ يېغى بىلەن كالىپۇكنى ياغلاش كېرەك. بەلغەم ماددىسىنى كۆپەيتكۈچى ھەر خىل يېمەك-ئىچمەكلىكلەر ۋە يەللىك تاماقلاردىن پەرھىز قىلىش لازىم.

ئەگەر، قىزىتمىلىق كېسەللىكلەردىكى بۆھراندىن بولسا، داۋالمىسىمۇ بولدى. ئۈزلۈكسىز يوقاپ كېتىدۇ.

ئەگەر، قان ۋە سەپرا سەۋەبىدىن قوقاقتەك مۇدۈرلەر چىققان بولسا، قىيىل تومۇردىن مۇۋاپىق مىقداردا قان ئالىسىمۇ بولدى.

## كالىپۇك تارتىشىش

كالىپۇك تارتىشىش (ئىختىلاجۇششە فەتى) كالىپۇكنىڭ لېپىلداپ تارتىشقانلىقىغا، ھەتتا تارتىشىشنىڭ ئېغىرلىشىپ كالىپۇكنىڭ نورمال ھەرىكىتىگە تەسىر يەتكۈزگەنلىكىگە قارىتىلغان.

### سەۋەبى

بەش خىل بولدى:

1. بەدەندىكى نورمال سۇيۇقلۇق ياكى قاننىڭ كۆپلەپ چىقىپ كېتىپ كالىپۇققا يامان تەسىر كۆرسەتكەنلىكىدىن كېلىپ چىقىدۇ.





2. ئاشقازان شىركىچىلىكىدىن پەيدا بولىدۇ. يەنى غىدىقلىغۇچى بىرەر يات ماددا ئاشقازان كىرىش ئېغىزىغا قۇيۇلغاندا، ئۇنى توسۇش ئۈچۈن ئاشقازان يىغىلىپ كېڭىيىپ ھەرىكەتلىنىدۇ. بۇ ھەرىكەت كالبۇك پەيلىرىنىڭ تارتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

3. يۈز فالجى (لەقۋە)، تۇتقاقلىق (سەرنى) كېسەللىكلىرى يۈز بېرىشتىن ئىلگىرى مېڭىگە غىدىقلىغۇچى بىرەر ماددا تەسىر قىلغانلىقتىن مېڭىدىكى كالبۇكقا تۇتاش بولغان سېزىم پەيلىرىنىڭ غىدىقلىنىشى پەيدا قىلىپ كالبۇك تارتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

4. بەدەندە قويۇق يەل پەيدا بولۇپ كالبۇكقا يامان تەسىر قىلغانلىقتىن كالبۇكنىڭ لېپىلداپ تارتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

5. قاننىڭ كۆپلۈكىدىن كالبۇكنىڭ ئۇششاق ئىنچىكە تومۇرلارغا قان تولغاندا، ئۇلار قىسمەن توسۇلۇپ بىر خىل سوۋۇتقۇچى قۇۋۋەت پەيدا قىلىدۇ. ھەمدە ئۇنىڭدىن ئاجراالغان قان مەنبەلىك بۇخارلارنى يەلگە ئايلاندۇرۇپ، كالبۇك تېرىسىدىكى ئۇششاق نۆشۈكلەرنى زىچلاشتۇرۇپ قويسۇ. نەتىجىدە يەللەر ئارقىلىق كالبۇك تارتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

#### ئالامىتى

بىر كالبۇك ياكى ئۈستۈن-ئاستىقى ئىككىلا كالبۇكقا تۇرۇپ-تۇرۇپ تارتىشىش كۆرۈلىدۇ. بۇ خىل ئەھۋال ئېغىرلاشسا ھەتتا ئېغىزنى نورمال ئېچىپ-يۇمۇشقا تەسىر يەتكۈزىدۇ. كۆپىنچە ھاللاردا كالبۇكنىڭ سوغۇقنى سېزىشچانلىقى تۆۋەن بولىدۇ.

1-خىلىدا: ئاغرىق كىشىدە كۆپلەپ سۇيۇقلۇق ياكى قان يوقاتقانلىق تارىخى بولىدۇ. بەدەن زەئىپ، روھى-ھالىتى تۆۋەن بولىدۇ.

2-خىلىدا: كالبۇك تارتىشىش بىلەن بىللە كۆڭۈل ئېلىشىش، ھېق تۇتۇشلار بولىدۇ. بۇ خىلدىكى كالبۇك تارتىشىش ئاغرىقنىڭ قۇسۇدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.

3-خىلىدا: كېسەل كىشىدە كالبۇك تارتىشىش بىلەن بىرگە ئىچى تىلداش، ئېزىلەڭگۈلۈك، پۇت-قوللار قوللىشىشتەك سەرنى كېسلى يۈز بېرىشنىڭ ئالدىدىكى بىشارەتلىك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

4-خىلىدا: كالبۇك تارتىشىش بىلەن بىرگە كالبۇكقا قىچىشىش بولىدۇ.



5-خىلىدا: كالىپۇك تارتىشىش بىلەن بىرگە كالىپۇك چىگىلىش، قىچىشىش ئالامەتلىرى بولىدۇ.

## داۋاسى

1-خىلىدىكىسىنى داۋالاشتا، ئالدى بىلەن سۇيۇقلۇق ياكى قان يوقىتىشنىڭ سەۋەبلىرىنى ئېنىقلاپ ئۇنى يوقىتىشقا چارە قىلىش كېرەك. ئاندىن كېيىن ئومۇمىي بەدەننى قۇۋۋەتلىگۈچى، سۇيۇقلۇقلارنى تولدۇرغۇچى، قان كۆپەيتكۈچى دورىلار ۋە يېمەك-ئىچمەكلىكلەرنى بېرىش لازىم.

2-خىلىدىكىسىنى داۋالاشتا، ئالدى بىلەن ئاشقازاننى تازىلاش، قەي قىلدۇرۇش، سەپرا ياكى بەلغەم سۈرگىسىنى ئايرىم-ئايرىم ياكى بىر قىلىپ ئىچكۈزۈش لازىم. ھەببى ئەنكار قاتارلىقلارنى ئىستېمال قىلسا بولىدۇ. ئاندىن كېيىن ئاشقازاننى كۈچەيتكۈچى دورىلارنى ئىستېمال قىلدۇرۇش، مەسىلەن: جەۋارىش ئامىيە، جەۋارىش كۆمۈنى، ئىتريفېلى كەبىر قاتارلىقلاردىن بېرىش لازىم.

3-خىلىدىكىسىنى داۋالاشتا، ئوخشاشلا ئالدى بىلەن مېڭىنى تازىلاش، بۇنىڭ ئۈچۈن ھەببى قوقىيا ياكى ھەببى ئىيارەجنى ئىستېمال قىلىش لازىم. ئاندىن كېيىن قۇرۇق ئۈزۈم، ئاقىر-قەرھا قاتارلىقلار بىلەن غەر-غەر قىلىش ھەمدە لەقۋەگە قىلىندىغان چارلەرنىڭ يەڭگىلەرلىرىنى قىلىش لازىم. ماددە تۆلھايات، مەئجۇنى تۇجاھ قاتارلىقلاردىن بەرسە بولىدۇ.

4-خىلىدىكىسىنى داۋالاشتا، قۇيۇق بەللەرنى تارقاققۇچى دورىلارنى ئىستېمال قىلىش، تىترەش (رەئىشە) كېسەللىكىگە قىلىندىغان چارلەرنى قىلىش بىلەن بىرگە جويۇزنى بابۇنە يېغىدا يۇمشاق ئېزىپ كالىپۇكقا چېپىش كېرەك.

5-خىلىدىكىسىنى داۋالاشتا، مۇۋاپىق تېپىلغاندا ئالدى بىلەن قىفال تومۇردىن قان ئېلىش، 6-5 كۈن تۈتكەندىن كېيىن تۆت تومۇر (چاھاررەگ) دىن ياكى تىل ئاستىدىكى تومۇردىن قان ئېلىش كېرەك. ئۇنىڭدىن كېيىن ئىسسىق كېسەللىكلەردە بېرىلىدىغان مەتبۇخلارغا شاھتەررە قوشۇپ ئىچىنى يۇمشىتىش، ئاندىن كېيىن تېرە تۈشۈكلىرىنى ئېچىشقا تىرىشىش كېرەك. ياكى ھەببى شەبىيار بەرگەندىن كېيىن رۇمبادىيان، بىنەپشە، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، بىسفايەج، بادىرەنجى بۇيا يوپۇرمىقى قاتارلىقلارنى قاينىتىپ، سۈزۈپ، ئوڭا مۇۋاپىق مىقداردا ئاپتاپىي گۈلقەنت قوشۇپ ئىچىش لازىم. ئىتريفېلى كەبىر قاتارلىق دورىلارنى ئىستېمال قىلىش بىلەن بىرگە سۈسۈن يېغى، قوستە يېغى قاتارلىق



ياغلار بىلەن كالىپۇكىنى ياغلاش ۋە كالىپۇكىغا ئىسسىق تۈتكۈزۈش لازىم.  
چۈچۈمەل شورپىلار بىلەن قاننى پەسەيتىش، تاماق مىقدارىنى ئازايتىش كېرەك.  
مەتبۇخى ئۈستۈخۇددۇس مۇلەيىنى 3-1 قېتىم بەرسىمۇ ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

مەتبۇخى ئۈستۈخۇددۇس مۇلەيىن

بىسفايەج، زاراڭزا مېغىزى ھەر بىرى 13.5 گرام، چىلان 20 دانە، سەرپىستان 20 دانە، ئۈستۈخۇددۇس، گۈلى بابۇنە، قەنتەرىيون دەقىق، ئەفتمۇن ھەر بىرى 8.1 گرام، سۈرۈنجان 5.4 گرام، تەرەنجىن 100 گرام.  
ئەفتمۇندىن باشقا دورىلارنى چالا سوقۇپ 1.5 لىتر سۇ قويۇپ چىلاپ بېرىمى قالغىچە قاينىتىپ تەرەنجىن قوشۇپ قاندا بويىچە سۈزۈپ ئېلىنىدۇ.  
كېسەلنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا قاراپ كۈندە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا 50 مىللىلېتردىن بېرىلىدۇ.

## كالىپۇك ۋە رەملىرى

كالىپۇك ۋە رەملىرى (تاماسھايى لەب، ئىلتىھابۇششەفەتى) ھەر خىل ئىچكى، تاشقى سەۋەبلەردىن بولغان كالىپۇك ئىششىقلىرىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

كالىپۇك ئىششىقلىرى خىلت (ماددا)سىز ياكى خىلت (ماددا)لىق سەۋەبلەردىن يەنى ماددىسىز (ئىسسىق، سوغۇق، ھۆل، قورۇق) ياكى بەدەندىكى تۆت خىلت (سەپرا، قان، بەلغەم، سەۋدا)نىڭ غەيرىي تەبىئىي تۈزگىرىشلىرى كالىپۇكىغا يامان تەسىر قىلغانلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ.

بەزىدە كالىپۇكىغا بىر نەرسە تېگىپ كېتىشتەك سىرتقى زەخمىلەر تۈپەيلىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

بەزىدە قاتتىق سوغۇق ۋە ئىسسىقلاردا تۈزۈن يول يۈرۈش، شورلۇق سۇلارنى ئېچىش



قاتارلىق سەۋەبلەردىنمۇ كېلىپ چىقىدۇ.

### ئالامىتى

ماددىسىز كەپپىياتلاردىن بولغان بولسا، ئىششىق كالىپۇكتىلا بولۇپ ئەتراپقا تارقىمايدۇ. قىزىش، ئاغرىش ئانچە ئېغىر بولمايدۇ. تېرىسى بىرئاز قوۋزاقلىشىدۇ. خىلىت ئۆزگىرىشىدىن بولغان بولسا، شۇ خىلىتلارنىڭ ئۆزگەرگەنلىكىگە خاس ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. مەسىلەن، كالىپۇك ئىششىقىنىڭ بەلغەمدىن بولغانلىرىدا قىزىش ئانچە ئېغىر بولمايدۇ. ئىششىق ئاق، يۇمشاق بولىدۇ. قاندىن بولغانلىرىدا ئىسسىتما بولىدۇ. ئىششىق قارىغا مايىل بولۇپ قىزىرىپ، ئېچىشىدۇ.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن ماددىلىق ياكى ماددىسىز سەۋەبتىن ئىكەنلىكىنى ئېنىق ئايرىش كېرەك. كالىپۇك ئىششىقى ماددىسىز ئىسسىقنىڭ تەسىرىدىن بولغان بولسا، گۈل يېغى، بىنەپشە يېغى بىلەن ياغلاش، ئاق سەندەلنى كۆك يۇمغاقسۇت سۈيىدە سۈرۈپ تېتىقنى چىقىرىپ كالىپۇكقا سۈرۈش كېرەك. ماددىسىز سوغۇقتىن بولغان بولسا، سۆسۈن يېغى، ياسمەن يېغىغا بىر ئاز قۇندۇز قەھرى قوشۇپ ياغلىسا ياخشى تەسىر قىلىدۇ.

كالىپۇك ئىششىقى ماددىلىق سەۋەبتىن بولغان بولسا، ئالدى بىلەن سەۋەبچى بولغان خىلىتنى مۇنزىچ بېرىپ پىشۇرۇش، مۇسھل بېرىپ بەدەندىن تازىلاش لازىم. بەدەن تازىلانغاندىن كېيىن ھوزۇز، بابۇنە، ئارپا تۇنى، گۈلاب، ئىت ئۈزۈمىنىڭ ئوسارىسىگە ئوخشاش ۋەرەمنى ياندۇرۇپ، ئەزانى قورۇغۇچى دورىلارنى كالىپۇكقا سۈرۈش، ئاخىرىدا بادام يېغى ۋە ئاق موم بىلەن تەييارلانغان مەلھەمنى چېپىش، قىزىق سۇ بىلەن ئوبدان يۇيۇش لازىم.

بەلغەم خىلىتىدىن بولغانلىرىغا سېرىق چېچەك، بابۇنە، ئىككىلىملىكلەرگە ئوخشاش تارقاقچۇچى دورىلارنى چېپىش لازىم. سەۋدا خىلىتىدىن بولغانلىرىغا كالىپۇك بەۋاسىرىدا ئېتىلغان دورىلارنى ئىشلىتىش، لېكىن تارقاقچۇچى ئىسسىق دورىلارنى قەتئىي ئىشلەتمەسلىك لازىم. ئىششىقنىڭ ئېغىرلاشماسلىقى ئۈچۈن سوغۇق نەرسىلەرنى مۇۋاپىق تۈردە يەرلىك ئورۇنغا ياقسا بولىدۇ.

بۇ كېسەللىكتە تاماققا دىققەت قىلىش، تاماقنى كەم يېيىش، يەللىك تاماقلاردىن

## كالپۇك دورىيىش

كالپۇك دورىيىپ قېلىش (تەقەللۇسۇششەفەتى) ئۈستۈن ۋە ئاستىنقى كالپۇكلارنىڭ بولۇپمۇ ئۈستۈنكى كالپۇكنىڭ تاشقى تەرەپكە تارتىشىپ، ئورۇلۇپ قالغاندەك دورىيىپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان بولۇپ، ئېغىزنىڭ سىرتقى كۆرۈنۈشىگە تەسىر بەتكۈزۈپلا قالماي، بەلكى تاۋۇشلارنى توغرا تەلەپپۇز قىلىشقىمۇ بەلگىلىك دەرىجىدە دەخلى يەتكۈزىدۇ. بۇ كېسەللىك خەلق ئارىسىدا «كالپۇكى دورىيىپ قاپتۇ» دەپ تەسۋىرلىنىپ «دورداق، دورداي كالپۇك» دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

### سەۋەبى

مەزكۇر كېسەللىك تۇغما (بىرلەمچى) خاراكتېرلىك ۋە كېيىن پەيدا بولغان (ئىككىلەمچى) خاراكتېرلىك دەپ ئىككى خىل بولىدۇ. كېيىن پەيدا بولغان كالپۇك دورىيىپ قېلىش كالپۇكقا بىرەر نۇقسان يەتكەنلىكتىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇ خىل نۇقسانغا ئاساسەن تۆۋەندىكى 2 خىل تەشەننۇج سەۋەبچى بولىدۇ.

1. ھۆلۈك ئاشقان تەشەننۇجىدىن كالپۇك دورىيىپ قالىدۇ. بۇنىڭدا كالپۇك پەيلىرىنىڭ كاۋاكلىرىغا كۆپىنچە بەلغەم ماددىسى توشۇپ قالىدۇ. دە، بۇ خىل توشۇقلۇق كالپۇك پەيلىرىنىڭ توغرىسىغا سوزۇلۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ كالپۇكنى تارتىشتۇرۇپ كالپۇك دورىيىشىنى پەيدا قىلىدۇ. بۇ، تەشەننۇجى ئىستىلا ئىدىن يەنى توشۇپ قېلىش خاراكتېرلىك تارتىشىپ قېلىشتىن بولغان كالپۇك دورىيىش دەپ ئاتىلىدۇ.

2. قۇرۇقلۇق ئاشقان تەشەننۇجىدىن كالپۇك دورىيىپ قالىدۇ. بۇنىڭدا بەدەننى قۇرۇتقۇچى ئامىللاردىن، مەسىلەن: كۆپ قۇسۇش، ئۇزۇن مۇددەت ئىچى سۈرۈش، دائىم ئادەتتىن تاشقىرى ئاچ قېلىش، ئويۇقسىزلىق، ئارتۇقچە جاپا تارتىش ۋە ئۆتكۈر قىزىتمىلىق كېسەللىكلەر تۈپەيلىدىن كالپۇك پەيلىرى تارتىشىپ كالپۇك دورىيىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ تەشەننۇجى ئىستىفراغدىن يەنى ئىستىفراغ خاراكتېرلىك تارتىشىپ قېلىشتىن بولغان كالپۇك دورىيىش دەپ ئاتىلىدۇ. بەزىدە ئۆلۈم يېقىنلاپ قالغاندەك

### ئالامىتى

1. ھۆللۈك ئاشقان تەشەنئۇجىدىن بولغان كالبۇك دورىدىشتا، كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆپىنچە بىردىنلا پەيدا بولىدۇ. كالبۇكتا ئېغىرلىق ۋە سۇسلىق بولىدۇ. بولۇپمۇ كالبۇك ھەرىكەت قىلسا تېخىمۇ تارتىشىپ دورىدىپ كېتىدۇ. كالبۇك بوش، يۇمشاق ۋە سوغۇق بىلىنىدۇ. سىرتقى جەھەتتە ياغلار بىلەن ياغلىسا ياغنى تارتمايدۇ.
2. قۇرۇقلۇق ئاشقان تەشەنئۇجىدىن بولغان كالبۇك دورىدىشتا، كالبۇك دورىدىش ئاستا-ئاستا باشلىنىدۇ. كالبۇك ئورۇق، چىگرىق ۋە سوغۇق بىلىنىدۇ. سىرتقى جەھەتتە ياغلار بىلەن ياغلىسا ياغنى تېزلا تارتىپ كېتىدۇ.

### داۋاسى

ئەگەر كالبۇك دورىدىش تۇغما بولغان بولۇپ باللىق مەزگىلدە كالبۇكنى ناھايىتى يۇمشاقلىق بىلەن دائىم بىر تەرەپكە تارتىش ئارقىلىق تۈزەش مۇمكىن. كوناغانلارنىڭ داۋاسى يوق.

1. ھۆللۈك ئاشقان تەشەنئۇجىدىن بولغان كالبۇك دورىدىشىنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن ماددىنى پىشۇرۇش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن ھەر كۈنى ماٹول ئوسۇل شەرىپتىگە گۈلقەنت قوشۇپ ئىستېمال قىلىش كېرەك. ماددا پىشقاندىن كېيىن فالەج كېسەللىكىدە بېرىلگەن ئىيارەجلەردىن، مەسلەن: ئىيارەجى فەيقەرانى بېرىش كېرەك. لېكىن ماددىنى تازىلاشتا ئەسەبلەردىكى ماددىلارنى تولۇق تارتىپ چىقىرىش ئۈچۈن يەڭگىل تەسىرلىك دورىلارنى تەدرىجىي قوللىنىش كېرەك. ماددا تازىلىنىپ بولغاندىن كېيىن ئىسسىق تەبىئەتلىك ياغلار، مەسلەن: قوستى يېغى، سۇزاپ يېغى، ياسمەن يېغى قاتارلىقلار بىلەن كالبۇكنى ياغلاش كېرەك. قۇندۇز قەھرى، فەرفىيۇن، ئاقىر قەھالارنى يۇقىرىدىكى ياغلاردا ئېزىپ ياغلىسا تەسىرى تېخىمۇ ياخشى.

2. قۇرۇقلۇق ئاشقان تەشەنئۇجىدىن بولغان كالبۇك دورىدىش ئوتتۇرا ياشلىقلار ۋە ياشانغانلاردا كۆرۈلسە ئاسانلىقچە داۋا قوبۇل قىلمايدۇ ياكى ساقايمىدۇ. ياشلار ۋە بالىلاردىكىسىمۇ تەستەرك ساقىيدۇ ھەمدە ئۇزۇن ۋاقىت كېتىدۇ.

ئالدى بىلەن پۈتۈن بەدەنگە بولۇپمۇ ئۇقسان يەتكەن ئەزاغا ھۆللۈك يەتكۈزۈشكە



تەرىشىش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن يېڭى سېغىلغان ئېشەك سۈتى، ئۈچكە سۈتى، ئارپا سۈيى، بېھى تورۇقى شىرسى، بىنەپشە شەرىپتى، نىلۇفەر شەرىپتى، قاپاق يېغى، تاتلىق بادام يېغى قاتارلىقلاردىن قايسى بىرى تېپىلسا شۇنى بەككە ھالدا ياكى بىر قانچىسىنى بىرلەشتۈرۈپ ئىچسە، كالىپۇكقا سۈرسە بولىدۇ. بادام يېغىدا ئەتكەن ھالدا ئوبدان پايدا قىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا مۇناسىۋەتلىك ھۆلۈك دورىلارنى، مەسلەن: بىنەپشە گۈلى، تۈسۈڭ غازىڭى، ئاق لەيلى غازىڭى ۋە گۈلى، ئارپا ئۈنى، سەي كاۋىسى، ئۈچكە سۈتى قاتارلىقلار بىلەن قايناتقان سۇدا پۈتۈن بەدەننى ۋە كالىپۇكنى يۇيۇش، بەدەنگە ۋە يەرلىك ئورۇنغا ھۆلەشتۈرگۈچى دورىلارنى سۈركەش، مەسلەن: كالىنىڭ پاقالچاق يىلىكى، مېكىيان توخۇنىڭ يېغى، ئاق موم، بىنەپشەلەردىن ياسالغان قىروتى قاتارلىقلارنى سۈرۈش لازىم.

### كالىپۇك ئۇششاق مۇدۈرى ۋە يىرىڭلىق چاقىسى

كالىپۇكقا ئۇششاق مۇدۈر ۋە يىرىڭلىق چاقا چىقىش (بۇسۇرۇششە فەتى ۋە قۇرۇھۇششە فەتى) بەدەندىكى خىلىتلارنىڭ ئۆزگىرىشى كالىپۇكقا يامان تەسىر قىلىپ كالىپۇك چۆرىسىگە ئۇششاق مۇدۈرلەر ۋە يىرىڭلىق چاقىلار چىققانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

بەدەندىكى خىلىتلارنىڭ بولۇپمۇ قان، سەپرا ماددىسىنىڭ غەيرىي تەبىئىي ھالدا نورمالسىز ئۆزگىرىشى تۈپەيلىدىن بەزى قويۇق ماددىلار كالىپۇك ئەتراپىدا توختاپ قېلىپ، بۇخارات پەيدا قىلىش بىلەن كالىپۇكقا ئوخشىمىغان دەرىجىدە مۇدۈر چىقىدۇ. ئەگەر ئۇ ئوقۇنەتلەنسە يىرىڭلىق چاقىلارغا ئايلىنىدۇ.

ئالامىتى

مەزكۇر كېسەلنى پەيدا قىلغۇچى سەۋەبچى ماددىلار بەگگىل بولسا كالىپۇك ئەتراپىغا پات-پات ئۇششاق مۇدۈر چىقىپ، ئۈزلۈكسىز يوقىلىپ كېتىدۇ، ئاغرىشتەك باشقا







ئالامەتلەر بولمايدۇ. ئەگەر بۇخارات كۈچلۈك، ئوقۇنەتلىنىش ئېغىر بولۇپ تۇششاق مۇدۈرلەر ئۇزۇنغىچە ساقايمىسا، تەدرىجىي چوڭىيىپ يىرىڭلىق چاقىغا ئايلىنىدۇ، بەزىلىرى ئەتراپىغا يامراپ ئېغىز يارىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. قىزىرىش، چىڭقىلىش، لوقۇلداپ ئاغرىشتەك ئالامەتلەر قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

### داۋاسى

مەتبۇخى ھەلىلە ياكى مەتبۇخى ئەفتمۇن، ئىتريفىلى ئەفتمۇن قاتارلىق دورىلارنى بېرىش لازىم. سىرتتىن ئەھۋالغا قاراپ مەلھىمى ئىسپىداچ چېپىلىدۇ ياكى مەلھىمى گىلى ئەرمىنى تەييارلاپ چاپسا بولىدۇ.

### مەلھىمى گىلى ئەرمىنى

گۈل يېغى، بابۇنە گۈلى، ئاق لەيلى گۈلى ھەر بىرى 10 گرام، زىغىر، ئىسبە غۇل ھەر بىرى 6 گرام، قاپاق مېغىزى 10 گرام، گىلى ئەرمىنى 15 گرام. بابۇننى قاينىتىپ تۇنىڭ سۈيىدە ئاق لەيلى گۈلى، زىغىر، ئىسبە غۇللارنىڭ لۇئاب (شىرىسى) نى چىقىرىپ، تۇنىڭغا قاپاق مېغىزى، گىلى ئەرمىنى سوقۇپ قوشۇپ، ئوبدان ئارىلاشتۇرۇپ خېمىر قىلىپ كالىۋىكقا چاپسا بولىدۇ.

## كالىۋىكقا ئارتۇقچە گۆش ئۆسۈش

كالىۋىكقا ئارتۇقچە گۆش ئۆسۈش (بەۋاسىرى لەب، بەۋاسىرۇششە فەتى)، كالىۋىك ئىچىگە كىچىك ئۈزۈمدەك چوڭلۇقتا ئارتۇقچە گۆش ئۆسۈپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان.

### سەۋەبى

ئىچكى، تاشقى ئامىللارنىڭ تەسىرىدىن كۆيۈپ، بۇزۇلغان قاننىڭ كالىۋىك تۇششاق



شاخچە تومۇرلىرىدا توختاپ قېلىشى تۈپەيلىدىن تەدرىجىي ھالدا ئۆسمە گۆش پەيدا بولىدۇ.

## ئالامىتى

ئالامىتى 2 خىل بولىدۇ:

1. كۆپىنچە تۆۋەنكى كالىپۇكىغا كىچىك ئۈزۈمدەك چوڭلۇقتا رەڭگى كۆكۈش كەلگەن قانتىق مۇنەك ئۆسۈپ چىقىپ، ئوتتۇرىسىدىن يېرىلىدۇ. بەزىلىرى چوڭىپ كالىپۇك تېشىغا كۆتۈرۈلۈپ بىر ئاز تۇرۇلۇپ قالىدۇ.
2. تۆۋەنكى كالىپۇكنا شەكلى قارا ئۈجمىگە ئوخشاش گۆش پەيدا بولىدۇ، ئاغرىمايدۇ. بەزىلىرى چوڭىپ كالىپۇكنىڭ تېگى تەرەپنى قورۇپ، كالىپۇك سېزىمىنى يۇقتىدۇ. بەزىلىرى يامانلىشىپ سەرتان (راك) غا ئايلىنىپ قېلىشى مۇمكىن.

## داۋاسى

كېسەللىك يېڭى ۋە يەڭگىلەرەك بولسا مەتبۇخى ئەفتمۇن، ئىبارەج فەبقەرا بېرىپ بەدەننى تازىلاش بىلەن بىرگە، سىرتقى تەرەپتىن يەرلىك ئورۇننى مەلھىمى دارچىنى بىلەن ياغلاش لازىم. كالىپۇك بەۋاسىرى رەڭگىنىڭ قارا ياكى قىزىللىقىغا دىققەت قىلىش كېرەك. ئەگەر رەڭگى قارا بولسا، كالىپۇكنىڭ ئۈزۈمىنى ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن نەشتە بىلەن كالىپۇكنى تىلغاندىن كېيىن قاننى توختىتىش ئۈچۈن سىركە سۈركەش كېرەك. چۈنكى سىركە قان توختىتىشقا داغلىغاننىڭ ئورنىنى باسدۇ. ئەگەر كالىپۇك بەۋاسىرىنىڭ رەڭگى قىزىل بولسا، تىغ ئىشلىتىشنى ساقلىنىش شەرت. چۈنكى بۇ چاغدا ئوششاق ھەرىكەتلىك تومۇرلار قان تولغان (ئىستىلائوددەمى) ھالەتتە بولغانلىقتىن تىغ تەگسە مەزكۇر تومۇرلار كېسىلىپ كېتىپ، قان توختىماسلىق خەۋپى بولىدۇ. بۇنداق ھاللاردا ئالدى بىلەن زىسادى ئەدەس (بۇرچاق قويۇق مەلھىمى) ۋە مەلھىمى موردارسەنگە (گۆش ئۈندۈرگۈچى مەلھەم) ئىشلىتىش لازىم.

كېسەللىك كونا، ئېغىرراق بولسا مەخسۇس دەستكارى ئۈسۈلى بىلەن كېسىپ ئېلىۋېتىش، كالىپۇكنى ئۈزۈنسىغا تىلپ ئاندىن كالىپۇك سىرتىغا تۇرۇلۇپ قالمىغۇدەك ھالەتتە تىكىپ، زەئفەر، خۇنسىياۋشانلارغا ئوخشاش قان توختاتقۇچى دورىلارنى سېپىپ، ئاندىن جاراھەتنى پۈتتۈرگۈچى مەلھەملەرنى سۈركەش لازىم.



## زىمادى ئەدەس

ئاق پۇرچاق، بابۇنە، ئىككىلىملىك، ئاق لەيلى تۇرۇقى ھەر بىرىدىن باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، شۇنىڭغا لايىق مىقداردىكى تۇخۇم سېرىقى ۋە مېكىيان تۇخۇ يېغى ئېلىنىدۇ. ئالدى بىلەن يۇقىرىقى تۆت خىل دورىنى سۇدا ئوبدان پىشۇرغاندىن كېيىن سۈزۈپ ئېلىپ، تۇخۇم سېرىقى، تۇخۇ يېغى بىلەن ئېزىپ خېمىردەك قىلىنىدۇ. كالىۋك بەۋاسىرى ۋە چاقىسىغا ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ. لازىم بولغاندا تەييارلاپ كالىۋكقا تاڭسا بولىدۇ.

## مەلھىمى موردارسەنگ

مەدەستاندىن 23 گرام ئېلىپ يۇمشاق سوقۇلىدۇ، زەيتۇن يېغىدىن 6 گرام ئېلىپ قىزىتىلىدۇ. كۈندۈز، مىلتىق دورىسى. ئەزەرۇت، خۇتسىياۋشان، زېپى يابىسلارنىڭ ھەر بىرىدىن 6 گرام ئېلىپ تالقانلىغاندىن كېيىن مەدەستان ۋە زەيتۇن يېغىنى قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. چاراهەتلەرگە گۆش ئۈندۈرۈپ. چاراهەتنى پۈتتۈرۈشتە ئىنتايىن ياخشى تەسىرگە ئىگە.

## ئېغىز پۇراش

ئېغىز پۇراش (بەخىرۇلفەمى) ئېغىز سېسىق پۇرىغانلىقىغا بولۇپمۇ گەپ قىلغاندا ئېغىزدىن سېسىق پۇراق چىققانلىقىغا قارىتىلغان بولۇپ، كۆپىنچە ھاللاردا كېسەل كىشىنىڭ ئۆزىگە بىلىنمەي باشقىلارغا بىلىنىدۇ.

## سەۋەبى

ئىچكى، تاشقى سەۋەبلەرنىڭ يامان تەسىرىدىن ئېغىز پۇراش كېلىپ چىقىدۇ. ئىچكى جەھەتتە بىرەر خىلىنىڭ ئۆزگىرىشىدىن پەيدا بولغان بەزى قويۇق





بۇخاراتلىق كېسەللىكلەرنىڭ، مەسىلەن: ئۆپكە سىلى، گال، ئېغىز-چىش كېسەللىكلىرى، ئاشقازان كېسەللىكلىرى، پۈتۈن بەدەنلىك يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر ۋە ئۆسمە كېسەللىكلەرنىڭ ئوقۇنۇت بۇخارلىرى ئېغىز ئارقىلىق سىرتقا چىقىپ ئېغىز پۇراشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

تاشقى جەھەتتە يېمەك-ئىچمەك ماددىلىرى ئېغىز بوشلۇقى ۋە چىش مۇنۇكلىرىگە يىغىلىپ ۋاقتى-ۋاقتىدا پاكىزلەنمىگەچكە تەدرىجىي ھالدا ئوقۇنۇت پەيدا قىلىپ، ئېغىز پۇراشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

### ئالامىتى

گەپ قىلغاندا، ئېغىز ئارقىلىق نەپەسلىنىپ نەپەس چىقارغاندا ئېغىز پۇرايدۇ. كۆپىنچە ئاغرىقنىڭ تۈزىگە بىلىنمەي يېقىن تۇرغان ياكى قارشىسىدىكى كىشىلەرگە بىلىنىدۇ. كېسەللىك يېڭى ۋە يېنىك بولسا ئېغىز بەزىدە سېسىق پۇرايدۇ، بەزىدە پۇرىمايدۇ. ئەگەر كېسەللىك كوناغان ۋە ئېغىراق بولسا ئېغىزدىن دائىم كۈچلۈك سېسىق پۇراق چىقىدۇ.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن قايسى خىلىت بۇزۇلغان بولسا شۇ خىلىتنى تازىلاپ تەكشۈش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن مەتبۇخى ئەفتمۇن، مەتبۇخى ھەلىيە، ئىيارەج فەيقەرا قاتارلىق دورىلار بېرىلىدۇ. سۇنىيۇل، پوستى تۇرۇنجى (جۈيزە پوستى)، سەئىدى كوفىلارنى 5 گرامدىن ئېلىپ، 100 گرام سىركە بىلەن قاينىتىپ ئېغىزنى چايقاش لازىم.

ئېغىز پۇراشقا سەۋەبچى بولغان ئەسلى كېسەللىكنى داۋالاشقا ئاكتىپ تەدبىر قىلىش لازىم. ئەسلى كېسەللىك ساقايىسا ئېغىز پۇراش شۇنىڭغا ئەگىشىپ ياخشىلىنىپ قالىدۇ.

ئېغىز بوشلۇقىنىڭ تازىلىقى ياخشى بولمىغانلىقتىن كېلىپ چىققان ئېغىز پۇراشنى داۋالاشتا ئالدىنى ئېلىشنى ئاساس قىلىش، ئېغىزنى دائىم تاماقتىن كېيىن، كەچتە ئۇخلاشتىن بۇرۇن ۋە ئۇخلاپ قوپقاندىن كېيىن يىلمان سۇ بىلەن چۈتكىلاپ يۇيۇش، تۇز سۈيى ياكى مۇناسىۋەتلىك دورا سۇلىرى بىلەن ئېغىزنى چايقاش لازىم.





## شۈلگەي ئېقىش

شۈلگەي ئېقىش (كەسرە تۇللۇتايى) كېسلى ئادەتتىكى چاغلاردا ۋە بەزىدە ئوخلىغان ۋاقىتتا ئېغىزدىن كۆپ مىقداردا شۈلگەي ئاققانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

1. ئاشقازاندا ھۆل ئىسسىقلىقنىڭ غەلبە قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ.
  2. ھەزىمنىڭ ناچارلىشىپ ئاشقازاندا بەلغەم خۇسۇسىيەتلىك سوغۇق سۇيۇقلۇقلارنىڭ توپلىشىپ قالغانلىقىدىن پەيدا بولىدۇ.
- بەك ياشانغاندا، ھامىلدارلىقتا، كىچىك بالىلاردا، زەھەرلەنگەندە ۋە يىلان، چايان قاتارلىقلار چاققاندىمۇ ئېغىزدىن شۈلگەي ئېقىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ.

ئالامىتى

1. ئىسسىقلىقتىن بولسا، شۈلگەي قورساق ئاچ ۋاقتىدا كۆپىيىدۇ.
2. سوغۇقتىن بولسا، قورساق توق ۋاقتىدا شۈلگەي كۆپىيىدۇ. ھەزىم قىلىش خىزمىتى ئاجىزلىشىپ ئېغىز تەمى ئاچچىق - چۈچۈك بولۇپ قالىدۇ.
3. ياشانغانلىق، ھامىلدارلىق، بالىلىق، زەھەرلەنگەنلىك، زەھەرلىك ھاساراتلار چاققانلىق تارىخى بولىدۇ.

داۋاسى

1. ئاشقازاندا ھۆل ئىسسىق يىغىلغانلىقتىن بولغان شۈلگەي ئېقىشىنى داۋالاشتا، ئانار، ئالما، بېھى ۋە غورا قىياملىرىنى بېرىش؛ ئالما، بېھىگە ئوخشاش تۇتقۇچى مېۋىلەرنى ئىستېمال قىلىش ۋە ئانار شەرىپتى، ئالما شەرىپتى قاتارلىقلارنى ئىچىش كېرەك. سىماق، ماش، قىزىلگۈللەرنى ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ، قاينىتىپ سۈيى بىلەن ئېغىزنى چايقاش





لازىم. ھۆل كاسىنى ئازراق تۈز بىلەن چالا سوقۇپ يېيىش كېرەك. بۇ چارىلەر ئىسسىقنى قايتۇرۇش، ھۆللۈك قۇرۇتۇش، شۆلگەي تىزگىنلەش رولىغا ئىگە.

2. ئاشقازاندا بەلغىمى سوغۇقلۇق يىغىلغانلىقتىن بولغان ئېغىزدىن شۆلگەي ئېقىشىنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن سېرىق چېچەك، تۇرۇپ تۇرۇقى، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى قاتارلىقلارنى قاينىتىپ ئىچكۈزۈپ قۇستۇرۇش لازىم. تۇنىڭدىن كېيىن ئاشقازاننى كۈچەيتىش ئۈچۈن ئىتريپىلى كەبىر، جەۋارىش كۆمۈنى، جەۋارىش ئىتريپىلى قاتارلىق ئىسسىق مەئجۇناتلارنى ئىستېمال قىلىش، بۇغداي تالقىنى بىر ئاز قىچا بىلەن قوشۇپ يېيىش، كۈندۈر ۋە مەستكىنى چايناش كېرەك.

### ئېغىز ۋە رىمى

ئېغىز ۋە رىمى (ۋەرەمۇلفەمى، قۇلاڭ) ئېغىزدا يۈز بەرگەن پىشلاقسىمان ھۆل چاقىغا قارىتىلغان بولۇپ، ئېغىز ۋە تىلىنىڭ ئۈستىدە پەيدا بولىدۇ. تەدرىجىي كېڭىيىپ ئېغىزنىڭ ھەممە يېرىنى قاپلايدۇ. ئېغىز شىللىق پەردىلىرى ئاقىرىپ ياپىلاق مۇدۈر پەيدا بولىدۇ. مەزكۇر كېسەللىك كۆپىنچە ئەمچەك يېشىدىكى بالىلاردا كۆپرەك ئۇچرايدۇ. بەزىدە بالىلارنىڭ تىل ئۈستى، قوۋۇز ئىچىنى قاپلىغاندىن سىرت، يەنە گالغا ھەتتا ئۆپكەگە قەدەر يامراپ كېتىشى مۇمكىن. خەلق ئارىسىدا ئۇنى «ئېغىز ئاغرىش» دەپ ئاتايدۇ.

سەۋەبى

ئومۇمىي جەھەتتىن ئېيتقاندا ئىچكى ياكى تاشقى ئامىللارنىڭ ئېغىزغا يامان تەسىر قىلغانلىقىدىن ئېغىز ئاغرىش كېلىپ چىقىدۇ.

ئىچكى جەھەتتە خىلىتلارنىڭ قايسى بىرى سان ياكى سۈپەت جەھەتتە ئۆزگىرىپ ئوفۇنەت پەيدا قىلىپ، ئېغىزغا يامان تەسىر قىلغانلىقىدىن ئېغىز ئاغرىش كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭدا كۆپىنچە قان ياكى سەپرا، شور بەلغەم، كۆيگەن سەۋدا قاتارلىقلاردىن پەيدا بولىدۇ.

تاشقى جەھەتتە ئېغىز تازىلىقىغا ئېتىبار بەرمەسلىك، بەزى ئومۇمىي بەدەن كېسەللىكلىرىنىڭ تەسىرى ۋە يىمىرگۈچى ماددىلارنى ئېغىزغا ئېلىش، سىمابلىق





ياسالساڭا ئىستېمال قىلىش قاتارلىقلاردىن كېلىپ چىقىدۇ.

### ئالامىتى

ئېغىز شىللىق پەردىلىرىگە ئاقۇش رەڭلىك پىشلاققا ئوخشاش ئۇششاق مۇدۇرلەر چىقىپ ئېغىز ئوخشىمىغان دەرىجىدە ئاغرىيدۇ. ئېغىز شىللىق پەردىلىرى كۆيۈشكە ئىلگىن بەڭگىل دەرىجىدە ئىششىش كۆرۈلىدۇ. كىچىك بالىلار تولا يىغلاپ ئەمچەك ئەمەي بىئارام بولىدۇ.

قان ياكى سەپرا ماددىسىدىن بولسا، بەدەندە ھارارەت ۋە قىزىللىق بولىدۇ. ئېغىز شىللىق پەردىلىرى كۆتۈرۈلۈپ قالغاندەك كۆرۈنىدۇ ھەمدە كۆيۈشۈپ، ئېچىشىپ قاتتىق ئاغرىيدۇ. ئېغىز رەڭگى توق قىزىل بولىدۇ، شۇڭىگە ئاقمايدۇ.

شور بەلغەم ماددىسىدىن بولسا كۆيۈشۈپ، ئېچىشىپ ئاغرىش ئېغىر بولمايدۇ. شور بەلغەمنىڭ تۈزلۈقلۈقى تۈپەيلىدىن ئېغىز ئەتراپىدا ئۇششاق ئاق رەڭلىك چېچەكتەك جاراھەتلەر بولىدۇ. شۇڭىگە كۆپ ئاقىدۇ.

كۆيىگەن سەۋدا ماددىسىدىن بولسا ئېغىز قۇرۇيدۇ، قورۇلۇپ ئاغرىيدۇ. شۇڭىگە ئاقمايدۇ. ئادەتتىن تاشقىرى ئېچىشىدۇ. تىل ئۈستىنى قارامۇل گەز باغلايدۇ ھەمدە سەۋدانىڭ باشقا ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن غالىب كەلگەن خىلىتى بەدەندىن تازىلاپ چىقىرىش كېرەك. مۇۋاپىق تېپىلسا قان ئېلىشمۇ پايدىلىق. ئەگەر مەزكۇر كېسەللىك ئومۇمىي بەدەن شېرىكچىلىكىدىن بولسا، ئۆكھەل تومۇرى (رەڭگى ھەفتى ئەندام) دىن قان ئالسا بولىدۇ. ئەگەر باشنىڭ شېرىكچىلىكىدىن بولسا ئالدى بىلەن قىفال تومۇردىن، ئاندىن كېيىن تىل ئاستى تومۇرى ۋە چاھار رەگ تومۇرى (ئۈستۈن ۋە ئاستىنى كالىپۇك ئىچىدىكى تومۇرلار) دىن قان ئالسا بولىدۇ. چاھار رەگ تومۇرىدىن قان ئېلىش قان ۋە سەپرا ماددىسىدىن بولغان بارلىق ئېغىز كېسەللىكلىرى ئۈچۈن پايدىلىق.

ئەگەر مەزكۇر كېسەللىك ئېغىرراق بولۇپ، ئېغىزدىن سۇيۇقلۇق كۆپ ئاقسا كۈچلۈك دورىلار بىلەن ئاجىز دورىلارنى بىرلەشتۈرۈپ مۆتىدىل قىلىپ ئىشلىتىش لازىم.





ئەگەر كېسەللىك ئېغىرلىشىپ تاڭلاي تېرىسى ۋە تىل ئاستىدىن ئۆتۈپ ھەتتا شۇ جايلارنىڭ سۆڭەكلىرىگىچە يەتكەن بولسا، ئوفۇنەتلەنگەن جاراھەتنىڭ ئەتراپىغا يېىلماسلىقى ئۈچۈن كۈچلۈك دورىلارنى، مەسىلەن: فلافىيونى ئاقاقىيا بىلەن ئىشلىتىش لازىم. بۇنىڭدا ھەرقانداق رەۋغىناتلارنى بولۇپمۇ زەيتۇن يېغىنى ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش لازىم. ئەگەر ياغلارنى ئىشلىتىشتىكى مەقسەت باشقا دورىلارنىڭ قۇرۇقلۇقىنى يوقىتىش ئۈچۈن بولسا توتقۇچى (قابىز) ياغلارنى، مەسىلەن: ھەبۇلتاس يېغىنى گۈل يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

قان ياكى سەپرادىن بولغان ئېغىز ۋەرىمىنى داۋالاشتا كېسەل ماددىسىنى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى ھەلىيلە، مەتبۇخى شاھتەررە بېرىلىدۇ. ھارارەتنى پەسەيتىش ئۈچۈن نىلۇفەر شەرىپىنى ئىچكۈزۈلىدۇ ياكى ئۇنىڭغا سوغۇق تەبىئەتلىك تۇرۇقلار شىرىسى، مەسىلەن: سېمىز ئوت تۇرۇقى، تەرخەمەك تۇرۇقى، تاۋۇز تۇرۇقى، قاپاق تۇرۇقى، ئۆسۈك تۇرۇقى ۋە كاسىن ئۇرۇقلىرىنىڭ شىرىسىنى قوشۇپ ئىستېمال قىلدۇرۇلىدۇ. سىرتقى جەھەتتە قىزىلگۈل، يۇمىغاقسۈت تۇرۇقى، مارجان شوخلىسىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ، 100 گىرام سىركە بىلەن قاينىتىپ، ئېغىزنى كۈندە 3 قېتىم چايقاش ياكى تاباشىر، قىزىلگۈل، سۇماق، يۇمىغاقسۈت تۇرۇقى، گۈلنارلارنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گىرام ئېلىپ ئۇنىڭغا 1 گىرام كافۇر قوشۇپ يۇمشاق سوقۇپ ئېغىزغا سېپىش كېرەك. ئىسبەغۇل لوئايى بىلەن كۆك يۇمىغاقسۈت سۈيىنى بىرلەشتۈرۈپ ئېغىزنى چايقاش ياكى خېنە يوپۇرمىقىنى سۇغا چىلاپ ياكى يېڭى خېنە بولسا سىقىپ سۈيىنى چىقىرىپ ئېغىز چايقاش كېرەك. بۇ سۇغا مۇۋاپىق مىقداردا تاباشىر، كافۇر قوشۇلسا ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى. كافۇر ۋە تاباشىرلارنى ئېزىپ چېپىشىمۇ كۆپ مەنپەئەت قىلىدۇ. كۆيدۈرۈلگەن گاۋزە بان، كۆيدۈرۈلگەن بۇغدايلارنى بىرلەشتۈرۈپ چېپىش ياكى تۇڭا كات ھىندى ئارىلاشتۇرۇپ چېپىش، مارجان شوخلىسىنى تاجىگۈل سۈيىدە ئېزىپ سۈرۈش، قىزىلگۈل، تەرەنجىبىن، يۇمىغاقسۈتلەرنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ چېپىش، ئۈجمە يوپۇرمىقىنى چايناش، مامىرانچىنى قىزىلگۈل بىلەن تەڭ مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ سېپىش، پاقا يوپۇرمىقى سۈيىدە ئېغىزنى چايقاش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى ناھايىتى ياخشى پايدا قىلىدۇ.

ئەگەر ئېغىزدىكى يارا سېسىپ بەدبۇي پۇراق چىقسا قورۇغۇچى دورىلار بىلەن ئېغىزنى چايقىسا سېسىغان ئورۇنلارنى يوقىتىپ، ھۆللۈكنى قۇرۇتىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن سىركە، ئۆشۈدۈر، تۇز ياكى تۇز ۋە زەمچە ئېرىتمىسى بىلەن ئېغىزنى چايقاش كېرەك. ئەگەر سىركىنىڭ ئېچىشتۈرۈشىدىن ئېھتىيات قىلىشقا توغرا كەلسە، ئۇنىڭ ئورنىغا زەئەفەر قوشسا بولىدۇ.







شور بەلغەم ماددىسىدىن بولغان ئېغىز ۋەرەمنى داۋالاشتا كېسەل ماددىسىنى تازىلاش ئۈچۈن ھەبىي ئىيارەج، ھەبىي سەبىرە ئىچكۈزۈش، مامرانچىنى، قارا ھەلىيلە، ئاقىرقەرھالارنىڭ ھەر بىرىدىن 5 گرام ئېلىپ 100 گرام سىركە بىلەن قاينىتىپ سۈزۈپ، سۈيى بىلەن ئېغىزنى چايقاش؛ ئاقىرقەرھال، تۇخمەك مېۋىسى سۈيى بىلەن غەر-غەرە قىلىش كېرەك. سۇقۇقى سۇنۇن سەپسىمۇ ناھايىتى ئوبدان پايدا قىلىدۇ.

كۆيگەن سەۋدا ماددىسىدىن بولغان ئېغىز ۋەرەمنى داۋالاشتا كېسەل ماددىسىنى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى ئەفتمۇن ئىچكۈزۈش، ماددا تازىلىنىپ بولغاندىن كېيىن كالا يىلىكى بىلەن جاراھەتنى مايلاش كېرەك. جاراھەتنى قۇرۇتۇش ۋە پۈتتۈرۈش ئۈچۈن خېنە يوپۇرمىقىنى چايناش، خېنە يوپۇرمىقى، ئاق لەيلى تۇرۇقى، مارجان شونخىلىسى، ئىسبەغۇل، قىزىلگۈللەرنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ قاينىتىپ سۈزۈپ، سۈيى بىلەن ئېغىزنى چايقاش لازىم.

يېمەك-ئىچمەك جەھەتتە بەك ئاچچىق-چۈچۈك، قىزىق، تۈزلۈك ۋە بەك تاتلىق نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلىشتىن پەرھىز قىلىش كېرەك.

### ئېغىزغا مۇدۇر چىقىش

ئېغىزغا مۇدۇر چىقىش (بۇسۇرۇلغەمى) ئېغىز شىللىق پەردىسىگە ئوخشىمىغان چوڭلۇقتا مۇدۇرلەر چىققانلىقىغا قارىتىلغان بولۇپ، كۆپىنچە ئاشقازان يارىسى، ئۈچەي مەددە كېسەللىكلىرى بار كىشىلەردە، ھەيز كۆرگەن ئاياللاردا ۋە قەنت سېشىش (زىياپىت) كە ئوخشاش ماددا ئالمىشىش بۇزۇلغان كىشىلەردە جىقراق ئوچرايدۇ.

سەۋەبى

مەزكۇر كېسەللىك ئاساسەن قاننىڭ ئېغىر دەرىجىدە بۇزۇلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ ھەمدە ئۈسكۈغا كۆپىنچە سەپرا ئارىلاشقان بولىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئېغىز تازىلىقىغا دىققەت قىلماسلىق، ئېغىز ئىچى ھەر خىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن زەخمىلىنىش نەتىجىسىدە ئېغىزغا جەراسىملار ئورۇنلىشىش قاتارلىقلاردىنمۇ مەزكۇر كېسەللىك كېلىپ چىقىدۇ.



## ئالامتى

مەزكۇر كېسەللىكتە ئېغىز شىللىق پەردىلىرىگە ئوخشاش بولمىغان چوڭلۇقتا مۇدۈرلەر چىقىپ، ئېغىزنىڭ قاتتىق ئاغرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ھەتتا بىرەر نەرسە چايناشقىمۇ مۇمكىن بولماي قالىدۇ.

## داۋاسى

ئالدى بىلەن كېسەللىك ماددىسىنى بەدەندىن تازىلاپ چىقىرىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن مەتبۇخى ئەفتمۇن، مەتبۇخى ھەلىيلە ئىچكىزۈش، ئاندىن كېيىن قىزىلگۈل، مارجان شوخلىسى، مارجان شوخلا يوپۇرمىقى، كاسنى يوپۇرمىقى ۋە يىلتىزى، يۇمغاقسۇت، كۆك ماشلارنى سىركە بىلەن قاينىتىپ سۈزۈپ، مەزكۇر سۇيۇقلۇق بىلەن ئېغىزنى چايقاش كېرەك.

## ئېغىز ئىچى سويۇلۇش

ئېغىز ئىچى سويۇلۇش (تەقەششۇرۇلفەمى) قوۋۇز ۋە تاڭلاي بەلغە ماسمان پەردىلىرىنىڭ سويۇلۇپ تېگى ئېچىلىپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان.

## سەۋەبى

ھەر خىل ئىچكى-تاشقى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ئۆتكۈر خاراكتېرلىك قىزىق بۇخارلار ئېغىز ئىچىنى ئەستەزلەپ تۇرغان نېپىز بەلغە ماسمان پەردىلەرنى كۆيدۈرۈپ ۋە قۇرۇتۇپ، بەرلىك ئورۇندىكى ئەزالارنىڭ بىر-بىرىگە تۇتۇشۇپ تۇرۇشىنى تەمىنلەۋاتقان ھۆلۈكنى يوقىتىپ، مەزكۇر ئەزالاردىكى نېپىز بەلغە ماسمان پەردىلەرنىڭ سويۇلۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇلاردىن باشقا، كۆيدۈرگۈچى دورا، قىزىق تاماق ۋە قايناقسۇغا ئوخشاش نەرسىلەرنى بىلىپ-بىلمەي بىراقلا ئېغىزغا ئېلىش قاتارلىق سەۋەبلەردىنمۇ ئېغىز كۆيۈپ



قېلىپ ئېغىز ئىچى بەلغە مېسىمان پەردىلىرىنىڭ سويۇلۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

### ئالامىتى

ئېغىز، تىل ۋە تاماقلارغا قارىسا بەلغە مېسىمان پەردە سويۇلۇپ ئۇنىڭ تېگىدىكى توقۇلمىلارنىڭ ئېچىلىپ قالغانلىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ. ئېغىز ئېچىشىپ ئاغرىدۇ، يېمەكلىكلەرنى چايناش قىيىنلىشىدۇ. بەلغام مېسىمان پەردىنى سويسا ئاسانلا سويۇلۇپ چىقىدۇ، ئەمما ئاغرىمايدۇ.

### داۋاسى

ئىچكى جەھەتتە مەتبۇخى ھەلىيلە ئىچكۈزۈش، سىرتقى جەھەتتە ئاس، گۈلتار، قىزىلگۈللەرنى سىركە بىلەن قاينىتىپ، سۈزگەندىن كېيىن مەزكۇر سۇيۇقلۇق بىلەن ئېغىزنى چايقاش لازىم.

## ئېغىز گۆشخور چاقىسى

ئېغىز گۆشخور چاقىسى (ئاكىلە تۇلفەمى) ئېغىز ئىچىگە چىققان بىر خىل ھۆل جاراھەتلىك چاقىنىڭ قوۋۇز گۆشىنى قىسقا مۇددەت ئىچىدە چىرىتىپ، ئېغىز بوشلۇقىنى كامار قىلىپ قويغانلىقىغا قارىتىلغان. مەزكۇر كېسەللىك قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ئەتراپىغا تارقىلىدۇ. ئۇنىڭ كېسەل ماددىسى قانچە تۆتكۈر بولسا شۇنچە تېز يامرايدۇ. ئوخشەق ئارىسىدا ئېغىز يەل يارىسى دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

### سەۋەبى

ھەر خىل ئىچكى-تاشقى ئامىللارنىڭ ئېغىزغا يامان تەسىر قالغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئىچكى جەھەتتە كىشى زەئىپلەشكەن ھەمدە ئېغىز بوشلۇقىنىڭ تازىلىقى ياخشى





بولمىغان چاغدا بەدەندىكى بىرەر خىلىنىڭ بولۇپمۇ قان، تاتلىق ياكى شور بەلغەم ياكى سەۋدا خىلىنىڭ نورماللىقتىن ئۆزگىرىپ ئارتىپ كېتىپ، ئوقۇنەت پەيدا قىلىپ، ئېغىزغا يامان تەسىر كۆرسەتكەنلىكىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

تاشقى جەھەتتە تاماكنى كۆپ چېكىش، ئىسسىقلىق دورىلار كۆپ سېلىنغان تاماقلارنى ئىستېمال قىلىش، قەۋزىيەت بولۇش، ھەزىم بۇزۇلۇش، قىزىل چىقىش، چىش چىقىپ ياكى بىرەر چىش بۇزۇلۇپ ئېغىز ئىچى ئوقۇنەتلىنىش ۋە بەزى سىقىلىش، سىزلام (سۆزەك) كېسەللىكلەردە سىمايلىق دورىلارنى ئىستېمال قىلىش، مايلىق، ئىسسىق تاماقلارنى يەپ ئارقىدىن دائىم مۇزلۇق سوغۇق يېمەك-ئىچمەكلەرنى ئىستېمال قىلىش قاتارلىقلاردىن كېلىپ چىقىدۇ. ئۆپكە ۋە رىسمى، تولغاق، قارا بەزگەك قاتارلىق كېسەللىكلەر بىلەن بەدنى ئاجىزلىغان، ئوزۇقلىنىشى ناچارلاشقان بالىلاردىمۇ ئاسانلا پەيدا بولىدۇ.

### ئالامىتى

ئېغىز ئىچىدە بولۇپمۇ قۇۋۇز گۆشىدە دەسلەپتە چىگىت چوڭلۇقىدا قارامتۇل مۇنەكچە پەيدا بولىدۇ، كېسەللىك ناھايىتى تېز تەرەققىي قىلىپ يامراپ، ئەتراپتىكى گۆشلەرنى چىرتىپ چوڭ كامار ھاسىل قىلىدۇ ھەمدە ئېغىز بوشلۇقى، چىش مۈلۈكلىرىنى ئېچىپ قويدۇ. ئېغىزدىن قاتتىق سېسىق پۇراق كېلىدۇ. قىچىشىش، ئېچىشىش ۋە كۆيۈشۈش ئەھۋاللىرى ئېغىر بولىدۇ، پۈتۈن بەدەن قىزىيدۇ. ئېغىزدىن داۋاملىق شۆلگەي ئاقىدۇ، تاماق يېيىش تەسكە توختايدۇ.

### داۋاسى

ئەگەر نا مۇۋاپىق ئەھۋاللار بولمىسا، ئالدى بىلەن قان ئېلىش، ئاندىن كېيىن بەدەننى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى ئەقىمۇن بېرىش كېرەك. ئوقۇنەتلىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ھەببى كىرىت، ھەببى سىماب قاتارلىق دورىلارنى ئىستېمال قىلىش، سۇقۇفى ئاكىلىنى بەرلىك ئورۇنغا سېپىش كېرەك.

سىرتىدىن ئارچا مونچقى، قارىغاي مېۋىسى، يالپۇزلارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ چىلاشقۇدەك سىركە بىلەن قاينىتىپ سۈزۈپ، ئېغىزنى چايقاش ياكى سىركە، سۇماق سۈيى، غورا سۈيى بىلەن ئېغىزنى چايقاش لازىم. سۇقۇفى سۇتۇن سەپسىمۇ بولىدۇ.



## سۇقۇنى سۇنۇن

كۆيدۈرۈلگەن كۆكتاش، موزا ھەر بىرى 60 گرام، بۇجغۇن 120 گرام، زەمچە 45 گرام، قزىلگۈل 30 گرام، ئانار پوستى 250 گرام. دورىلارنى سوقۇپ تاسقاپ جاراھەتكە سەپسە بولىدۇ.

تۈنگۈدىن باشقا تۆۋەنكى زىمادنى چاپسىمۇ بولىدۇ. شىگرىپ 60 گرام، دېۋىرقاي يىلىمى 30 گرام، ئاق موم 60 گرام، زىغىر مېيى 90 گرام، شىگرىپنى تالقانلاپ، زىغىر مېيىنى قىزىتىپ موم ۋە دېۋىرقاي يىلىمىنى ئېرىتىپ سوۋۇغاندا شىگرىپنى سېلىپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ جاراھەتكە چېپىلىدۇ.

سېسىغان گۆشلەرنى تازىلاشتا قۇرسى فەلدىفيۇننىڭ رولى ناھايىتى ياخشى بولۇپ ئۇنى ئېزىپ چاقما سېپىپ بەرسە سېسىغان ۋە بۇزۇلغان گۆشلەرنى يوقىتىپ، جاراھەتنى ياخشىلايدۇ.

دەستكارلىق ئۇسۇلى بىلەن گۆشنى كېسىپ تاشلاپ، كېسەل ياخشىلانغاندا يامسىمۇ بولىدۇ.

## قۇرسى فەلدىفيۇن

سېرىق زەرىنىخ، ئاقاقيا، زارارىھ (ئالا كۈلۈك) ھەر بىرى 3 گرامدىن، سۇ تەگمىگەن ئاھاك 12 گرام، سىركە ئېھتىياجغا لايىق ئېلىنىدۇ. دورىلارنى قائىدە بويىچە يۇمشاق سالاھە قىلىپ، سىركە بىلەن خېمىر قىلىپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇپ، ئىككىنچى قېتىم سوقۇپ سىركە بىلەن يەنە خېمىر قىلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇش ئۇسۇلىنى ئۈچ قېتىم تەكرارلاپ 4-قېتىمدا يەنە سىركە بىلەن خېمىر قىلىپ قائىدە بويىچە قۇرس قىلىنىدۇ. لازىم تېپىلغاندا يېرىم قۇرسدىن ئىككى قېتىم شۈمۈپ تۈكۈرۈۋېتىپ، ئارقىدىن گۈل يىغى بىلەن چىش تۇۋىنى ياغلاش لازىم.

## تىل ئاغرىش

تىل ئاغرىش (ۋە جىۋىلسانى) مۇستەقىل كېسەللىك بولماي، بەلكى بەزى تىل كېسەللىكلىرىنىڭ ئالامىتى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئۇ كۆپىنچە ھاللاردا ئېغىرراق دەرىجىدىكى تىل كۆيۈشۈپ ئېچىشىش (ھىرقە تۈللىسانى) ۋە تىل قىچىشىش (ھىككە تۈللىسانى)،

تىل قۇرۇشلاردىنمۇ كېلىپ چىقىدۇ.

سەۋەبى

تىل ئاغرىشىنىڭ سەۋەبلىرى مۇرەككەپ. بەزىلىرى يەرلىك سەۋەبلەردىن، بەزىلىرى پۈتۈن بەدەن كېسەللىكلىرى تۈپەيلىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بەزىلىرى ھەتتا پەقەت روھىي سەۋەبلەردىنلا تىل ئاغرىش سېزىمى كېلىپ چىقىدۇ. ئۆتكۈر چىشلارنىڭ تىلنى دائىم غىدىقلىشى تۈپەيلىدىن تىل زەخمىلىنىپ يارىلىنىشى ياكى جاراھەتلىنىشى، تاماكنى بەك كۆپ چېكىش، ئېغىزنى غىدىقلىغۇچى سۇيۇقلۇقلار بىلەن دائىم چايقاش، ئېغىر دەرىجىدىكى قان ئازلىق، تۆمۈر ماددىسى ۋە يېمەكلىكلەردىكى جەۋھىرى ماددىلارنىڭ يېتىشمەسلىكىدەك سەۋەبلەردىن تىل ئاغرىش كېلىپ چىقىدۇ.

بەزى ئاياللار ھەيز كۆرگەندە تىلى ئاغرىغاندەك ھېس قىلىدۇ. سەۋەبىنى ئېنىق بىلمىگەچكە روھىي جەھەتتە بىر خىل ئەندىشە ھېس قىلىدۇ. تىلنىڭ قىزىرىپ كۆيۈشۈپ ئاغرىغاندەك بولۇشى ئاساسەن سەپرا ماددىسىنىڭ سان-سۈپەت جەھەتتە نورماللىقتىن ئۆزگىرىپ تىلغا يامان تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ ياكى ئۇ، ئاشقازان ۋە مېڭە قاتارلىق ئەزالار بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ھەر خىل ئاچچىق-چۈچۈك، ئۆتكۈر، تۈزلۈك، تاتلىق نەرسىلەرنى كۆپ ئىستېمال قىلغانلىقتىن سەپرا ماددىسى ئېشىپ تىلغا يامان تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامىتى

تىل ئاغرىيدۇ، تىل رەڭگى قىزىل كۆرۈنىدۇ، كۆيۈشۈش، ئېچىشىش سېزىمى روشەنرەك بولىدۇ. ئىسسىق ۋە ئىسسىقلىق نەرسىلەرنى ئېغىزغا ئالسا ئاغرىش كۈچىيىدۇ. سوغۇق ۋە سوغۇقلۇق نەرسىلەرنى ئېغىزغا ئالسا ئاغرىش پەسسىيىدۇ.

داۋاسى

سەۋەبلەرگە قاراپ چارە قىلىش كېرەك. ئۆتكۈر چىشىنى ئوڭلاش، تاماكا چېكىشىنى تاشلاش، ئوزۇقلۇقنى ياخشىلاش، يېڭى كۆكتاتلارنى ئىستېمال قىلىش، قان ئازلىقنى داۋالاش لازىم.



تىل كۆيۈشكەندەك بولۇپ ئاغرىشىنى داۋالاشتا، ئالدى بىلەن سەپرا ماددىسىنى تازىلاپ تەكشۈش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن نەمرى ھىندى، خىيارشەنەبەر قاتارلىقلارنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ چىلاپ ئېچىش كېرەك.

ھۆل مېۋە-چېۋىلەرنىڭ سۈيىنى ئىستېمال قىلىش، ئۆسۈڭ، سېمىز ئوت، كۆك يۇمغاقسۇت، مارجان شوخلىسى، ئىسبەغۇل، بېھى تۇرۇقلىرىنىڭ سۈيى بىلەن ئېغزىنى چايقاش لازىم.

## تىل قۇرۇش

تىل قۇرۇش (جەفافۇللىسانى) تىلنىڭ ئادەتتە تۈزلۈكىدىن قۇرۇپ سۇيۇقلۇق ئىستېمال قىلىسىمۇ ياخشىلانمىغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

1. كۆپىنچە ھارارەت ۋە قۇرۇقلۇقتىن يەنى قۇرۇق ئىسسىقتىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇ كۆپىنچە سەپراللىق قىزىتما، كېزىك ۋە بوغما قاتارلىق ئۆتكۈر ئىسسىملىق كېسەللىكلەردە يۈز بېرىدۇ.

2. قويۇق شىرنىلىك ماددىلار يەنى شىلىمىش، چاپلاشقاق قويۇق خىلىتلارنىڭ تىل ئۈستىگە چۈشۈپ، ئۇنىڭ ئۆز تەبىئىيىتى ئارقىلىق تىلنىڭ ھۆلۈكىنى قۇرۇتقانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامىتى

1. قۇرۇق ئىسسىقتىن بولغان تىل قۇرۇشتا تىل ئۈستى سارغۇچ ۋە يىرىك بولىدۇ، سەپرانىڭ غالىبلىقىغا دائىر ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

2. قويۇق چاپلاشقاق ماددىلاردىن بولغان تىل قۇرۇش ھەقىقىي تىل قۇرۇش بولماستىن، بەلكى تىل ئۈستىدە پەيدا بولغان ھۆلۈكنىڭ قويۇقلىشىپ قالغانلىقىدىن بولغاچقا ئادەتتە خاتا ھالدا تىل قۇرۇش دەپ قارىلىدۇ. ئۇنىڭدا تىل چاپلىشاڭغۇ بولىدۇ، ئېغزى





سۇيۇقلۇقمۇ چاپلىشاڭغۇ كېلىدۇ، تىل ئېچىشىپ تاغرىيدۇ.

### داۋاسى

1. قۇرۇق ئىسسىقتىن بولغان تىل قۇرۇشىنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن ھارارەتنى پەسەيتىش، ھۆلۈك پەيدا قىلىش ئۈچۈن نىيلۇفەر شەرىپىتى، مەتبۇخى ھەلىيلە، مەتبۇخى شاھتەررە قاتارلىقلارنى ئىستېمال قىلىش؛ تەمرى ھىندى، فۇلۇس (خىيارشەنەنەر) قاتارلىقلارنى چىلاپ ئېچىش لازىم. ھۆل مېۋە-چىۋىلەرنىڭ سۈيىنى قوشۇمچە ئىچىپ بېرىشمۇ كۆپ مەنپەئەت قىلىدۇ. ئامۇت غازىڭى، قىزىلگۈل، ئانارگۈلى قاتارلىقلارنى قاينىتىپ ئېغىزنى چايقاش؛ ئۆسۈك، سېمىز ئوت، كۆك بۇمغا قىسۇت، مارجان شوخلىسى، ئىسبە غۇل، بېھى قاتارلىقلار ئۇرۇقنىڭ لۇئابى بىلەن ئېغىزنى چايقاش؛ بېھى ئۇرۇقى لۇئابى ۋە نىيلۇفەر سۈيىنى شېكەر بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تىلغا سۈركەش ۋە ئېغىزغا ئېلىش لازىم. ئەگەر بۇنىڭغا قاپاق ئۇرۇقى مېغىزى شىرسى ياكى سېمىز ئوت ئۇرۇقى شىرسى ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلەتسە ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى. ئەگەر ئاشقازانغا سەپرا ماددىسى يىغىلغان بولسا، تەنقىيەدىن كېيىن ئىسبە غۇل لۇئابىغا ئىسكەنجىپىن ئارىلاشتۇرۇپ ئىچسە ناھايىتى مەنپەئەت قىلىدۇ.

2. قۇيۇق چاپلاشقاق ماددىلاردىن بولغان تىل قۇرۇشىنى داۋالاشتا سىماقتى ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ ياكى يالپۇزنىڭ ئۆزىنى تىلغا سۈركەش، ئەڭ ياخشىسى سۈگەت ياغىچىدىن كىچىك پالاقچە ياساپ ئىسكەنجىپىنى ياكى قوغۇن ۋە شېكەر سۈيىنى پالاقچىغا يۇقتۇرۇپ تىلغا سۈركەش لازىم.

### تىل يېرىلىش

تىل يېرىلىش (شىققاقۇللىسانى) تىل قۇرۇشىنىڭ ھەددىدىن زىيادە كۈچىيىپ تىل يېرىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغانلىقىغا قارىتىلغان بولۇپ، ئەتىياز پەسلىدە كۆپرەك ئۇچرايدۇ.

### سەۋەبى

ئاساسلىق، ھەر خىل ئىچكى، تاشقى سەۋەبلەردىن بەدەندە قۇرۇقلۇقنىڭ ئېغىر دەرىجىدە ئېشىپ تىلغا تەبىئىي ھالدا يامان تەسىر كۆرسەتكەنلىكىدىن كېلىپ چىقىدۇ.







بۇنىڭدا بىرى، ئىچكى سەۋەبلەردىن مېڭدە قاتتىق قۇرۇقلۇق پەيدا بولۇپ، ئۇنىڭ تەسىرى سېزىم ئەسەبلىرى ئارقىلىق تىلغا ئۆتۈپ تىل يېرىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. يەنە بىرى، ھەر خىل قۇرۇقلۇق يەتكۈزگۈچى كۆكتات، يېمەك-ئىچمەكلەر، ئۆتكۈر تەسىرلىك دورىلار، چاي دورىلىرى قاتارلىقلارنى كۆپ ئىستېمال قىلىش؛ قۇرۇقلۇق پەيدا قىلغۇچى ھەرىكەت بىلەن ھەددىدىن زىيادە مەشغۇل بولۇش قاتارلىق سەۋەبلەردىن ئاشقازاندا ئېغىر دەرىجىدە قۇرۇقلۇق پەيدا بولۇپ، تىلغا يامان تەسىر قىلغانلىقتىن تىل يېرىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

### ئالامىتى

مېڭىگە قۇرۇقلۇق يەتكەندىن بولغان تىل يېرىلىشتا تىل رەڭگى قىزىرىدۇ، تىل قۇرۇيدۇ، تىل چوڭقۇرراق يېرىلغان بولۇپ ئېچىشىدۇ. بىر نەرسە، بولۇپمۇ ئاچچىق-چۈچۈك، تۇزلۇق نەرسىلەر تەگسە ئېچىشىپ ئاغرىيدۇ. تىل يېرىلىشتىن ئىلگىرى ئويۇقسىزلىق، مېڭدە قۇرۇقلۇق ئاشقان ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. ئاشقازانغا قۇرۇقلۇق يەتكەندىن بولغان تىل يېرىلىشتا تىلنىڭ رەڭگى قىزىرىدۇ، قۇرۇيدۇ. تىل ئۈستى يول-يول بولۇپ يېرىلىپ كېتىدۇ. كېسەل كىشىدىن بەدبۇي ئىشىنىڭ پۇرىقىدەك كېكىرىك چىقىدۇ. ئېغىز تەمى غالب كەلگەن خىلىت تەمدە بولىدۇ. بەزىدە تىل زىيادە قۇرغاقلىشىپ يېرىلغانلىقتىن گالىنى غىدىقلاپ قۇرۇق قەي قىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

### داۋاسى

ئومۇمىي بەدەنگە بولۇپمۇ مېڭە ۋە ئاشقازانغا ھۆلۈك يەتكۈزگۈچى كۈچلۈك دورا ۋە يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش لازىم. بۇنىڭ بىلەن بىرگە كۆك ماش، بوغداي، ئارپا، گۈرۈچلەر بىلەن يارما ئاش قىلىپ ئېچىش؛ ئاچچىق-چۈچۈك، تۇزلۇق يېمەكلىكلەردىن پەرھىز قىلىش؛ قۇرۇقلۇق يەتكۈزگۈچى ھەرىكەتلەردىن ساقلىنىش كېرەك.

ئاق لەيلى تۇرۇقىنىڭ لۇئابى، يېھى تۇرۇقىنىڭ لۇئابى ھەم موم يېغى قاتارلىقلارنى ئەھۋالغا قاراپ ئېچىش كېرەك. بىنەپشە يېغى بىلەن تەييارلانغان قىرۋىتى، ئىسبەغۇل شىرسى قاتارلىقلارنى تىلغا سۈركەش؛ بىر ئاز ئىسبەغۇل ياكى سەرپىستاننى ئاغزىدا تۇتۇش لازىم. تەرخەمەك بولۇپمۇ تەرخەمەك كۆپۈكى (زۇبىدە تۇلخىيار) نى تىلغا سۈركەسە ئۈنۈمى ياخشى. چۈنكى تەرخەمەك كۆپۈكى ھۆل ۋە شىلىمىشىق بولغاچقا قۇرۇقلۇق ئاشقان ۋە يېرىلغان جايلار





ئۈچۈن ھەممىدىن ياخشىراق مەنپەئەت قىلىدۇ.  
تەرخەمەك كۆپۈكنى ئېلىشنىڭ ئۇسۇلى مۇنداق: تەرخەمەكنى ئىككى پارچە قىلىپ  
بىر-بىرىگە سۈركەپ بەرسە كۆپۈك پەيدا بولىدۇ.

## تىل قىچىشىش

تىل قىچىشىش (ھىككە تولىلسانى) بەزى ئىچكى، تاشقى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن  
تىلنىڭ ئۆزلىكىدىن ئوخشىمىغان دەرىجىدە قىچىشقانلىقىغا قارىتىلغان.

### سەۋەبى

كۆيىگەن ئۆتكۈر ماددىلارنىڭ بولۇپمۇ كۆيىگەن سەۋدا ماددىسىنىڭ مېڭىدىن  
تىلغا چۈشكەنلىكى ياكى ئۇنىڭ ئاشقازان ۋە باشقا ئەزالاردىن ئېغزغا يۈزلىنىپ تىلغا يامان  
تەسىر كۆرسەتكەنلىكىدىن كېلىپ چىقىدۇ. ئايرىم ھاللاردا بەزى غىدىقلىغۇچى  
نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلىش ئۇ تىل قىچىشىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

### ئالامىتى

تىل قىزىرىدۇ ۋە ئۆزلىكىدىن قىچىشىدۇ. ئېغىزدا پات-پات شۆلگەي ھاسىل  
بولىدۇ. تىل قىچىشىش بەگىلەرەك بولسا تىل غىدىقلىغاندەك سېزىلىدۇ، ئېغىرراق  
بولسا ئىختىيارسىز ھالدا تىلنى ئۈستۈنكى چىشلارغا سۈركەشكە مەجبۇر قىلىپ كېسەل  
كىشىنى بىئارام قىلىدۇ. ئېغىزنى ھوردىسا ياكى ئىسسىق سۇ بىلەن يۇيسا ياكى ئىسسىق  
شورپا قاتارلىق نەرسىلەرنى ئېغىزغا ئالسا راھەتلەنگەندەك ھېس قىلىدۇ.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن كېسەل ماددىسىنى بەدەندىن تازىلاش، يەنى سەۋدا مۇسەلىپى ياكى  
مەتبۇخى ئەفتمۇنى ئىچكۈزۈپ بەدەننى تەنقىيە قىلىش كېرەك. بەدەنگە ھۆللۈك  
يەتكۈزىدىغان چارلەرنى قىلىش، بۇنىڭ ئۈچۈن ماتولجەبىن، ئىسكەنجىبىن، نىلۇفەر  
شەرىپتى، خەشخاش شەرىپتى، بىنەپشە شەرىپتى قاتارلىقلارنى ئىچكۈزۈش كېرەك. ئاندىن





كېيىن كۈندە 3 قېتىم تۆۋەندىكى تۈسۈلدا ئېغزىنى چايقاش كېرەك. بىرىنچى قېتىمدا، ئىسسىق سۇ بىلەن چايقاش؛ ئىككىنچى قېتىمدا، سۈتى ئازراق شېكەر بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ چايقاش؛ ئۈچىنچى قېتىمدا، سىرگە گۈل يېغىنى ئارىلاشتۇرۇپ چايقاش كېرەك. مەتبۇخى ھەلىلە بىلەن ئېغزىنى چايقىسىمۇ مەنپەئەت قىلىدۇ. ھەلىلىنى قاينىتىپ ئېغزىنى چايقاش ياكى تۇنى تىلغا سۇۋاش تىلدىكى ئىسسىق ماددىنى تازىلاشتا ناھايىتى ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.

تىلنىڭ بەك قىچشقانلىقىدىن ئېغزدا پات-پات شۆلگەي ھاسىل بولسا، ئاس ئۆسۈملۈكى يوپۇرمىقى، ھەبۇلتاسنىڭ ئۆزى، ئاقىرقەرھ، قۇرۇق يېشىل ئۈزۈم قاتارلىقلاردىن ئازراق ئېلىپ سىركە بىلەن قاينىتىپ ئېغزىنى چايقاش ياكى ئېغزغا ئېلىپ بىرئاز تورغۇزۇش كېرەك. ئەگەر بۇنىڭ بىلەنمۇ ياخشىلانمىسا بەدەن بەك ئاجىزلاپ كەتمىگەن بولسىلا قىيال تومۇردىن قان ئېلىشنى ئويلاشسا بولىدۇ ياكى ئالدى بىلەن مەتبۇخى ئەقىمۇن بىلەن ئىچىنى تازىلىغاندىن كېيىن تەمرى ھىندى، ئەينۇلا، چىلان، قىزىلگۈل، بىسەپشەرنى مەتبۇخى ئەقىمۇنغا قوشۇپ قاينىتىپ ئىچكۈزۈش، سېرىق ھەلىلىنى تىلغا سۈركەش لازىم. سېرىق ھەلىلىنى ئېغزدا تۇتسا تاماقتىن كېيىن ئېغزغا شۆلگەي يىغىلىدۇ، مەزكۇر شۆلگەينى يۇتسا تىلنىڭ قىچشىشىنى پەسەيتىشتە چوڭ رول ئوينايدۇ. تۆتكۈر، چۈچۈمەل نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلىشتىن ساقلىنىش لازىم.

### تىل كۆيۈشۈپ ئېچىشىش

تىل كۆيۈشۈپ ئېچىشىش (ھىرقە تۇللىسانى) ھەر خىل ئىچكى، تاشقى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن يەڭگىل بولغاندا تىلنىڭ كۆيۈشكەندەك بولغانلىقى، ئېغىر بولغاندا ئېچىشقانلىقى ھەتتا ئاغرىش سېزىمى پەيدا قىلغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

ئىچكى جەھەتتە ئاشقازان كىرىش ئېغزى ياكى مېڭىنىڭ ھارارىتى ئاشقانلىقى، ئۆتكۈر، شىرنىلىك، قويۇق ماددىلارنىڭ تىلغا قۇيۇلغانلىقى، ئىسسىق خىلىتلارنىڭ يۇقىرىغا ئۆرلەپ تىلغا يامان تەسىر قىلغانلىقى ھەمدە ئېغىر دەرىجىدىكى قىزىما





ۋە ئىچكى ئەزالاردىكى ئىششىقلارنىڭ يامان تەسىر قىلغانلىقى توپەيلىدىن مەزكۇر كېسەلنىڭ كېلىپ چىقىدۇ.

تاشقى جەمەتتە ئاساسەن ئۆتكۈرلۈكى، شۇرلۇقى، ئاچچىقلىقى ۋە تاتلىقلىقى زىيادە بولغان نەرسىلەر ھەمدە بەك ئۆسسىياتقۇچى يېمەك-ئىچمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلىشتىن كېلىپ چىقىدۇ.

### ئالامىتى

تىل كۆيۈشكەندەك بىلىنىدۇ، تىل رەڭگى قىزىل بولىدۇ. ئېغىر بولسا تىلى كۆيۈپ قالغاندەك ئېچىشىپ كېسەل كىشى تىلىنى بىرەر نەرسىگە تەككۈزۈشتىنمۇ قورقىدىغان بولۇپ قالىدۇ. ھەتتا تىل ئاغرىش كېلىپ چىقىدۇ.

### داۋاسى

قايسى سەۋەبتىن بولغان تىل كۆيۈشۈپ ئېچىشىش بولمىسۇن ئوڭدا يېتىپ ئوخلاش ۋە داۋاملىق ئېغىزنى ئېچىپ تۇرۇشتىن ساقلىنىش كېرەك.

قوغۇن ئورۇقى مېخىزى، تەرخەمەك ئورۇقى، قاپاق ئورۇقى، تاتلىق بادام، نىشاستە، كەترا، تەرەنجىبىلەردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ ھەب ياساپ دائىم ئېغىزغا سېلىپ تۇرغۇزۇش كېرەك. ئەيتۇلا ئورۇقچىسى، تەمرى ھىندى ئورۇقچىسى، شېكەر قاتارلىقلارنى ئېغىزدا تۇرغۇزۇش ياكى سوۋۇتقۇچى، ھۆللەشتۈرگۈچى سىقىمىلارنى، مەسلەن: تۈسۈڭ سۈيى، يۇمغاقسۈت سۈيى، سېمىز ئوت سۈيى، پاقا يوپۇرمىقى سۈيى، يەرلىك شوخلا سۈيى، ئىسبەغۇل لۇئابى، بېھى ئورۇقى لۇئابى قاتارلىقلارنىڭ قايسى بىرى بىلەن ئېغىزنى چايقاش كېرەك.

كېسەل كىشىنىڭ مىزاجى ۋە ئەھۋالى كۆترەلگۈدەك بولسا مەتبۇخى ئەقىمۇن بىلەن بەدەننى تەنقىيە قىلىش، ئىسكەنجىبىنى ئىستېمال قىلىش كېرەك. ھەمدە كۈندە 3 قېتىم ئېغىزنى چايقاش، يەنى 1-قېتىمدا ئىسسىق سۇ بىلەن، 2-قېتىمدا سۈت ۋە شېكەر بىلەن، 3-قېتىمدا سىركە ۋە گۈل يېغى بىلەن چايقاش كېرەك. ئەگەر كېسەل كىشىنىڭ مىزاجى ئۆزگىرىپ قالمىسا ۋە بەدەن قۇۋۋىتى ئۆز ھالىتىدە بولسا، قىيغال تومۇرىدىن قان ئېلىش ۋە مۇناسىپ مەتبۇخلارنى ئىچكۈزۈش كېرەك. لېكىن مەتبۇخقا ھەلىلە، تەمرى ھىندى، چىلان، ئەيتۇلا، قىزىلگۈل، بىنەپشەلەرنى قوشماسلىق لازىم.





ئاندىن كېيىن بەرگى مور بىلەن تۈزنى ئارىلاشتۇرۇپ چايناش، ئەگەر كېسەللىك بۇنىڭ بىلەن ياخشىلانمىسا سېرىق ھەلىيلىنى تىلغا سۈركەش ياكى ئېغىزدا تورغۇزۇش كېرەك، تاماقتىن كېيىن ھەلىيلىنى ئېغىزغا ئېلىپ شالۋاق ئاققۇزۇش كېرەك، ئەمما بەدەننى تەنقىيە قىلىپ بولغاندىن كېيىن ھەلىيلىنى ئىشلەتسە كۆپ مەنپەئەت قىلمايدۇ. تەنقىيەدىن كېيىن تىلنىڭ يېرىلىشىنى داۋالاشتا قوللانغان داۋالاش چارىلىرى ئوبدان پايدا قىلىدۇ.

ئاشقازان ۋە مېڭە ھارارىتى ئاشقاندىن بولغانلارغا سىركە، گۈلۈپ ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش دورىلارنى ئىچكۈزۈش، ئاشقازان ۋە مېڭىگە لايىق كېلىدىغان يۇمشاققۇچى ۋە سوۋۇتقۇچى چىلانمىلارنى ئىستېمال قىلىش، ئەھۋالغا قاراپ ئازراق كافۇرنى تىل ئۈستىگە قويۇش كېرەك.

ئىسسىق قوبۇق ماددىلارنىڭ تىلغا قويۇلغانلىقىدىن بولغانلارغا ياغلار بىلەن تىلنى ياغلاش ھەمدە باش ساھەسىنى مايلاش كېرەك. نىلۈقەر يېغى، بىنەپشە يېغى، گۈل يېغىغا ئوخشاش ياغلار بىلەن بىر مەزگىل ئېغىزنى چايقاشنى ئادەت قىلىش كېرەك. يالپۇزنى ئېزىپ تىل ئۈستىدە تورغۇزسىمۇ، ئانارگۈلى ۋە ئامۇتلارنى قاينىتىپ ئېغىزنى يۇيسىمۇ بولىدۇ.

ئىسسىق خىلىتلار يۇقىرىغا ئۆرلەپ بولغانلارغا ئىسسىقلىقتىن بولغان نەزلىنى داۋالاشتا قوللىنىدىغان مۇسەللەرنى بېرىش ۋە غەر-غەرلەرنى ئىشلىتىش كېرەك.

قىزىتما ۋە قورساقتىكى ئىششىقلاردىن بولغانلارغا بالدۇرراق داۋا قىلىش، مۇۋاپىق تېپىلسا باسىلىق تومۇردىن قان ئېلىش، يەرلىك شوخلىنى شېكەر بىلەن، كاسىن سۈيىنى خىيار شەنبەر بىلەن، كەشكەپنى ئازراق بادام يېغى بىلەن ئىچكۈزۈش كېرەك. ئەگەر قان ئېلىش ۋە ئىچىنى تازىلاشقا ئېھتىياج چۈشسە قان ئېلىش ياكى ئىچىنى سۈردۈرۈش كېرەك. مۇۋاپىق تېپىلغاندا مۇمكىن بولسا ئىككى ئۆسۈلنى تەڭلا قوللانسا بولىدۇ.

تىل قىچىشىش كېسەللىكى كۈچەيگەنلىكتىن بولغانلاردا ئەگەر ئېغىزدا شۆلگەي كۆپەيگەن بولسا خاس سىركە بىلەن ئېغىزنى چايقاش ھەتتا سائەتلەپ ئېغىزدا تورغۇزۇش كېرەك.

## تىل يوغىناپ كېتىش

تىلنىڭ يوغىناپ كېتىشى (ئەزەمۇللىسانى) تىلنىڭ نورمال ھالەتتىن چوڭلاپ





كەتكەنلىكىگە بەزىدە ھەتتا تىل يوغىناپ ئېغىزغا پاتماي سىرتقا چىقىپ ساڭگىلاپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان.

### سەۋەبى

خىلىتلارنىڭ غەيرىي تەبىئىي ھالدا ئۆزگىرىپ تىلغا نەسر قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭدا كۆپىنچە قاننىڭ غالىبلىقى، بەزىدە بەلغەمنىڭ ئاشقانلىقى سەۋەب بولىدۇ.

مېڭىدىكى ئارتۇق ھۆلۈك ماددىلارنىڭ تىلغا قويۇلغانلىقى ياكى كېرەكسىز ماددىلار تۈپەيلىدىن كېلىپ چىققان تىل ياللىغى ياكى خوناققا ئوخشاش گال ياللىغىنىڭ تەرەققىي قىلىشىدىن تىل يوغىناش كېلىپ چىقىدۇ.

### ئالامىتى

تىلنىڭ يوغىناپ قالغانلىقى كېسەل كىشىنىڭ ئۆزىگە خېلى ئېنىق مەلۇم بولىدۇ. يەڭگىلەرەك بولسا تىلنى ئېغىزدىن چىقارغاندا ئادەتتىكىدىن يوغانراق ئىكەنلىكىنى بايقىغىلى، تىل يانلىرىدا چىشىنىڭ ئىزلىرىنى كۆرگىلى بولىدۇ. ئېغىرراق بولسا تىل ئېغىزغا پاتماي ئېغىزنىڭ سىرتىغا چىقىپ ساڭگىلاپ قالىدۇ.

بۇلاردىن باشقا قايسى خىلىتنىڭ ئۆزگىرىشىدىن بولغان بولسا شۇ خىلىتقا خاس بەلگىلەر كۆرۈلىدۇ، مەسىلەن: قاندىن بولسا تىل رەڭگى قىزىل كېلىدۇ قاتارلىقلار.

### داۋاسى

قاندىن بولغان تىل يوغىناش كۆپىنچە ئىسسىقتىن بولىدۇ، شۇڭا ئالدى بىلەن تىل ئاستى تومۇرىدىن قان ئالغاندىن كېيىن سەپرانىڭ مۇسەپلىنى بېرىپ بەدەننى تەنقىيە قىلىش، قاننى سوۋۇتقۇچى شەربەتلەردىن ئانار شەربىتى، چىلان شەربىتى، رىباس شەربىتى قاتارلىقلارنى ئىستېمال قىلىش كېرەك. چۈچۈمەل جۈيزە، ئانار، رىباس قاتارلىقلارنى داۋاملىق تىل ئۈستىگە قويۇپ بېرىش كېرەك، ئۈزۈم غورىسىغا ئازراق سىماق قوشۇپ ئىستېمال قىلىشۇمۇ بولىدۇ.

ئەگەر تىل يوغىناش ئۆتكۈر قاننىڭ كۆپلىكىدىن بولسا مۇۋاپىق تېپىلغاندا ئىككىلا





بىلەكتىكى قىفالىق تومۇرىدىن قان ئالسا بولىدۇ. لېكىن ھەر قېتىملىق قان ئېلىش ئارىلىقى 3 كۈندىن ئاز بولماسلىقى لازىم. ئۇنىڭدىن كېيىن مەتبۇخى ھەلىيلە، تەمرى ھىندى ۋە شۇنىڭغا ئوخشاشلار بىلەن تەنقىيە قىلىش، تەنقىيەدىن كېيىن تۆۋەنكى دورىلار بىلەن ھوقنە قىلىش كېرەك:

سوقۇلغان ئارپا 400 گرام، چىلان 50 دانە، سەرپىستان 25 گرام، ئىسبەغۇل يوپۇرمىقى، خويىيازى يوپۇرماقلىرىدىن مۇۋاپىق مىقداردا، بۇغداي كېپىكى 25 گرام، سوقۇلغان بادام مېغىزى 80 گرام، دورىلارنىڭ ھەممىسىنى قاينىتىپ سۈزۈپ ئۇڭا 80 گرام بىسپە يېغى ۋە 120 مىللىلىتىر ئادەم سۈتى قۇيۇپ ئەتىگەن ئاخشامدا ئىككى قېتىم ھوقنە قىلىندۇ.

تامىقىغا ئېشىك سۈتىنى كېپەك تۇمىچى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ بېرىش كېرەك، قىزىلگۈل، ئەدەس، يۇمغاقسۈتلەرنىڭ ھەر بىرىدىن 25 گرام ئېلىپ قاينىتىپ ئۇڭا تەڭ مىقداردا سىركە قوشۇپ ئېغىزنى چايقاش كېرەك. ئەگەر يۇقىرىقى چارىلەر كۆرۈنەرلىك ئۈنۈم بەرمىسە تىل ئاستىدىكى ئوڭ ۋە سول تومۇرلاردىن قان ئېلىشنى ئويلاشسا بولىدۇ. لېكىن يۇقىرىقى ئۇسۇل-چارە ۋە دورىلارنى قوللانغاندا مىزاجنىڭ تۈزگۈر قىلىشى، قۇۋۋەت ۋە بەدەن قارشىلىق كۈچىنىڭ ئاجىزلاپ كېتىشىگە ئالاھىدە دىققەت قىلىش، مەزكۇر كېسەللىك جەريانىدا بۇرۇن قاناتتىن ھەزەر ئەيلەش كېرەك. ئەگەر بۇ ئەھۋاللارنىڭ بىرەرسى كۆرۈلسە ئالدى بىلەن شۇ كېسەللىكنى داۋالاپ ئۇنىڭ كېسەللىك ماددىسىنى يوقىتىش كېرەك. ئۇنداق بولمىغاندا يامان ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ئەگەر تىل يوغىناش سەپىرادىن بولسا سەپرا مۇسەپپىلەرغا ئازراق سوقمۇنىيا قوشۇپ ئىشلىتىش، سېرىق ئوتنى سىركە بىلەن ئىستېمال قىلىش، تامىقىغا ئۈزۈم غورىسى سېلىپ بېرىش كېرەك.

بەلغەمدىن بولغان تىل يوغىناشنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن بەلغەم مۇتەرجى بىلەن بەدەننى تەنقىيە قىلغاندىن كېيىن تۆشۈدۈرنى سىركە ياكى زەنجىبىل بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تىلغا سۈركەش، زەنجىبىل، فىلىز، تۇزلارنى يۇمشاق سوقۇپ تىلغا سۈركەش كېرەك. سوزاپ مەتبۇخى، ئەنجۈر مەتبۇخى قاتارلىقلار بىلەن ئېغىزنى چايقاش كېرەك، مەتبۇخى ئەنقەردىيانىڭ تىلىنى كىچىكلىتىشتە تەسىرى تېز. قۇشقاچ گۆشى چۈشكەن ماددە تۇلھايات ئوبدان پايدا قىلىدۇ.

بۇزۇلغان سۇيۇق ھۆللىكتىن بولغان تىل يوغىناشنى داۋالاشتا لەقۋە ۋە فالەج كېسەللىرىدە قوللانغان ھوقىنى ئىشلەتسە بولىدۇ. ئىيارەجلەرنىڭ بىرەرسى بىلەن ئېغىزنى غەر-غەرە قىلىش، تىلغا ئىيارەج، تەرىپاق، لوغازىيا قاتارلىقلارنى سۈركەش كېرەك





ئەگەر مزاجدا جىددىي تۈزگىرىش بولسا يۇقىرىقىلارنى ئىشلەتمەسلىك ياكى مزاجى ئەسلىگە كەلگىچە ئىشلەتمەسلىك كېرەك. ئاندىن كېيىن ئالدىدا ئېيتىلغان يەڭگىلەرەك داۋالاش ئۇسۇللىرىنى قوللىنىش كېرەك. ئايرىم ۋاقتلاردا تىلغا ھەسەلنى تەنھا ياكى سۆڭەتەر بىلەن بىرلەشتۈرۈپ سۈركەش كېرەك.

سەۋەددىن بولغان تىل بوغناشنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن مەتبۇخى ئەفتمۇن بىلەن تەنقىيە قىلىش كېرەك. لېكىن داۋالاشتا ئالدىراڭغۇلۇق قىلماسلىق كېرەك. قان ئېلىشقا بولمايدۇ. ئەگەر مزاجدا جىددىي تۈزگىرىش كۆرۈلسە ئاندىن باسىلىق تومۇردىن قان ئالسا بولىدۇ. لېكىن باشقا دورىلارنى ئىستېمال قىلىشقا بولمايدۇ. ئىستىفراغ قىلىشقا ھاجەت چۈشسە بىرەر توسقۇنلۇق بولمىسا، يەڭگىل دەرىجىدىكى مەتبۇخ بېرىش، لەتىپ تاماقلارنى ئىستېمال قىلىش، بەدەن قۇۋۋىتىنى ساقلاشقا دىققەت قىلىش كېرەك. ئەقىل جايدا بولماسلىقلار قوشۇلۇپ كەلسە تىلدىكى كېسەلنى داۋالاش بىلەن بىرگە مالخوليا كېسەللىكىنى داۋالاشتىكى ئۇسۇللارنى بىللە قوللىنىش لازىم. ئەگەر تىلدا ئىششىق بولسا ئالاھىدە ھۇشيار بولۇش، قاتتىق ئىششىق ۋە راكقا ئايلىنىپ قېلىشتىن ساقلىنىش كېرەك. تىل بوغناش ئەگەر بوغما (خوناق) دىن بولغان بولسا ئالدى بىلەن بوغمنى داۋالاش كېرەك.

ئەگەر تىل ساڭگىلىتىش كىچىك بالىلاردا كۆرۈلسە لىسانئە سافۇر بىلەن غزالاندۇرۇشلا كۆپايە قىلىدۇ.

## تەم تېتىشىنىڭ بۇزۇلۇشى ۋە يوقىلىشى

تەم تېتىشىنىڭ بۇزۇلۇشى ۋە يوقىلىشى (فەسادۇرزەۋقى ۋە پۇتلا نۇرزەۋقى) بۇ ئاساسەن تىلىنىڭ تەم سېزىش كۈچى ئاجىزلاپ بۇزۇلغانلىقىغا ياكى تەم سېزىش كۈچىنىڭ پۈتۈنلەي يوقالغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

خىلىتلارنىڭ غەيرىي نورمال ئۆزگىرىپ تىلىنىڭ تەم سېزىش كۈچىنى بۇزغانلىقىدىن ياكى تەم سېزىش كۈچىنىڭ بىر خىل تەم سەۋەبىدىن نورماللىقتىن







چىقىپ ئاجىزلىغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

بەزى ئۆتكۈر غىدىقلىغۇچى نەرسىلەر، مەسىلەن: ئاققەرەھا، دارچىنى، قەلەمفۇر قاتارلىق دورىلارنىڭ تىلى غىدىقلىشى، تاماكا، ئەپيۇندەك مەس قىلغۇچى نەرسىلەرنى كۆپ ئىستېمال قىلىش، نەزلە سۇيۇقلۇقنىڭ قويۇلۇشى، ھەزىمنىڭ بۇزۇلۇشى قاتارلىقلاردىنمۇ كېلىپ چىقىدۇ.

بەزى ئارتۇقچە ھۆللۈك ياكى قويۇق ماددىلارنىڭ مېڭىدىن كېلىپ تىلدا شاخلانغان تەم سەزگۈچى ئەسەب يوللىرىنى نەمدەپ ۋە توساپ قويغانلىقى ياكى زىيادە سوغۇق ۋە ئىسسىقلارنىڭ تەسىرىدىن تىلنىڭ تەم سېزىش كۈچى يوقىلىپ، نەرسىلەرنىڭ تەمىنى پۈتۈنلەي سەزمەس بولۇپ قالىدۇ.

### ئالامىتى

تەملىرىنى سېزىش كۈچى تۆۋەن بولىدۇ ياكى توغرا تېتالمايدۇ. تاتلىق نەرسىنى ئاچچىق، ئاچچىق نەرسىنى تاتلىق سېزىپ قالىدۇ. بەزىدە ھەر خىل مېۋە-چېۋە قاتارلىق نەرسىلەرنىڭ تەمىنى ئۆز ئەينى سەزمەستىن باشقىچە تەملىرىدە سېزىدۇ. قان غالىب كەلگەندە ئېغىز دائىم تاتلىق، سەپرا غالىب كەلگەندە ئاچچىق، بەلغەم غالىب كەلگەندە تۈزلۈك، سەۋدا غالىب كەلگەندە چۈچمەل بولىدۇ.

باشقا ئامىللاردىن بولغانلاردا، ئۆتكۈر، غىدىقلىغۇچى، مەس قىلغۇچى نەرسىلەرنى ئىشلەتكەن، نەزلە بولغان، ھەزىم بۇزۇلغانلىق تارىخى بولىدۇ. ھەمدە شۇنىڭغا مۇناسىپ ھالدىكى ئالامەتلەر بولىدۇ.

تەم سېزىش پۈتۈنلەي يوقالغاندا كۆپىنچە ھېچنەرسىنى سەزمەيدۇ. تەم سېزىم كۈچى توسۇلۇپ يوقىلىدۇ.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن قايسى خىلىتىن بولغان بولسا، شۇ خىلىتنى تازىلاپ تەكشۈش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئىگىر، قىزىل قىچا، ئاققەرەھا، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى قاتارلىقلارنى قاينىتىپ سۈيىگە بىر ئاز ھەسەل قوشۇپ ئىسسىق ھالدا پات-پات ئېغىزنى چايقاش ياكى يۇمشاق سوقۇپ تىل ئۈستىگە سېپىش كېرەك.

تەم سېزىش كۈچىنى ئاشۇرغۇچى تەدبىرلەرنى قوللىنىش بىلەن بىرگە تەم سېزىمىنى





تاجزلاشتۇرغۇچى ئامىللارنى توساش ۋە يوقىتىش، تاماكا چېكىشنى تاشلاش، زەھەرلىك چېكىملىكلەرنى قەتئىي مەنئى قىلىش كېرەك.

نەزلىدىن بولغانلارغا ئالدى بىلەن زۇكامنى داۋالاپ نەزلىنى توختىتىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن نوقۇنى نەزلە بېرىش، يەنى گۈل بىنەپشىدىن 7 گرام، چىلاندىن 5 دانە، سەرپىستاندىن 9 دانە، گاۋزەباندىن 5 گرام، بىخسۇس مۇقەششەردىن 5 گرام، خوبىزىدىن 7 گرام ئېلىپ قايىناقسۇغا بىر كېچە چىلاپ تەمىنى چىقارغاندىن كېيىن سۈزۈپ ئىچكۈزۈش كېرەك.

تىل تەم سېزىش كۈچى پۈتۈنلەي يوقىلىشنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن ماتۇلئوسۇلنى بېرىپ، ئاندىن كېيىن ئىيارەجى قەيقەرا، ھەببى قوقيا قاتارلىق دورىلارنى بېرىش ئارقىلىق توسالغۇلارنى ئېچىپ ماددىنى تازىلاپ، تىلنىڭ نورمال سېزىمىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش لازىم.

ئەگەر سوغۇقتىن بولغان بولسا قىچا، ئاقىرقەرھالارنى قاينىتىپ سۈيدە ئېغىزنى چايقاش ياكى تالقان قىلىپ تىل ئۈستىگە سېپىش لازىم.

ئەگەر ئىسسىقلىقتىن بولغان بولسا ئىسكەنجىبىنى بېرىش، قىزىلگۈل، سىماقنى قاينىتىپ ئېغىزنى چايقاش لازىم.

## تىل ئېغىرلىقى

تىل ئېغىرلىقى (سقلۇللىسانى) كېسەل كىشىنىڭ سۆزلەشتە قىيىنلىشى، بەزى ھەرپلەر ناۋۇشىنى توغرا تەلەپپۇز قىلالماسلىقىغا قارىتىلغان. مەزكۇر كېسەللىك تۇغما ۋە كېيىن پەيدا بولغان دەپ ئىككى خىل بولىدۇ.

سەۋەبى

1. مىزاج ۋە خىلىستلارنىڭ بۇزۇلۇشىدىن تىل ئېغىرلىقى كېلىپ چىقىدۇ، بۇنىڭدا كۆپىنچە قۇرۇقلۇق ۋە ئىسسىقلىقتىن بولىدۇ.

2. مېڭە تەرەپتىن بەلغەم ياكى قان خۇسۇسىيەتلىك ھۆلۈك تىلغا يامان تەسىر قىلغانلىقتىن تىل بۇشىش ھەتتا فالەجلىنىپ ياكى ئىستراخالىنىپ تىل ئېغىرلىقى





كېلىپ چىقىدۇ.

3. باشقا ئەزالاردىكى بولۇپمۇ مېڭىدىكى كېسەللىكلەر يەنى مېڭە پەردە ئىششىقى، مېڭىگە قان چۈشۈشتەك كېسەللىكلەر ئاسارتىدىن تىل ئېغىرلىقى كېلىپ چىقىدۇ.
4. تىلنىڭ ئۆزىدىكى كېسەللىكلەر سەۋەبىدىن تىل ئېغىرلىقى كېلىپ چىقىدۇ يەنى تىل ئاستىدىكى چاندېرنىڭ توغما قىسقا بولۇشى ياكى تىل ئاستىغا ھەر خىل جاراھەت چىقىپ تاتۇق قالدۇرۇپ تىل ئاستىدىكى چاندېرلارنى قىسقارتىپ قويۇشى ۋە ئەسەبلەرنى بۇزۇپ قويۇشىدىن كېلىپ چىقىدۇ.
5. سىرتقى زەخىملىنىشلەر تۈپەيلىدىن، مەسىلەن: باشنىڭ ئارقا تەرىپىگە بىر نەرسە تېگىش، قاتتىق يىقىلىش سەۋەبىدىن تىلنى ھەنگە تەلدۈرگۈچى پەيلەر ئۈزۈلۈپ تىل ئېغىرلىشىش كېلىپ چىقىدۇ.

### ئالامىتى

- ئورتاق ئالامىتى شۇكى، كىشى سۆز قىلغاندا تاۋۇشلارنى توغرا تەلەپپۇز قىلالمايدۇ. سۆزلەشتە قىيىنلىق ياكى كېكەچلەپ سۆزلەيدۇ. كۆپىنچە كىچىك بالىلاردا يۈز بېرىدۇ.
1. ئىسسىقلىق ۋە قۇرۇقلۇقتىن بولغانلىرىدا تىل سۇيۇقلۇقى يوقىلىدۇ. تىل گۆشلىرى تارتىشىپ قالىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە تىلنى ئەركىن ھەرىكەتتە ئەندۈرەلمەيدىغان بولغاچقا سۆزلەرنى دادىل ۋە ئاھاڭلىق چىقىرىشقا تەسسىز بولىدۇ.
  2. ھۆللىكتىن بولغان تىل ئېغىرلىقىدا باشقا ئەزالاردا فالە جىلىنىش بولماسلىقى مۇمكىن. لېكىن تىل فالە جىلىنىپ ھەرىكەتسىز بولۇپ قالىدۇ. ئېغىزدىن دائىم سۇ ئېقىپ تۇرىدۇ. تىلدىكى فالە جىلىنىش ئېغىر بولسا پەقەتلا سۆز قىلالماس بولۇپ قېلىشى مۇمكىن. يەڭگىلەر ك بولسا كېكەچلەپ سۆزلەيدىغان بولۇپ قالىدۇ.
  3. مېڭە پەردە ئىششىقى ۋە مېڭىگە قان چۈشكەنلىك تارىخى بولىدۇ. كۆپىنچە چوڭلاردا ئۇچرايدۇ. تىلنىڭ ئېغىرلىق دەرىجىسى سەۋەبىنىڭ ئېغىر-يېنىكلىكىگە قاراپ بولىدۇ.
  4. تىلنىڭ ئاستىنى تەكشۈرگەندە جاراھەت چىقىپ قالدۇرغان ئىزلار بولىدۇ. كېسەل كىشى تىل ئاستىنىڭ تارتىشىدىغانلىقىدىن شىكايەت قىلىدۇ.
  5. سىرتقى جەھەتتە زەخىملىنىش تارىخى بولىدۇ.

### داۋاسى

1. ئەگەر بىرەر خىلىتىنىڭ ئۆزگىرىشىدىن بولغان بولسا شۇ خىلىتىقا ماس





بەلگىلەر كۆرۈلدى. قايسى ماددىدىن پەيدا بولغان بولسا، شۇ ماددا تەسىر قىلغاندا تىل ئېغىرلىقى كۈچىيىپ قالىدۇ. ئىسسىقتىن، قۇرۇقتىن بولغانلارغا ھۆللۈك نەرسىلەرنى تىلغا سۈركەش كېرەك. بىنەپسە يېغى، قاپاق مېغىزى، تاتلىق بادام يېغى، بېھى تورۇقىنىڭ لۇتابى، ئاق ئەيلى تورۇقى لۇتابى، توخۇ يېغى، ئوردەك يېغى قاتارلىقلارنى بىرلەشتۈرۈپ، مېغىز دورىلارنى ئېزىپ بىرلىكتە تىل ئۈستىگە كۈندە بىر قانچە قېتىم سۈركەش لازىم.

2. ھۆللۈكتىن تىل بوشتىشىپ فالە جلىنىپ تىل ئېغىرلاشقانلارغا ئالدى بىلەن ھەببى ئىستەمخۇن، ئىيارە جى سەغىر ياكى ئىيارە جى فەيقەرا بىلەن ئومۇمىي بەدەننى تەنقىيە قىلىش، ئاندىن كېيىن مەخسۇس ھەببى قوقيا بىلەن مېگىنى تەنقىيە قىلىش كېرەك. ھەمدە ئىيارە جى فەيقەرا ياكى تۆشۈدۈر، فىلىفىل بىلەن ئېغىزنى چاقىش، سېرىق چېچەك يېغى ۋە بابۇنە يېغىنى تىلغا سۈركەش لازىم. بۇ جەھەتتە ئىگىرنىڭ مەنپەئەتى خېلى چوڭ. تىلنى تەرتىپلىك ھەرىكەتلەندۈرۈپ بېرىش ھەمدە سامساق مەئجۇنى، مەئجۇنى ماددە تۇلھايات، مەئجۇنى تۈستۈخۇددۇس قاتارلىقلارنى ئىستېمال قىلىش كېرەك. ئەگەر قان غالىب بولسا تىل تومۇرلىرىدىن قان ئېلىش ۋە ئاستىقى ئىگەككە ھىجامەت قويۇش كېرەك. بۇلاردىن باشقا يەنە تۆۋەندىكى چارە ۋە دورىلارنى ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ.

(1) تىلدىكى ئىستىرخا ئېغىرلىشىپ سۆزلەش تەسكە چۈشسە ئازراق فەرفىيۇن ۋە كۈندۈشنى بىر قىلىپ سوقۇپ تىلغا ۋە تىل تۈۋىگە سۇۋاش ھەمدە مۇشۇ خىلدىكى دورىلارنى گەجگىنىڭ ئارقا مېگىگە يېقىن كېلىدىغان جايغا قويۇش ھەمدە مۇشۇ خىلدىكى دورىلاردىن ئوخشاش مىقداردا ئېلىپ ھەب ياساپ ئىستېمال قىلىش كېرەك.

(2) مەستىكىدىن 6 گرام، ھىگىدىن 4 گرام ئېلىپ سوقۇپ نوقۇت چوڭلۇقىدا ھەب قىلىپ تىل ئاستىغا قويۇش كېرەك.

(3) ئازراق ئىگىر سېلىپ قاينىتىلغان ئىسكەنجىن ئەنسىلى بىلەن ئېغىزنى غەر-غەرە قىلىش ناھايىتى پايدىلىق.

(4) تۆشۈدۈر، فىلىفىل، قىچا، ئاقىرقەھا، زەنجىبىل، قۇرۇق ئۈزۈم، بۆرە ئەرمىنى، سۈتتەر، نەمەك ھىندى، سىياھدان، مەرزەنجۇش قاتارلىقلارنى سوقۇپ قاينىتىپ ئېغىزنى چاقىش ياكى ئۇنى ئېغىزغا ئېلىپ تۇرغۇزۇش، لېكىن دورا سۇيۇقلۇقى گالدىن تۆتۈپ كەتمەسلىكى كېرەك.

(5) سۈتتەردىن بىر ھەسسە، ئاقىرقەھا، قىچىلار ھەر بىرىدىن بېرىم ھەسسە. زەنجىبىلدىن ئۈچ ھەسسە، تۆشۈدۈردىن 1/4 ھەسسە ئېلىپ ئېغىزنى چاقىش كېرەك.

(6) قىچا، تۆشۈدۈر، زەنجىبىل، ئاقىرقەھا، سۈتتەر، فىلىفىل، سىياھدان، ھىندى تۈزلىرىنىڭ ھەربىرىدىن 3 گرام ئېلىپ قاينىتىپ ئېغىزنى چاقىسا بەلغەمدىن بولغان





تىل ئېغىرلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

(7) بىخ كەبىر، قىچا، سۆڭەك، ئاقىرقەرھالارنىڭ قايناتمىسى بىلەن ئېغىزنى چايقاش كېرەك.

(8) قىچىنى چالا. ئاقىرقەرھانى يۇمشاق سوقۇپ ئازراق سىركە ئارىلاشتۇرۇپ ئېغىزنى چايقاش، ھەمدە ئېغىز چايقاپ بولغاندىن كېيىن فىلىل، تۆشۈدۈر، قىچا، ئاقىرقەرھە، تەنكار، زەنجىبىل، سۆڭەك، بۆرە ئەرمىنىلەرنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق يانچىپ ھەسەل بىلەن يۇغۇرۇپ تىلغا قويۇش لازىم.

(9) تۆشۈدۈر، فىلىل، زەنجىبىلنىڭ ھەر بىرىدىن 3 گرام، تۈزدىن 2 گرام ياكى زەنجىبىل، زەرنەب، سىياھداننىڭ ھەر بىرىدىن 3 گرام، بەسباسەدىن 5 گرام، قەلەمفۇردىن 4 گرام، ئاش تۈزدىن 7 گرام ئېلىپ سوقۇپ تىلغا قويۇش لازىم.

(10) ئىگىر تۈركى ۋە جوزبوۋا ياكى تۆشۈدۈر، ئاقىرقەرھالاردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ تىلغا قويۇش كېرەك.

(11) سۈنبۈل، قىزىلگۈلنىڭ ھەر بىرىدىن 3 گرام، ئىزخىر، قەلەمفۇر، فەرفىيۇنلارنىڭ ھەر بىرىدىن 1.5 گرام ئېلىپ مۇميا ياكى ئەنبەرى ئەشەب بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ يۇغۇرۇپ تىل ئاستىغا قويۇپ ئېغىزدىن شالۋاق ئاققۇزۇش تەجرىبىدىن ئۆتكەن چارىدۇر.

(12) دارچىن، ھۇماما، سۈنبۈل تىپلەرنىڭ ھەر بىرىدىن 9 گرام، سازەج ھىندى، جۇۋىنا، مۇدەھرەج (يۇمىلاق) زىراۋەندى، تەۋىل (تۈزۈن) زىراۋەندى، چىگىسەي ئورۇقى، سېرىق چىچەك، مەستىكى، رۇمىدىيان. تاغ سەۋزە ئورۇقلىرىنىڭ ھەر بىرىدىن 7 گرام ئېلىپ سوقۇپ تاسقاپ تالقان تەييارلاپ ھەر قېتىمدا 4 گرامدىن قايناقسۇ بىلەن ئىچىشكە بېرىلسە تىلنىڭ بوشتىشىپ كېتىشىگە مەنپەئەت قىلىدۇ.

(13) پىستىننىڭ سىرتقى پوستىنى تىلغا قويۇش، زەنجىبىلنى لىمۇن سۈيىدە ئېزىپ تىلغا سۇۋاش مەزكۇر خىلدىكى تىل ئېغىرلىقىنى داۋالاشتا تەجرىبىدىن ئۆتكەن چارىلەردۇر.

يېمەك-ئىچمەك جەھەتتە چەلەڭ ۋە كۈندۈرنى قۇرۇق ئۈزۈم، فىلىللار بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىستېمال قىلىش، قىچىنى قىچا يېغىغا قوشۇپ يېيىش، تۆگىنىڭ تىلىنى پۇشۇرۇپ شورپىسى بىلەن ئىستېمال قىلىش، تەنكارنى نانغا قوشۇپ يېيىش، تاماقلارغا سىياھدان سېلىپ ئىستېمال قىلىش، پىندۇق يېيىش قاتارلىقلارنىڭ كۆپ مەنپەئەتى بار.

كېسەللىك ئەھۋالى ياخشىلانماي ئېغىزدىن داۋاملىق شالۋاق ئېقىش كۈچەيسە،





كېسەللىك ماددىسىنىڭ كۈچلۈك ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. بۇنىڭدا مۇھەللىلات دورىلارنى تۇتقۇچى دورىلار بىلەن قوشۇپ ئىشلىتىش ھەمدە سۇنبۇلنى قىزىلگۈل بىلەن، غۇنچە ئۈزۈمنى ئىزخىر، تاباشىرلار بىلەن قاينىتىپ ئېغىزنى چايقاش كېرەك.

تىلدىكى ئىستىرخا مېڭە شىركىچىلىكىدىن بولسا باشقا ئەزالاردىمۇ ئېغىرلىق بولىدۇ. بۇنىڭدا فالەج كېسەللىكىدە قوللانغان توسۇللارنى قوللىنىش كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا بېدە ئەنجىر يېغى، ماتۇلتۇسۇل ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش دورىلار بىلەن داۋالاش، لەقۇە كېسەللىكىدە كۆرسىتىلگەن تېمىتا ۋە غەر-غەرەلەرنى ئىشلىتىش كېرەك.

يۇمشاق تاڭلايغا ئاپەت يەتكەندىن بولغان تىل ئېغىرلىقىنى داۋالاشتا تىلنىڭ قۇرۇقلۇق ۋە ئىسسىقلىقتىن بولغان ئېغىرلىقىنى داۋالاشقا قوللانغان چارىلەرنى قوللىنىش، مۇناسىۋەتلىك دورىلارنى ئېغىزدا تۇتۇش ۋە غەر-غەرە قىلىش كېرەك ھەمدە سۆز قىلغاندا چوڭقۇر نەپەس ئالسا تاڭلاي مۇسكوللىرىغا كۈچ كىرىپ سۆزلەشكە ئاسانلىق توغۇلىدۇ.

3. مېڭە پەردە ئىششىقى قاتارلىق كېسەللىكلەردىن پەيدا بولغان تىل ئېغىرلىقلىرىدا كېسەللىك ئۈزۈنغا سوزۇلىدۇ. ساقىيىشى تەسرەك. يەڭگىلەرەكلەرگە ئىستىرخادىن بولغان تىل ئېغىرلىقىنى داۋالاشتىكى يەڭگىلەرەك دورىلارنى ئىشلەتسە بولىدۇ. تىل ئاستىدىن، ئېغىزدىن سۇ ئاققۇزۇشۇمۇ مەنپەئەت قىلىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن تۆشۈدۈر بىلەن ئاق تۈزنى ئارىلاشتۇرۇپ تىلغا سۈركەش كېرەك.

4. تىل ئاستىدىكى چاندىرلارنىڭ قىسقىلىقى سەۋەبىدىن بولغان تىل ئېغىرلىقىنى داۋالاشتا، دەستىكارلىق ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، قىسقىراپ قالغان چاندىرنى كېسىش كېرەك. كەسكەندە تىل ئاستىدىكى شىريانلارنىڭ كېسىلىپ كەتمەسلىكىگە دىققەت قىلىش، كېسىپ بولغاندىن كېيىن قان توختىتىش ئۈچۈن كەسكەن جايغا زاك سېپىش كېرەك. ئەگەر چاندىرلارنى كېسىشتىن قورقسا يېپەكنىڭ ئىنچىكە تاللىرىدىن يېڭنە توملۇقىدا يىپ تەييارلاپ چاندىرنى باغلاپ تىلنى ئاستا ھەرىكەتلەندۈرۈپ بەرسە چاندىرلار ئۈزلۈكسىز ئۈزۈلىدۇ.

ئومۇمەن تىلنىڭ ھەرىكەتچانلىقىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن جويۇزنى شۈمۈش كېرەك ياكى 10 گرام تۆشۈدۈرنى 100 گرام سىركە بىلەن قاينىتىپ ياكى توم زەنجىبىلنى تۈز بىلەن قاينىتىپ ئېغىزنى چايقاش ۋە تىلغا سۈركەش لازىم.

5. سىرتقى زەخمىدىن بولغان تىل ئېغىرلىقىنى داۋالاشتا ئەگەر تىل ئەسەب پەيلىرى ئۈزۈلگەن بولسا داۋالاپ ساقايتقىلى بولمايدۇ.





## كېكە چىلىك

كېكە چىلىك (لەكنە تۇللىسانى) سۆزلىگەندە كىشىلەرنىڭ كېكە چىلەپ بىرەر تاۋۇشنى قايتا-قايتا تەكرارلايدىغانلىقىغا قارىتىلغان بولۇپ، ئۇنىڭ تىل ئېغىرلىقى بىلەن بەلگىلىك دەرىجىدە پەرقى بولىدۇ. كۆپىنچە كىچىك بالىلاردا كۆرۈلىدۇ.

### سەۋەبى

بۇ كېسەللىكنىڭ سەۋەبى كۆپ ھاللاردا روھىي ئامىللارغا مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. كۆپىنچە بالىنىڭ تىلى چىقۇۋاتقاندا قاتتىق قورقۇپ كېتىش ۋە جىددىيلىشىشتىن باشلىنىدۇ. بەزى بالىلار باشقىلارنىڭ كېكە چىلىكىنى ئۇزۇن مۇددەت دوراپ ئادەتلەنگەنلىكى تۈپەيلىدىن كېيىنچە مەلۇم ھەرپلەرنى تەلەپپۇز قىلغان ياكى سۆزلىگەندە كېكە چىلەيدىغان بولۇپ قالىدۇ.

بەزىدە تىل ئاستىدىكى چاندىرلار قىسقىلىقىدىنمۇ تىل ھەرىكىتى چەكلىمىگە ئۇچراپ كېكە چىلىك كېلىپ چىقىدۇ.

### ئالامىتى

سۆزلەش جەريانىدا بولۇپمۇ ھەر بىر جۈملە سۆزنىڭ باش ھەرپىنى تەلەپپۇز قىلىشتا تونى تەكرار-تەكرار ئېيتىشقا مەجبۇر بولۇپ، دۇدۇقلاپ قالىدۇ. قورققاندا، غەزەپلەنگەندە، روھىي جەھەتتىن جىددىيلەشكەندە، كېكە چىلەپ سۆزلەش تېخىمۇ كۈچىيىدۇ.

### داۋاسى

ئاتا-ئانىلار بالىنىڭ تىلى چىقۇۋاتقان مەزگىلدە سۆزلەش ئەھۋالىغا دىققەت قىلىشى، بالىنى مەسخىرە قىلماسلىقى ۋە قورقۇتماسلىقى لازىم. ئەگەر دۇدۇقلاش ئەھۋالى بارلىقىنى بايقىسا، سەۋرلىك بىلەن تۈزىتىپ مەشىق قىلدۇرۇش كېرەك.





ئىگىر مۇراباسى بۇ جەھەتتە ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. مەزكۇر مۇرابىيا ھۆل ئىگىرنى پوستىدىن ئاجرىتىپ، ئوششاق توغراپ ھەسەل بىلەن قاينىتىپ قىيام قىلىپ تەييارلىنىدۇ. كۈندە 2-3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 9—12 گرامدىن يېگۈزۈلىدۇ. ھۆل ئىگىر تېپىلمىسا قۇرۇق ئىگىرنى لاتىغا ئوراپ سۇ بىلەن نەملەنگەن قۇمغا كۆمۈپ قۇمنى پات-پات نەپلەپ تۇرسا بىر قانچە كۈندىن كېيىن ئىگىر سۇنى ئۆزىگە تارتىپ ھۆللىنىدۇ. ئاندىن كېيىن يۇقىرىقى تۇسۇلدا تەييارلاپ ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ.

ئەگەر تىل ئاستى چاندېرلىرىنىڭ قىسقىلىقى بىلىنسە كەستۈرۈۋەتسە بولىدۇ. ناۋادا تىل ئەسەبلىرىدە پالەجلىنىش كۆرۈلسە، تىل ئېغىرلىقىنى داۋالاشتىكى چارىلەردىن بىرىنى قوللىنىش مۇمكىن.

## تىل ۋەرمىسى

تىل ۋەرمىسى (ۋەرەمۇللىسانى، ئىلتىھابۇللىسانى، ئاماسى زەبان) باشقا ئەزالاردا يۈز بەرگەنگە ئوخشاش بىرەر خىلىتىنىڭ ئۆزگىرىشى تۈپەيلىدىن تىلدا ئىششىق پەيدا بولغانلىقىغا قارىتىلغان.

### سەۋەبى

ئىچكى-تاشقى ئامىللارنىڭ تەسىرىدىن بەدەندىكى تۆت خىلىتىنىڭ يەنى قان، سەپرا، بەلغەم، سەۋدا ماددىلىرىنىڭ ئۆزگىرىپ ئوقۇنەت پەيدا قىلىپ تىلغا يامان تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

### ئالامىتى

1. قاندىن بولغان تىل ۋەرمىسىدە تىل قىزىرىدۇ، چىڭقىلىپ ئاغرىيدۇ. ئېغىزدىن ئازراق شۆلگەي ئاقىدۇ ۋە باش، يۈزنىڭ چىڭقىلىپ ئاغرىشى قوشۇلۇپ كېلىدۇ.
2. سەپرادىن بولغان تىل ۋەرمىسىدە تىلنىڭ رەڭگى سېرىق بولىدۇ. ئاغرىش بولۇپمۇ ئېچىشىش كۈچلۈكرەك بولىدۇ. ئېغىزدىن سۇ ئاقمايدۇ، قۇرغاق بولىدۇ. تىلنىڭ ھەممە جايىغا







مۇدۇر-مۇدۇر نەرسەلەر پەيدا بولۇپ، شەكلى مەلۇم دەرىجىدە ئۆزگىرىپ كېتىدۇ.  
 3. بەلغەمدىن بولغان تىل ۋەرىمىدە تىل ئاق رەڭلىك بولۇپ، ئېغىزدىن كۆپلەپ سۇيۇقلۇق ئاقىدۇ، ئاغرىش ئانچە ئېغىر بولمايدۇ.  
 4. سەۋدادىن بولغان تىل ۋەرىمىدە كېسەللىك ئەھۋالى يەڭگىل بولسا تىلنىڭ رەڭگى قارامتۇل، ئېغىرراق بولسا قارا رەڭدە بولىدۇ. سۇيۇقلۇق كۆپ ئاقمايدۇ. تىل قۇرۇقراق، ئېغىز ئىچى قۇۋۇلىشىپ ئاغرىيدۇ.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن كېسەلگە سەۋەبچى بولغان زىيادە خىلىتى مۇناسىپ مۇزىنجلار بىلەن پىشۇرۇپ، مۇسەللار ئارقىلىق بەدەندىن تازىلاش كېرەك.

1. قاندىن بولغان تىل ۋەرىمىنى داۋالاشتا، مۇۋاپىق تېپىلسا قىفالى تومۇردىن قان ئالسا بولىدۇ. سۈرگە دورىلىرىدىن قارا تۈرۈك، تەمرى ھىندى، قۇلۇس قاتارلىق دورىلارنى، مەتبۇخلاردىن مەتبۇخى شاھتەررەنى ئىچكۈزۈش كېرەك. ئەگەر ئىششىق ئېغىرلىشىپ قىزىل كېكىرتەك تارىيىپ ھېچ نەرسە ئۆتمەي دورا ئىستېمال قىلالمىسا، مۇناسىپ دورىلار بىلەن ھۆقنە قىلىش ياكى ئىششىقنى يۇمشىتىپ، ماددىنى قايتۇرۇش ئۈچۈن ئۆسۈڭ، كاسىن، مارجان شوخلا ۋە شۇنىڭغا ئوخشاشلارنى قاينىتىپ، ئېغىز ۋە تىلنى چايقاش ياكى بابۇنە، ئىككىل مىلىك، بىنەپشە، خىيارى شەنەبەر، ئانار گۈلى، سەندەل، سېمىز ئوت ئۇرۇقىنى قوشۇپ قاينىتىپ ئېغىزنى چايقاش لازىم. ئىششىقنىڭ باشلىنىش جەريانى ئۆتكەندىن كېيىن، كاكىنەج، كالىك بەسەي سۈيىنى چىقىرىپ زىغىر لۇئابى قوشۇپ غەر-غەرە قىلىش، ئىششىق پەسلەشكە يېقىنلاشقاندا بابۇنە، ئىككىل مىلىك، بىنەپشەلەرنى قايناتقان سۇغا خىيارشەنەبەر سۈيىنى قوشۇپ غەر-غەرە قىلىش، ئېغىزنى چايقاش لازىم.

2. سەپرادىن بولغان تىل ۋەرىمىنى داۋالاشتا قان ئېلىش پايدا قىلمايدۇ. قاندىن بولغان تىل ۋەرىمىنى داۋالاشتىكى چارىلەرنى قوللىنىش بىلەن بىرگە مەتبۇخى ھەلىيلىنى بېرىش كېرەك.

3. بەلغەمدىن بولغان تىل ۋەرىمىنى داۋالاشتا ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن مۇناسىپ دورىلار بىلەن تەييارلانغان، ئانچە ئۆتكۈر بولمىغان دورا سۇيۇقلۇقىنى ھۆقنە قىلىش ئارقىلىق ئىچىنى يۇمشىتىپ تازىلاش، ئۆسۈڭدىن باشقا يەنە ئىيارەجى فەيقەرانى بېرىش كېرەك. ئارپا بادىيان، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، بىنەپشە، چىلانلارنى قاينىتىپ سۈيىگە گۈلھەنت





سېلىپ ئېغىزنى چايقاش كېرەك. مەنچۈنى مەسرەدىيۇس، مەنچۈنى سەنجىرىنا بەرسىمۇ بولىدۇ.

4. سەۋادىن بولغان تىل ۋەمىنى داۋالاشتا، ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى ئەفتمۇن بېرىش، ئەنجۈر، شۇمشە، زىغىزنى قاينىتىپ، سۈيىگە بىنەپشە يېقى، ھەسەل، خىيار شەنبەر قوشۇپ ئېغىزنى چايقاش لازىم. ئۆسۈك، كاسنى، ھۆل يۇمىماقسۇتلەرنىڭ سىقىلغان سۈيىگە داكىنى چىلاپ تىلغا سۈركەش ياكى شۇ دورا سۈيى بىلەن ئېغىزنى ئوزۇنراق ۋاقىت چايقاش لازىم. بۇ چارە ئىسسىق دورىلار ئىشلەتكەن، لېكىن ئىششىق تېزلىشىپ سەرتانغا ئايلىنىپ قېلىش خەۋىي بولغانلار ئۈچۈنمۇ ئۆتۈمى بولىدۇ.

تىلنىڭ ھەر خىل سەۋەبىدىن بولغان ۋەرەملىرىگە پاقا يوپۇرمىقى ئورۇقدىن 20 گرامىنى 100 مىللىلېتر سىركە بىلەن قاينىتىپ تىلنىڭ ئۈستىگە سۈركىسىمۇ ياخشى ئۆتۈم بېرىدۇ.

### تىل ئاستى پاقىسىمان ئۆسۈمىسى

تىل ئاستى پاقىسىمان ئۆسۈمىسى (زەفدە ئۆللىسانى) تىل ئاستىغا كۆكۈش پاقىغا ئوخشاش ئۆسۈمە گۆش پەيدا بولۇپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان. قەدىمكى ھۆكۈمالار تونى پاقا بېشى كېسەللىكى دەپمۇ ئاتىغان. بۇ ئۆسۈمە چوڭايسا سۆزلەش قىيىنلىشىدۇ، كېسەل كىشىگە قاتتىق بىئاراملىق ئېلىپ كېلىدۇ.

سەۋەبى

خىلىتلارنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشلىرى تىلغا يامان تەسىر قىلىپ پەيدا بولىدۇ. بۇنىڭدا كۆپىنچە قويۇق قان ياكى بەلغەم ئوقۇنەت ۋە بۇخاراتلىق ماددىلىرى تىل ئاستىغا يىغىلغانلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامىتى

تىل ئاستىنىڭ بىر ياكى ئىككىلا تەرىپىگە كۆكۈش قارامتۇل، بەزىدە قىزىل رەڭلىك، چوڭ-كىچىكلىكى پەرقلىق ئۆسۈمە بەز پەيدا بولىدۇ. تەرەققىي قىلسا نورمال





سۆزلەشكە دەخلى يېتىدۇ. تىلنى ئەركىن ھەرىكەتلەندۈرەلمەيدۇ. ئېغىزدىن داۋاملىق كۆپلەپ شۆلگەي ئاقىدۇ. بۇنىڭ بەزىلىرى يامان سۈپەتلىك تۆسىمگە ئايلىنىدۇ. قويۇق قان سەۋەبىدىن بولغانلىرىدا تۆسىمنىڭ رەڭگى قىزىل بولۇش بىلەن بىرگە كۆيۈشۈش بولىدۇ. قويۇق بەلغەمدىن بولغانلىرىدا تۆسىمنىڭ رەڭگى ئاقراق ھەم قاتتىقراق بولىدۇ.

### داۋاسى

قاندىن بولغانلىرىنى داۋالاشتا قاندىن بولغان ئېغىز ئاغرىش كېسەللىكىدە ئېيتىلغان سوۋۇتقۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش ھەمدە مۇۋاپىق تېپىلسا قىيال تومۇرىدىن قان ئېلىش كېرەك. زۇلۇك قۇرۇتى قويىسىمۇ بولىدۇ. سەپرا مۇسەھلى بىلەن مېڭىنى تەنقىيە قىلىش كېرەك. كاسىن سۈيى، تۆسۈڭ سۈيى، يەرلىك شوخلا سۈيىنى ئېغىزدا تۇرغۇزسا ئوبدان مەنپەئەت قىلىدۇ.

بەلغەمدىن بولغانلىرىنى داۋالاشتا كېسەللىك ماددىسىنى پىشۇرۇپ بولغاندىن كېيىن ھەيى ئىيارەج بىلەن تازىلاش كېرەك. تەنقىيەدىن كېيىن تۆشۈدۈر، موزىلارنى يۇمشاق سوقۇپ تىلغا سۈركەش ۋە سىركە، تۇزلارنى ئېغىزغا ئېلىش كېرەك. ئەگەر بۇ چارىلەر ئۈنۈم بەرمەسە گۆشنى يىگۈچى ۋە يوقانقۇچى دورىلارنى، مەسلەن: تۆشۈدۈر، كۆيدۈرۈلگەن زاك، زەنگار، بىخ سۆسۈن، مۇرمەككى، ئاچچىق سۆرۈنجانلارنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ سىركىگە چىلاپ ئوبدان ئېرىتىپ يەرلىك ئورۇنغا قويۇش كېرەك. ئەگەر بۇنىڭدىنمۇ كۈچلۈكرەك ئىلاج قىلىشقا ئېھتىياج چۈشسە، بۇرۇن بەۋاسىرى ۋە ئېغىز ئاغرىشتا قوللانغان تۆسۈل-چارە ۋە دورىلارنى قوللىنىش ھەمدە تىل ئاستى تومۇرىدىن قان ئېلىش كېرەك. تەنگار، زەنگار ياكى ئانارگۈلنى، زاك ياكى قەلقەتار، موزا قاتارلىقلارنى زىماد قىلىشىمۇ بولىدۇ. پوستى بىخ كە بىرنى قاينىتىپ ئېغىزنى چايقاشمۇ مەنپەئەت قىلىدۇ.

ئەگەر يۇقىرىقى تەدبىرلەر بىلەن ئۈنۈم كۆرۈلمەسە تۆسىمە قېپنى يېرىپ ماددىلارنى چىقىرىۋېتىش كېرەك. تازىلاش ئۈچۈن سىركىگە ئازراق سۇ قۇيۇپ ئېغىزنى چايقاش، ئاندىن كېيىن كۆيدۈرۈلگەن زاكنى چاپلاش، گۆشنى يەپ تازىلىغۇچى مەلھەملەرنى داۋاملىق ئىشلىتىش ھەمدە مىزاجنى ئىسلاھ قىلىش كېرەك.

تۆۋەنكىدەك ياخشى تۆسۈللارنى قوللانسىمۇ بولىدۇ: سۆستەر، ئانار پوستى ۋە تۇزلارنى بىر قىلىپ تىلغا سۈركەش كېرەك. كۆيدۈرۈلگەن زاك، سۆرۈنجانلارنى تۇخۇم ئېقى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تىل ئاستىغا قويۇش، شەب يەمانى، بىخ سۆسۈن، زەئفەر، مۇرمەككى،





موزىلارنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ پاقىسىمان ئۆسمىگە قويۇش كۆپ مەنپەئەتلىكتۇر. كۆكتار، يەرلىك شوخلا، فلفىل، زىغىر، بىخ سۇس، ئاق لەيلىلەرنى قاينىتىپ غەر-غەر قىلىش ئوبدان مەنپەئەت قىلدۇ.

ئەگەر پاقىسىمان ئۆسمە قېتىۋالسا سۈنئەتتىن 2 گرام، زۇفادىن 4 گرام، سەدەب تالىقىنىدىن 8 گرام ئېلىپ سوقۇپ شېكەر ئارىلاشتۇرۇپ تاكى ئۆسمىدە قىچىشىش سېزىمى پەيدا بولغىچە چىپىش كېرەك. ئۈنۈمدىن كېيىن ھەبۇلكاس غولى، ئانارگۈلى، كۈندۈر پوستلىرىنى سىركىدە قاينىتىپ ئېغىزنى چايقاش، ئاغرىق بېسىلغىچە گۈل يېغى بىلەن ئېغىزنى چايقاش كېرەك.

ئەگەر ئۆسمىدىن قان كەلسە ئانارگۈلى، كۈندۈر پوستىنىڭ ھەر بىرىدىن 4 گرام، مۇرمەككىدىن 8 گرام ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ ساپلاشتۇرۇپ يەرلىك ئورۇنغا چىپىش كېرەك.

ئەگەر مەزكۇر ئۆسمە ئۆزىراپ كەتسە، دەستكارلىق ئوسۇلى بىلەن تىل ئاستىدىكى تومۇرنى بىر تەرەپكە داچىتىپ قان تومۇرلارغا دەخلى يەتكۈزمەسلىك شەرتى ئاستىدا ئۆسمىنى كېسىپ ئېلىۋېتىش كېرەك. چۈنكى تومۇرلار زەخمىلەنسە قان توختىماي تۆلۈم ھادىسى كېلىپ چىقىشى مۇمكىن. ئاندىن كېيىن كونا چىگىتنى ئېزىپ سىركە بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ چىپىش، ئىككىنچى كۈنى چىگىتنى ئېزىپ سەفېداپ، مۇردارسەنگە، گۈل يېغى، مۇملاردىن ياسالغان مەلھەم بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ چىپىش كېرەك. بەزىدە ئىنچىكە نەيچە بىلەن ئۆسمىدىكى نەرسىلەرنى شۇمۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن مەلھەم چىپىپ قويىسىمۇ بولىدۇ. يەرلىك ئورۇنغا سۇ تەككۈزۈشتىن ساقلىنىش، ئوسسىغاندا ئېغىزنى يوغان ئېچىپ سۈنى جاراھەت ئورنىغا تەككۈزمەي ئۆدۈل گالغا قويۇش كېرەك.

ئەگەر ئۆسمە يوغىناپ تىلنىڭ ھەرىكىتى توسقۇنلۇققا ئۆچرسا تاكى ئاغرىمايدىغان بولغانغا قەدەر تىل ئاستىنى ئاستا چېكىپ بېرىش، ئاندىن كېيىن مۇمنى سىركىدە ئېرىتىپ سۈرتۈش كېرەك.

ئەگەر ئۆسمە يەللىك سەۋەبلەردىن بولسا ئىسبە غۇل يوپۇرمىقى سۈيى، پاقا يوپۇرمىقى سۈيى، ئانار سۈلىرىنى ياكى ئانار سۈيىنى سىركە بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئېغىزغا تاكى يەل يوقالغىچە ئېلىش كېرەك. ئۆسمە ئېغىز ئالغان ۋە دەستكارلىقتىن كېيىن كېچىسى يۈتەل قوشۇلسا چۈچۈكبۇيا، ئوستۇخۇدۇس، چىلان، گۈل نىلۇفەر، ئاق لەيلىلەرنى يەرلىك شوخلا ئەرقى بىلەن قاينىتىپ سېلىپ ئىچكۈزسە بولىدۇ.



## چىشىنىڭ ساقلىقنى ساقلاش تەدبىرلىرى

چىش يېمەكلىكلەرنى چىشلەپ ئۈزۈش، كېسىش، چايناش ئارقىلىق ئۇلارنى ئېزىپ ھەزىم قىلىشقا لايىقلاشتۇرۇش رولىنى ئوينايدۇ. ئەگەر چىشلار بولمىسا تاماقلار ئېزىلمەي ئاشقازانغا چۈشۈپ ئۇنىڭ خىزمىتىنى ئېغىرلاشتۇرۇپ قويدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، چىشلار ھەربىي تاۋۇشلىرىنىڭ توغرا ۋە تولۇق چىقىشىدىمۇ بەلگىلىك دەرىجىدە رول ئوينايدۇ. شۇڭا چىشلارنىڭ ساقلىقنى ساقلاشقا ئالاھىدە ئېتىبار بېرىش كېرەك.

1. چىشنى دائىم يۇيۇپ پاكىزلەپ تۇرۇش، شاكراب تۈز سۈيى بىلەن ئېغىزنى چايقاش، بولۇپمۇ ئاخشىمى ئۇخلاشتىن بۇرۇن، ئەتىسى تويۇقۇدىن كېيىن چىش چوتكىسىغا چىش پاستىسى يۇقۇتۇپ چىشنى چوتكىلاشقا ئادەتلىنىش كېرەك. شارائىت بولمىغان جايلاردا ئەڭ ياخشىسى 3 ۋاخ تاماقتىن كېيىن ئېغىزغا سۇ ئېلىپ چايقاش، كۆرسەتكۈچ ۋە باش بارماقلارنى چىشقا تەككۈزۈپ پاكىزلەش كېرەك.

2. تاتلىق يېمەكلىكلەر بولۇپمۇ كەمبۇت قاتارلىق نەرسىلەرنى يېگەندىن كېيىن ئۇخلاشتىن بۇرۇن چوقۇم چىشنى چوتكىلاپ تاتلىق نەرسىلەرنىڭ قالدۇقلىرىنى تازىلاپ چىقىرىۋېتىش لازىم. چۈنكى چىش كاۋاكلىشىپ بۇزۇلۇش قاتارلىق چىش كېسەللىكلىرى كۆپىنچە مۇشۇ سەۋەبتىن كېلىپ چىقىدۇ.

3. چىش بىلەن قاتتىق نەرسىلەرنى چىشىلمەسلىك بولۇپمۇ چاقماسلىق مەسىلەن، تۈرۈك تۆكچىسى، بادام تۆكچىسى قاتارلىق نەرسىلەرنى چىش بىلەن چاقماسلىق كېرەك.

4. بەك سوغۇق ياكى ئىسسىق نەرسىلەرنى ئېغىزغا ئالماسلىق ياكى بەك سوغۇق نەرسىلەرنىڭ ئارقىدىنلا بەك ئىسسىق نەرسىلەر، بەك ئىسسىق نەرسىلەرنىڭ ئارقىدىنلا بەك سوغۇق نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلماسلىق لازىم.

5. چىشنى قاماتقۇچى چۈچۈمەل نەرسىلەرنى كۆپلەپ ئېغىزغا ئېلىشتىن ساقلىنىش لازىم.

6. قەينى كۆپ قىلماسلىق بولۇپمۇ چۈچۈمەل نەرسىلەر ياندىغان قەينى كۆپ قىلماسلىق كېرەك. قەيدىن كېيىن چوقۇم ئېغىزنى چايقاپ چىشلارنى پاكىزلەش كېرەك.

7. چىشلاردا ئاغرىش كۆرۈلسە ۋاقتىدا چارە قىلىش، كاۋاكلىشىش، سۇنۇش، چۈشۈشتەك چىش پۈتۈنلۈكى بۇزۇلۇش ئەھۋاللىرى كۆرۈلسە ۋاقتىدا چىش تېۋىپىغا



كۆرسىتىپ يامىنىش، چىش سالدۇرۇش كېرەك.

تىبابىتىمىز چىشنىڭ ساقلىقىنى ساقلاشتا رىئايە قىلىشقا تېگىشلىك يۇقىرىقىدەك تازىلىق ساۋاتلىرىنى تەشەببۇس قىلىشتىن سىرت بەزى تۆۋەنكى ئۇسۇل-چارە ۋە دورىلارنىمۇ قوللىنىدۇ، مەسىلەن: چىشلارنى كۈچەيتىش ئۈچۈن ھەر ئايدا 1-2 قېتىم مۇناسىپ سۇنۇنلارنى چىشلارغا سېپىدۇ، ئېغىز چايقاش تۇسخىلىرى بىلەن ئېغىزنى چايقايدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزى ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ چىش ۋە چىش مۈلۈكلىرىگە سۈركەيدۇ ياكى سۈتلۈك ئوتنىڭ يىلتىزنى ئۈزۈم شارابى بىلەن قاينىتىپ ئېغىز چايقايدۇ. لازىم تېپىلغاندا 2-3 يىلدا بىر قېتىم ئېغىزدىكى تۆت تومۇر (چاھاررەگ) دىن قان ئېلىپ تۇرۇشنى تەۋسىيە قىلىدۇ. چىشنىڭ مزاجى ئىسسىق بولسا رەۋغىنى گۈل قاتارلىقلارنى، سوغۇق بولسا رەۋغىنى ئانار، رەۋغىنى ئىزخىر، رەۋغىنى بابۇنە ۋە رەۋغىنى مەستىكىگە ئوخشاش ئىسسىق تەبىئەتلىك ياغلارنى سۈركەيدۇ. بۇنىڭدا چىشنىڭ مزاجى ئىسسىق بولسا ئالدى بىلەن شېكەر، سوغۇق بولسا ھەسەل سۈركىگەندىن كېيىن مۇناسىۋەتلىك ياغلار بىلەن چىشنى ياغلايدۇ. ئەگەر شۇ كىشىنىڭ مزاجى قۇرۇق ۋە سوغۇقلاققا مايىل بولسا، چىشلارنى ياغلاش بىلەن بىرگە مېگە ۋە ئاشقازاننى تازىلاشنى بىرگە ئېلىپ بارىدۇ. ئەگەر چىش قاماپ قېلىش ئەھۋالى كۆرۈلسە قوربۇچى نەرسىلەرنى ئېغىزدا تۇزۇنراق تۇرغۇزىدۇ، قاتارلىقلار.

## چىش كېسەللىكلىرىنى داۋالاشنىڭ ئومۇمىي پرىنسىپى ۋە بەزى دورىلىرى

چىشنىڭ مزاجى قۇرۇق بولىدۇ. چىش كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتا دورىلارنىڭ ئىسسىق، سوغۇق ۋە مۆتىدىللىكىنى نەزەردە تۇتۇش كېرەك. بەدەننىڭ ئومۇمىي مزاجىدا ئۆزگىرىش بولغاندا بولۇپمۇ سوغۇقلاققا مايىل بولغاندا چىشنىڭ مزاجى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە تىرىشىشى كېرەك.

چىشنىڭ ئەڭ ياخشى دورىلىرى چىشنى قۇرۇتقۇچى ۋە چىگىتقۇچى دورىلاردۇر. سوغۇققا مايىل قۇرۇتقۇچى دورىلار بىرئاز چۈچۈمەلرەك كېلىدۇ، مەسىلەن: سەندەل، كافۇر، قىزىلگۈل تۇرۇقى، ئانارگۈلى، خۇنسىياۋشان، موزا، كەربىيا، مەرۋايىت، فۇفەل، ئارپا تونى، ئۈجمە دەرىخى پوستى، ھۇمماز يىلتىزى، ھەلىبە مېغىزى، ئامۇت تۇرۇقى، ئاقاقىيا، سىماق،





جۈپتى بەللۇت قاتارلىقلار.

ئىسسىققا مايىل قۇرۇتقۇچى دورىلارنىڭ ئىسسىق كەپپىياتى بەزىلىرىنىڭ جەۋھىرىدە بولسا، بەزىلىرىنىڭ دورا ئەتراپىدا بولىدۇ.

ئىسسىق كەپپىياتى دورىنىڭ جەۋھىرىدە بولىدىغانلار: كۆيدۈرۈلگەن تۇز، كۆيدۈرۈلگەن سەئىدى كۇفى، كۆيدۈرۈلگەن سازەج ھىندى، كۆيدۈرۈلگەن بۇغا مۇڭگۈزى، دارچىن، زۇفا، ئىزخىر، بىخ كەبىر ۋە ئۇنىڭ مېۋىسى (مېۋىسى بىخ كەبىردىن كۈچلۈك بولىدۇ)، كۆيدۈرۈلگەن ياكى كۆيدۈرۈلمىگەن ئۇد، ئىپار، ئارچا دەرىخى يوپۇرمىقى، سازەج ھىندى يوپۇرمىقى، پۈدىنە ۋە ئۇنىڭ كۆلى، مەستىكى، تەنكار، زىراۋەندى مۇدەھرەجلەرنىڭ كۆلى، ئۈزۈم تېلىنىڭ كۆلى، توشقان بېشىنىڭ كۆلى، ئارچا ياغچىنىڭ كۆلى، ئاقىرقەھرا كۆلى، كۈندۈر ۋە شەھمەھە نىزەل كۆلى قاتارلىقلار.

ئىسسىقلىق كەپپىياتى دورىنىڭ تۈزى ياكى ئەتراپىدا بولىدىغانلار: موزنىڭ كۆلى (ئەگەر ئۇنى كۆيدۈرگەندىن كېيىن سىركىدە سوۋۇتسا كەپپىياتى مۆتىدىللىشىدۇ)، ئۈزۈم توشىشاق شاخلىرىنىڭ كۆلى، قومۇش كۆلى قاتارلىقلار.

چىشىقا ئىشلىتىلىدىغان دورىلارنى مۆتىدىل قىلىشقا ئېھتىياج چۈشسە يۇقىرىقى سوغۇق ۋە ئىسسىق دورىلارنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ تەكشۈپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ. چىشىقا ئىشلىتىلىدىغان دورىلارنىڭ بەزىلىرى تارقاققۇچى ۋە يۇمشاققۇچى، بەزىلىرى سوۋۇتقۇچى، بەزىلىرى سېزىمنى ئاشۇرغۇچى دورىلار بولۇپ، سېزىمنى ئاشۇرغۇچى دورىلار كېيىنچە يامان تەسىرلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، شۇڭا ئۇلارنى ئامال بار ئىشلەتمەسلىك كېرەك. ئاندىن باشقا، چىش كېسەللىكلىرى ئۈچۈن قاتتىق دەرىجىدە تارقاققۇچى ۋە قىزىتقۇچى دورىلارنى ئىستېمال قىلماسلىق كېرەك. مەسىلەن: ھەنزەل، خەرىق، قىشائۇلھىمار قاتارلىقلار. ئەگەر ئىشلىتىشكە زۆرۈرىيەت بولۇپ قالسا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش كېرەك. سۇتۇن دورىلارنى ئىشقا ئاشۇرۇش ۋاقتىدا ئىشلەتمەي، مېۋە قىلىشتىن بۇرۇن ئىشلىتىش لازىم. چىشلارنىڭ بۇزۇلۇشىنى قابىز دورىلار ئارقىلىق داۋالاش سەل تەسكە توختايدۇ. چىشنىڭ ھەر خىل كېسەللىكلىرىگە قۇفەل، موزا، بەللۇت، دارچىنى، زورنىباد، سۇنتەر قاتارلىق دورىلار ئوبدان مەنپەئەت قىلىدۇ.

### چىش ئاغرىش

چىش ئاغرىش (دەردى دەندان، ۋە جىئوئە ستانى) بەزى چىش كېسەللىكلىرىدە





بولدىغان ئومۇمىي ئالامەتكە قارىتىلغان. ئۇ ئادەتتە مزاجنىڭ خىلتىسىز ياكى خىلتىلىق بۇزۇلۇشىدىن بولغان چىش ئاغرىش، باشقا ئەزا كېسەللىكلىرى شېرىكچىلىكىدىن بولغان چىش ئاغرىش ۋە چىشنىڭ ئۆزىدىكى ئۆزگىرىشلەردىن بولغان چىش ئاغرىشلارغا ئايرىلدى.

### سەۋەبى

1. مزاجنىڭ خىلتىسىز بۇزۇلۇشى چىشقا يامان تەسىر قىلسا چىش ئاغرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنىڭدا كۆپىنچە ماددىسىز ئىسسىق ۋە سوغۇقنىڭ تەسىرىدىن بولغانلىرى كۆپ ئۇچرايدۇ.

2. مزاجنىڭ خىلتىلىق بۇزۇلۇشى چىشقا يامان تەسىر قىلسا چىش ئاغرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنىڭدا كۆپىنچە قان، سەپرا، بەلغەم ماددىلىرىنىڭ ئاشقانلىقىدىن بولغانلىرى كۆپ ئۇچرايدۇ.

3. باشقا ئەزالاردىكى ئۆزگىرىشلەر چىشقا يامان تەسىر كۆرسىتىپ چىش ئاغرىشىنى پەيدا قىلىدۇ. بۇنىڭدا ئاشقازان ۋە باشقا ساھەسىدىكى ئۆزگىرىشلەردىن كېلىپ چىققان كېسەللىكلەرنىڭ چىشقا تەسىر قىلغانلىرى كۆپ ئۇچرايدۇ.

ئاشقازان قويۇق، ئۆتكۈر ياكى ناچار ماددىلارغا تولۇپ، ئۇلارنىڭ زىيانلىق تەسىرى چىشقا ئۆرلىگەنلىكتىن چىش ئاغرىش كېلىپ چىقىدۇ.

باش تەرەپتىن قويۇق يەللەر چىش يىلتىزى ۋە چىش سېزىم ئەسەبلىرىگە چۈشكەنلىكتىن چىش ئاغرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھەر خىل كېسەللىكلەر، مەسىلەن، يۇقىرى قان بېسىم كېسىلى، زىيائىت (قەنت سىيىش) كېسىلى، بۇرۇن يان بوشلۇقى ۋەرمى، ئېغىر دەرىجىدىكى كەمقانلىق كېسىلى، زۇكامۇلۇئە بائى (تارقىلۇچان زۇكام)، ئېغىر دەرىجىدىكى ئەسەب ئاجىزلىقى قاتارلىقلارنىڭ تەسىرىدىن چىش ئوخشىمىغان دەرىجىدە ئاغرىدۇ.

4. چىشنىڭ ئۆزىدىكى ئۆزگىرىشلەر تۈپەيلىدىن چىش ئاغرىش كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭدا كۆپىنچە چىش كاۋاكلىشىش، چىش مۇلۇكلىرى ئىشىشىپ ۋەرەملىنىش قاتارلىقلاردىن بولدىغانلىرى كۆپ ئۇچرايدۇ.

### ئالامىتى

1. مزاجنىڭ خىلتىسىز بۇزۇلۇشىدىن بولغان چىش ئاغرىشتا ئەگەر چىش ئاغرىش







ماددىسىز ئىسسىقتىن بولسا ئاغرىش قاتتىق باشلىنىدۇ. ئىككى ئېگەك قىزىق بولىدۇ. ئېغىزغا سوغۇق سۇ ئالسا خوش يېقىپ چىش ئاغرىقى پەسەيگەندەك بولىدۇ، چىشنىڭ تۈۋى ئىششىقسىز قىزىرىدۇ.

ئەگەر ماددىسىز سوغۇقتىن بولسا، سوغۇق شامال ياكى سوغۇق نەرسىلەر تەگسە ئاغرىش كۈچىيىدۇ. ئىسسىقلىقنىڭ ئالامىتى كۆرۈلمەيدۇ. لوقۇلداپ ئاغرىش بولمايدۇ. ئىسسىق نەرسىلەر تەسىر قىلسا خوش ياقىدۇ ياكى ئاغرىق پەسىيىپ قالىدۇ.

2. مىزاجنىڭ خىلىتلىق بۇزۇلۇشىدىن بولغان چىش ئاغرىشتا، ئەگەر چىش ئاغرىش قانىنىڭ غالىبلىقىدىن بولسا، چىشنىڭ تۈۋى قىزىرىدۇ، ئىششىيدۇ، چىش ئېغىرلىشىپ، لوقۇلداپ، چىقىلىپ ئاغرىيدۇ. قانىنىڭ غالىب كەلگەنلىك ئالامەتلىرى بولىدۇ.

ئەگەر سەيرانىڭ غالىبلىقىدىن بولسا، چىش كۆيۈشۈپ ئاغرىيدۇ. بەزىدە باش، چېكە ساھەلىرىنىڭ چىقىلىپ ئاغرىشىمۇ قوشۇلۇپ كېلىدۇ. چىشنىڭ تۈۋى سېرىق بولىدۇ. سەپرا غالىبلىقىنىڭ باشقا ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.

ئەگەر بەلغەمنىڭ ئاشقانلىقىدىن بولسا، چىش ئاغرىش بوش بولىدۇ. لوقۇلداپ ئاغرىش بولمايدۇ. چىش تۈۋى قىزىرىدۇ. سوغۇق نەرسىلەر تەسىر قىلسا ئاغرىش كۈچىيىدۇ. قىزىق نەرسىلەر تەگسە خوش ياقىدۇ. ئىسسىقلىقنىڭ ئالامەتلىرىدىن ھېچ بىرى كۆرۈلمەيدۇ.

3. باشقا ئەزا ۋە كېسەللىكلەردىن بولغان چىش ئاغرىشتا، ئەگەر ئۇ ئاشقازاندىكى يەل-يۇخارانلارنىڭ ئۆزلىگەنلىكىدىن بولسا، قورساق تويۇپ كەتكەن ياكى ھەزىم قىلىش ناچارلاشقان چاغلاردا ۋە ياكى كېچىدە تاماق يېسە چىش ئاغرىش كۈچىيىدۇ ياكى ئەسلىدىكى ئاغرىق كۈچىيىپ كېتىدۇ.

ئەگەر باشقا كېسەللىكلەردىن بولسا، شۇ خىلدىكى كېسەللىكلەرنىڭ ئۆزىگە خاس ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. چىش تارتىشىپ ئاغرىيدۇ. ئاغرىش بىر جايدىن يەنە بىر جايعا يۆتكىلىپ تۇرىدۇ.

4. چىشنىڭ ئۆزىدىكى ئۆزگىرىشلەردىن بولغانلىرىدا چىش ئاغرىش چىشتىكى كاۋاكىلارنىڭ ئېغىر-يەڭگىللىكى، چىش مۇلۇكلىرىدىكى ئىششىق، ۋەرەملىنىش دەرىجىسىگە قاراپ ھەر خىل بولىدۇ.

داۋاسى

چىش ئاغرىشىنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن سەۋەبىنى ئېنىقلاپ سەۋەبىگە قارىتا چارە





قىلىش، كېسەللىك كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى ماددىنى ئايرىپ مۇناسىپ دورىلار بىلەن تازىلاش ۋە مىزاجنى تەڭشەش ھەمدە ئاغرىق توختىتىش تەدبىرلىرىنى قىلىش لازىم. ئىسسىقلىقتىن بولسا، سوغۇق دورا ۋە چارە تەدبىرلەرنى، سوغۇقتىن بولسا ئىسسىق دورا ۋە چارە تەدبىرلەرنى قىلىش كېرەك.

قان غالىبلىقتىن بولسا، ئەھۋالغا قاراپ مۇۋاپىق تېپىلسا قان ئالغان ياكى ھىجامەت قويغاندىن كېيىن مەتبۇخى ھەلىلە ياكى مەتبۇخى ئەفتمۇن بېرىش كېرەك. گاۋزەبان، ئىت ئۈزۈمى، يۇمغاقسۈتلەرنى قاينىتىپ سۈيىنى ئېغىزدا تۇرغۇزۇش، ئەگەر چىش ئاغرىش قاتتىق بولسا تەرياقى ئەسنانى چىشقا قويۇش كېرەك.

سەپرانىڭ غالىبلىقىدىن بولسا، مەتبۇخى ھەلىلە ياكى تەمرى ھېندى بېرىلىدۇ. بەلغەمدىن بولسا، بەلغەمنى تازىلاش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ھەببى ئىيارەج ياكى ھەببى سەبرە بەرگەندىن كېيىن تەرياقى ئەسنانى بېرىش كېرەك.

تۆۋەندىكى ئۇسۇل-چارە ۋە دورىلارنى چىش ئاغرىشىنىڭ كېلىپ چىقىش سەۋەبىگە قاراپ تاللاپ قوللانسا بولىدۇ:

(1) سىركە ۋە گۈلاپنى ئېغىزغا ئېلىپ تۇتۇش، ئاغرىق بەك قاتتىق بولسا يۇقىرىقىلارغا ئازراق كافۇر قوشۇپ ئاغزىغا ئېلىش لازىم.

(2) قىچا، ئاقىرقەرھە، پىلىل ۋە ئاق تۈزنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ، چىش تۈۋىگە بېسىش كېرەك.

(3) ئىت ئۈزۈمى (مارجان شوخلا) نىڭ سۈيى، ھۆل يۇمغاقسۈت سۈيى، پاقا يوپۇرمىقىنىڭ سۈيى قاتارلىقلارنى ئېغىزدا تۇتۇش لازىم.

(4) ئەنسۇن (رۇمىيادىيان) بىلەن زىرنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ قاينىتىپ ئېغىزنى چايقىسا بولىدۇ. چىش «قۇرۇت يېگەن» لىكىن ئاغرىسا كۈدە تۇرۇقى، پىياز تۇرۇقى، مىڭدۈنە تۇرۇقى قاتارلىقلارنى موم بىلەن بىللە چوچ ئۈستىگە قويۇپ، قومۇش نەيچە ياكى ۋارۇنكىدەك بىر نەرسە ئارقىلىق چىشنى ئىسلىسا چىش ئاغرىقى توختايدۇ.

(5) يىلان پوستىنى سىركىدە قاينىتىپ ئاغزىنى چايقىسا ياكى ئال (تەك) نىڭ پوستى بىلەن يوپۇرمىقىنى قاينىتىپ ئېغىزنى يۇيسا ئاغرىق توختايدۇ.

(6) چىش بوشتاپ كېتىپ لىكىشىپ ئاغرىسا قىزىلگۈل، يەسىمۇق، پۇرچاق، تۆشۈدۈر، كوچىلا، زەئفەر، ئانار پوستىنى سوقۇپ چىش تۈۋىگە بېسىش لازىم.

(7) 3.5 گرام ئاقىرقەرھە، 165 مىللىگرام كافۇرنى سوقۇپ گۈل يېغىغا ئارىلاشتۇرۇپ سىرتتىن سۈركەش مۇمكىن. چىش كاۋاك بولسا، كۆكنار يېغىنى چىش كاۋىكىغا تېمىتىش كېرەك.





(8) كابابەچىنى سۇدا (ئەڭ ياخشىسى ئاچچىق سۇدا) قاينىتىپ سۈيگە ئازراق زەمچە سېلىپ ئېغىزنى چايقاش لازىم.

(9) تېرەكنىڭ قاتتىق قوۋزىقى، ئىسلانغان قومۇشتىن تەڭ مىقداردا ئېلىپ، كابابەچىنىدىن مۇشۇ مىقداردا ئېلىپ بىر پىيالە سۇدا قاينىتىپ ئېغىزنى چايقىسا چىش ئاغرىقى پەسىيىپ قالىدۇ.

(10) ئاپتاپپەرەس يىلتىزىدىن 250 گرام، قارا ھەلىلىدىن 17.5 گرام، ئاق تۇزدىن 17.5 گرام، سېرىق ئەمەندىن 250 گرام، كابابەچىنىدىن 17.5 گرام ئېلىپ 3 پىيالە سۇدا يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ سۈزۈپ، يىلمان ھالدا ئېغىزنى چايقاش كېرەك.

(11) سۆڭەت گۈلنىڭ گۈلىدىن ئازراق ئېلىپ، سۇدا قاينىتىپ ئېغىزنى چايقىسا بولىدۇ. يۇمشاق توغرىغۇ تالقىنىنى بۇرۇن ئىچىگە نەيچە بىلەن پۈركىسە چىشنىڭ ئاغرىقى توختايدۇ، بىر قېتىمدا توختىمىسا يەنە بىر قېتىم پۈركەش مۇمكىن.

(12) ھەرە كۆنىكىنى كابابەچىنى بىلەن بىللە قاينىتىپ سۈزۈپ سۈيگە ئازراق تۈز قوشۇپ ئېغىزغا ئېلىپ تۇرسا كاۋاك چىشنىڭ ئاغرىقىنى پەسەيتىدۇ.

(13) چىش ئاغرىقى كۆمىلىچىنىڭ ئۈنۈمىمۇ ياخشى.

چىش ئاغرىقى كۆمىلىچى:

ئاق تۇرپۇت 7 گرام، سۈرۈنجان، سېرىق ھەلىلىنىڭ ھەر بىرىدىن 3.5 گرام، قىزىلگۈل، بىنەپشە، ئەقىمۇن، تاش تۇز، بوزدان، رومبادىيان، پۇشۇرۇلغان سوقمۇنيا، مۇقىل، غارىقۇن، سەكبە نەجلىرنىڭ ھەر بىرىدىن 2.1 گرام.

تەييارلىنىشى: مەزكۇر دورىلارنى قائىدە بويىچە سوقۇپ، تاسقاپ ئەرەقى بادىيان بىلەن خېمىر قىلىپ نوقۇت چوڭلۇقىدا كۆمۈلە قىلىنىدۇ.

تەبىئىي: قۇرۇق ئىسسىق

خۇسۇسىيىتى: بەلغەمدىن بولغان چىش ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: ئەنگەن-ئاخشامدا 3.5 گرامدىن ئىستېمال قىلىدۇ.

(14) چىش ئاغرىقىدا ئىشلىتىلىدىغان تۆۋەنكى مەخسۇس ئۆسۈمنىڭ ئۈنۈمىمۇ

ياخشى.

ئاقسرقەرھا، بۇزورۇلبەنجىنىڭ ھەر بىرىدىن 7 گرام، كۆك ماش 10.5 گرام، خەشخاش 7.7 گرام.



دورلارنى چالا سوقۇپ سۇدا قايناتقاندىن كېيىن سۈيىدە ئېغىز چايقىلىدۇ.

## چىش قاماش

چىش قاماش (زەرەسۈكە سنانى) ھەر خىل ئىچكى-تاشقى ئامىللارنىڭ تەسىرىدىن چىشنىڭ قاماپ نەرسىلەرنى چايناشتىن ئۆزىنى تارتىدىغان ياكى چايناشتا قىيىلىدىغان بولۇپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

1. قابىز (قورۇغۇچى)، قېرىق، ئاچچىق-چۈچۈك نەرسىلەرنى چاينىغان ياكى يېگەن چاغدا ئۇ نەرسىلەر چىشتا ئۇزۇن تۇرۇپ قېلىپ، شۇ نەرسىنىڭ سۇيۇق ۋە لەتىپ قىسىملىرى چىشنىڭ جىسمىغا ئۆتۈپ چىشنى يىرىكلەشتۈرگۈچى سوغۇقلۇق پەيدا قىلىدۇ-دە، چىش ئەسەبلىرىنىڭ سەزگۈرلۈكى ئېشىپ چىش قاماشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

2. بەك سوغۇق نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلغاندا چىش قاماپ قالىدۇ.

3. ئاچچىق خىلىت ئاشقازان ئاغزىغا يىغىلىپ ئاندىن قەي بىلەن چىقىپ ئۇنىڭ بۇخارى ئۆرلەپ چىش قاماشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ئالامىتى

چىش قاماشنىڭ 1-خىلىدىكىسىدە قابىز، قېرىق نەرسىلەر ئىستېمال قىلغانلىق تارىخى بولىدۇ.

2-خىلىدىكىسىدە سوغۇق ياكى يىلمان نەرسىگە ئۇچراشسا چىش ئاغرىيدۇ، قاتتىق نەرسىلەرنى چاينىيالمايدۇ.

3-خىلىدىكىسىدە ئاچچىق كېكرىك كېلىدۇ، ئاغزى ئاچچىق بولىدۇ. ئاچچىق قەي ۋە ئاغزىدىن سۇ كۆپ كېلىدۇ.

1- خىلىدىكىسىنى داۋالاشتا بىمارنىڭ مزاجى ئىسسىق بولسا، مەتبۇخى ھەلىپلە ياكى مەتبۇخى ئەقىمۇن بېرىش، گۈل يېغى، كافۇرلارنى چىشقا قويۇش لازىم. سېمىز ئوتنىڭ يوپۇرمىقى ۋە غولى ياكى تاغ رەيھىنى (بادرۇج) قاتارلىقلارنى چايناش لازىم. بىلىمان زەيتۇن. يېغى بىلەن ئېغىزنى چايقىسىمۇ بولىدۇ. ئاغرىقنىڭ مزاجى سوغۇق بولسا، جويۇز، ئاچچىق بادام مېغىزى، ياڭاق، پىندۇق، نارجىل مېغىزى قاتارلىقلارنىڭ قايسى بىرى تېپىلسا قىزىتىپ چىشلارغا سۈركەش ياكى تۇخۇم سېرىقىنى چالا پۇشۇرۇپ چىشلارغا چېپىش كېرەك.

2- خىلىدىكىسىنى داۋالاشتا ھەبۇلغار، زەمچە، تۇزۇن زىراۋەندىلەرنى يۇمشاق ئېزىپ چىشنىڭ تۇۋىگە سۈركەش، تەرياقى كەبىر، بىلىسان يېغىنى سۈركەش لازىم. چىشتا ھارارەت پەيدا بولغان سەۋەبتىن قامسا، گۈل يېغىغا كافۇر ۋە سەندەللەرنى قوشۇپ چىشقا سۈركەش ۋە ئاغزىدا تۇتۇش لازىم.

3- خىلىدىكىسىنى داۋالاشتا ئاشقازاندىكى ئاچچىق خىلىتلىق ماددىنى تازىلاشقا تىرىشىش كېرەك. بۇنىڭ ماددىسى ئاشقازاننىڭ ئاغزىدا بولغانلىقى ئۈچۈن قەي ئارقىلىق تازىلىغاننىڭ مەنبەئەتى ياخشىراق بولىدۇ. ماددىنى تازىلىغاندىن كېيىن يۇقىرىدا ئېيتىلغان چارنى قىلىش بىلەن بىرگە سەتتەر، تاغ رەيھىنى، ھەسەل، تۇزلانى چىشقا سۈركەش ياكى زەيتۇن يېغىنىڭ دۇغىنى ماس پىيالغا ئېلىپ ئوتتا ياكى ئاپتاپتا قويۇپ قىزىتىپ چىشقا سۈركەش لازىم.

## چىش مىدىرلاپ قېلىش

بۇ، ئاساسلىق ھەر خىل ئىچكى سەۋەبلەردىن بولغان چىش مىدىرلاپ قېلىش (جۇنپىدەنى دەندان) قا ھەتتا چىش چۈشۈپ كېتىش (ئوتتادەنى دەندان) كە قارىتىلغان.

سەۋەبى

ئارتۇق ھۆلۈك بولۇپمۇ سۇيۇق بەلغەم ھۆلۈكىنىڭ چىش تۇۋىگە يىغىلىپ



قېلىشىدىن چىشلار بوشاپ مىدىرلاپ قالىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا چىش تۇۋىدىكى گۆشلەرنىڭ ئازلاپ قېچىشى (يىگىدىشى)، چىش تۇۋى يەللىك يارىسى، چىش تۇۋىگە ئوزۇقلۇق-قۇۋۋەتلەرنىڭ يېتىشمەسلىكى، چىشنىڭ تۇۋىگە ئىسسىق خاراكتېرلىك ئىششىق پەيدا بولۇش قاتارلىقلاردا چىش مىدىرلاپ قېلىش، ھەتتا چۈشۈپ كېتىش ئەھۋاللىرى يۈز بېرىدۇ. بۇ، ياشانغان كىشىلەردە تەبىئىي ئەھۋال، ياشلاردا بولسا كېسەللىك بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. يەنى بەزىدە ياشلاردا كۆپىنچە ئاچ قېلىش ياكى ئوزۇقلانماستىن ياخشى بولماسلىق، كۆپ قان يوقىتىش، ئىچى سۈرۈش قاتارلىق سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ئوزۇقلۇق يېتىشمەي چىش مۈلۈكلىرى بوشاپ چىش مىدىرلاپ قالىدۇ ھەتتا چۈشۈپ كېتىدۇ. سىرتقى زەخم ئاسانلا چىشلارنىڭ مىدىرلاپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا بەزىدە سىمابلىق دورىلارنى ئىستېمال قىلغانلىقتىنمۇ چىش مىدىرلاش، چۈشۈپ كېتىش ئەھۋاللىرى يۈز بېرىدۇ.

### ئالامىتى

چىشنىڭ مىدىرلاپ قالغانلىقى ئېنىق بولىدۇ. چىش مۈلۈكلىرى ئورۇقلاپ، ئاقىرىپ چىش تۇۋى كۆرۈنۈپ قالىدۇ. چىشلار بوشاپ قاتتىق-قۇرۇق نەرسىلەرنى نورمال چاپىنالمىدايدۇ. چىش ئاسانلا چۈشۈپ كېتىدۇ. ئادەتتىكى چاغلاردا ئاغرىمايدۇ. چىش ئۆزىراپ قالغاندەك بولىدۇ.

### داۋاسى

چىش مىدىرلاپ قېلىش قېرى كىشىلەردە كۆرۈلسە ئاساسىي جەھەتتىن ئوبدان چارە يوق، ئەمما ئالدىنى ئېلىش ۋە مۇھاپىزەت قىلىش ئۈچۈن كۆپىنچە ھۆلۈكنى تازىلاپ، قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى دورىلار بېرىلىدۇ. مەسىلەن: سوتىدى، سۇنبۇل، كۆيدۈرۈلگەن ئۆد، مەستىكى، قۇرۇق قىزىلگۈلگە ئوخشاش دورىلارنى چىشنىڭ تۇۋىگە سېپىش لازىم. ياشلاردا كۆرۈلسە سەۋەبىگە قارىتا چارە قىلىش، قۇۋۋەتلەندۈرۈش لازىم. سىرتتىن ئاقىرقەرها، موزا، پىنە، سۇنبۇل، زەمچە قاتارلىق دورىلارنى بىرلەشتۈرۈپ ياكى ئايرىم تالقان قىلىپ چىش تۇۋىگە بېسىش لازىم.

چىش تۇۋى گۆشلىرى ئازلىقى ۋە يەل يارىدىن بولغان چىش مىدىرلاپ قېلىشىنى داۋالاشتا، مۇۋاپىق تېپىلسا قىفال تومۇر ۋە كاپۇكلاردىكى تۆت تومۇر (چىھاررەگ) دىن قان





ئالسا بولىدۇ. مۇنزىجىدىن كېيىن سەيرانىڭ مۇسەلىنى بېرىش كېرەك. گۆش، سۈت قاتارلىقلاردىن پەرەز قىلىش، سىماق، زىرىشك، بادام مېغىزى قاتارلىقلارنى تامىقىغا قوشۇپ بېرىش كېرەك. كۈندۈر، زىراۋەندى مۇدەھەرەج، خۇنسىياۋشان، ئىرسالاردىن تەڭ مىقداردا ئېلىپ سۇتۇن ياساپ ئىشلەتمە بولىدۇ.

ئەگەر چىش گۆشلىرىنىڭ ئازلىقى مىزاجنىڭ ئىسسىقلىقى ياكى سوغۇقلۇقىدىن ياكى چىشقا زەربە يەتكەن ياكى ئىششىغانلىقتىن بولسا ئالدى بىلەن سەۋەبىنى يوقىتىش لازىم. چىش تۈۋى گۆشلىرىنىڭ ئازلىقىنى داۋالاش ئۈچۈن قاش تېشى، تېشىلىمىگەن مەرۋايىت، جوز ھىندى، ئاچچىق بادام مېغىزلىرىنى كالا يېغىدا قىزارغىچە قورۇغاندىن كېيىن كۆيدۈرۈلگەن فۇفەل، خېنە يوپۇرمىقى، زەيتۇن يوپۇرمىقىلارنىڭ ھەر بىرىدىن 8 گرام ئېلىپ قوشۇپ سۇتۇن ياساپ كەچتە چىش گۆشلىرىگە سۈركەش كېرەك. ئامۇت تۇرۇقى، ھەبىي كاكەج، كەمرەك دەرىخىنىڭ پوستى، ئامىيە يوپۇرمىقىنىڭ ھەر بىرىدىن 15 گرام ئېلىپ قاينىتىپ ئېغىز چايقىسا ئوبدان مەنپەئەت قىلىدۇ.

ئەگەر چىش تۈۋى گۆشلىرى بۇزۇلغان بولسا فىلدىنقىيۇن ۋە باشقا تۆتكۈر دورىلارنى ئىشلىتىش، قابىز چايقالمىلار بىلەن ئېغىز چايقاش كېرەك. ئانارگۈلى، ئامىيە، شەب يەمانى، ئاقاقىيالارنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ سۇتۇن ياساپ ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ.

چىش تۈۋىدىن گۆش ئۈندۈرۈش ۋە ئېغىز پۇراشنى يوقىتىش ئۈچۈن خۇنسىياۋشان، گەزمازەج، ئەنزەرۇت، كۈندۈر، جويۇز، كۆيدۈرۈلگەن قۇمۇش، تاباشىر، ئاقاقىيا، قىزىلگۈل، ئانارگۈلى، جۈپتى بەللۇت، ئاچچىق ئانار پوستلارنىڭ ھەر بىرىدىن بىر ھەسسە، قەسبوزەرىدەدىن يېرىم ھەسسە ئېلىپ سوقۇپ، تاسقاپ كۈندە ئۇخلاشتىن بۇرۇن چىش تۈۋىگە سۈرسە بولىدۇ. سەئىدى كوفى، ئانارگۈلى، سىماق، شەب يەمانى (زەمچە) لەرنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ سۇتۇن ياساپ سەپسىمۇ بولىدۇ.

چىشنى چىگىتىش، گۆش ئۈندۈرۈش ۋە چىش تۈۋى سوزۇلما جاراھەتلىرى ئۈچۈن مەستكى رومى، كەھربا، فۇفەلىنىڭ گۈلى، خۇنسىياۋشان، موزا، ئانارگۈلى، قارا ھەلىيە، سېرىق ھەلىيە پوستى، ئامىلە، خېنە يوپۇرمىقى، كات سەفەد، قۇرۇق يۇمغاقسۈتلەرنىڭ ھەر بىرىدىن بىر ھەسسە، ئاشتۇزىدىن يېرىم ھەسسە ئېلىپ سوقۇپ تاسقاپ ئۇخلاشتىن بۇرۇن چىشقا سۇۋاش كېرەك.

زىراۋەندى مۇدەھەرەج، كۈندۈر، خۇنسىياۋشان، كۆرۈسە تۈنى، بىخ سۆسۈنلەرنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ ئىسكەنجىبىل ئەنسىلى بىلەن قوشۇپ سۈرسە چىش تۈۋىنى مەھكەم قىلىدۇ.

مەستكى رومى، سەنگى جاراھەت، ئەزەرۇتلارنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ





سوۋسىمۇ چىش ئاغرىش ۋە چىش گۆشلىرىنىڭ ئازلىقىغا مەنپەئەت قىلدۇ.  
يۇقىرىدىكى تەدبىرلەر كۆپايە قىلمىسا تىيارەجلەر بىلەن تەنقىيە قىلغاندىن كېيىن  
ئانار پوستىدىن 100 گرام، ئانارگۈلى، موزا، زەمچە (شەييەمانى)، ئاققەرەھالارنىڭ ھەر  
بىرىدىن 40 گرام، سىماقتىن 60 گرام ئېلىپ سوقۇپ قۇرسنى يانجىپ چىشقا  
سۈركەش ياكى قورس ياساپ قۇرۇتۇپ، لازىم بولغاندا يانجىپ چىشقا سۈركەش لازىم.  
يەنە ئانار پوستىدىن 12 گرام، قالغان دورىلاردىن 8 گرام، سىماق، تۇزلارنىڭ ھەر  
بىرىدىن 4 گرام ئېلىپ ياكى زەمچىنى كۆيدۈرۈپ سىركىدە سوۋۇتۇپ ئۈنىڭدىن بىر  
ھەسسە، سوقۇلغان تۈزدىن 2 ھەسسە، سىماقتىن 3 ھەسسە قوشۇپ سوقۇپ سۇتۇن ياساپ  
ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ. ئەگەر بۇلاردىمۇ مەنپەئەت كۆرۈلمىسە يېڭىنى قىزىتىپ بۇزۇلغان  
گۆشنى داغلاش كېرەك.

چىش تۇۋىنىڭ ئىششىقى تۈپەيلىدىن چىش بوشىغان بولسا، ئالدى بىلەن  
بەدەننى تازىلاش، ئۈنىڭدىن كېيىن تاباشىر، سېرىق ھەلىلە پوستى، ياۋا ئانارگۈلى،  
سۇماققا ئوخشاش قابز ۋە سوغۇق دورىلارنى سۇقۇپ قىلىپ چىش تۈۋىگە سۈركەش ۋە  
پاقا يوپۇرمىقى، سېمىز ئوت سۇلىرى بىلەن ئاغزىنى چايقاش لازىم.

سىرتقى زەخمىلىنىشتىن كېلىپ چىققان مىدىرلاپ قالغان چىشنى ئېلىۋېتىشكە  
توغرا كەلسە، ئالدى بىلەن چىشنىڭ يىلتىزنى بوشاشتۇرىدىغان دورىلارنى ئىشلىتىپ،  
ئاندىن چىشنى تارتسا ئاسان چىقىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن ئۈجمە دەرىخىنىڭ پوستى، ئاققەرەھالارنى  
يۇمشاق سوقۇپ سىركىگە ئارىلاشتۇرۇپ ئاپتاپقا قويۇپ ھەسەلگە ئوخشاش ھالەتكە  
كەلتۈرۈپ، تارتىلىدىغان چىشنىڭ تۈۋىگە ھەر كۈنى ئۈچ قېتىم چىپىش لازىم ياكى  
شاتۇت دەرىخىنىڭ پوستى، بۆرە سويىمىسىنىڭ يىلتىز پوستى، سېرىق زەرىخ،  
ئاققەرەھا، زەرچۇبە، شەبۇم، قىشاۋلھىمار يىلتىزى قاتارلىقلارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ  
ھەممىسىنى سوقۇپ، تاسقاپ سىركىگە ئارىلاشتۇرۇپ ئۈچ كۈن تۇرغۇزۇپ ئاندىن  
تارتىلىدىغان چىشنىڭ تۈۋىگە چىپىش كېرەك. قىزىل زەرىخنى سىركىگە بىر  
قانچە كۈن چىلاپ تارتىلىدىغان چىشنىڭ تۈۋىگە قويسۇمۇ بولىدۇ، سىركىنىڭ دۇغىنى  
قويسۇمۇ، خام ئەنجۈرنىڭ سۈتىنى تېمىتىسۇمۇ، ئەنجۈرنىڭ ھۆل يوپۇرمىقىنى ئېزىپ قويسۇمۇ  
چىشنى بوشاشتۇرىدۇ. تارتىلىدىغان چىش تۈۋىگە يۇقىرىقى دورىلارنى  
تەككۈزگەندە يېنىدىكى ساق چىشلارنى خېمىر ياكى باشقا دورىلار بىلەن ئوراپ  
مۇھاپىزەت قىلىش كېرەك.

مىدىرلاپ قالغان چىشنى قول ياكى تىل بىلەن تولا مىدىرلاتماسلىق، قاتتىق  
نەرسىلەرنى چىشلەمەسلىك ۋە چاينىماسلىق كېرەك.







## چىش كاۋاكلىشىش ، ئۇۋۇلۇش ۋە كامارلىشىش

چىش كاۋاكلىشىش، ئۇۋۇلۇش ۋە كامارلىشىش (تەئەككۈل، تەفەتتۇت ۋە تەسەققۇبۇلئەسنانى) كېسەللىكلىرى چىش نورمال مزاجىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن چىشنىڭ كاۋاكلىشىپ كېتىشى (تەئەككۈلئەسنانى)، ئۇۋۇلۇپ كېتىشى (تەفەتتەتئەسنانى) ۋە كامار بولۇپ قېلىشى (تەسەققۇبۇلئەسنانى) غا قارىتىلغان.

### سەۋەبى

1. غەيرىي تەبىئىي بەلغەم يەنى بۇزۇق ھۆلۈكنىڭ مەلۇم بىر چىش، چىش مۈلۈكى ۋە ئۇنىڭ ئەسەبلىرىگە تەسىر قىلغانلىقىدىن شۇ چىشنىڭ مزاجى بۇزۇلۇپ ئۇنىڭ كاۋاكلىشىش، ئۇۋۇلۇش ۋە كامار بولۇپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.
2. قۇرۇقلۇق غالىب كېلىپ چىشلارغا تەسىر قىلغانلىقتىن ئۇلارغا ئوزۇقلۇق ماددىلار يېتىشمەي چىشلارنىڭ تەركىبىي قىسىملىرىنى بىر-بىرى بىلەن تۇتاشتۇرۇپ تۇرغۇچى ھۆلۈكلەر قۇرۇيدۇ. نەتىجىدە چىشلارنىڭ كاۋاكلىشىش، ئۇۋۇلۇش ۋە كامار بولۇپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.
3. چىشنىڭ تازىلىقىغا ئەھمىيەت بەرمىگەنلىكتىن يېمەكلىكلەر بۇزۇلۇپ چىشنى چىرىتىپ كامار قىلىپ قويدۇ. ئادەتتە بۇ، «قۇرت يېگەن چىش» دەپ ئاتىلىدۇ.

### ئالامىتى

1. سوغۇق بولۇپمۇ ھۆل سوغۇق تەسىر قىلسا چىش ئاغرىدۇ. چىشنىڭ رەڭگى كۆكۈش سېرىقلىققا مائىللىشىپ تەدرىجىي ھالدا تېشىلىپ كاۋاكلىشىدۇ، يېمەكلىكلەرنى چاينىغانسېرى ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگە ئەگىشىپ شۇ چىش يېرىلىدۇ ۋە ئاخىرى كامارلىشىدۇ.
2. قۇرۇقلۇقتىن بولغانلىرىدا يەنە چىش تۈۋى قۇرۇغاندەك بىلىنىدۇ ھەمدە بۇ خىلى ياشانغان كىشىلەر، كېسەلدىن يېڭى قوپقان، تېنى ئاجىز كىشىلەردە كۆپرەك كۆرۈلىدۇ.





3. قۇرت يېگەن چىش كېسەل كىشىگە ئېنىق بىلىنىدۇ. تاماق يېگەندە يېمەكلىكلەر چىش كامرىغا كىرىۋالىدۇ، بەزىدە ئاغرىيدۇ. كېسەل يەڭگىل بولسا ئاغرىش بولمايدۇ. كاۋاك چوڭقۇرلىشىپ چىش ئەسەبلىرىگە يەتكەندە ئاغرىش كۈچلۈك بولىدۇ. بۇ كىچىك بالىلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ.

### داۋاسى

1. بۇزۇق ھۆلۈك غالىب كەلگەنلىكتىن بولغانلىرىنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن ھۆلۈكنى تازىلاش ئۈچۈن ئىيارە جى فەيقەرانى بېرىش شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇزۇق ماددىلارنى دەشى قىلىدىغان، چىشنى قۇۋۋەتلىەيدىغان، چىشنىڭ تۇۋۇلۇپ زېدىلىنىشىنى توسقۇچى قابىز دورىلاردىن ھوزۇز، مۇزا، ئاقىرقەھا، سۇنبۇل رۇمى، سەئىدى كۇفى قاتارلىقلارنى يۇمشاق سوقۇپ چىشقا بېسىش كېرەك. گۈلنار، زەمچە، ھەببۇلئاسلارنىڭ ھەر بىرىدىن 5 گرام ئېلىپ 100 مىللىلىتىر سىركە بىلەن قاينىتىپ چىشنى چايقاش، قارىمۇچ، ئاقىرقەھالارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ چىشنىڭ كامرىغا كىرگۈزۈپ قويۇش كېرەك.

2. قۇرۇقلۇق غالىب كەلگەنلىكتىن بولغانلىرىنى داۋالاشتا ئوزۇقلىنىش ۋە داۋالاش جەھەتلەرنىڭ ھەممىسىدە مىزاجنى ھۆللەشتۈرۈپ چىشلارنىڭ نورمال سۈيىنى ئەسلىگە كەلتۈرگۈچى يېمەك-ئىچمەك ۋە چارە تەدبىرلەر قوللىنىلىدۇ. يېمەك-ئىچمەك جەھەتتە ھەر خىل مېۋىلەر سۈيى، سۈت ۋە تۇخۇم قاتارلىقلارنى ئىچىش، ئارپا، بۇغداي، گۈرۈچ قاتارلىقلارنى پاققان گۆشى بىلەن قاينىتىپ ئىستېمال قىلىش كېرەك. چارە-تەدبىرلەر جەھەتتە تۇخۇم ئېقى، ئىسبەغۇل شىرسى، بادام يېغى، بىنەپسە يېغى قاتارلىقلارنىڭ قايسىسى بىرى بولسا چىشقا سۈركەش ياكى ئېغىزنى چايقاش كېرەك. گەرچە بۇ ئۇسۇللارنىڭ شىپالىق ئۈنۈمى قانائەتلىنەرلىك بولمىسىمۇ، يەنىلا بەلگىلىك دەرىجىدە مەنپەئەتتى بار. ئامىيە ئوسارىسىنىڭ يىلمى ياكى شىرسىگە مەستكى ۋە بىر ئاز كافۇرلارنى يۇمشاق ئېزىپ كاۋاكلاشقان چىشقا سېلىپ قويۇش كېرەك.

3. چىشنى قۇرت يېيىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن چىشنىڭ تازىلىقىغا دىققەت قىلىش لازىم. چىشنىڭ كاۋاكلىشىشىغا قارشى تۇرۇش كۈچىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن روسۇت، نارجىل، سوندى ھىندى، مۇزا، ئاقىرقەھالارنى قايناتقان سۇ بىلەن ئېغىزنى چايقاش لازىم. ئانارگۈلى، زەمچىلەرنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ بىر ئاز سۇ بىلەن پۇشۇرۇپ كاۋاك جايغا قويۇش كېرەك.





چىشىنىڭ مەزكۇر كېسەللىكلىرى مەيلى قايسى سەۋەبتىن بولسۇن، چىشىنىڭ كاۋاكلاشقان، تېشىلگەن يېرى ئاز بولسا تۇنى ئىكەك بىلەن قىرىۋېتىپ قالغان جايىنى بىر قانچە قېتىم داغلىغاندىن كېيىن زاماسكىلسا ياكى زەيتۇن يېغى ۋە مەرزەنجۇش سۈيى سۈركەپ قويسا چىشىنىڭ ساق قىسىملىرى شۇ پېتى ساقلىنىپ قېلىپ قايتا كاۋاكلاشمايدۇ.

## چىش رەڭگى ئۆزگىرىش

چىش رەڭگىنىڭ ئۆزگىرىشى (تەغەييۇرى رەڭگى دەندان) سىرتقا كۆرۈنۈپ تۇرغان پارقراق سىرتق قىسىمنىڭ رەڭگى ئۆزگەرگەنلىكىگە قارىتىلغان.

سەۋەبى

ھەر خىل تاشقى ۋە ئىچكى سەۋەبلەرنىڭ چىشقا يامان تەسىر كۆرسىتىشى تۈپەيلىدىن چىشىنىڭ رەڭگى ئۆزگىرىپ قالىدۇ. تاشقى جەھەتتە كۆپىنچە بەزى يېمەكلىكلەرنىڭ تەسىرى ئاساسىي رول ئوينايدۇ. ئىچكى جەھەتتە بىرەر خىلنىڭ بۇزۇلۇپ چىشقا ئەكس تەسىر كۆرسەتكەنلىكىدىن چىش رەڭگى ئۆزگىرىپ قالىدۇ.

ئالامىتى

چىشىنىڭ رەڭگىنى ئۆزگەرتكۈچى يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلغانلىق تارىخى بولىدۇ.

خىلىتلار تەسىرىدىن بولغانلىرىدا ئەگەر سەپرا ماددىسىدىن بولسا، چىشىنىڭ رەڭگى سىرتقا ئۆزگىرىدۇ. بەلغەمدىن بولسا، ئاق گەز رەڭگىدە بولىدۇ. سەۋاددىن بولسا، قارامتۇل كۆكۈش رەڭگە ئۆزگىرىدۇ. گەرچە چىشتا يۇقىرىقىدەك رەڭ ئۆزگىرىشلىرى كۆرۈلسمۇ، لېكىن چىش تېشىلىش، تۇۋۇلۇشلار كۆرۈلمەيدۇ. تەسىر قىلغان بۇزۇق ماددا قويۇق بولسا چىش رەڭگىنىڭ ئۆزگىرىشى ئاستا،



سۇيۇق بولسا تېز بولىدۇ.

### داۋاسى

چىش رەڭگىنى ئۆزگەرتكۈچى يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلىشنى توختىتىش ۋە ئالدى بىلەن قايسى خىلدىن بولغان بولسا، شۇ خىلدىكى بەدەن ۋە مېڭىدىن تازىلاش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن ھەبىي ئىيارەج ياكى ھەبىي قوقىيا بېرىلىدۇ. ماددا تازىلانغاندىن كېيىن چىشنى پاراقىراتقۇچى سۇتۇن دورىلار بىلەن چىشنى سۈرتۈپ تازىلاپ پاراقىرىتىش كېرەك.

چىشنىڭ رەڭگى سېرىق بولسا، مارجان شوخلىسى، ئارپا، كۆك ماشىلارنى سىركە بىلەن قاينىتىپ چىشنى يۇيۇش كېرەك. ئەگەر چىشنىڭ رەڭگى قارامتۇل بولسا، گۈللۈك ئەمەن، سېرىق ئون، مەستىكلەردىن باراۋەر مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ گۈل يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ چىش ئۈستىگە سۈركەش لازىم.

ئەگەر چىشنىڭ رەڭگى كۆكۈش قارامتۇل بولسا، شەھمەھە نىزەلنى پوستى ۋە ئۇرۇقىدىن ئايرىپ سىركە بىلەن قاينىتىپ چىشنى چايقاش ۋە چىشقا سۈركەش كېرەك (شەھمەھە نىزەلنىڭ ئورۇقى زەھەرلىك بولغاچقا، ئورۇقنى ئاجرىتىپ ئېلىنىۋېتىشكە ئالاھىدە دىققەت قىلىش لازىم). ئونىڭدىن كېيىن مەستىكى يېغى بىلەن ئۆزگەرتكەن چىشنى ياغلاپ تۇرۇش كېرەك.

چىشنىڭ رەڭگى گەج رەڭگىدە بولسا مەستىكى يېغىنى سۈركەش، يەنە مېككىيان توخۇ يېغى، ئاقمۇچ، گۈل خەيرى (شەببۇي) يېغىدا ئېرىتىپ بىر ئاز زۇفا، بىر ئاز ھىڭ قوشۇپ چىشقا قويۇش لازىم.

چىشنى داۋاملىق پاكىزلەپ تۇرۇشنى ئادەت قىلىش لازىم.

### چىش تۈۋىگە گەجسىمان قېتىشىملار پەيدا بولۇش

چىش تۈۋىگە گەجسىمان قېتىشىملار پەيدا بولۇش (قۇلاھۈكە ستانى، قەلەھ، ھەفەر) چىشنىڭ ئەتراپىغا بولۇپمۇ ئىككى چىشنىڭ ئارىلىقىغا ۋە تۈۋىگە گەجسىمان، تاشسىمان ۋە ساپال قاچا جىسمىدەك قېتىشىملارنىڭ پەيدا بولغانلىقىغا قارىتىلغان.

## سەۋەبى

ھەر خىل ئىچكى، تاشقى تەسىرلەر تۈپەيلىدىن كېلىپ چىقىدۇ. ئىچكى جەھەتتە ئاساسلىق ئاشقازاندا يىغىلغان خىلىتلاردىن ئۆزلىگەن بۇخاراتنىڭ چىش تۈۋىگە تەسىر قىلىپ، يىغىلغانلىقىدىن پەيدا بولىدۇ. تاشقى جەھەتتە ۋاقتى-ۋاقتىدا چىشلارنى يۇيۇپ تازىلاپ تۇرماسلىق، تاماق ھەزىم بولماي تۇرۇپلا ئوخلاش قاتارلىقلاردىن كېلىپ چىقىدۇ.

## ئالامىتى

تەكشۈرگەندە چىشلار تۈۋى ۋە ئىككى چىش ئارىلىقىدا گەجسىمان، تاشسىمان ۋە ساپال قاچا جىسمىدەك قاتقان نەرسىلەرنىڭ بارلىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ. بۇ قېتىش-مىلار كۆپىنچە كەسكۈچى چىشلار تۈۋىدە پەيدا بولىدۇ ھەمدە چىشلارنىڭ ئىچكى تەرىپىدە كۆپرەك كۆرۈلىدۇ. كەلتۈرۈپ چىقارغان خىلت ۋە ئىستېمال قىلغان يېمەك-ئىچمەكلىكلەرنىڭ تەبىئىي تۈپەيلىدىن قېتىشمىلارنىڭ رەڭگى قارا، كۆك، ساغۇچ، ئاق كېلىدۇ.

## داۋاسى

سەۋەبىچى خىلىتى ئايرىغاندىن كېيىن مۇناسىپ ھالدىكى مۇسەللارنى بېرىش ياكى مۇۋاپىق تېپىلغاندا قان ئېلىش ئارقىلىق ئومۇمىي بەدەن ۋە ئاشقازاننى تازىلاش كېرەك. ئاندىن كېيىن سەدەپ كۆيدۈرۈلمىسى، تۈز، كىيىك مۇڭگۈزى كۆيدۈرۈلمىسى قاتارلىقلاردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ چىش تۈۋىگە باسقاندىن كېيىن چىشنى يۇيۇش كېرەك. ئەگەر، قېتىشمىلار قاتتىق بولۇپ مۇستەھكەم ئورۇنلاشقان بولسا، تۆمۈر ئەسۋابىلار ئارقىلىق قېتىشمىلارنى قىرىپ ئېلىۋېتىش ھەمدە ھەر ئاخشىمى چىشنى مۇۋاپىق مايلار بىلەن ياغلاپ تۇرۇش كېرەك.

## ئوخلىغاندا چىشنى غۇچۇرلىتىش

ئوخلىغاندا چىشنى غۇچۇرلىتىش (سەرىرۈكە سنانى فىننەۋم) ئوخلىغاندا بىمارنىڭ



چىشىنى تۇرۇپ-تۇرۇپ غۇچۇرلاتقانلىقىغا قارىتىلغان بولۇپ، كۆپىنچە كىچىك بالىلاردا كۆرۈلىدۇ.

### سەۋەبى

ئىچكى-تاشقى ئامىللارنىڭ تەسىرىدىن بەلغەم ماددىسى ئارتىپ گۆش ۋە پەيلەرنىڭ بوشىشىپ كېتىشى نەتىجىسىدە ئۇخلىغاندا چىش غۇچۇرلىتىش ئەھۋالى كېلىپ چىقىدۇ. شۇڭا كۆپىنچە فالەج، سەرئى، سەكتە قاتارلىق كېسەللىكلەرنىڭ باشلىنىشىدا كۆپرەك پەيدا بولىدۇ. بالىلاردا ئۈچەي مەدە قۇرتى قاتارلىق پارازىت قۇرت كېسەللىكلىرى پەيدا بولغاندا ئۇخلىغاندا چىش غۇچۇرلىتىش ئەھۋالى كېلىپ چىقىدۇ.

### ئالامىتى

كۆپىنچە ھاللاردا كېچىسى ئۇخلىغاندا بىمار چىشىنى غۇچۇرلىتىدۇ. بىمارنىڭ ئۆزىگە كۆپىنچە ھاللاردا بىلىنمەيدۇ، باشقىلار تەرىپىدىن سېزىلىدۇ.

ئەگەر بەلغەم ماددىسىدىن بولسا، ئىسسىقلىق نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلغاندا ياكى يېشى چوڭايغانسىرى چىشىنى غۇچۇرلىتىش ئازىيدۇ ياكى يوقىلىدۇ. ئۈچەيدە مەدە قۇرت بولسا، قورساق ئاغرىش قوشۇلۇپ كېلىدۇ. باشقا بىرەر كېسەللىكلەرنىڭ تەسىرىدىن بولغان بولسا، سەۋەبلەرنى تەپسىلىي تەكشۈرگەندە شۇنىڭغا خاس بەلگىلەرنى بايقىغىلى بولىدۇ.

### داۋاسى

ئەگەر بەلغەم ماددىسىدىن بولسا، ئىيارەج فەيقەرا بىلەن زىيادە بەلغەم ماددىسىنى تازىلىغاندىن كېيىن ئىتريفېلى كەبىر، داۋا ئىلمىشكى، ماددە تۆلھايات قاتارلىق دورىلار بېرىلىدۇ.

ئەگەر ئۈچەيدە مەدە قۇرت بولغانلىقتىن بولسا قۇرت چۈشۈرگۈچى دورىلار بېرىلىدۇ. تاشقى تەرەپتىن قۇستە يېغى ۋە سۇسۇن يېغى بىلەن گەدەن، ئىگەك ۋە قۇلاق ئەتراپىنى ياغلاش كېرەك.





## چىش سۈيى يوقىلىش

چىش سۈيى يوقىلىش (زەھابى مائۇلەستانى) چىش سۈيىنىڭ يوقىلىپ چىشىنىڭ ئىسسىق ياكى سوغۇق نەرسىلەرگە بەرداشلىق بېرەلمەيدىغان، ھەتتا قاتتىق نەرسىلەرنى چايناشتىن قورقىدىغان بولۇپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان.

### سەۋەبى

ھەر خىل ئىچكى-تاشقى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن سوغۇق ياكى ئىسسىق ئىللەتلەر چىشقا يامان تەسىر كۆرسىتىپ، چىش سۈيىنىڭ كېتىپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بەزىدە قورۇتقۇچى ھارارەتتىن كېلىپ چىقىدۇ، لېكىن بۇ خىلى ئاز ئوچرايدۇ.

### ئالامىتى

چىش ئىسسىق ياكى سوغۇق نەرسىگە بەرداشلىق بېرەلمەيدۇ. بولۇپمۇ چىش قاتتىق نەرسىلەرنى چايناش ۋە سوغۇق نەرسىلەرنى ئېغىزغا ئېلىشتىن قاچىدىغان بولۇپ قالىدۇ. چىش ئاغرىقىنىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىدە كۆپرەك كۆرۈلىدۇ. مەزكۇر كېسەلنىڭ ئىسسىق ياكى سوغۇقلىقى چىش مۈلۈكلىرىنىڭ قېنىق قىزىل ۋە قىزىقلىقى ياكى شۇنداق ئەمەسلىكىدىن ئايرىلىدۇ.

### داۋاسى

چىش سۈيى يوقىلىش سوغۇقتىن بولسا، بادىئەندىن 8 گرام ئېلىپ قاينىتىپ 40 گرام گۈلqەنت بىلەن بېرىش لازىم. ئەگەر تۈنىڭغا ئۈستۈخۇددۇس، بادىرەنجى بۇيا، يەرلىك شوخلا، ئەسلى سۇس قوشۇپ بەرسە تېخىمۇ ياخشى. تامىقىغا نوقۇت يارمىسى ۋە زاراڭزا مېغىزىنى سېلىپ بېرىش كېرەك. ھەبۇلغار، زەمچە، موزا، زىراۋەندىلەرنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ، تاسقاپ سونۇن ياساپ ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ.





ئىسسىق نان، قورۇلغان تۇخۇم سېرىقى، قورۇلغان تال، قورۇلغان ئەنسىلەرنى سىركىدە نەملەپ سىرتتىن داۋاملىق ئىسسىق تۆتكۈزۈپ بەرسىمۇ بولىدۇ. ئەگەر، بۇنىڭدىمۇ ياخشىلانمىسا ئىيارەجى فەيقارانى سۈرۈش لازىم. ئەگەر بۇمۇ مەنپەئەت قىلمىسا تەرياقى فارۇق ۋە بىلسان يېغىنى سۈرۈش لازىم. قىچا يېغىنى ئىسسىتپ ئېغىزغا ئالسا ياكى قىزىق پېتى چىشىنىڭ ئۆزىگە تېمىتسا ناھايىتى پايدا قىلىدۇ. تۆچكىنىڭ قېنىنى سىركىدە قاينىتىپ چىشقا تېمىتسىمۇ بولىدۇ. ئەگەر، زادىلا پايدا قىلمىسا بەلغەمنىڭ مۇسەھلى ھەببى ئىيارەج بىلەن بەدەننى تەنقىيە قىلىش كېرەك.

تۆۋەندىكى ئۇسۇل چىش سۈيىنىڭ كېتىپ قېلىشىغا، جۈملىدىن ھەممە چىش كېسەللىكلىرىدە چىشنى كۈچەيتىش ئۈچۈن ناھايىتى ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.

ئاس ئۆسۈملۈكنىڭ غولى، بىخ كەبىر، بىخ كاكىنەج، جويۇز، قىزىلگۈل، پىل چىشى تالقىنى، زەمچىلەرنىڭ ھەر بىرىدىن مۇناسىپ مىقداردا دورىلارنىڭ كۈچلۈك-ئاجىزلىقىغا قاراپ تەكشۈپ ئېلىپ، سىركىدە قايناتقاندىن كېيىن ئېغىزنى چايقاش كېرەك. كۆپىنچە كىشىلەر بۇ كېسەللىككە گىرىپتار بولغاندا تۆگىنىڭ تېلىنى ئىستېمال قىلىدۇ. بۇنىڭدا تۆگە تېلىنى زىخقا تۆتكۈزۈپ كاۋاپ قىلىپ يېسىمۇ ياكى تۇنى پۇشۇرۇپ چىشقا چاپسىمۇ بولىدۇ، بۇ خېلى پايدىلىقتۇر.

چىش سۈيى يوقىلىش ئىسسىقتىن بولسا، كافۇردىن  $1/4$  ھەسسە، سەندەلدىن بىر ھەسسە ياكى يومىغاقسۇت، سېمىز ئوت تۇرۇقنىڭ ھەر بىرىدىن بىر ھەسسە ئېلىپ، ئۇلارنى مۇۋاپىق مىقداردىكى گۈل يېغىدا ئېرىتىپ چىشقا سۈركەش كېرەك. ئاندىن كېيىن ئىسبە غۇل لۇئابىنى ئەرىقى گۈل بىلەن قوشۇپ ئىشلىتىش لازىم.

سېمىز ئوتنىڭ غولى ۋە يوپۇرمىقىنى چاپسىمۇ ياخشى ياكى بادام مېغىزىنى يېسىمۇ بولىدۇ.

غاز يېغى ياكى توخۇ يېغىنى ئىستېمال قىلىش كېرەك. ئەگەر يۇقىرىقى چارىلەر مەنپەئەت قىلمىسا قان ئېلىش ئارقىلىق ئىستىفراغ قىلىش كېرەك.

## چىش تۇۋى قاناش

چىش تۇۋى قاناش (لىسەئى دامىيە) چىش مۈلۈكلىرىنىڭ ئاسانلا قانايدىغان بولۇپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان.





ئىچكى، تاشقى ئامىللارنىڭ تەسىرىدىن چىش مۈلۈكلىرىنىڭ يەرلىك ئورۇندىكى تۆتىنچى ھەزىم قۇۋۋىتى (قوۋۋىتى غازىيە) ئاجزلىشىپ، ئوششاق قىلغان تومۇرلار سۇسلىشىپ، شۇ ئورۇندىكى تۇتۇش قۇۋۋىتىنىڭ ئۈزلۈكسىز ئاجزلىشىشى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ خىل ئاجزلىشىش تۈپەيلىدىن چىش مۈلۈكلىرى ئاسانلا قانايىدىغان بولۇپ قالىدۇ.

قاننىڭ غالىبلىقى تۈپەيلىدىن ئوششاق تومۇرلار قانغا تولۇپ، چىقىلىشىدىنمۇ چىش تۈۋىنىڭ ئاسانلا قاننى كېلىپ چىقىدۇ.

### ئالامىتى

چىش مۈلۈكلىرىدىكى قوۋۋىتى غازىيە ئاجزلاشقانلىقتىن بولسا، چىش مۈلۈكلىرىنىڭ رەڭگى ئاقۇش، ئېغىز شىللىق پەردىلىرىمۇ ئاق ھەمدە چىققان قانمۇ سۇس قىزىل ۋە سۇيۇق بولىدۇ.

ئەگەر قاننىڭ كۆپلۈكىدىن بولسا، چىش مۈلۈكلىرى چىقىلىدۇ ۋە رەڭگى توق قىزىل بولىدۇ. چىققان قانمۇ قويۇق، توق قىزىل رەڭدە بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە قان ماددىسىنىڭ غالىبلىقىغا دائىر بەلگىلەر كۆرۈلىدۇ.

### داۋاسى

قوۋۋىتى غازىيەنىڭ سۇسلاشقانلىقىدىن بولسا، قىزىل ئۈزۈم شەرىپىتى، ئانار شەرىپىتى، ماددە تولھايات قاتارلىق دورىلارنى بېرىش لازىم. ئوزۇقلۇقنى كۈچلەندۈرۈش، قاننى كۆپەيتىش ئۈچۈن سۈت، تۇخۇم، گۆش ۋە كۆكتاتلاردىن سەۋزە قاتارلىق يېڭى كۆكتاتلارنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش كېرەك.

ئەگەر قاننىڭ كۆپلۈكىدىن بولسا، مەتبۇخى شاھتەررە، تەمرى ھىندى، پۇتوس، چىلان قاتارلىق دورىلار بېرىلىدۇ. كۆك ماش، گۈرۈچلەر بىلەن شويلا گۈرۈچ قىلىپ ئىچىش، بەلگىل تاماقلار بىلەن ئوزۇقلىنىش كېرەك.

سىرتتىن ئانار پوستى، ئارچا مونچىقى، ئاتىرقەرھە، يولغۇن مېۋىسى قاتارلىق دورىلارنىڭ



قايسى بىرى تېپىلسا ئونگىدىن 10 گرام ئېلىپ بىر ئاز زەمچە قوشۇپ 100 مىللىلتر سۇ بىلەن يېرىم قالغىچە قاينىتىپ سۈزۈپ چىش مۇلۇكلىرىنى چايقاش لازىم. چىش تۈۋىگە سۇقۇقى سۇتۇن سەپسىمۇ ئوبدان مەنپەئەت قىلىدۇ. زەرۋرى شەب (زەمچە تالقىنى) نىڭ ئۈنۈمىمۇ ياخشى.

### زەرۋرى شەب

كۆيدۈرۈپ سىرگىگە چىلاپ سوۋۇتۇلغان زەمچە بىر ھەسسە، تاش تۈز ئىككى ھەسسە، قىزىل زاك بىر يېرىم ھەسسە. تەييارلىنىشى: دورىلارنى قائىدە بويىچە يۇمشاق سوقۇپ تالقان تەييارلىنىدۇ. تەبىئىتى: مۆتىدىل ۋە قۇرۇق. خۇسۇسىيىتى: چىش قاناشنى توختىتىدۇ. چىش ۋە چىشنىڭ تۈۋىنى كۈچەيتىدۇ. مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ چىش تۈۋىگە بېسىلىدۇ.

## چىش مۇلۇكلىرى ياللۇغى

چىش مۇلۇكلىرى ياللۇغى (ۋەرەمۇللىسەئى) چىش مۇلۇكلىرىنىڭ ئىششىپ تۇغۇنە تلىنىپ ئاغرىغانلىقىغا قارىتىلىدۇ.

### سەۋەبى

ئىچكى. تاشقى تەسىرلەرنىڭ چىش مۇلۇكلىرىگە يامان تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ. ئىچكى جەھەتتە بىرەر خىلىتىنىڭ بۇزۇلۇپ، چىش مۇلۇكلىرىگە يىغىلغانلىقىدىن چىش مۇلۇكلىرىنىڭ ئىششىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. سىرتقى جەھەتتە ئۇرۇلۇش-سوقۇلۇش، يىقىلىش قاتارلىق ھادىسىلەر تۈپەيلىدىن چىش مۇلۇكلىرى زەخىملىنىپ چىش مۇلۇكلىرى ئىششىقى كېلىپ چىقىدۇ.



## ئالامىتى

قايسى خىلىت سەۋەبىدىن بولغان بولسا شۇ خىلىتنىڭ ئۆزىگە خاس بەلگىلىرى كۆرۈلىدۇ. مەسىلەن، قان ياكى سەپرادىن بولسا، ئىششىق رەڭگىنىڭ قىزىللىقى ۋە لوقۇلداپ ئاغرىشى كۆرۈنەرلىك بولىدۇ. سىرتقى زەخمىدىن بولسا زەخمىلىنىش تارىخى بولىدۇ.

## داۋاسى

ئالدى بىلەن كېسەللىك كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى خىلىتنى تازىلاپ نورماللاشتۇرۇش ئۈچۈن مەتبۇخى ھەلسىلە ياكى مەتبۇخى فۇۋاكىھەلەرنى بېرىش لازىم. سىرتتىن يومغاقسوت ئورۇقى، قىزىل سەندەل، فۇفەل، سىماقلارنى قاينىتىپ ئېغىزنى چايقاش، گۈل يېغى بىلەن ياغلاش لازىم.

ئەگەر يۇقىرىقى ئۇسۇل بىلەن ئىششىق يانماي يىرىك تۇتسا، بەزى مەلھەملەر ئارقىلىق يىرىكنى ئېغىز ئالدىدۇرۇش ياكى نەشتەر بىلەن يېرىپ يىرىكنى ئاققۇزۇش لازىم. سىرتقى زەخمىدىن بولغان چىش مۈلۈكلىرى ئىششىقنى داۋالاشتا كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ مۇۋاپىق تۈردىكى ئىششىق ياندۇرغۇچى دورىلارنى ئىچكى - تاشقى جەھەتتە قوللىنىش لازىم.

## چىش مۈلۈكى يىرىكلىق چاقىسى ۋە ئاقىسى

چىش مۈلۈكى يىرىكلىق چاقىسى ئاقىسى (قۇرۇھوللىسە ئى ۋە، ناسۇرۇللىسە ئى) بەزى چىش مۈلۈكى ئىششىقلىرىنىڭ يىرىكلاپ چاقىغا ئايلىنىشى ياكى بەزى چاقىلارنىڭ كوناپ ساقايماي ئاقىغا ئايلانغانلىقىغا قارىتىلغان.

## سەۋەبى

قان، سەپرا، بۇزۇق ھۆلۈكلەر تۈپەيلىدىن چىش مۈلۈكلىرىدە پەيدا بولغان



ئىششىقلار جەراسمىلىنىپ چاقىلارغا ئايلىنىدۇ ھەمدە چاقىلار تۇقۇنەتلىنىپ يىرىڭلايدۇ ھەتتا يىرىڭ ۋە زەرداب چىقىپ ئاقىمغا ئايلىنىدۇ. بەزىدە بۇنىڭغا چىرىگەن ماددا ياكى كۆيگەن سەۋداماددىسىنىڭ غالىبلىقىمۇ سەۋەب بولىدۇ.

### ئالامىتى

چىش تۇۋى ئاغرىپ قىزىشقاندا بىلىنىدۇ ئېغىز پۇرايدۇ. تەكشۈرگەندە يىرىڭلىق چاقا بولسا چىش تۇۋىدىن قويۇق يىرىڭ چىقىدۇ. ئاقما بولسا زەرداب چىقىدۇ. ئەگەر يىرىڭ ۋە زەرداب داۋاملىق چىقماي چىش تۇۋى كۆپۈپ چىڭقىلىپ توشقاندا، باسسا يىرىڭ ۋە زەرداب چىقىدۇ. بىرنەچچە كۈندىن كېيىن يەنە يىرىڭ ۋە زەرداب يىغىلىدۇ.

### داۋاسى

ئالدى بىلەن ئىچكى جەھەتتىن نە تېۋىخى شاھتەررە، مە تېۋىخى ھەلىلە بېرىپ كېسەللىك ماددىسىنى تازىلاش كېرەك. ئاندىن كېيىن سىرتىدىن خويىسلەھە دىد، موزا، ئاقىرقەرھا، گۈلنار، زەمچىلەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، يۇمشاق سۇقۇپ زەرداب چىققان چىشلارنىڭ تۇۋىگە بېسىش كېرەك. 100 مىللىلىتىر سىركىنى 10 گرام زەمچە بىلەن قاينىتىپ بېرىمى قالغاندا ئېلىپ چىش تۇۋىگە سۈركەش لازىم. ئەگەر بۇ چاقا ئاقما (ناسۇر) غا ئايلىنغان بولسا بۇنىڭغا كونا سىركە، فەلدە فېۋنلارنى ئىشلەتسە (چاقىغا سەپسە) بۇزۇق گۆشلەر يوقىلىدۇ. ئاندىن موزا، مورمەككىي ۋە شۇلارغا ئوخشاش قابىز دورىلارنى ئىشلەتسە يېڭى گۆش ئۈنىدۇ.

## تاڭلاي قىچىشىش

تاڭلاي قىچىشىش (ھىككە تۆلەنەكى) ئاساسلىق ئىچكى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن تاڭلاينىڭ قىچىشىدىغان بولۇپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان.



## سەۋەبى

ئاساسلىق، ئاشقازان ياكى مېڭە ھارارىتىنىڭ تاڭلايغا تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ. يەنى، ئاشقازاندىكى غەيرىي تەبىئىي ھارارەتنىڭ يۇقىرىغا ئۆرلەپ تاڭلايغا تەسىر قىلىشىدىن تاڭلاي قىچىشىش كېلىپ چىقىدۇ. مېڭىدىن بەلغىمى شور ياكى دەسلەپكى نەزلە سۇيۇقلۇقى تۆكۈلمىمۇ تاڭلاي قىچىشىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

## ئالامىتى

تاڭلاي ئۈزلۈكسىز قىچىشىدىغان بولۇپ قالىدۇ. بىمار ئىختىيارسىز ھالدا تىلىنى تاڭلايغا سۈركەپ تاڭلاينى نەمدىگۈسى ۋە قىچىشىشنى باسقۇسى كېلىدۇ. ھارارەت بەلگىلىرى كۆرۈلىدۇ.

مېڭە ھارارىتىدىن بولغانلىرىدا تاڭلاي قۇرۇش، ئېچىشىش، ئويۇق كەملىك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.

ئاشقازان ھارارىتىدىن بولغانلىرىدا ئوسىش بىلەن بىرگە ئېغىز ئاچچىق بولۇش، كۆڭۈل ئاينىش، قەي قىلىش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.

## داۋاسى

ھەر ئىككى خىلدىكى تاڭلاي قىچىشىشنى داۋالاشتا مۇۋاپىق تېپىلسا قىفال تومۇردىن قان ئالسا بولىدۇ. مېڭە ۋە پۈتۈن بەدەننى ھەر خىل چىلانمىلار بىلەن تەنقىيە قىلىش، ئېغىزنى ئەرنىقى گۈل ياكى سىركە بىلەن يۇيۇش كېرەك. ھارارىتىنى پەسەيتىش ئۈچۈن سېمىز ئوت شىرسى ۋە تەرخەمەك ئورۇقى شىرسىنىڭ ھەر بىرىدىن 9 گرام، بېھى ئورۇقى شىرسىدىن 3 گرام، چۈچۈك ئالما شەرىتىدىن 40 گرام، ئىسبەغۇل، بۇغداي كېپىكىنىڭ ھەر بىرىدىن 7 گرام، تۇخمى رەبھاندىن 4 گرام ئېلىپ بېرىلىدۇ. تۆۋەنكى ھەبى ئېغىزدا تۇتۇش كېرەك:

ئىشاستە. تاباشىر، كەترا، تەرخەمەك ئورۇقى، قاپاق ئورۇقى، تاۋۇز ئورۇقى، بېھى ئورۇقىنىڭ ھەر بىرىدىن 8 گرام، شىرخىستىن 12 گرام ئېلىپ، بۇلارنى ئىسبەغۇل لۇتابى بىلەن نوقۇت چوڭلۇقىدا ھەب ياساپ ئەھۋالغا قاراپ 1-2 تالدىن ئېغىزدا تۇرغۇزۇلىدۇ.

بەلغىمى شورىدىن بولغان تاڭلاي قىچىشىشتا كۆپىنچە چۈچۈمەل تەمدىكى چىلانمىلار بىلەن مېڭە ۋە پۈتۈن بەدەننى تەنقىيە قىلىشنى ئويلىشىش كېرەك. ئېغىزنى چايقاش ئۈچۈن يۇمىغاقسۇت، كاسىن، ئۇسۇڭ ئورۇقلىرىنىڭ ھەرىرىدىن 40 گرام ئېلىپ 40 گرام قارا ئۈجمە قاينىتىلمىسىغا قوشۇپ ئېغىزنى چايقاش، ئارىپىدىن تاماق قىلىپ بېرىش كېرەك. ئەيتۈلنى ئېغىزغا ئېلىپ تورغۇزۇشمۇ پايدىلىق.

## تاڭلاي مۇدۇر چاقىسى

تاڭلاي مۇدۇر چاقىسى (بوسۇرۇلپە نەكى) باشقا ئەزالارغا پەيدا بولغانغا ئوخشىلاش تاڭلايغا مۇدۇر-چاقا پەيدا بولغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

كۆپىنچە، مېڭىدىن ئۆتكۈر قىزىق ماددىلار بولۇپمۇ نەزلە ماددىلار تاڭلايغا تۆكۈلۈپ مۇدۇر-چاقىلارنى پەيدا قىلىدۇ. بەزىدە مۇدۇر-چاقا پەيدا قىلغۇچى نەرسىلەرنى، مەسىلەن: ياڭاق، قويۇق ۋە مايلىق تاماقلار ياكى بەك ئاتلىق نەرسىلەرنى كۆپ ئىستېمال قىلىشتىنمۇ كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامىتى

بىمار تاڭلاي قىسمىنىڭ ئېچىشىشىدىغانلىقى بەزىدە ھەتتا كۆيۈشۈپ ئاغرىدىغانلىقى، ئىلنى تاڭلىغا تەككۈزسە مۇدۇرلەر بارلىقىدىن شىكايەت قىلىدۇ. تەكشۈرگەندە تاڭلايدا مۇدۇر-چاقا پەيدا بولغانلىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ.

داۋاسى

ئالدى بىلەن ئۆتكۈر قىزىق ماددىلارنى مېڭىدىن ۋە پۈتۈن بەدەندىن تازىلاش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن مۇۋاپىق ئېپىلغاندا قان ئالسا بولىدۇ.



مەتبۇخى ھەلىلە ياكى مەتبۇخى شاھتەررە ئىچكۈزۈپ ياكى 100 گرام تەرەنجىبىن ياكى خىيارشەنبەرگە 5 گرام بادام يېغى قوشۇلغان شەرىپتى دەردنى ئىچكۈزۈپ بەدەننى تەنقىيە قىلىش كېرەك. مېۋە سۈيلىرىگە مۇۋاپىق مىقداردا شىرخىست سېلىپ بەرسىمۇ بولىدۇ.

تەنقىيىدىن كېيىن ئامۇت غازىكى، قىزىلگۈل، ئانارگۈل، يەرلىك شوخلا يىلتىزى قاتارلىقلارنى سىركە بىلەن قاينىتىپ ئېغىزنى چايقاش كېرەك. يۇمىغاقسۈت سۈيى، ھەمىشە باھار سۈيى، يەرلىك شوخلا سۈيلىرىنىڭ ھەر بىرىدىن 30 مىللىلىتىر ئېلىپ ئۈنىڭغا سوقۇلغان ئاق سەندەلدىن 9 گرام، قارا ئۈجمە قاينىتىلمىسىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ قوشۇپ ئېغىزنى چايقىسا ناھايىتى ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.

چاقا پەيدا قىلغۇچى نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلغاندىن بولغان تاڭلاي مۇدۈر-چاقىسىنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن قان ئېلىش كېرەك. ئاندىن كېيىن ئۈچكە ياكى قوتاز قايمىقىنىڭ تۈزىنى ياكى ئۇلارنى ئەرىقى گۈلگە ئارىلاشتۇرۇپ يەرلىك ئورۇنغا سۈرۈش لازىم، ھەمدە زىق سۈيى، كاسىن سۈيى، تەرخەمەك سۈيلىرىنىڭ ھەر بىرىدىن 7 مىللىلىتىر، بېھى تۇرۇقى، لۇئابىدىن 3 مىللىلىتىر، ئەرىقى گۈل، ئەرىقى نىلۈفەرلەرنىڭ ھەر بىرىدىن 70 مىللىلىتىر ئېلىپ ئىچكۈزۈش، شەرىپتى نىلۈفەرنى قوشۇمچە ئىستېمال قىلىش كېرەك. تامىقى ئۈچۈن ئارپا ئېشى ئىچكۈزۈلىدۇ. سىركە بىلەن ئەرىقى گۈلابىنى قوشۇپ ئېغىزنى چايقاش، ھەر ۋاقىت كەترانى ئېغىزدا تۇتۇش كېرەك.

گۈل يېغى، قاپاق يېغى ۋە تۆسۈك يېغى قاتارلىقلارنىڭ قايسى بىرى بولسا شۇنى ئېغىزغا ئېلىش بەك مەنپەئەتلىك.

### تاڭلاي ياللۇغى

تاڭلاي ياللۇغى (ۋەرەمۇلھەنەكى) تاڭلاينىڭ ئىشىشىپ تاماق ئىستېمال قىلىش ۋە سۆزلەشكە بەلگىلىك دەرىجىدە تەسىر قىلغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

ئاساسلىق، خېلىستىلارنىڭ ئۈزگىرىپ تاڭلايغا يامان تەسىر كۆرسەتكەنلىكىدىن



كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭدا كۆپىنچە قان ۋە بەلغەم خىلىتىشنىڭ نورمالسىزلىقىدىن پەيدا بولىدىغانلىرى كۆپ ئۇچرايدۇ.

### ئالامىتى

قاندىن بولغانلىرىدا ھارارەت قوشۇلۇپ كېلىش بىلەن بىرگە ئىشش كۆرۈلسە ئاغرىش ئېغىر بولىدۇ. ئىششنىڭ رەڭگى قىزىل كېلىدۇ. ئېچىشىش، كۆيۈشۈش، تۇساشلار بولىدۇ. بەلغەمدىن بولغانلىرىدا ئىششنىڭ رەڭگى ئاقۇش كېلىدۇ ھەمدە ئاغرىش ئېغىر بولمايدۇ ياكى ئاغرىمايدۇ.

### داۋاسى

قاندىن بولغانلىرىدا مۇۋاپىق تېپىلسا ئالدى بىلەن قىفال تومۇردىن قان ئېلىش، ھەمدە 3 كۈندىن كېيىن كالىپۇكلاردىكى تۆت تومۇر (چاھاررەگ) دىن قان ئېلىش كېرەك. چۈچۈمەل چىلانمىلار بىلەن بەدەننى تەنقىيە قىلىش، مەتبۇخى ھەلىيلە ياكى مەتبۇخى شاھتەررەنى ئىچكۈزۈش ياكى سەپرانىڭ مۇسەھلىنى ئىستېمال قىلدۇرۇش كېرەك. ئاندىن كېيىن سوغۇققا مايىل لۇئابلاردىن بېھى تۇرۇقى لۇئابى، كەترا لۇئابى ۋە ئىسبە غۇل لۇئابلىرىنى ئېغىزغا ئېلىش ياكى ئۇلار بىلەن ئېغىزنى چايقاش كېرەك. تاباشىر، قىزىلگۈل، سېمىز ئوت تۇرۇقى، نىشاستە، كەترا، سەمغى ئەرەبى، ئەدەس ئۇندىن مۇۋاپىق مىقداردا، كافۇردىن ئازراق ئېلىپ سوقۇپ ئىششقا چىپىش كېرەك. بۇ ئۇسۇلغا ئۇسۇڭ تۇرۇقى، كاسىن تۇرۇقى، سەمغى فارىسى، ماش ئۇندىن قوشسا مەنپەئەتى تېخىمۇ ياخشى. كېسەلنىڭ دەسلەپتە بايۇنە، بىتەپشە، ئامۇت تۇرۇقلىرىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ تۇڭا خىيارشەنەر قوشۇپ ئېغىزنى چايقىسىمۇ بولىدۇ.

بۇلاردىن باشقا يەنە، ئىسسىقتىن بولغان ئېغىز ئاغرىش ۋە تىل ئىششقىدا كۆرسىتىلگەن چارە-تەدبىرلەرنى قىلسا بولىدۇ. تامىقىغا گۈرۈچ، كالىك بەسەي، سېمىز ئوت سېلىپ بېرىش كېرەك.

بەلغەمدىن بولغانلىرىدا ئالدى بىلەن مەتبۇخى ئەفتمۇن ياكى ھەببى ئىيارەجلەرنى ئىچكۈزۈپ بەدەننى تەنقىيە قىلغاندىن كېيىن گەزمازەج، ئاقىر قەرھالارنى سىركىدە قاينىتىپ ئېغىزنى چايقاش كېرەك. ئەگەر بۇ مەنپەئەت قىلمىسا ئىيارەجى تەلخ بىلەن





ئىششىق يوقالغىچە ئېغىزنى چايقاش، تاماقتىن كېيىن نوقۇت سۈيى ئىچىش لازىم. ئەگەر بەلغەمدىن بولغان تاڭلاي يالغۇغدا قۇۋۋەت ئاجىزلىقى بولسا، بالا ھەمراھىنى قورۇپ ئىستېمال قىلدۇرۇش كېرەك. مىزاجدا باشقا ئۆزگىرىش بولمىسا 3 كۈنگىچە توختىماي ھەببى شەبىيار بەرسە بولىدۇ. ئەڭ ياخشىسى تەنقىيدىن كېيىن ئاقىرقەرهانى كونا سىركىدە قاينىتىپ ئېغىزنى غەر-غەرە قىلىش كېرەك. بۇلاردىن باشقا يەنە، بەلغەمدىن بولغان ئېغىز ئاغرىش ۋە تىل ئىششىقىدا كۆرسىتىلگەن چارە-تەدبىرلەرنى قوللانسا بولىدۇ.

### تاڭلاينىڭ سۇلۇق ئىششىقى ۋە تېشىلىشى

تاڭلاينىڭ سۇلۇق ئىششىقى ۋە تېشىلىشى (ئابىلەئى كام ۋە سۇراخى ئان) تاڭلاينىڭ ئىششىپ سۇ كۆتەرگەنلىكى، ھەمدە ئۇنىڭ تېشىلىگەنلىكىگە قارىتىلغان.

سەۋەبى

ئۆتكۈر ئىسسىق ماددىلارنىڭ تاڭلايغا تۆكۈلگەنلىكى ياكى ئاتشەك كېسەللىكى ماددىسىنىڭ تاڭلايغا تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامىتى

تاڭلاي ئاقىرىپ سۇلۇق ئىششىق پەيدا بولىدۇ، ھەتتا يامانلىشىپ تېشىلىدۇ. بۇرۇن-يۇتقۇنچاق يولى كېڭەيگەندە نېمە يېسە شۇ نەرسە بۇرۇندىن چىقىدۇ.

داۋاسى

مۇۋاپىق تېپىلسا ئالدى بىلەن قان ئالسا بولىدۇ. چىلان، شاھتەررە ۋە باشقا قان تازىلىغۇچى دورىلارنى ئىچكىۈزۈش كېرەك. ئېغىز گۆشخۇر يارىسىدا ئېيتىلغان 2-3. نۇسخا مەزكۇر كېسەللىك ئۈچۈنمۇ پايدا قىلىدۇ. مۇسەھل بىلەن بەدەننى تەنقىيە قىلغاندىن





كېيىن ئىتريفىلى شاھتەررە، شەرىپتى شاھتەررەلەرنى ئىستېمال قىلىش لازىم.  
ئانار پوستى، ئانارگۈلى، قىزىلگۈل، ھەببۇلكاس، گەزمازەج، جويۇزلارنى مۇۋاپىق  
مىقداردا ئېلىپ سۇ بىلەن قاينىتىپ، سۈزۈپ، ئېغىزنى غەر-غەرە قىلسا ناھايىتى  
مەنپەئەت قىلىدۇ.

قىزىلگۈل تۇرۇقىدىن 3 گرام، پىرسياۋشان، زۇفا، يۇمغاقسۈتلەرنىڭ ھەر بىرىدىن  
5 گرام، ئەدەستىن 7 گرام، ئانارگۈلدىن 4 گرام، خەشخاش پوستىدىن بىر دانە  
ئېلىپ ھەسەل بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ قاينىتىپ، ئېغىزنى غەر-غەرە قىلسۇمۇ ناھايىتى  
مەنپەئەتلىك.

پوستى خەشخاش، قۇرۇق يۇمغاقسۈت، ئانارگۈلى، قارا ھەلىيە، ھەببۇلكاس، ئامۇت  
غازىڭى قاتارلىقلارنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ يارىغا سېپىش ھەمدە تاجىگۈل،  
خېنە يوپۇرماقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 6 گرام، گەزمازەج، موزىلارنىڭ ھەر بىرىدىن 5  
گرام، ئەدەستىن 12 گرام، پاقا يوپۇرمىقىدىن 70 گرام ئېلىپ قاينىتىپ، ھوزوز  
مەككى، گىل ئەرمىنى، قىزىل سەندەل، ئاقاقىيالارنىڭ ھەر بىرىدىن 3 گرام ئېلىپ  
سوقۇپ قايناتىمىغا ئارىلاشتۇرۇپ، ئېغىزنى بىر نەچچە قېتىم چايقىسىمۇ ئويدان تەسىر  
قىلىدۇ.

خېنە يوپۇرمىقى، ئانارگۈلى، ئاقاقىيا، ئامۇت غازىڭى، قۇرۇق يۇمغاقسۈت،  
گەزمازەج، پۇستى بىخ گوندى، پۇستى بىخ چەنبىلى، گۈل سىوتىلارنىڭ ھەر  
بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ قاينىتىپ سۈزۈپ غەر-غەرە قىلسۇمۇ ناھايىتى ياخشى مەنپەئەت  
قىلىدۇ.

سىمابىن 3 گرام، قارا شېكەردىن 20 گرام ئېلىپ بۇلارنى ئويدان سوقۇپ جوۋنە  
سۈيى بىلەن يۇغۇرۇپ 10 دانە ھەب ياساپ تەنسى-ئاخشىمى بىر دانىدىن ئىستېمال  
قىلىش كېرەك.

ئەگەر بۇ كېسەل 10 ياش ئەتراپىدىكى بالىلاردا يۈز بەرسە، مەزكۇر ھەب دورىدىن  
تەتگەن-ئاخشىامدا ئىككى ھەپتە بېرىش كېرەك. فىلىل قوشۇلغان ھەببى توتىيامۇ ئويدان پايدا  
قىلىدۇ.

تامىقى ئۈچۈن ئۈچكە شورپىسى بېرىلىدۇ. تاتلىق، چۈچۈمەل نەرسىلەردىن پەرھىز  
قىلىنىدۇ.





## كچىك تىل ئىششىقى

كچىك تىل ئىششىقى (ئىلتىھابوللەھاتى) باشقا ئەزالاردا ئىششىق پەيدا بولغانغا ئوخشاش كچىك تىلدا ئىششىق پەيدا بولغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

قان، سەپرا، بەلغەم ۋە سەۋدادىن ئىبارەت 4 خىلنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشلىرى كچىك تىلغا يامان تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ. قان ۋە سەپرادىن بولغانلىرى كۆپ ئۇچرايدۇ. بەزىدە زۇكام سەۋەبىدىنمۇ كچىك تىل ئىششىقىدۇ.

ئالامىتى

قاندىن بولسا كچىك تىل قىزىرىپ پارقرايدۇ، ئىششىقىدۇ، چىقىقلىپ ئاغرىيدۇ. تاماق يۇتۇش قىيىنلىشىدۇ.

سەپرادىن بولسا كچىك تىل قىزىرىپ ئىششىقىدۇ. كۆيۈشۈپ، ئېچىشىپ ئاغرىيدۇ. ئېغىز قۇرۇپ، قۇسسۇزلۇق كۆپىيىدۇ. ھەتتا خەپرۈكىنىمۇ يۇتالمايدۇ. ئېغىز تەمى ئاچچىق بولىدۇ. بەزىدە باشمۇ قىزىپ ئاغرىيدۇ.

بەلغەمدىن بولسا ئىششىق بوشراق، كچىك تىل يۇمشاقراق، ئاغرىش يەڭگىلەرەك بولىدۇ. كچىك تىلنىڭ رەڭگى ئاق بولۇپ، ئۇزراپ قالغاندەك كۆرۈنىدۇ.

سەۋدادىن بولسا ئىششىق قاتتىقراق بولىدۇ. كچىك تىل ۋە گالنىڭ ئەتراپى قارامتۇل رەڭدە كۆرۈنىدۇ. ئېغىز تەمى چۈچۈمەل بولىدۇ.

زۇكامدىن بولسا زۇكامنىڭ ئالامەتلىرى قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

داۋاسى

قان ياكى سەپرادىن بولغانلىرىنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن ماددىنى يۇمشىتىش،





ياندۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىش لازىم. مەسلەن: قاندىن بولغانلىرىدا زۆرۈر كەلگەندە ئاز مىقداردا قان ئېلىپ قاننىڭ ھارارىتىنى پەسەيتىش، سەپرادىن بولغانلىرىدا ئۆزىگە مۇناسىپ سۈرگە دورىلار بىلەن سەپرانى سۈرۈش لازىم. مەتبۇخى ھەلىيلە، مەتبۇخى شاھتەررە ۋە قۇرسى تاباشىر مۇلەيىس قاتارلىقلار بېرىلىدۇ. ئاندىن كىيىن سىرگىگە گۈل يىغىنى ئارىلاشتۇرۇپ غەر-غەرە قىلىش، قۇرۇق قىزىلگۈل، كاقۇر، گۈلنارلارنى يۇمشاق ئېزىپ شۇ جايغا سۈركەش لازىم.

تەمىرى ھىندىنى چىلاپ سۈزۈپ شىرسىدە شىرخىستىنى ئېرىتىپ ئىچىش ياكى خىيارشەنبەرنىڭ مەتبۇخىغا تەرەنجىبىن قوشۇپ ئىچىش، ماددىنى ياندۇرۇش ئۈچۈن مارجان شوخلا ۋە كاسىنلارنىڭ سىقىلغان سۈيى ۋە قابىز دورىلار بىلەن مەسلەن: ياكقاننىڭ تاشقى پوستى، قىزىلگۈل قاينىتىلغان سۇلارغا رەۋەن سېلىپ غەر-غەرە قىلىش لازىم. ئەگەر ماددىنى قايتۇرغۇچى دورىلارنىڭ مەنپەئەتى كۆرۈلمىسە، ماددىنى تارقاققۇچى ۋە يۇمشاققۇچى دورىلارنى، مەسلەن: خىيارشەنبەر مېغىزى، خىتىمى (ئاق لەيلى)، ئامۇت، بېھى ئۇرۇقلىرىنىڭ شىرسى، ھۆل يۇمغاقسۈتنىڭ سۈيى، پاقا يوپۇرمىقىنىڭ سۈيى قاتارلىقلارنى قوشۇپ ئېغىزنى چايقىسا ئاغرىق پەسىيدۇ، ماددىنى يۇمشىتىپ تارقىتىدۇ.

بەلغەم، سەۋدادىن بولغانلىرىنى داۋالاشتا ئىششىقلارنى ياندۇرۇش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن ھەببى قوقيا، ھەببى سەبرى قاتارلىقلارنى بېرىش، بەلغەمنى تازىلاش ئۈچۈن گۈلقەنت، ئاچچىقسۇ، سىرگەنجىبىن، قىچىلارنى ئارىلاشتۇرۇپ غەر-غەرە قىلىش، بەلغەمنى ئېرىتىش ۋە يۇمشىتىش ئۈچۈن تۆشۈدۈرنى يۇمشاق ئېزىپ نەيچە ئارقىلىق كىچىك تىلغا پۈركەش، موزا، تۆشۈدۈر، تاش تۈز، زەمچىلەرنى يۇمشاق ئېزىپ، دورىنى كۆرسەتكۈچ بارماق ئۈچىغا قويۇپ كىچىك تىل ئۈستىگە قويۇش لازىم.

سەۋدانى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى ئەفتمۇن بېرىش ياكى مەتبۇخى مائۇلجۇبىن، ئەفتمۇن چۈشكەن سىرگەنجىبىن بېرىش لازىم. ماددىنى يۇمشىتىش ۋە تارقىتىش ئۈچۈن چۈچۈكبۇيا يىلتىزنىڭ شىرسى، خىيارشەنبەرنىڭ مېغىزى، يېڭى سېغىلغان سۈت، بادام يېغى، ھۆلبەنىڭ شىرسى قاتارلىقلارغا بىر ئاز تۈز قوشۇپ ئېغىزنى چايقاش لازىم. ئەگەر ئىششىق يانماي قېتىۋېلىش خەۋپى بولسا ھۆل يۇمغاقسۈت سۈيى، ئوسۇڭ سۈيىگە ئوخشاش سوغۇق دورىلارنى ئېغىزدا تۇتۇش ۋە شۇنىڭ بىلەن غەر-غەرە قىلىش، ئىسسىق دورىلاردىن ساقلىنىش لازىم.

زۇكامدىن بولغانلىرىنى داۋالاشتا مەتبۇخى بادىرەنجى بۇيا، شەرىبى خەشخاشلارنى بېھى ئۇرۇقى، زىغىر، سېمىز ئوت ئۇرۇقى شىرسى بىلەن قوشۇپ ئىچكۈزۈش كېرەك. سىماق ياكى شاتوت، ئانار پوستى، قىزىلگۈل، گۈلنار قاتارلىقلارنى قاينىتىپ گالىنى چايقاش كېرەك.





## كچچك تىل بوششىپ قېلىش

كچچك تىل بوششىپ قېلىش (ئىستىرخائىلەھاتى) كچچك تىلنىڭ ئىچكى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن بوششىپ تۆۋەن تەرەپكە ساڭگىلاپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

ئارتۇقچە ھۆلۈكلەرنىڭ ئەسەبلەر ئارقىلىق كچچك تىلغا تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭدا ئاساسلىق قان ۋە بەلغەم خىلىتىدىكى ھۆلۈكنىڭ ئاشقانلىقى ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدۇ. بەزىدە مېڭە تەرەپتىكى سىزىم پەيلىرىنىڭ ھۆلۈكى ئېشىپ كچچك تىلغا تەسىر قىلغانلىقىدىنمۇ كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامىتى

بىمار گېلىغا بىر نەرسە ئېسىلىپ، چاپلىشىپ قالغاندەك سېزىدۇ ھەتتا ئېغىرلاشسا بىر نەرسە يۇتالمايدۇ. ئېغىزنى ئاچقۇزۇپ تەكشۈرگەندە كچچك تىلنىڭ نورمال ھالەتتە تۇرماي تېڭىگە چاپلىشىپ تۇرغانلىقى ياكى ئۈزۈرەپ ساڭگىلاپ قالغانلىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ.

قان مەنبەلىك ھۆلۈكتىن بولغانلىرىدا چوڭ ۋە كچچك تىللارنىڭ ھەممىسى قىزىق ۋە قىزىل رەڭدە بولىدۇ ھەمدە قان مىزاجىنىڭ باشقا بەلگىلىرى كۆرۈلىدۇ. بەلغەم مەنبەلىك ھۆلۈكتىن بولغانلىرىدا كچچك تىلدا قىزىللىق بولمايدۇ. ئېغىزدىن شۈلگەي كۆپ كېلىدۇ. بەلغەم مىزاجىنىڭ باشقا بەلگىلىرى كۆرۈلىدۇ.

داۋاسى

قاندىن بولغانلىرىغا قان مەنبەلىك كچچك تىل ئىششىقىنى داۋالاش ئوسۇلى بويىچە چارە قىلىش ۋە قەۋزىيەت بولۇشتىن ساقلىنىش، ئەگەر قەۋزىيەت بولسا مۇناسىپ





دورلار ئارقىلىق ئىچىنى ماڭدۇرۇش لازىم. مەسلەن، چىلان، بىنەپشە، ئاق لەيلى، گاۋزەبان، قىزىلگۈل ئەينۈللەرنى مۇۋاپىق مىقتاردا ئېلىپ بىر كېچە سۇغا چىلاپ ئەتىسى سىقىپ سۈزۈپ ئىچىش لازىم. بۇندىن باشقا گۈلاپقا سىركىنى قېتىپ غەر-غەرە قىلىش لازىم.

بەلغەمدىن بولغانلىرىغا ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن ئىيارەجى قەيقەرا، ئىتريفېلى كەبىر، ماۋل ھەسەل قاتارلىقلارنى بېرىش، ئاندىن كېيىن ئاقىرقەرھا، تاباشىر، قاقىلىلەرنىڭ ھەر بىرىدىن 4 گرام، زەئفەردىن 1 گرام ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ كىچىك تىلغا سۈركەش كېرەك. ئانار پوستى موزا، زەمچە، سىماقلارنىڭ ھەر بىرىدىن 3 گرام ئېلىپ 100 گرام سىركە بىلەن قاينىتىپ گالىنى چايقاش لازىم.

بەلغەم ماددىسىنى تارقىتىش ئۈچۈن ھەسەل سۈيى، زۇفا قاينىتىلمىسى بىلەن غەر-غەرە قىلىش، ھۆللۈكنى تارقىتىپ قۇرۇتۇش ئۈچۈن زەمچە ۋە ھەببۇلكاسىنى يۇمشاق ئېزىپ ئاچچىق ياكى تاتلىق ئانار پوستىنىڭ ئىچكى قەۋەت پەردىلىرى سۈيىگە ئارىلاشتۇرۇپ ئېغىزنى چايقاش لازىم. يەنە كۆيدۈرۈلگەن زەمچە، بۇغا مۇڭگۈزى، نۆشۈدۈرلەرنى قوشۇپ يۇمشاق ئېزىپ، نەيچە ئارقىلىق كىچىك تىلغا پۈركەش ياكى بىۋاسىتە كىچىك تىلغا سۈركەش لازىم.

ئەگەر كىچىك تىل بوشاشقان بولۇپ تۇۋى ئىنچىكە، ئوچى تەرىپى سېمىز ۋە توم بولۇپ قالغان بولسا، زىفتى رۇمىنى قايناق سۇدا ئېرىتىپ قىزىق ھالدا غەر-غەرە قىلسا ئىششىق يۇمشايدۇ ۋە تارقايدۇ. بۇنىڭدىن كېيىن قابىز دورىلار، مەسلەن: لەھىيە تۇتتىسىنىڭ شىرىسىگە سۆك (ئامىلەننىڭ ئوسارسى)، موزىلارنى قوشۇپ غەر-غەرە قىلىش لازىم.

ئەگەر كىچىك تىلدا ھارارەت بولغانلىقتىن قىزىللىق ۋە قىزىقلىق پەيدا بولسا، مارجان شوخلا (ئىت شوخلىسى) ۋە ھۆل يۇمىغاقسۇننىڭ سۇلىرى بىلەن غەر-غەرە قىلىش لازىم.

ئەگەر كىچىك تىل بوشىشىپ ساڭگىلاپ دورا بىلەن تىلنى كۆتۈرۈش مۇمكىن بولمىسا، كىچىك تىلنىڭ ئارتۇقنى كېسىپ ئېلىۋېتىش لازىم. كېسىپ ئېلىۋېتىشتىن بۇرۇن ئەزالارنى تازىلاپ ئاندىن كېسىش كېرەك. كېسىپ بولغاندىن كېيىن كېسەلگە سىماق چىلانغان گۈلاپنى ئىچۈرۈش ۋە غەر-غەرە قىلىش لازىم. شۇنداق قىلغاندا قان توختايدۇ. يەنە ئەپيۇن چۈشكەن قۇرسى كەھرىبا، شارابى جەۋز، شارابى خەرتۇبىلارنىمۇ تەييارلاپ قويۇش كېرەك، چۈنكى بۇ دولار بىلەن ئېغىزنى چايقىسا قان توختىتىش رولىنى ئوينايدۇ.





## گال توششاق مۇدۇرى

گالغا توششاق مۇدۇر چىقىش (بۇسۇرۇلەلقى) گالنىڭ ئىچى ۋە ئەتراپىغا توششاق مۇدۇر چىقىپ، كۆيۈشۈپ ئاغرىغانلىقىغا قارىتىلغان.

### سەۋەبى

ئىچكى ۋە تاشقى سەۋەبلەرنىڭ گالغا يامان تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ. ئىچكى جەھەتتە بىرەر خىلىتنىڭ بولۇپمۇ قان ياكى سەپرا ماددىسىنىڭ ئۆزگىرىشىدىن زىيادە ھارارەت پەيدا بولۇپ كېلىپ چىقىدۇ. تاشقى جەھەتتە لازا، تۇزلۇق، ئۆتكۈر نەرسىلەرنى كۆپ ئىستېمال قىلىش، شورلۇق سۇ ئىچىش، ئۈزەمەي سۆزلەش، ناخشا ئېيتىش قاتارلىق سەۋەبلەرنىڭ گالغا يامان تەسىر قىلغانلىقىدىن پەيدا بولىدۇ.

### ئالامىتى

گەپ قىلغاندا، تاماق يەپ بىر نەرسە يۇتقاندا، يۈتەلگەندە گال ئاغرىدۇ. بەزىدە ئىسسىتمىسى تۈرلەيدۇ، گال قۇرۇيدۇ. ئېغىزنى ئاچقۇزۇپ تەكشۈرگەندە گال ئەتراپىدا توششاق مۇدۇرلەر بارلىقىنى ئېنىق كۆرگىلى بولىدۇ.

### داۋاسى

زىغىر، بېھى تۇرۇقى، ئىسبەغۇللارنىڭ شىرسىنى چىقىرىپ ئوڭا بىر ئاز سىركە ياكى گۈل يېغى، بىنەپشە يېغى قوشۇپ ئاز-ئازدىن بىر قانچە قېتىم ئىچكۈزۈش لازىم. ھەببى سۇئالنى ئېغىزغا سېلىپ شۈمۈپ سۈيىنى يۇتۇش كېرەك. گالغا سۇقۇقى سۇنۇن پۈركۈش، سىركىنى قايناقسۇ بىلەن تەڭشەپ گالنى چاپقاش كېرەك. ئەگەر سىركىنىڭ تەسىرىدىن گال ئاغرىسا، گۈلى بىنەپشە يېغى ۋە زىغىر يېغى شىرسى بىلەن





غەر-غەرە قىلىسمۇ بولىدۇ.

چىققان مۇدۇر يىرىڭلىق بولسا، ئاغرىقنى پەسەيتىش ئۈچۈن موم يېغى ياكى مەرھىمى ئەببەزنىڭ قايسىسى بولسا شۇنى يالغۇز ياكى تۇخۇم ئېقى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ يىلمان قىلىپ ئاغزىغا ئېلىپ تۇرۇش كېرەك.

قايتا-قايتا تەكرارلانغان ۋە جىددىي خاراكتېرىدە يېڭى باشلانغانلىرىغا موزىنى ئالغانلاپ تاسىقاپ، قۇمۇش نەيچە ئارقىلىق گالغا كۈندە ئىككى قېتىم پۈركۈپ بەرسە ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

پەرھىز: ئاچچىق-چۈچۈك، تۈزلۈق، قاتتىق-قۇرۇق تاماقلاردىن پەرھىز قىلىش لازىم.

## گال ئىششىقى

گال ئىششىقى (ئىلتىھابۇلھەلقى) گال ساھەسىنىڭ ئومۇميۈزلۈك ھالدا ۋەرەملىنىپ ئىششىغانلىقىغا قارىتىلغان بولۇپ، يەڭگىل بولغاندا يۇتۇش قىيىنلىشىدۇ، ئېغىر بولغاندا يۇتۇش پۈتۈنلەي توسۇلىدۇ، ھەتتا نەپەسلىنىشكە دەخلى يېتىدۇ.

سەۋەبى

بەدەندىكى قان، سەپرا، بەلغەم ۋە سەۋادىن ئىبارەت تۆت خىلنىڭ غەيرىي نەبىئىي ھالدا ئۈزگىرىپ گالغا يامان تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭدا كۆپىنچە، قان ياكى سەپرا ماددىسىنىڭ غالىب كېلىپ گالنىڭ ئېغىز ۋە تىلغا تۇتاش بولغان شىللىق ئەستەر پەردىلىرى ۋە سېرىق ئەتلىرىگە يامان تەسىر كۆرسىتىپ ئىششىق پەيدا قىلغانلىقى، بولۇپمۇ گالنىڭ ئىككى تەرىپىدىكى بادامسىمان بەزلەر (لەۋزە تەين) نىڭ جەراسىملانغانلىقى ئاساسىي ئامىللار بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.

ئالامىتى

گال ئىششىقىنىڭ ماددىسى قاندىن بولسا يۈز-كۆزى قىزىل بولىدۇ، باش ۋە بويۇننىڭ ئەتراپىدىكى تومۇرلار قانغا تولۇپ لوقۇلداپ ھەرىكەتلىنىدۇ، گال شىللىق







پەردىلىرى كۆپىدۇ، ئېغىزنىڭ تەمى تاتلىقراق بولىدۇ. سەپرادىن بولسا ئېغىز قۇرۇپ، كۆپ تۇسسايىدۇ. ئېغىز تەمى ئاچچىق بولىدۇ. گال كۆيۈشۈپ ۋە ئېچىشىپ ئاغرىيدۇ. ئويۇقۇ كەم بولىدۇ. بەلغەمدىن بولسا بىمارنىڭ يۈز-كۆزى ئېسەڭگۈ بولۇپ، ئىششىقنىڭ رەڭگى ئاق، ئېغىزدىن شالۋاق كۆپ ئاقىدۇ، ئاغرىق يەڭگىل بولۇپ، تاماق يۇتۇش قىيىن كېلىدۇ. سەۋدادىن بولسا گالدىكى ئىششىق قاتتىق بولىدۇ ھەم ئۇزۇنغا سوزۇلىدۇ. ئېغىزنىڭ تەمى قېرىق ياكى ئاچچىق-چۈچۈك بولىدۇ، گال قۇرغاقلىشىدۇ.

### داۋاسى

قاننىڭ غالىبلىقىدىن بولغان گال ئىششىقىنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن قاننى سوۋۇتۇش چارىلىرىنى قوللىنىش، يەڭگىل ھۆقنە قىلىش ياكى مېۋىلەر سۈيى ۋە شۇنىڭغا ئوخشاشلار ئارقىلىق بەدەننى تازىلاش ئاندىن ئېغىزنى غەر-غەرە قىلىش كېرەك. ئەمما بەدەننى تازىلماي تۇرۇپ غەر-غەرە قىلىشتىن ساقلىنىش لازىم.

ماددىنى پۇشۇرۇش ۋە تارقىتىش ئۈچۈن ئەنجۈر، ۋاسالغۇ، ھۆلە، ئامۇت ئورۇقى، زىغىرلەر قاينىتىلغان سۇغا يېڭى سېغىلغان سۈت ۋە خىيارشەنەبەر سۈيى قاتارلىقلارنى قوشۇپ غەر-غەرە قىلىش لازىم. ئەگەر يۇقىرىقى غەر-غەرەلەر ئارقىلىق ئىششىق يانمىسا توغرىغۇ، ھىڭ، شەپەرەڭ مايقى قاتارلىقلارنى يۇمشاق ئېزىپ يېڭى سېغىلغان سۈت بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ غەر-غەرە قىلسا ئېغىز ئالدۇرىدۇ ياكى موزا، گۈلتار، زەمچە، ئانار پوستى ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش قابىز نەرسىلەرنى سۇدا قاينىتىپ غەر-غەرە قىلسا، ئەزالارنى قاتتىق قورۇش ئارقىلىق ئىششىقنى ئېغىز ئالدۇرىدۇ.

سەپرادىن بولسا ئالدى بىلەن مۇناسىپ مۇزىچ، مۇسەللار ئارقىلىق سەپرانى تازىلاش لازىم. ئاندىن كېيىن كۆك ماش قاينىتىلغان سۇ، شاتوت شىرسى، ئۆسۈڭ ئورۇقنىڭ شىرسى، كاسىن ئورۇقنىڭ شىرسى قاتارلىقلار بىلەن غەر-غەرە قىلىش لازىم.

كېسەللىكنىڭ ئاخىرىقى مەزگىلدە بۇغداي كېپىكىنى سۇ بىلەن قاينىتىپ، سىقىپ سۈزۈپ تۇنىڭغا خىيار شەنەبەر قوشۇپ غەر-غەرە قىلىش كېرەك.

ئەگەر ماددىنى ئىچكى تەرەپتىن تاشقى تەرەپكە تارتىش توغرا كەلسە زىنقى رۇمى، ئاق توغرىغۇ، قىچا، ياۋا سۇزابلارنى گالنىڭ ئۇدۇل تاشقى تەرەپىدىكى بويۇن ساھەسىگە چېپىش ياكى ئېگەك ئاستىغا لوڭقا قويۇش كېرەك.

بەلغەمدىن بولسا ئالدى بىلەن تېز ھۆقنە قىلىش ياكى ئىيارەجى فەيقەرا، ھەببى قوقيا





ئارقىلىق بەلغەمنى تەنقىيە قىلىش، ئاچچىقسۇ، ھەسەل ياكى شاتتۇتنىڭ شىرسى، ياۋا پىياز سىركە نىجىسى، تۇرۇپ سۇيى، قىچا، ئاقىرقەرھالار ياكى ياشاق تاشقى پوستىنىڭ رۇيى، بادىيان سۇيى قاتارلىقلارنىڭ تىپلىغى بىلەن غەر-غەرە قىلىش لازىم. سىركە ۋە ھەسەل بىلەن غەر-غەرە قىلسا ماددىنى يوقتىشتا ئوبدان مەنپەئەت قىلىدۇ. كېسەللىك ئاخىرلاشقاندا ئاق مومنى سۆسۈن يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ سىرتقى تەرەپتىن چېپىش كېرەك. تېز ھۆقنە قىلىش ئۇسۇلى: بۇغداي كېپىكى، سېرىق چېچەك، ئىككىل مېلىك، ئەنجۈرلەرنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سۇدا قاينىتىپ سىقىپ سۈزۈپ، ئاق توغرىغۇ، قىزىل شېكەر، ئاچچىقسۇلارنى قوشۇپ ھۆقنە (ھەمەل) قىلىنىدۇ.

سەۋدادىن بولسا ئوتتۇراھال ھۆقنە قىلىش ياكى ئىيارەجى فەيقەرا، مەتبۇخى ئەفتمۇنلار ئارقىلىق سەۋدانى تازىلاش، ئەنجۈر قاينىتىلمىسى ياكى ياشاق پوستىنىڭ رۇيىغا ياكى ئاچچىقسۇغا ھۆلبە شىرسى، خىيار شەنەبەر مېغىزى قاتارلىقلارنى قوشۇپ غەر-غەرە قىلىش لازىم. ياكى قىزىق جۇلاپ، ھەسەل سۇيى، ئۈزۈم شارابى (مەيپۇختەم) قاتارلىقلار بىلەن ياكى ئىككىل مېلىك، زىغىر، بابۇنە، ھۆلبەلەرنىڭ قاينىتىلمىسى بىلەن غەر-غەرە قىلىش لازىم. ھۆلبە، زىغىر، سېرىق چېچەك، بابۇنە، كەرەم يوپۇرمىقى ۋە تۇرۇقى، مەرزەنجۈشلەرنى سوقۇپ پىشۇرۇپ، توخۇ يېغى، ئودەك يېغى قاتارلىقلارنى ئېرىتىپ، ھەممىنى بىرلەشتۈرۈپ گالىنىڭ تۇدۇل تاشقى تەرىپىدىن بويۇنغا چېپىش كېرەك.

## گال بادامسىمان بەزلەر ئىششىقى

گال بادامسىمان بەزلەر ئىششىقى (ئىلتىھابۇللەۋزە تەبىئى) گالىنىڭ ئىككى يېنىدىكى بادامسىمان بەزلەرنىڭ ئىششىغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

ئىچكى ۋە تاشقى سەۋەبلەرنىڭ گال بادامسىمان بەزلىرىگە يامان تەسىر قىلغانلىقىدىن پەيدا بولىدۇ.

ئىچكى جەھەتتە تۆت خىلنىڭ بىرەرسى نورماللىقتىن ئۆزگىرىپ ئۇقۇنەت پەيدا قىلىپ، گال بادامسىمان بەزلىرىنىڭ بىرىگە ياكى ئىككىسىگەلا يامان تەسىر





قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ. ئىسسىقتىن بولغانلىرى كۆپىنچە قان ۋە سەپرادىن بولىدۇ. سوغۇقتىن بولغانلىرى سەۋدا ۋە بەلغەمدىن كېلىپ چىقىدۇ. سىرتقى جەھەتتە ئادەم زىيادە چارچىغان، ھاراق-شارابنى تولا ئىستېمال قىلغان، ئوزۇقلىنىش ناچارلاشقان، سوغۇقتا قالغاندا بەدەن قارشىلىق كۈچى ئاجىزلىشىپ ئاسانلا گال بادامسىمان بەزىلىرىنىڭ ئىششىقىغا گىرىپتار بولىدۇ. يۇقىرىقىلاردىن باشقا، ئىچ قېتىپ قەۋزىيەت بولغۇچىلاردا ئوڭايلا يۈز بېرىدۇ. زۇكام بولغان چاغدا دائىم قوشۇمچە ئالامەت بولۇپ كۆرۈلىدۇ.

### ئالامىتى

قاندىن بولسا گال قىچىشىپ ئاغرىيدۇ. ئېغىرلاشسا تويۇقسىز گال ئاغرىپ، تاماق قىزىرىپ ئىششىپ بىر نەرسە يۇتۇش قىيىنلىشىدۇ. بەدەن ھارارىتى تۈرلەپ جۇغ-جۇغ بولۇش، تىترەش يۈز بېرىدۇ. پۈتۈن بەدەن ماغدۇرسىزلىنىپ، بوغۇملار سىقىراپ ئاغرىيدۇ. ئېڭەك ئاستى بېزى ئىششىيدۇ. ئېغىزدا شۆلگەي زىيادىلىشىدۇ. تىلى بېسىپ تەكشۈرگەندە گالدا قىزىرىش يۈز بەرگەنلىكى، بادامچە بەزىلىرىنىڭ بوغناپ ئىششىغانلىقى، يىرىڭلىق نۇقتىلار بارلىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ. سەپرادىن بولسا، يۇقىرىقى ئالامەتلەردىن تاشقىرى يەنە باش ئاغرىش، ئوسساش، گال قۇرۇپ ئاغرىشلار قوشۇلۇپ كېلىدۇ. بەلغەم ۋە سەۋدادىن بولسا بەدەن قىزىمايدۇ. گالدا قىزىللىق بولمايدۇ، ئاغرىش ئېغىر بولمايدۇ. قىچىشىش يەڭگىلەرەك بولىدۇ. ئېغىزدىن شالۋاق ئاقىدۇ. بەلغەمدىن بولسا ئىششىق بوش بولۇپ، رەڭگى ئاقۇش، سەۋدادىن بولسا ئىششىق قاتتىق بولۇپ، رەڭگى كۆكۈش بولىدۇ.

### داۋاسى

قايسى خىللىتىن بولغان بولسا، شۇ خىللىتى تازىلاپ، تەڭشەش كېرەك. قان ياكى سەپرادىن بولسا، مۇۋاپىق تېپىلسا قان ئالسا بولىدۇ. كاسىن ئورۇقى، ئوسۇك ئورۇقى يۇمىخاقسۇت ئورۇقلىرىنىڭ ھەر بىرىدىن 10 گرام ئېلىپ 300 مىللىلىتر سۇدا يېرىمى قالىغىچە قاينىتىپ سۈزۈپ قەنت سېلىپ ياكى چىلان شەرىپتىگە قوشۇپ كۈنگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 20 مىللىلىتردىن ئىچىش كېرەك.





ئەگەر سوغۇقتىن يەنى بەلغەم ۋە سەۋدادىن بولسا، ئىبارەج قەيقەرا بېرىش لازىم ئاقىرقەرھادىن 15 گرام، قۇرۇق ئۈزۈمدىن 10 گرام، زۇقادىن 5 گرام، سۆسۈن يىلتىزىدىن 5 گرام ئېلىپ بىرلەشتۈرۈپ 300 مىللىلتر سۇ بىلەن يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ سۈزۈپ گالىنى چايقاش لازىم.

سىرتقى تەرەپتىن ئىششىقنى تارقىتىش ئۈچۈن بىنەپسە يېغى، گۈل يېغى بىلەن مايلاش، ئىسسىق ئۆتكۈزۈش، سوغۇق تېگىش شامالداپ قېلىشتىن ساقلىنىش لازىم. ئاقسۈتى: بەزى كىشىلەردە بۇ كېسەل پات-پات تەكرارلىنىپ تۇرىدۇ ۋە ئاستا-ئاستا بوغۇملارغا تەسىر قىلىپ مەفاسىل (بوغۇم ياللۇغى) نى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھەتتا يۈرەككە تەسىر كۆرسىتىدۇ. شۇڭا سەل قارىماي ئاكتىپ داۋالاش لازىم. تەكرارلىنىپ ئادەت بولۇپ قالغانلار دەستكارلىق ئۈسۈلى بىلەن بادامچە بەزلەرنى ئالدۇرۇۋېتىش كېرەك.

## بوغما

بوغما (خۇناق) كېسەلى گالدا ئاق پەردە پەيدا بولغان كېسەلگە قارىتىلغان بولۇپ، ئۆتكۈر يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ. شۇڭا ئۇ خۇناقۇلۇۋە بائىشى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. خەلق ئارىسىدا ئادەتتە ئاق تاماق كېسەلى دەپ ئاتىلىدۇ.

### سەۋەبى

ئىچكى تاشقى ئامىللار (ھەر خىل گۆش، تاتلىق نەرسىلەر ۋە ھاراقنى كۆپ ئىستېمال قىلىش، بويۇن سىرتقى جەھەتتە زەخمىگە ئۇچراش قاتارلىق) نىڭ تەسىرىدىن بىرەر خىلىت (ئاساسلىق قان، سەپرا) سان ياكى سۈپەت جەھەتتە ئۆزگىرىپ ئۆفۇنەت ۋە بۇخارات پەيدا قىلىپ، گال ئەتراپىدىكى موشەك گۆشلەرگە يامان تەسىر قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

بوغما بىلەن كېسەللەنگەنلەردىن ساقلارغا يۇقۇش ئارقىلىقمۇ مەزكۇر كېسەللىك كېلىپ چىقىدۇ.



كۆپىنچە بالىلاردا كۆپ ئوچرايدۇ. گال ئىششىپ، ئونكىدا يالغان ئاق پەردە ھاسىل بولىدۇ. مەزكۇر ئاق پەردىنى قىسىپ تارتسا، ئوڭايلىقچە ئاجرىمايدۇ. شۇ بەلگىگە قاراپلا بوغما كېسىلدىن گۇمانلىنىشقا بولىدۇ.

يۇقۇملىنىپ (كۆپىنچە بالىلاردا) كېسەللىك ئالامەتلىرى كېلىپ چىققىچە تەخمىنەن 1—7 كۈن ۋاقىت ئۆتىدۇ. قىزىيدۇ، گېلى ئاغرىيدۇ، بېشى ئاغرىپ ماغدۇرسىزلىنىدۇ. تاماق يىگۈسى كەلمەيدۇ، كۆڭلى ئېلىشىدۇ، بەزىدە قۇسۇدۇ. بادامچە بەزلىرى بىلەن يۇمشاق تاڭلاي قىزىرىپ ئىششىدۇ. ئاق چېكىتلەر پەيدا بولۇپ بارغانسېرى كېڭىيىپ، ئاقۇش كۆلرەڭ ساختا پەردە ھاسىل قىلىدۇ. كېسەللىك ئېغىر بولسا بەدەن ھارارىتى تۆۋەنلەپ كېتىدۇ. بىمار ھالىسىزلىنىپ يېتىپ قالىدۇ، چىرايى تاتىرىدۇ، قول-پۇتلىرى مۇزلايدۇ. تومۇرى تېز ئەمما ئىنچىكە بولۇپ، بىمار تۇيۇقسىز ھۇشسىزلىنىدۇ. بۇ خەۋپلىك ھادىسە بولۇپ، يۈرەك زەئىپلىشىش تۈپەيلىدىن كىچىك بالىلاردا تۆلۈمنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ئېغىز ساھەسىدە ئاق پەردە ھاسىل قىلغاچقا ئادەتتە ئۇ ئاق تاماق كېسىلى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئەگەر بۇ پەردە چوڭىيىپ ئىششىسا ياكى كېڭەيسە ئاۋاز بوغۇلۇپ، نەپەس قىسىلىدۇ. ئېغىز ۋە بۇرۇندىن قان ئارىلاش شىلمىشىق سۇ كېلىدۇ. ئاق پەردىنى قىسىپ تارتسا ئاجرىمايدۇ. قىسقان جاي قانايدۇ. مۇشۇ بەلگىلەر ئارقىلىق گال بادامسىمان بەزىلەر ئىششىقىدىن پەرقلەندۈرۈشكە بولىدۇ.

مەزكۇر كېسەللىك كىچىك بالىلاردا ئېغىر دەرىجىدە كۆرۈلۈپ ۋاقىتدا چارە قىلىنمىسا، بوغۇلۇپ قېلىش تۈپەيلىدىن ئۆلۈپ قېلىشى مۇمكىن. بۇ كېسەللىك خىلىتلارنىڭ ئوخشىمىغان ئۆزگىرىشلىرىدىن بولغاچقا يۇقىرىقى ئالامەتلەردىن باشقا يەنە خىلىتلارغا خاس بەلگىلىك پەرقلىرى بولىدۇ.

سەپرادىن بولسا ھارارەت يۇقىرى بولۇپ، ئېچىشىش ئاغرىشقا قارىغاندا كۈچلۈكرەك بولىدۇ. گال ئىچىگە قارىسا گال ئەتراپى ئىششىغاندىن سىرت ئاق ساختا پەردە سېرىققا مايىل بولىدۇ.

قاندىن بولسا ئاغرىش ناھايىتى ئېغىر بولۇپ ئېچىشىدۇ. ھارارەت ئۈستۈن بولۇپ. گال ئەتراپى قىزارغان بولىدۇ. ئىششىق ئېنىق كۆرۈلىدۇ.

بەلغەمدىن بولسا يۇقىرىقى ئالامەتلىرى ئانچە ئېغىر بولمايدۇ. لېكىن ئىششىق ئاق رەڭلىك بولىدۇ.

بوغما كېسەللىكى ھاياتقا خەۋپ يەتكۈزۈدىغان ۋە كەڭ تارقىلىدىغان كېسەللىك بولغانلىقى ئۈچۈن، ئەڭ ياخشىسى ۋاقىتنى تۈتكۈزمەي غەرىبچە داۋالاش ئورۇنلىرىغا يوللاش ياكى دوختۇرلار بىلەن ھەمكارلىشىپ داۋالاش كېرەك.

چەت-ياقا شارائىت بولمىغان جايلاردا تىبابىتىمىزنىڭ داۋالاش تەدبىرلىرىنى ئەستايىدىل قوللىنىش مەزكۇر كېسەلنى داۋالاش ياكى ئۇنى يەڭگىلەشتە بەلگىلىك دەرىجىدە مۇھىم رول ئوينايدۇ. شۇڭا ئالدى بىلەن كېسەللىك سەۋەبچىسىنى ۋە قايسى خىلىتىغا تەئەللۇقلۇقنى ئوبدان ئېنىقلاش، شۇ خىلىتنى نورماللاشتۇرۇش ۋە ئىششىق قايتۇرۇش ئۇسۇللىرىنى جىددىي قوللىنىش كېرەك.

قان ياكى سەپرادىن بولسا، ئالدى بىلەن مۇۋاپىق تېپىلسا قان ئېلىش، توغرا تېپىلغاندا قاننى تۆككەل ياكى باسىملىق تومۇردىن ئېلىش كېرەك. بوغمدا قان ئېلىشنىڭ بەزىدە نەتىجىسى خېلى چوڭ بولىدۇ. ئەمما، كېسەلنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى ناچار بولسا، بىراقلا كۆپ قان ئېلىش توغرا ئەمەس. بىر قانچە كۈن تۈتكۈچە كۈندە بىر قېتىم، ئاز-ئازدىن قان ئېلىش لازىم ياكى پاقالچەك ساھەسىگە ھىجامەت قويىمۇ بولىدۇ. ئەگەر يالغۇزلىقىنى ئېغىر بولماي ئاغرىق كۈچلۈك بولسا، گەندەننىڭ بىر تەرىپىگە ياكى ئىككى تەرىپىگە ھىجامەت قويۇش كېرەك. ھىجامەت قويغان جايدىن بىر ئاز قان چىقارسا ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ. ئەگەر قان ئالمىسىمۇ بولسا قان ئالماستىن مۇۋاپىق سۈرگە دورىسى بېرىشلا كۆپايە قىلىدۇ. ئەمما ئاغرىقنىڭ تىلى سىرتقا چىقىپ ئەھۋالى ناچارلاشقاندا، دەرھال تىل ئاستى تومۇرلىرىدىن بولسىمۇ قان چىقىرىش لازىم.

خاس قان ماددىسىدىن بولغان بولسا ئىچكى تەرەپتىن ئەرىقى شاھتەررە، ئەرىقى نىيلىۋەرە، ئەرىقى شىپالارنى ئىستېمال قىلدۇرۇش، ئىششىقنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە سىرتقى تەرەپتىن گالغا ھۆل يۇمغاقسۇت ياكى مارجان شوخلىسىنى تېگىش ياكى ئاق سەندەلنى سۈرۈپ چىپىش لازىم.

ئەگەر سەپرادىن بولسا مەتبۇخى ھەلىيلە، ئەرىقى ئەنگۈرى شىفا، ئەرىقى كاسىنى بېرىلىدۇ. بابۇنە ئاق لەيلى تۇرۇقى، پىرسياۋشان، تۇرۇپ تۇرۇقى، ئەنجۈر، يۇمغاقسۇت تۇرۇقلىرىنى ئايرىم ياكى بىرلەشتۈرۈپ قاينىتىپ، سۈزۈپ، سۈيى بىلەن گالنى چايقاش لازىم. قوينىڭ ياكى توخۇننىڭ تۆتىنى سىرتتىن سۈركەش لازىم. بىر قوشۇق سىركىنى بىر قوشۇق قايناقسۇ بىلەن تەڭشەپ ئېغىز چايقاش لازىم.



ئەگەر ئارقا تەرەت قاتتىق كەلسە ياكى تەستە كەلسە تۆۋەنكى پۇمشاتقۇچى ھۆقنىنى ئىشلىتىش كېرەك:

بۇغداي كېپىكى 30 گرام، سېرىق چېچەك تۇرۇقى 15 گرام، ئىككىلىملىك 12 گرام، ئەنجۈر قېقى 21 گرام، تۇز 24 گرام، قارا شېكەر 36 گرام، ئاچچىق سۇ (ئەپكامە) 30 مىللىلىتىر.

قارا شېكەر، ئەپكامە، تۇزدىن باشقىلارنى قاينىتىپ، سۈزگەندىن كېيىن قالغان دورىلارنى قوشۇپ كىلىزما ئوسۇلى بىلەن ئارقا يولدىن بىر قېتىمدىلا ھۆقنە قىلىش كېرەك.

كېسەلنىڭ 3-كۈنى پۇنۇسىنى كالا سۈتىدە ئېزىپ گالىنى چايقاش لازىم. بوغمىنى ئېغىز ئالدىدۇرۇش ئۈچۈن ناشقى تەرەپتىن سوغۇق دورىلارنى ئىشلەتمەسلىك كېرەك. ئۇنداق بولمىغاندا ياللىغلا نغاندىن پەيدا بولغان ئوقۇنەتلەرنى بەدەنگە تارقىتىپ قويىدۇ.

ئەگەر سەۋدانىڭ كۆپلۈكى كۆرۈلسە، يۇقىرىقى چارىلەر بىلەن بىللە ئىبارەج فەيقەرا، مەتبۇخى ئەفتمۇن قوشۇمچە بېرىلىدۇ.

چېقىشتۇرما تەشخىس: بوغما كېسەللىكى بىلەن بادامچە بەز ياللىغىنى ئويدان پەرقلەندۈرۈش لازىم. چۈنكى ئۇلارنىڭ ئالامەتلىرى ئوخشىشىپ كېتىدۇ. مۇھىم بەلگىسى ئىششىقتا بولۇپ، بوغمىدا ياپىلاق كېگە يىگەن ئىششىق ھەم ئاق پەردە بولىدۇ. بادامچە بەز ياللىغىدا ئىششىق ئايرىم چاپلاپ قويغاندەك كۆرۈنىدۇ.

ئاقسۈتى: بوغما يۈرەككە تەسىر قىلسا ئاقسۈتى يامان بولۇپ، ئۆپكەگە تەسىر قىلسا ئۆپكە ياللىغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بوغما ئېغىر ئۆتكەندە قىزىتما بولۇش، تارتىشىپ قېلىشلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ۋە يۇقىرىدا ئېيتىلغاندەك ھاياتقا خەۋپ يەتكۈزىدىغان ئەھۋاللار كۆرۈلىدۇ. شۇڭا بوغمىنى ۋاقتىدا جىددىي داۋالاش كېرەك.

## ئاۋاز نوخۇلداپ چىقىش

ئاۋاز نوخۇلداپ چىقىش (خەنان) سۆزلىگەندە ئاۋاز ياخشى چىقماي نوخۇلداپ، ئېنىق ئاڭلىغىلى بولمىغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

مەزكۇر كېسەللىك كۆپىنچە قان ۋە سەپرانىڭ غالىب كېلىپ گالغا يامان تەسىر



قىلغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بەزىلەر گال بادامسىمان بەزىلەرنىڭ ياللوغى ۋە كىچىك تىل ياللوغىدىن كېلىپ چىقىدۇ دەپمۇ قارايدۇ.

### ئالامىتى

بىمار سۆز قىلغاندا ئاۋازى نوخۇلداپ ئېنىق چىقمايدۇ. باشقىلار بىمارنىڭ نېمە دەۋاتقانلىقىنى ئاساسىي جەھەتتە ئېنىق ئايرىيالمايدۇ. بىمار سۇ ئىچسە سۇ بۇرىندىن چىقىپ كېتىدۇ. بىمارنىڭ كۆزى قىزغۇچ كۆرۈنىدۇ ۋە ياشقا تولغان بولىدۇ. بېشى بەزىدە بەگىگىل بەزىدە قاتتىق ئاغرىيدۇ.

### داۋاسى

مۇۋاپىق تېپىلسا ئالدى بىلەن قىغال تومۇردىن قان ئېلىش كېرەك. يۇمىغاقسۇت سۈيى، يەرلىك شوخلا سۈيى ۋە كاسىن، تۆسۈڭ سۈيىلىرىنى قوشۇپ ياكى مەزكۇر سۇلاردا مۇۋاپىق مىقداردىكى ھوزوزنى ئېرتىپ ئېغىزغا ئېلىپ غەر-غەرە قىلىش كېرەك. ئەگەر ئۈنۈمى كۆرۈلمىسە مەزكۇر دورىلارنىڭ سۈيىدىن مەتبۇخ تەييارلاپ ئىچىش لازىم. ئانار پوستى، موزا، تۇزلاردىن تەڭ مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ باش بارماققا مىلاپ، كۈندە ئون ياكى ئون ئىككى قېتىم بادامسىمان بەز ياللوغى بار جايلارغا سۈركەش كېرەك. ياكى ئانار پوستى، تۆشۈدۈرلەرنىڭ ھەر بىرىدىن 3 گرام ئېلىپ سوقۇپ يۇقىرىقى ئۇسۇل بويىچە ئىشلەتسە ۋە موزنى خېنە ياكى خام ئانار سۈيىدە قاينىتىپ، سۈيىنى ئېغىزغا ئېلىپ غەر-غەرە قىلسا ناھايىتى ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ. ئەگەر بۇنىڭدىنمۇ ئوڭلانمىسا سەپرانىڭ مۇسەھلىنى بېرىش كېرەك. چۈشكۈرتكۈچى دورىلارنى ئىشلەتسىمۇ كۆپ مەنپەئەت قىلىدۇ. بۇرۇن بەۋاسىرىنى داۋالاشتا قوللانغان تەدبىرلەرنى بەگىگلەرەك دەرىجىدە قوللانسىمۇ بولىدۇ. موزنى يېرىپ تاتلىق ئانار سۈيىدە بىر پەس قايناتقاندىن كېيىن ئۇنىڭغا ئەزەرۈت، كۈندۈرنى ئارىلاشتۇرۇپ، بۇرۇنغا مەزكۇر سۈيىنى تېمىتىش ياكى موزنى ئانار سۈيىدە قاينىتىپ سۈيىنى ئېغىزغا ئېلىپ غەر-غەرە قىلىش لازىم.

### ئاۋاز پۈتۈش

ئاۋاز پۈتۈش (بۇتلانۇسسەۋتى) ھەر خىل سەۋەبلەردىن ئاۋازنىڭ نورماللىقتىن





بۇزۇلۇشى ياكى ئاۋازنىڭ پۈتۈپ نورمال ئاۋاز چىقىرىلماسلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

ھەر خىل ئىچكى ۋە تاشقى ئامىللارنىڭ گالغا تەسىر قىلىشى نەتىجىسىدە كېلىپ چىقىدۇ.

ئىچكى جەھەتتە: 1. مزاجنىڭ بۇزۇلۇشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. گالنىڭ ئەسلىي مزاجى ھۆل-قۇرۇقلۇقتا مۆتىدىل بولۇپ، بۇ مۆتىدىللىك ئاۋازنىڭ نورمال چىقىشىغا ياردەم بېرىدۇ. ئەگەر ماددىسىز ھۆللۈك ياكى قۇرۇقلۇق غالب كەلسە، گالنىڭ ئەسلىي مزاجى بۇزۇلۇپ ئاۋاز تۈزگىرىدۇ ھەمدە سەۋەبىنىڭ ئېغىر-يېنىكلىكىگە قاراپ، ئاۋاز ھەر خىل دەرىجىدە پۈتۈپ قالىدۇ. 2. نەزلە سۇيۇقلۇقى مېڭە تەرەپتىن گالغا قۇيۇلۇشىدىن ئاۋاز پۈتۈپ قالىدۇ. بۇ نەزلە ئاۋازى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. 3. ھەر خىل قىزىتمىلىق كېسەللىك-لەردە، گالدىكى سۇيۇقلۇق يوقالغانلىقتىن قۇرۇقلۇق ئېشىپ ئاۋاز پۈتۈپ قالىدۇ.

تاشقى جەھەتتە: كۈچلۈك ھەرىكەتلەردىن كېيىن بەدەن راسا قىزىپ تۇرغاندا مۇزدەك سۇ ئىچىش ۋە باشقا سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن گالغا سوغۇق ئۆتۈپ كېتىش، ئاۋاز پەردىلىرىنى ھەددىدىن زىيادە كۈچەپ ئىشلىتىش يەنى يۇقىرى ئاۋازدا ئۆزمەي ناخشا ئېيتىش، ۋارقىراپ تۇرۇنغۇچە قاتتىق يىغلاش، كۈچەپ تۇرۇن مۇددەت سۆزلەش، بۇس، چاڭ-توزان، ئىس، غىدىقلىغۇچى گازلارنىڭ تەسىرىگە ئۇچراش، ھەددىدىن زىيادە تاماكا چېكىش قاتارلىقلاردىن ئاۋاز پۈتۈپ قالىدۇ.

ئالامىتى

سۆزلىگەندە خىقىراپ ئاۋاز ئېنىق چىقمايدۇ ياكى كىسىلداپ قالىدۇ. ئەگەر قۇرۇقلۇقتىن بولغان بولسا يېڭى باشلانغاندا گال ئىچى قىزىپ چىقىشىدۇ ۋە قۇرۇيدۇ. ئاۋازنىڭ پۈتۈشى قۇرۇقلۇقنىڭ ئېشىشىغا ئەگىشىپ ئېغىرلىشىدۇ. گال ئاغرىش قوشۇلۇپ كېلىدۇ. تۆكۈرۈك ئاز كېلىدۇ. ھۆللۈك نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلسا، بىر ئاز ئارام تاپىدۇ ۋە ئاۋازدا ياخشىلىنىپ قالغاندەك بولىدۇ.

ئەگەر ھۆللۈكتىن بولغان بولسا گال ئانچە بەك قۇرۇمايدۇ، قىزىمايدۇ، ئاغرىمايدۇ. ئېغىزدىن شالۋاق ئاقىدۇ. ھۆللۈك، سوغۇقلۇق نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلسا ئاۋاز پۈتۈش ئېغىرلىشىدۇ.



ئەگەر باشقا سەۋەبلەردىن بولغان بولسا، شۇ سەۋەبلەر ئالدىدىن ئۆتكەنلىك تارىخى بولىدۇ.

## داۋاسى

داۋالاشتا ئالدى بىلەن سەۋەبىنى ئوبدان ئېنىقلاپ شۇ سەۋەبىنى تۈگىتىش، مىزاجىنى تەڭشەش ۋە گالىنى راۋانلاشتۇرۇپ ئاۋازنى ئاچقۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش لازىم. ئەگەر قۇرۇقلۇقتىن بولغان بولسا، ھۆللۈك بەتكۈزۈپ، گالىنى نەمدەپ ئاۋازنى ئاچقۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش لازىم. ھەببى سوتال بارىدىن كۈنگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 3 تالنى شۈمۈپ تەمىنى يۇتۇش كېرەك. قاپاق تۇرۇقى مېغىزى، تەرخەمەك تۇرۇقى مېغىزى، سېمىز ئوت تۇرۇقى، ئاق لەيلى تۇرۇقى قاتارلىقلارنىڭ شىرسىنى چىقىرىپ شەرىپتى بىنەپشە، شەرىپتى نىلۇفەر بىلەن قوشۇپ ئىچىش لازىم. ئۆچكە سۈتگە ئازراق زەنجىبىل قوشۇپ ئىچسىمۇ ياخشى تەسىر قىلىدۇ.

ئوزۇقلۇقلاردىن چالا پۇشۇرۇلغان تۇخۇمنى ئىچىش، توخۇ گۆشىنى سەۋزە، چامغۇرلار بىلەن پۇشۇرۇپ يېيىش لازىم. لوئوقى ئەنجۈر، لوئوقى كەرنەپلەرنى بېرىش لازىم. ئەگەر ھۆللۈك ۋە سوغۇقتىن بولغان بولسا، ئاچچىق بادام مېغىزى، زىغىر تۇرۇقى، رۇمبادىيان، رۇبەسۇس، ئەرەب يىلىمىدىن 3 گرامدىن ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، بېھى تۇرۇقى شىرسى بىلەن خېمىر قىلىپ، تۇقۇت چوڭلۇقىدا كۆمىلاچ قىلىپ كۈنگە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا 3 تال شۈمۈپ تەمىنى يۇتۇش لازىم. تازىلاشقا ھەببى غارىقۇن بېرىش لازىم. سوغۇقتىن بولغانلىرىغا بىر ئاز ھىڭنى قايناقسۇدا ئېرىتىپ گالىنى چايقاش لازىم. ئانارنىڭ بېغىنى ئېلىۋېتىپ كىچىك تۈشۈك ئېچىپ، چوغ ئۈستىگە بىر ئاز قويغاندىن كېيىن ھور چىقىشقا باشلىغاندا تۈشۈكدىن بىر ئاز بىنەپشە يېغى، بادام يېغى قوشۇپ ئازراق تۇرغۇزۇپ چوغدىن ئېلىپ سىقىپ، سۈيىنى ئىچىشكە بېرىش ياكى لوئوقى زەنجىبىل، لوئوقى ئەنجۈر، لوئوقى ھۆلەلەرنى بېرىش لازىم.

ئەگەر زۇكام نەزلە تەسىرىدىن بولغان بولسا لوئوقى سەرپىستان، شەرىپتى ئۇنپالارغا كۆكتار تۇرۇقى، بادام مېغىزى شىرسى قوشۇپ بېرىش لازىم. ئاۋاز بۇزۇلسا كۆكتار شاكىلىدىن 5 گرام، مارجان شوخلىسىدىن 10 گرام، زىغىر تۇرۇقىدىن 20 گرام ئېلىپ، 300 مىللىلىتر سۇ بىلەن قاينىتىپ سۈزۈپ، كەترا ياكى سەمغى ئەرەبى قوشۇپ گالىنى چايقاش ۋە ئىچىش كېرەك.

گالىنىڭ مىزاجىنى تەڭشەش ئۈچۈن، تۆۋەندىكى چارە ۋە دورىلارنىڭ ئۈنۈمى



ياخشى:

ئارپا قايناتقان سۈنى ئېچىش، ئاقلانغان ئارپا، چىلان، ئاق لەيلى ئورۇقى، سەرپىستانلاردىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ قاينىتىپ سۈيىگە ناۋات سېلىپ ئىچىش كېرەك. قىزىتمىلىق كېسەللىكلەردىن بولغان ئاۋاز پۈتۈشىنى داۋالاش تۈسۈللىرى قۇرۇقلۇقتىن بولغانلىرىنى داۋالاشقا ئاساسىي جەھەتتىن ئوخشىشىپ كېتىدۇ. ئارچىنى قاينىتىپ سۈيى ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

ئۆزۈنغا سوزۇلغان ئاۋاز پۈتۈشكە داۋائى تىنىن ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. چەلەك، كاكىنەج، قىچىلاردىن باراۋەر مىقداردا ئېلىپ قاينىتىپ، گالىنى چايقاش لازىم. دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار: ئومۇمەن ئاۋاز بۇزۇلۇپ، پۈتۈپ قالغان كىشىلەر ھەر خىل زىيانلىق نەرسىلەر يەنى چاڭ-توزان، ئاچچىق-چۈچۈك تاماقلار، تۆتكۈر قىزىق ۋە سوغۇق نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلىشتىن ساقلىنىش، تاماكا چەكمەسلىك، قاتتىق ئاۋاز بىلەن توۋلاش، ئۇزۇن مۇددەت ۋارقىراپ يىغلاشلاردىن ساقلىنىش لازىم.

### گالغا يېمەكلىكلەر تۇرۇپ قېلىش

گالغا يېمەكلىكلەر تۇرۇپ قېلىش يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلغاندا بەزى نەرسىلەرنىڭ بولۇپمۇ قاتتىق گۆش، قاتتىق نان، سۆڭەك پارچىلىرىنىڭ تۆۋەنگە چۈشۈشى ياكى سىرتقا چىقماي گالدا تۇرۇپ قالغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلغاندا ناتوغرا ئىستېمال قىلىش بولۇپمۇ قاتتىق نەرسىلەرنى، مەسىلەن: قاتتىق گۆش، قاتتىق نان، سۆڭەك پارچىسى قاتارلىقلارنى ئوبدان چايناپ گالدىن راۋان ئۆتۈش سالاھىتىگە كەلتۈرمەي تۇرۇپلا ئالدىراپ يۇتۇش، ياكى دىققەتسىزلىكتىن بېلىق قىلىرىقى، بېلىق قاسرىقى ۋە بېھنىڭ ئورۇقى قاتارلىق سىلىق نەرسىلەر گالغا كېتىپ قېلىشتىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامىتى

يېمەكلىكلەرنىڭ بەزىلىرى تۆۋەنگە چۈشۈپ كەتمەي ياكى چىقىپ كەتمەي





گالغا قاپلىشىپ قالىدۇ ياكى بېلىق قىلتىرىقى ۋە قاسىرىقىدەك نەرسىلەر گالغا قاپلىشىپ تۇرۇپ قالىدۇ. گەرچە چوڭ خەۋپ بولمىسىمۇ كىشىنى بىئارام قىلىدۇ. ئېغىزنى چوڭ ئاچقۇزۇپ تەكشۈرگەندە بۇ نەرسىلەرنى كۆپىنچە ھاللاردا كۆرگىلى بولىدۇ.

### داۋاسى

گالغا تۇرۇپ قالغان نەرسە گۆش، نان، سىلىق سۆڭەك، بېھنىڭ تۇرۇقى ۋە تۇنگىغا ئوخشاش يۇمشاق سىلىق نەرسىلەر بولسا، ئۇ ھالدا كېسەلنىڭ گەدىنى ۋە ئىككى تاغىنىڭ ئوتتۇرىسىغا ئۇرسا تاشقىرىغا چىقىپ كېتىدۇ ياكى تۆۋەن تەرەپكە چۈشىدۇ. ئەگەر تۆۋەن تەرەپكە چۈشۈپ كەتكەنلىكى بىلىنمەس، ئۇ ھالدا لۇئابلارنى ۋە يۇمشاق ئاتلىغا ئوخشاش تاماقلارنى بەرسە، ئۆزىنىڭ يۇمشاقلىقى بىلەن گالغا تۇرۇپ قالغان نەرسىنى سىلىقداپ ئاشقازانغا چۈشۈرىدۇ. ئاندىن كېيىن قەي قىلسا قەي ئارقىلىق چىقىپ كېتىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن ياخشىراق تۇسۇل شۇكى، ئاۋۋال ئوتلاپ ئىچىدىغان يۇمشاق تاماقلار بىلەن ئاشقازاننى تولدۇرۇپ ئاندىن قەي قىلىش لازىم.

ئەگەر تۇرۇپ قالغان نەرسە قىلتىرىق تىكەنگە ئوخشاش نەرسىلەر بولسا، بىر پارچە پاختىنى ياكى بىر پارچە يۇڭنى ئېلىپ پىششىق ۋە ئۇزۇن يېپتا ئوبدان چېگىپ ئاندىن ھەسەلگە ئوراپ، يۇتقۇزۇپ مۇۋاپىق ۋاقىت ئاقەت قىلىپ تۇرسا ھەسەل ئېرىپ قىلتىرىق ۋە تىكەن پاختىغا ياكى يۇڭغا يېپىشىدۇ، ئاندىن يېپنى ئاستا تارتسا بولىدۇ.

يەنە بىر خىل ئۇسۇلى: بىر دانە قۇرۇق ئەنجۈرنى يېپقا چېگىپ چالا چاپناپ يۇتۇپ ئاندىن يېپنى تارتسا، تۇرۇپ قالغان نەرسىنى ھەرىكەتلەندۈرۈپ تاشقىرىغا چىقىرىدۇ. ئەگەر گالغا تۇرۇپ قالغان نەرسە تۆۋەنگە ماڭماي ياكى تاشقىرى چىقماي شۇ جايدا بىر مەزگىل تۇرۇپ قالسا، زاغۇن ئۇرۇقىنى سوقۇپ تىزىق سۇ بىلەن ئىچكۈزسە بۇ نەرسىنى چىقىرىدۇ (تەجرىبىدىن ئۆتكەن).

ئاشقازاندا تۇرۇپ قالغان نەرسىنى ئاشقازاندا تۇرغۇزۇش توغرا ئەمەس، چۈنكى غەيرىي نەرسە ئاشقازانغا چۈشۈپ تۇرۇپ قالغاندا ئاشقازاننى ياكى ئۈچەينى جاراھەتلەندۈرۈپ قويۇش خەۋپى بولىدۇ.

ئەگەر يۇقىرىقىدەك ئۇسۇللارنى قوللىنىپ گالغا تۇرۇپ قالغان نەرسىلەر چىقار-غاندا گالنى جاراھەتلەندۈرۈپ قويسا سوغۇق لۇئابلار، مەسىلەن: يېھى تۇرۇقى، ئىسبەغۇل، ئاق لەيلى تۇرۇقى، رەبھان تۇرۇقلىرىگە ئوخشاش تۇرۇقلارنىڭ لۇئابى بىلەن غەرى-غەرە قىلىش، ئوتلاپ ئىچىدىغان مۇناسىپ يۇمشاق تاماقلارنى ۋە لۇئابلارنى ئىچىش، ئەگەر ئاغرىق قاتتىق





بولۇپ مزاجى خۇن مزاج بولسا، ئىششىق پەيدا بولماسلىقى ئۈچۈن غەر-غەرەنى كۆپرەك قىلىش، شىرنىلىك، تۆتكۈر ئەمەس نەرسىلەرنى يېيىش لازىم. شۇندىلا كېسەللىككە سەۋەب بولىدىغان ماددىلارنىڭ كۈچىشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

### غەيرىي نەرسىلەر يۇتۇۋېلىش

غەيرىي نەرسىلەر يۇتۇۋېلىش ئېھتىياتسىزلىقتىن ھەر خىل غەيرىي نەرسىلەر بولۇپمۇ مىخ، يىگنە، تۆمۈر پارچىسى ۋە سۆڭەك پارچىلىرىنىڭ گالغا سانجىلىپ قالغانلىقى ياكى تەنگە، مارجانغا ئوخشاش نەرسىلەرنى يۇتۇۋالغانلىقىغا قارىتىلغان.

سەۋەبى

بۇ ئەھۋال كۆپىنچە گۈدەك بالىلاردا كۆرۈلىدۇ. كۆپىنچە مىخ، يىگنە، تۆمۈر پارچىسى، تەنگە، مارجان قاتارلىق نەرسىلەرنى ئېغىزغا سېلىپ ئوينىغاندا ئېھتىياتسىزلىقتىن مىخ، يىگنە، تۆمۈر پارچىسى قاتارلىقلار گالغا كېتىپ قېلىپ سانجىلىپ قالىدۇ. تەنگە، مارجان قاتارلىق نەرسىلەرنى يۇتۇۋالىدۇ.

ئالامىتى

مەزكۇر ئەھۋال چوڭ ئادەم ياكى چوڭراق بالىلاردا كۆرۈلسە، غەيرىي نەرسىلەرنىڭ گېلىغا سانجىلىپ قالغانلىقى ياكى ئۇلارنى تۇيۇقسىز يۇتۇۋالغانلىقىنى شىكايەت قىلىدۇ. كىچىك بالىلاردا كۆرۈلسە گېلىغا سانجىلىپ قالغان نەرسە تۈپەيلىدىن بىئارام بولۇپ يىغلايدۇ ياكى ئاتا-ئانىسى ۋە باققۇچىلار بالا ئويناۋاتقان تەنگە، مارجان قاتارلىق نەرسىلەرنىڭ يوقاپ كەتكەنلىكىنى بايقايدۇ.

داۋاسى

بالا ئويناۋاتقان تەنگە، مارجانغا ئوخشاش نەرسىلەر يوقاپ كېتىپ ئوبدان ئىزدىسىمۇ





تېپىلمىسا، كىچىك بالىنىڭ مەزكۇر نەرسىلەرنى يۇتۇۋالغانلىقىنى مۇقىملاشتۇرۇشقا بولىدۇ. بۇنداق ئەھۋال ئاستىدا بەك ھودۇقۇپ كېتىش ھاجەتسىز. دوختۇرغا كۆرسىتىپ دوختۇرنىڭ مەسلىھىتى بويىچە چارە قىلىش كېرەك. ئادەتتە بۇ خىلدىكى نەرسىلەر بىرنەچچە كۈندىن كېيىن چوڭ تەرەت بىلەن چىقىپ كېتىدۇ.

ئەگەر گالغا مىخ، يىڭنە، تۆمۈر پارچىسى، سۆڭەك پارچىسى سانجىلىپ قالسا ئېغىزنى يۇغان ئاچقۇزۇپ غەيرىي نەرسىلەرنى ئەسۋاب بىلەن قىسىپ ئوڭ يۈنىلىش بويىچە ئېلىۋېتىش كېرەك ياكى ماگنىتتىن پايدىلانسىمۇ بولىدۇ. تۆۋەنكى ئۆسۈللەرنى ئەھۋالغا قاراپ قوللانسا بولىدۇ:

سەككىز قوڭ ماگنىت (مىقاتىس) تېشىنى يۇمشاق ئېزىپ ئوبدان سالاپە قىلىپ، بىر قوشۇق ئۈزۈم شاربىغا ئارىلاشتۇرۇپ ئاستىدا ئىچىپ بېرىم سائەت تۆتكەندىن كېيىن سانادىن 17.5 گرام، قىزىلگۈل، بىنەپشىلەرنىڭ ھەر بىرىدىن 7 گرام، سەرپىستاندىن 30 دانە ئېلىپ بىر پىيالە سۇدا قاينىتىپ بېرىمى قالغاندا سۈزۈپ 52.5 گرام يېڭى شىرخىستىنى ئارىلاشتۇرۇپ ئېرىتىپ، يىلمان ھالدا ئىچىپ، يەنە شامچە ئارقىلىق ياردەم بېرىش لازىم. دورىنىڭ ئۈنۈمى كۆرۈلگەندىن كېيىن قەنت شەرىپىنى گۈلاب ۋە رەبھان ئورۇقى قاتارلىقلار بىلەن ئىچىش، ئىچمىكى ئۈچۈن نوقۇت سۈيى ئىستېمال قىلىش لازىم.

كۈدە، پالەك قاتارلىقلارنى توغرىماستىن قورۇپ پۇشۇرۇپ يېسە گالدىكى غەيرىي نەرسىلەرنى ئورۇۋېلىپ چۈشۈرۈۋېتىدۇ.

ئەگەر يىڭنە، مىخ قاتارلىق نەرسىلەر تۆۋەنگە چۈشۈپ ئاشقازان-ئۈچەي يوللىرىغا سانجىلىپ قالسا، ئەڭ ياخشىسى غەربچە داۋالاش ئورۇنلىرىغا ئاپىرىپ كۆرسىتىپ دەرھال چارە قىلىش ياكى ئوپېراتسىيە ئۆسۈلى بىلەن ۋاقتىدا ئېلىۋېتىش لازىم. دىققەت قىلىدىغان ئىشلار:

مىخ، يىڭنە، تۆمۈر پارچىسى، تەنگە، مارجان قاتارلىق نەرسىلەرنى ئېغىزغا سېلىپ ئوينىماسلىق ھەققىدە بالىلارغا تەربىيە بېرىپ ئاگاھلاندۇرۇپ تۇرۇش كېرەك. بۇنداق نەرسىلەرنى ئويناش ئۈچۈن كىچىك بالىلارنىڭ قولىغا بەرمەسلىك ياكى قولى يەتكۈدەك جايلارغا قويماستىن كېرەك. بولۇپمۇ يىڭنە، مىخ قاتارلىق نەرسىلەر گېلىغا سانجىلىپ قالسا ياكى ئۇلارنى يۇتۇۋالسا، ئەڭ ياخشىسى غەربچە داۋالاش ئورۇنلىرىغا دەرھال ئاپىرىپ ھەر خىل ئۆسۈللەر ئارقىلىق تەكشۈرتۈپ، ئاكتىپ داۋالاش لازىم.





## گال بوغۇلۇپ قېلىشقا چارە قىلىش

بۇ ھەر خىل سىرتقى سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن گال بوغۇلۇپ، تېخى ئۆلۈپ قالمىغان كىشىلەرگە چارە قىلىپ قۇتۇلدۇرۇشقا قارىتىلغان.

### سەۋەبى

گال بوغۇلۇش قاتىلى، ئوغرى، بۇلاڭچى قاتارلىق يامان غەرەزدىكى جىنايەتچىلەرنىڭ مەلۇم مەقسەت ئۈچۈن، زىيانكەشلىككە ئۇچرىغۇچىنىڭ گېلىنى ئاغامچا قاتارلىق نەرسىلەر بىلەن بوغۇشى ياكى بەزى ئىرادىسىز ۋە نادان كىشىلەرنىڭ بەزى بىر روھىي ۋە جىسمانىي ئازابىلارغا چىدىماي ئېسىلىپ ئۆلۈۋېلىشقا ھەرىكەت قېلىشى تۈپەيلىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

بەزىدە خەرىبەققە ئوخشاش گالنى يوققۇچى دورىلارنى مەقسەتلىك ياكى مەقسەتسىز ھالدا ئىستېمال قىلىش تۈپەيلىدىنمۇ گال بوغۇلۇش كېلىپ چىقىدۇ.

### ئالامىتى

يۈز-كۆزلىرى كۆكسىرىپ، ئېغىزدىن كۆپۈك چىقىدۇ. ئېغىرلىرىدا چىرايى قارىدايدۇ. بەزىلەرنىڭ ئېغىزدىن ئازراق قان چىقىدۇ. ئېغىزدىن كۆپۈك ياكى قان چىقسا ھايات قېلىشىدىن ئاساسەن ئۈمىد كۈتكىلى بولمايدۇ.

ئەگەر بوغۇلغان ۋاقتى قىسقا ۋە يەڭگىل بولسا، كۆپۈك ۋە قان چىقماي خىقىراپ قالىدۇ، ئازراق تىنىق بولىدۇ.

ئەگەر خەرىبەققە ئوخشاش دورىلارنى ئىستېمال قىلغانلىقتىن گال بوغۇلغان بولسا، ئېغىز ۋە بۇرۇنى قۇرۇپ ھۆللۈك يوقىلىشقا ئوخشاش بەلگىلەر كۆرۈلىدۇ.

### داۋاسى

بوغۇلۇپ قالغان ئەھۋالنى كۆرگەن ھامان دەرھال بويۇننى يوققان نەرسىنى دەرھال





بوشتىش كېرەك. ئەگەر تىنق ئازراق بار بولسىلا بوغۇلۇشتىن كېلىپ چىققان يۈرەك ساھەسىدە قان قېيىشتىن پەيدا بولغان نەپەس قىيىنلىشىش، چىرايى قارىشىلارنى ياخشىلاش ئۈچۈن ئەھۋالغا قاراپ باسىلىق تومۇردىن بىرتاز قان ئېلىش ۋە گۈل يېغى، بىنەپشە ياغلىرىنى قىزىق سۇغا تېمىتىپ ئىچكۈزۈش لازىم.

ئەگەر تىنقى بار بولۇپ ھۇشغا كەلمىسە، بوغۇلغان كىشىنى ئوڭدا ياتقۇزۇپ پۇتىنى ئىسسىق سۇغا چىلاپ، سۇدىن چىقىرىپ قاتتىق تۇۋۇلاش كېرەك. يەنە قىزىل قىچىنى سوقۇپ تۇخۇم بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تاپىنغا چىپىش ھەمدە پاقالچاققا لوڭقا قۇيۇش كېرەك. كېپەكنى ياكى ئارپىنى بىرتاز قاينىتىپ بادام يېغى ياكى بىنەپشە يېغى قوشۇپ ئىستېمال قىلدۇرۇش، شۇنىڭ بىلەن بىرگە تۇخۇم سېرىقىنى چالا پىشۇرۇپ ئىچكۈزۈش لازىم. گالنىڭ بوغۇلغان قىسمى زەخمىلەنگەن بولسا، سىرتتىن مۇۋاپىق تۈردە داۋلاش لازىم.

ئەگەر بىمارنىڭ تىنقى راۋان بولمىسا كۆكرەك قىسمىنى قاندىلىك ھالدا بېسىپ سۈنشى نەپەس ئالدىرۇش، كافۇر، قۇندۇز قەھرى، ئىپار قاتارلىق دورىلارنى پۇرتىش بىلەن بىرگە ھەۋايى نەسىمىنى (كىسلارۇد) كىرگۈزۈش ياكى مەخسۇس چۈشكۈرتكۈچى دورىلار، مەسلەن: كۈندۈش، فەرىپيۇن، ھەققۇنەزلى قاتارلىقلارنى بۇرۇن ئىچىگە ئاز مىقداردا پۈركەش كېرەك.

ئەگەر يۇقىرىقى ئۇسۇللار ئارقىلىق تولىم خەۋىدىن قۇتۇلۇپ قالغان تەقدىردىمۇ مەلۇم ۋاقىت پەرۋىش قىلىشنى كۈچەيتىش لازىم. مەسلەن، قاتتىق-يىرىك، قالايمىقان تاماقلارنى يېيىش، قاتتىق ئاۋازدا سۆزلەش، توپا-چاڭ توزان، ئۆتكۈر ئىسسىق-سوغۇق ئامىللاردىن ساقلىنىش ۋە روھى جەھەتتە پەرۋىش قىلىپ كۈتۈشكە ئالاھىدە دىققەت قىلىش لازىم.







## ئېغىز بوشلۇقى كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدىغان بىر قىسىم دورىلار

### كالپۇك كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدىغان بىر قىسىم دورىلار

#### مەلھىمى ئىسپىداج

تەركىبى: قەلەي تۆپىسى، موزا، نشاستە، كەترا ھەر بىرى 7 گرام، توخۇ يېغى 30 گرام، كالا يىلىكى 30 گرام.  
تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى يۇمشاق سالاپە قىلىپ، ياغنى ئېرتىپ مەلھەم قىلىپ تەييارلىنىدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: ھەر خىل كالپۇك يېرىلىشلارغا سىرتتىن ئىشلىتىلىدۇ. دورا چاپمىغان مەزگىلدە كالپۇققا توخۇمنىڭ ئېقى سۈركەپ قويۇلىدۇ.

#### مەلھىمى مۇرداسەڭ

تەركىبى: مۇرداسەڭ، قەلەي تۆپىسى، زەئفەر، كۆيدۈرۈلگەن زەمچە، ھەر بىرى 3 گرام، بادام يېغى، ئاق موم ھەر بىرى 15 گرام.  
تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تاسقاپ، ياغنى ئېرتىپ مەلھەم قىلىنىدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: كالپۇك يېرىلغاندا سىرتتىن ئىشلىتىلىدۇ.

#### تىلاي ھۇزۇر

تەركىبى: ھۇزۇر، بابۇنە، ئارپا تونى ھەر بىرى 3 گرام، ئەنگۈرى شىفا مېۋىسىنىڭ





سۈي 10 مىللىپىتر، بادام يېغى 10 مىللىپىتر.  
تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى يۇمشاق سالاپە قىلىپ ئەنگۈرى شىفا سۈيى ۋە  
بادام يېغى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ تەييارلىنىدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: كالىپۇك ئىششىقى ئۈچۈن سىرتتىن چېپىلىدۇ.

### تىلاي شىبىت

تەركىبى: سېرىق چېچەك تۇرۇقى، گۈل بابۇنە، ئىككىلىملىك ھەربىرى 3 گرام،  
گۈل يېغى 10 مىللىپىتر سىرگە 10 مىللىپىتر.  
تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى يۇمشاق سالاپە قىلىپ قائىدە بويىچە تىلا  
ياساپ ساقلاپ قويۇلىدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: لازىم بولغاندا كالىپۇك ئىششىقىغا سىرتتىن چېپىلىدۇ.

### ئېغىز شىللىق پەردىسىگە ئىشلىتىلىدىغان بىر قىسىم دورىلار

#### داۋائى قۇلاڭ (1-نۇسخا)

تەركىبى: قىزىلگۈل گۈلى ئوتتۇرىسىدىكى سېرىق ئۇرۇق، تاباشىر،  
نىشاستە، كۆك ماش، سېمىز ئوت تۇرۇقى، يۇمغاقسۈت تۇرۇقى، خېنە يۇپۇرمىقى،  
سىماق، ئاقىرقەرھە ھەربىرى 5 گرام، كاقۇر 3 گرام.  
تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تاسقاپ تالقان قىلىپ  
ساقلاپ قويۇلىدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: لازىم بولغاندا ئېغىز شىللىق پەردىلىرىگە سېپىلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: ئېغىز شىللىق پەردىلىرى قىزارغانغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

#### داۋائى قۇلاڭنى ئەيەز

تەركىبى: ئاقىرقەرھە، تۇخۇمەك تۇرۇقى، مامىرانچىنى، سېرىق ھەلىيلە پوستى، ئانار  
پوستى، قىزىلگۈل ھەربىرى 3 گرام.



تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى قائىدە بويىچە يۇمشاق سوقۇپ، تاسقاپ تالقان قىلىپ ساقلاپ قويۇلدى.

ئىشلىتىلىشى: لازىم بولغاندا ئېغىز شىللىق پەردىلىرىگە سېپىپ قويۇلدى.  
خۇسۇسىيىتى: ئېغىز شىللىق پەردىلىرى ئاق چېچەكلەپ ئاغرىغانغا پايدا قىلدى.  
يۇقىرىقىلاردىن باشقا 10 گرام ھەسەلگە بىر قوشۇق تۇز ئارىلاشتۇرۇپ قايىناقسۇدا ئېرىتىپ، ئەتىگەن-ئاخىشام ئېغىزنى چايقىسىمۇ بولىدۇ.

## چىش ۋە چىش مۈلۈكلىرىگە ئىشلىتىلىدىغان بىر قىسىم دورىلار

### تەرياقى ئەسنان (1-نۇسخا)

تەركىبى: قۇندۇز قەھرى، ھىك، مۇرمەككى، قارىمۇچ، يۇمىلاق زىراۋەندى، توم زەنجىبىل، ئەپيۇن، بۇزۇرۇلبەنجى ھەر بىرى 3 گرام، ھەسەل 24 گرام.  
تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ يېپەك ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ ساقلاپ قويۇلدى.

ئىشلىتىلىشى: لازىم بولغاندا مەزكۇر دورىدىن بىر گرام ئېلىپ ئاغرىق چىش ئۈستىگە قويۇپ چىشلەپ 2—3 مىنۇت تۇرغۇزغاندىن كېيىن يۇتۇۋەتسە بولىدۇ ياكى مەزكۇر دورىنى پاختىغا مىلاپ، چىشنىڭ كاۋىكىغا سېلىپ قويىسىمۇ بولىدۇ.

### تەرياقى ئەسنان (2-نۇسخا)

تەركىبى: قارىمۇچ، ئاقىرقەرھە، تۇخۇمەك تۇرۇقى، زەنجىبىل، كابابەچىنى، بۇزۇرۇلبەنجى ھەر بىرى 3 گرام، ھەسەل 18 گرام.

تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، يېپەك ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ ساقلاپ قويۇلدى.

ئىشلىتىلىشى: لازىم بولغاندا ئاغرىق چىشقا چىشلەپ بىر ئاز تۇرغۇزغاندىن كېيىن يۇتۇۋەتسە بولىدۇ.

قوشۇمچە: ئەگەر چىشنى قۇرت يەپ كاۋاك بولۇپ ئاغرىقى تۇزۇنغا سوزۇلسا، بىر تال



سىمىنىڭ ئۈچىنى ئېگىپ قىزىتىپ يەڭگىل-يەڭگىل بىرقانچە قېتىم يەرلىك ئورۇننى داغلىسا ئاغرىق يوقىلىدۇ. لېكىن كالىپۇك، ئېغىز ئىچىنى كۆيدۈرۈپ قويۇشتىن ساقلىنىش كېرەك.

### تەرياقى ئەسنان (3-نۇسخا)

تەركىبى: ئاقىرقەرها 10 گرام، كافۇر 5 گرام، گۈل يېغى 15 گرام.  
تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى يۇمشاق سالاھىيە قىلىپ گۈل يېغى بىلەن بىرلەشتۈرگەندىن كېيىن ساقلاپ قويۇلىدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: لازىم تېپىلغاندا پاكىز پاختىنى دورىغا چىلاپ ئاغرىق چىشقا بېسىپ قويۇلىدۇ.

### سۇنۇنى سورۇنجان (سورۇنجانلىق چىش ئالقىنى)

تەركىبى: سورۇنجان، قەلەمپۇر، سەئىدى كۆفى، يۇلغۇن مېۋىسى، سېرىق ھەلىپە، ئاق سەندەل، قىزىلگۈللەر تەڭ مىقداردا.  
تەييارلىنىشى: يۇمشاق سوقۇپ تاختا ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ئالقان قىلىنىدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: چىش ئاجىزلىقلىرىنى داۋالايدۇ.

### سۇنۇنى مۇرمەككى مۇتەيىپ

تەركىبى: مۇرمەككى، جويۇز، ئەبھەل، ئاقىرقەرها لار تەڭ مىقداردا.  
تەييارلىنىشى: سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ چىشقا باسدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: چىش ئاغرىقىنى پەسەيتىپ ئېغىزنى خۇشبۇي قىلىدۇ.

### سۇنۇنى مۇرچ

تەركىبى: قارامۇچ 8 گرام، توغرىغۇ ياكى گىل ئەرمىنى 5 گرام، ئاقىرقەرها، تۇخۇمەك ھەربىرى 3 گرام.  
تەييارلىنىشى: سوقۇپ چىش تۈۋىگە باسدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: ھۆلۈكتىن بولغان چىش ئاغرىقىنى داۋالايدۇ.





### سۇنۇنى مۇجلى

تەركىبى: يۇلغۇن مېۋىسى، كۆپۈكى دەريا، فلفىل، قاقىلە، زەنجىبىل ھەر بىرى 6 گرام، ھىندى تۇزى 30 گرام، قورۇلغان ئارپا 21 گرام.  
تەييارلىنىشى: سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ چىشقا سېپىلىدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: چىش داغلىرىنى يوقىتىپ پارقىرىتىدۇ. ئېغىزنى خۇشبۇي قىلىدۇ.

### سۇنۇنى كاتھىندى

تەركىبى: كاتھىندى، تاتلىق قۇستى، توتىيا، زەنجىبىل تەڭ مىقداردا.  
تەييارلىنىشى: قانداق بويىچە سوقۇپ تەييارلىنىدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: چىش تۈۋىدىكى ئۆسۈپ قالغان ئارتۇق گۆشلەرنى يوقىتىدۇ. چىش تۈۋى ئاقمىسىنى داۋالايدۇ.

### سۇنۇنى مۇرمەككى

تەركىبى: مۇرمەككى، تۆشۈدۈر، سۆسۈن يىلتىزى، زەرنىخ، ئاقىرەھا تەڭ مىقداردا.  
تەييارلىنىشى: سوقۇپ تەييارلىنىدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: چىش تۈۋىگە چۈشكەن يەل يارا (ئاكىلە)، ئاقما (ناسۇر) لارنى داۋالايدۇ. قاننى توختىتىدۇ.

### سۇنۇنى نەمەك

تەركىبى: ئاچچىق ئانار پوستى، تاتلىق ئانار پوستى ھەر بىرى 30 گرام، ھىندى تۇزى، تۆشۈدۈر 15 گرام، موزا، ئانارگۈلى، زەمچە، نەغەز گۈلى، ئاقىرەھالارنىڭ ھەر بىرىدىن 30 گرام، سىماق 45 گرام.  
تەييارلىنىشى: دورىلارنى تالقانلاپ، سىركە بىلەن يوغۇرۇپ كۆمىلاچلاپ سايدا قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ. زۆرۈر تېپىلغاندا بىر دانىنى سوقۇپ ئىستېمال قىلىدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: چىش تۈۋىدىكى يەل يارا، ئارتۇق گۆشلەرنى يوقىتىدۇ.



## سۇنۇنى لەسسە

تەركىبى: تاغ تېكسىنىڭ كۆيدۈرۈلگەن مۇڭگۈزى، ئەندىرانى تۈزى، سېرىق ھەلىلە پوستى، قىزىلگۈل ھەر بىرى 6 گرام، ئانارگۈلى 3 گرام. تەييارلىنىشى: سوقۇپ چىشقا سېپىلدۇ. ئىشلىتىلىشى: چىش مۈلكى بوشىشىش ۋە قاناشلارنى دۋالايدۇ.

## مىدىرلىغان چىشنى چىڭىتقۇچى دورىلار

### سۇنۇنى مۇتەھەرىرىك (1-نۇسخا)

تەركىبى: زىراۋەندى مۇدەھرىج، كۆندۇر، دەمۈكە خۇەين (خۇنسىياۋشان)، بىخ سۈسەن، ئاقىرقەرها، كۆيدۈرۈلگەن زەمچە ھەر بىرى 7 گرام. تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى قائىدە بويىچە سوقۇپ، يېپەك ئەلگەكتە تاسقىغاندىن كېيىن ئالقان قىلىپ ساقلاپ قويۇلدى. ئىشلىتىلىشى: لازىم بولغاندا مىدىرلاپ قالغان چىشنىڭ تۈۋىگە بېسىپ قويۇلدى.

### سۇنۇنى مۇتەھەرىرىك (2-نۇسخا)

تەركىبى: ئانارگۈلى، ئامىلە مۇقەششەر، كۆيدۈرۈلگەن زەمچە، ئاقاقىيا، بۇغا مۇڭگۈزىنىڭ كۆيدۈرۈلگەن كۈلى، تاباشىر، ھەر بىرى 3 گرام. تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى قائىدە بويىچە يۇمشاق سوقۇپ ئالقان قىلىپ ساقلاپ قويۇلدى. ئىشلىتىلىشى: لازىم بولغاندا ئاغرىق چىشقا بېسىپ قويۇلدى.

## سۇنۇنى ئاكيلە

تەركىبى: ئاچچىق ۋە تاتلىق ئانار پوستى ھەر بىرى 8 گرام، نەمەكى ھىندى، نۆشۈدۈر



ھەر بىرى 13.5 گرام، موزا، ئانارگۈلى، كۆيدۈرۈلگەن زەمچە، نەغەز گۈلى، ئاقىر قەرھا ھەر بىرى 27 گرام، سۇمماق 40 گرام، كافۇر 10 گرام.  
تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى قائىدە بويىچە يۇمشاق سوقۇپ، تاسقاپ تالقان قىلىپ ساقلاپ قويۇلدى.  
ئىشلىتىلىشى: لازىم بولغاندا چىشىنىڭ تۈۋىگە بېسىپ قويۇلدى.

### سۇنۇنى شەپ

تەركىبى: مورمەككى، تۇتيا، زەمچە، نىشاستە، قىزىلگۈل، ئاچچىق ئانار ياغچىنىڭ پوستى، ھەلىيە ئۆكچىسى، سوك (ئامىلە جەۋھىرى)، ئانارگۈلى، موزا، يۇلغۇن مېۋىسى تەڭ مىقداردا.  
تەييارلىنىشى: قائىدە بويىچە سوقۇپ تەييارلىنىدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: مىدىرلاپ قالغان چىشىنى چىڭىتىدۇ.

### سۇنۇنى مۇمىسك

تەركىبى: ئانارگۈلى، ئامىلە، زەمچە، ئاقاقىيا تەڭ مىقداردا.  
تەييارلىنىشى: سوقۇپ تەييارلىنىدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: بوشىشىپ كەتكەن چىشلارنى چىڭىتىدۇ.

## گال كېسەللىكلەرگە ئىشلىتىلىدىغان بىر قىسىم دورىلار

### قۇللاى ھەلق

تەركىبى: كۆيدۈرۈلگەن زەمچە، نەغەز گۈلى، موزا، كۈندۈر، زەئەفەر ھەر بىرى 3 گرام، تۆشۈدۈر 5 گرام.  
تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى چالاراق سوقۇپ بىر جىڭ سىركىگە چىلاپ قويۇپ، ھەر خىل گال ئاغرىقلىرىدا شۇ سىركە بىلەن گال چايقىلىدۇ. كىچىك بالىلارغا ئىشلەتكەندە، تۈنىگە ئازراق گۈل يېغى قوشۇپ چايقىسا بولىدۇ.



ئىشلىتىلىشى: ئاغرىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ.

### ھەببى مېشىكى

تەركىبى: فۇفەل، قەلەمپۇر، خۇلىنجان ھەر بىرى 3 گرام، قىزىلگۈل، ئاق سەندەل، سېرىق ھەلىلە پوستى، لاجىندانە ھىندى ھەر بىرى 1.5 گرام.  
تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تاسقاپ بېھى ئورۇقىنىڭ شىرسى بىلەن خېمىر قىلىپ نوقۇت چوڭلۇقىدا ھەب تەييارلىنىدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: ئەتىگەن-ئاخشامدا ئېغىزغا سىلىپ شۇمۇپ تەمى يۇتۇلىدۇ. ھەر قېتىمدا 2-3 ھەب ئىشلىتىلىدۇ.  
خۇسۇسىيىتى: ھەر خىل سەۋەبتىن بولغان ئېغىز سېسىق پۇراشقا مەنپەئەت قىلىدۇ.

### داۋائى شىققاۋۇللىسان

تەركىبى: ئىسبەغۇل، بېھى ئورۇقى ھەر بىرى 7 گرام، توخۇ يېغى، كالا يىلىكى 15 گرام.  
تەييارلىنىشى: ئىسبەغۇل بىلەن بېھى ئورۇقىنى چالا سوقۇپ داكا خالىغا ئېلىپ 20 مىللىمېتىر قايناقسۇغا بىر كېچە-كۈندۈز چىلاپ، ئەتىسى قاندا بويىچە شىرسىنى چىقىرىپ، كالا يىلىكىنى توخۇ يېغىدا ئېرىتىپ دورىلارنىڭ شىرسى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ تەييارلىنىدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: لازىم بولغاندا تىل يېرىلغان كىشىلەر ئەتىگەن-ئاخشامدا تىلغا سۈركەيدۇ. تۈنۈڭدىن باشقا ھەر كۈنى بادام يېغى ياكى قاپاق يېغى بىلەن ياغلاپ تۇرسۇمۇ ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.

### داۋائى ۋەرەمى كام (گال ئىششىقى دورىسى)

تەركىبى: تاباشىر، قىزىلگۈل، سېمىز ئوت ئورۇقى، نشاستە، كەترا، سەمغى ۋەرەمى، نوقۇت ئونى ھەر بىرى 3 گرام، كافۇر 1 گرام.  
تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تاسقاپ تالقان قىلىپ ساقلاپ قويۇلىدۇ.





ئىشلىتىلىشى: تىل ۋە كىچىك تىلى ئىششىغان بىمارلار قايناقسۇدا ئېرىتىپ ئاغزىنى غەر-غەرە قىلدۇ.

### ھەببى خانازىر

تەركىبى: سەبرى 9 گرام، غارىقۇن 8 گرام، ئەنزەرۇت 12 گرام، شەھمى ھەنزەل 5 گرام، تۇرپۇت 21 گرام، جاۋشەر 3 گرام، تۇشۇدۇر 6 گرام، سەقمۇنيا 5 گرام.  
تەييارلىنىشى: كۆدە سۈيىدە ھەب قىلىپ 3 گرامدىن يەيدۇ.  
ئىشلىتىلىشى: گالغا (بويۇن بەزلىرىگە) چۈشكەن جاراھەتنى (لىمفا سىلىنى) داۋالايدۇ.

### گال بادامسىمان بەزىلىر ئىششىقىغا ئىشلىتىلىدىغان دورىلار

ئەگەر سەپرا ماددىسىدىن ئىششىغان بولسا ھەببى شىفاھىيە، ھەببى كافۇر، مەتبۇخى ھەلىلە، مەتبۇخى شاھتەرە، شەرىتى سىركەنجىن، سۇقۇقى ئىترىفىلى كەشىز قاتارلىق دورىلارنى كېسەلنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا قاراپ تاللاپ ئىشلەتسە بولىدۇ.

گالىنى چايقاش ئۈچۈن قارا ئۈجمە، شاتۇت، چۈچۈمەل ئالما، كاكنەج، كۆك پۇرچاق، ئارپا قاتارلىق دورىلارنى يەككە ھالەتتە قاينىتىپ سۈيىنى ئىسسىق ھالەتتە گالىنى چايقىسا ئىششىقنى تېز ياندۇرىدۇ.

سىرتىن گۈل يېغى، بادام يېغى، بىنەپشە ياغلىرىنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ سىركە ئارىلاشتۇرۇپ ياغلايدۇ.

ئەگەر بەلغەم ھادىسىدىن ئىششىغان بولسا ھەببى ئىبارەجى پەيقەرا، ھەببى قوقيا، مەئجۇنى تۇجاھ، بەرششا، مەتبۇخى ھەلىلە قاتارلىق دورىلار كېسەلنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالىغا قاراپ ئىشلىتىلىدۇ. گالىنى چايقاش ئۈچۈن بابۇنە، ئانار پوستى، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، قۇرۇق ئۈزۈملەرنىڭ ھەر بىرىدىن 15 گرام ئېلىپ 500 مىللىلېتر سۇدا بېرىمى قالغىچە قاينىتىپ، گالىنى كۈندە ئۈچ قېتىم چايقايدۇ. بىر قوشۇقتىن ئۈچ قېتىم ئىچسىمۇ بولىدۇ. سىرتىن گۈل يېغى ياكى كۈچۈلا يېغى بىلەن ياغلىسىمۇ بولىدۇ.

ئەگەر سەۋدا ماددىسىدىن ئىششىغان بولسا، سەۋدانى تازىلىغۇچى ۋە پۇشۇرغۇچى دورىلار ئىشلىتىلىدۇ.

مەسىلەن: مەتبۇخى ئەقىمۇن، مەتبۇخى بىنەپشە، مەئجۇنى تۇجاھ قاتارلىقلار،





شۇنىڭدەك قىزىلگۈل، گۈل بىنەپشە، رۇمادىيان، چۈچۈكبۇيا يىلتىزلىرىنىڭ ھەر بىرىدىن 5 گرام ئېلىپ 300 مىللىلېتر سۇدا يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ سۈزۈپ سۈيى بىلەن كېسەل كىشىنىڭ گېلى چايقىلىدۇ.

## ئاۋاز پۈتۈپ قېلىشقا ئىشلىتىلدىغان دورىلار

### مەتبۇخى خەشخاش

پوستى خەشخاش، چىلان، تۈسۈڭ تۇرۇقى، كۆك ماش، ئەنگۈر شىفا، بېھى تۇرۇقى ھەر بىرى 3 گرام، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى 5 گرام.

تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى 500 مىللىلېتر سۇغا چىلاپ يېرىم قالغىچە قاينىتىپ گال چايقىلىدۇ.

ئۇنىڭدىن باشقا نىشاستە، سەمغى ئەرەبى، كەترا، زىغى تۇرۇقى، بادام مېغىزى ھەر بىرى 15 گرام، رۇبۇسۇس 7 گرام، ئاق شېكەر 82 گرام.

تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تاسقاپ تالقان قىلىنىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: 10 گرامدىن ئۈچ قېتىم شۈمۈپ ئىچىدۇ.

يەنە ئەنگۈر شىفا 10 گرام، ئىسبەغۇل 10 گرام، بېھى تۇرۇقى 10 گرام.

تەييارلىنىشى: يۇقىرىقى دورىلارنىڭ ھەممىسىنى بىر چەينەككە سېلىپ دەملەپ قىزىق پىتى كۈندە ئۈچ قېتىم ئىچىدۇ.

ھەر خىل قۇرۇق ئىسسىق ۋە قۇرۇق سوغۇق تاماقلاردىن پەرھىز قىلدۇرۇلىدۇ.



## « كۆيغۇر تىبابەت قامۇسى » 2- جىلدا ئۇچرايدىغان ئاتالغۇلار سېلىشتۇرمىسى ☆

خەنزۇچىسى

ئۇيغۇرچىسى

ئەرەب، فارىسچىسى

ئاتالغۇنىڭ ئوقۇلۇشى

ئا

腮腺肿	تاختاي سۇ، يىرىڭلىق ئىستىقى	أَبْلَمَاءُ كَامَ (ف)	ئابلەئى كام
梅毒，坏疽	سېلىس	أَبْتَأَعُ (ف)	ئانتە شەك
火眼，红眼病	كۆز قىزىرىش	أَشْرُوبِ جَعْنَمِ (ف)	ئاشۇبى جەننەم
急性结膜炎	كۆز ئەستەرى پەردىسى ياللۇغى	كۆز ئەستەرى پەردىسى ياللۇغى	
口腔坏疽	ئېغىز گۆشخور چاقىسى	أَكْبَالُ الْقَمَرِ (ع)	ئاكئە تۇلقەمى
舌炎，舌头炎肿	تىل ۋەردىسى، تىل ئىستىقى	أَمَاسِ رَبَّانٍ (ف)	ئاماسى زەبان

☆ مەزكۇر ئاتالغۇلارنى بولماش ئابدۇرەھىم قادىر 1980-يىلى « ئۇيغۇر تىبابەت قامۇسى » نى تۈزۈشكە ياردەملەشكەندىن باشلاپ توپلان كىتى، ھازىر قايتىدىن تولۇقلاپ مەزكۇر جىلدىنىڭ ئاخىرىغا قوشۇمچە قىلدى.

鼻炎 (复)	بۇرۇن ۋەرمەلىرى	(ف)	آمّا سىھايى بېنىنى	ئاماسىھايى بېنىنى
耳炎 (复), 耳道炎, 中耳炎	قۇلاق ۋەرمەلىرى	(ف)	آمّا سىھايى كۆش	ئاماسىھايى كۆش
嘴唇炎肿 (复)	كالىپۇك ۋەرمەلىرى	(ف)	آمّا سىھايى لىب	ئاماسىھايى لىب
嘴唇炎肿 (复)	كالىپۇك ئىشىقلىرى			

ئە

打喷嚏剂	چۈشكۈرتكۈچى (دورلار)	(ع)	عَطَّش	ئەتۇش
打喷嚏	چۈشكۈرۈش	(ع)	عَطَسَ	ئەتەس
上下眼睑	قاپاقلار	(ع)	أَجْفَانُ	ئەجفان
抑制剂	تورمۇزلىغۇچى دورلار	(ع)	أَدْوِيَّةٌ رَادِعَةٌ	ئەدۋىيەئى رادىئە
消炎剂 (复)	ئىشىق قاپتۇرغۇچى دورلار	(ع)	أَدْوِيَّةٌ مُجَلِّئَةٌ	ئەدۋىيەئى مۇجەللەئە
并发性嗅觉虚弱	ئىككىلەمچى بۇزاش ئاجىزلىقى	(ع)	عَرَضُ الْخَفْفِ	ئەرزەۋلۇغە شەمى

药物蒸馏水，药露	دورا پارلىق سۇيى	عَرَق (ع)	ئەرەق
舌胖	تىل يوقىناش	عَطْمُ اللِّسَانِ (ع)	ئەزەمۇللىسانى
下弯曲骨	تۆۋەنكى ئەگرى سۆڭەك	عَظْمٌ مَلْتَوَى أَسْفَلِ (ع)	ئەزەمى مۇلتەۋىيى ئەسفەلى
筛骨	سۈزگۈچى سۆڭەك	عَظْمٌ مِصْفَاتٌ (ع)	ئەزەمى مىسفات
眼神经 (复)	كۆز نېرۋىلىرى	أَعْيَابُ عَيْنَيْهِ (ع)	ئەسايى ئەينىيە
鼻神经 (复)	بۇرۇن نېرۋىلىرى	أَعْيَابُ الْأَنْفِ (ع)	ئەسابۇلئەنفى
鼻神经 (复)	بۇرۇن پەررەك نېرۋىلىرى	أَعْيَابُ الْخَيْشُومِ (ع)	ئەسابۇلخەيشۇمى
味觉神经 (复)	تەم سېزىش نېرۋىلىرى	أَعْيَابُ ذَائِقَتِهِ (ع)	ئەسايى زائىقە
听神经 (复)	ئاڭلاش نېرۋىلىرى	أَعْيَابُ سَامِعِهِ (ع)	ئەسايى سامئە
嗅觉神经 (复)	بۇراش نېرۋىلىرى	أَعْيَابُ شَائِمِهِ (ع)	ئەسايى شامە
感觉神经 (复)	سەزگۈ نېرۋىلىرى	أَعْيَابُ حِسِّهِ (ع)	ئەسايى ھىسى

神经	نېرۋا	عَصَبٌ (ع)	نېرۋا	ئەسەب
咽喉神经	تاماق نېرۋىسى	عَصَبُ الْخَلْفِ (ع)	تاماق نېرۋىسى	ئەسەب بۇلپەنەكى
喉上神经	ئۈستۈن تاماق نېرۋىسى	عَصَبُ فَاقِ أَعْلَى (ع)	ئۈستۈن تاماق نېرۋىسى	ئەسەبى فەككى ئەلا
视神经鞘	كۆز كاۋاكاچە نېرۋىسى	عَصَبٌ مَبْجُوقٌ (ع)	كۆز كاۋاكاچە نېرۋىسى	ئەسەبى مۇجەۋۋەفە
牙齿 (复)	چىشلار	الْأَسْنَانُ (ع)	چىشلار	ئەسنان
夜盲症	ناماز شام قارىغۇسى	عَمَاءُ (ع)	ناماز شام قارىغۇسى	ئەشائە
眼科疾病 (复)	كۆز كېسەللىكلىرى	أَمْرَاضُ الْعَيْنِ (ع)	كۆز كېسەللىكلىرى	ئەمراز ۈلگەينى
鼻, 鼻子	بۇرۇن	أَنْفٌ (ع)	بۇرۇن	ئەنفى
睫毛 (复)	كۆز كېچىكلەر	أَهْدَابٌ (ع)	كۆز كېچىكلەر	ئەھداب
眼痛疼 (复)	كۆز ئاغرىش	أَوْجَاعُ الْعَيْنِ (ع)	كۆز ئاغرىش	ئەۋجائۇلگەينى
鼻炎 (复)	بۇرۇن ۋەزەملىرى	أَوْرَامُ الْأَنْفِ (ع)	بۇرۇن ۋەزەملىرى	ئەۋرامۇلگەنفى

耳炎 (复), 耳道炎,  
中耳炎

قۇلاق ۋەرمەلىرى

أَوْرَامُ الْأَذْنِ (ع)

ئەۋرامۇلئۇزنى

眼, 眼睛

كۆز

عَيْن (ع)

ئەين

## ب

非体液性寒

ماددىسىز سوغۇق  
خىلتىسىز سوغۇق

بَارْدٌ سَاذَجٌ (ع)

بارد ساذەج

物质代谢  
新陈代谢

ماددا ئاللىشىش

بَدَلٌ مَّا يَتَّحِلُّ (ع)

بەدەلى ما يەتەھەللەئۇ

鼻臭

بۇرۇن سېسىق بۇرۇش

بَخْرُ الْأَنْفِ (ع)

بەخىرۇلئەنفى

口臭

ئېغىز سېسىق بۇرۇش

بَخْرُ الْفَمِّ (ع)

بەخىرۇلقەمى

熏 (方法)

ئىسلاش (ئۆسۈلى)

بَخْرٌ (ع)

بەخۇر

睑内小粒肿 (专)

قاپاق ئىچى دانچىسىمان ئىشىقى

بِرْدَةٌ (ع)

بەردە

鼻中异物

بىد شىدىن چىزى درىيىنى (ف) بۇرۇندا غەبىرى نەرسە تۇرۇپ قېلىش

بەندە شۇدەنى چىزى

دەر يىنى

痔，痔疮	بوۋاسىر، گېھۇزوي	بوۋاسىر (ع)	بەۋاسىر
嘴唇痔疮	كالىپوك بوۋاسىرى	بوۋاسىرُ الشَّقِي (ع)	بەۋاسىرۇ شىشە فەتى
鼻痔	بۇرۇن بوۋاسىرى	بوۋاسىرُ الأنْفِ	بەۋاسىرۇلئەنفى
鼻痔	بۇرۇن بوۋاسىرى	بوۋاسىرُ يَنْبِي (ع)	بەۋاسىرى يىنبى
嘴唇发白，白唇	كالىپوك ئاقىرىش	بَيَاضُ الشَّقِي (ع)	بەيازۇ شىشە فەتى
睫毛发白 (复)	كەرىپكەلەر ئاقىرىش	بَيَاضُ الأَعْيَابِ (ع)	بەيازۇلئەھدەبى
白内障	كۆزگە ئاق چۈشۈش	بَيَاضُ العَيْنِ (ع)	بەيازۇلئەينى
味觉损亡	تەم تېتىشنىڭ يوقىلىشى	بُطْلَانُ الذُّوقِ (ع)	بۇتلانۇزۇقۇ
失去味觉	كاسلىق، ئاقلاش كۈچىنىڭ پۈتۈنلەي يوقىلىشى	بُطْلَانُ السَّمْعِ (ع)	بۇتلانۇسسەمئى
耳聋，失去听力			
失音，喉哑	ئاۋاز يوقىلىش، ئاۋاز چۈتۈش	بُطْلَانُ الصَّوْتِ (ع)	بۇتلانۇسسەۋتى



失去视力，视盲	قارنىقۇلۇق، كۆز كۆرمەسلىك	بُطْلَانُ الْبَصَرِ (ع)	بۇتلاپتۇلىمە سەرى
气，汽	يەل، گاز	بُخَارٌ (ع)	بۇخار
气，汽(复)	يەللەر، گازلار	بُخَارَاتٌ (ع)	بۇخارات
嘴唇粒肿	كالبۇك ئۇششاق مۇددارى	بُشْرُالْحَفَّتِ (ع)	بۇسۇرۇششەفەتى
鼻粒肿	بۇرۇن ئۇششاق مۇددۇر-چاقسى	بُشْرُالْأَنْفِ (ع)	بۇسۇرۇششەنقى
口腔粒肿	ئېغىز ئۇششاق مۇددۇر-چاقسى	بُشْرُالْفَمِ (ع)	بۇسۇرۇششەمى
咽喉粒肿	كالم ئۇششاق مۇددۇر-چاقسى	بُشْرُالْحَلْقِ (ع)	بۇسۇرۇششەلقى
腮粒肿	تاڭلاي ئۇششاق مۇددۇر-چاقسى	بُشْرُالْحَتَاكِ (ع)	بۇسۇرۇششەنەكى
耳粒肿	قۇلاق ئۇششاق مۇددۇر-چاقسى	بُشْرُالْأَذَنِ (ع)	بۇسۇرۇششەئىزى
视力避光	كۆزنىڭ يورۇقلۇقتىن قېچىشى	بُشْرُالْعَيْنِ (ع)	بۇشۇرۇششەيىنى
病危，危机	بەھران، كىرىزىس	بُحْرَانٌ (ع)	بۇھران

鼻子

بۇرۇن

بېنى (ف)

بېنى

ت

牙齿凹陷

چىش كاۋاكلىشى (ع)

تَاكُلُ الْأَسْنَانِ

تەمە ككوزلۇقلە سنانى

伤寒

كېزىك، تەب

تَبُّ (ف)

تەب

蛛网膜

گۈمۈچۈك تورسىمان بەردە

طَبَقَةُ حَنَكُونِيَّةٍ (ع)

تەبە قەئى ئەلگە بونىيە

毛状突起层

قاتتىق بەردە

طَبَقَةُ صَلْبِيَّةٍ (ع)

تەبە قەئى سۇلبىيە

巩膜

كۆرۈش تورسىمان بەردىسى

طَبَقَةُ شَكِيَّةٍ (ع)

تەبە قەئى شەبە كىيە

视网膜

مۈڭگۈز بەردە

طَبَقَةُ قَرْنِيَّةٍ (ع)

تەبە قەئى قەرنىيە

角膜

بالا ھەمراھسىمان بەردە

طَبَقَةُ مَشِيئِيَّةٍ (ع)

تەبە قەئى مە شىيىيە

胎盘状膜

قان تومۇزلۇق بەردە

脉络膜

结膜

ئەستەر بەردە

طَبَقَةُ مَلْتَمِيَّةٍ (ع)

تەبە قەئى مۇلتە ھەمە

虹膜	ئۈزۈمسىمان بەردە	طَبَقَةٌ عَيْنِيَّةٌ (ع)	تەبەقە ئى	ئىنەبىيە
结核热	سىل قىزىقىسى، ئورۇقلاشتۇرغۇچى قىزىقىسى	تَبِي دَرَقٌ (ف)	تەبىي دىقق	
消耗热	كىزىك قىزىقىسى	تَبِي مَحْرَقَةٌ (ف ع)	تەبىي مۇھرىققە	
伤寒热	ماي بىلەن ياغلاش (ئۈسۈلى)	تَدَهِينٌ (ع)	تەدەھىن	
搽油 (法)	ئۇلاق ئېغىرلىقى	طَرَشٌ (ع)	تەرەش	
听力下降	كۆز ئېقىمىغا رەڭدار چېكىت پەيدا بولۇش	طَرَقَةٌ (ع)	تەرەقە	
眼白色点	قۇلاق تۈۋى يېرىلمىش	تَرَقِيدٌ بِيح كَوْشِ (ف)	تەر قىيدەنى بىيىخى كۆش	
耳根裂痕	چىش كامارلىشىش	تَغْيِبُ الْأَسْنَانِ (ع)	تەسە قىتۇپۇلكە سىنانى	
牙齿空洞	كالبۇك يېرىلمىش	تَشَقُّقُ السِّنِّ (ع)	تەشەققە قۇششە قەتى	
嘴唇干裂	تىل يېرىلمىش	تَشَقُّقُ اللِّسَانِ (ع)	تەشەققە قۇللىسانى	
舌头干裂				

痉挛，抽筋

تارتىشىپ قېلىش

تَشْبِيحٌ (ع)

تەشەبىھ

诊断疾病

كېسەللەك تونۇش، دىئاگنوز

تَشْهِيْمٌ (ع)

تەشەبىھ

诊断

牙齿变色

چىش رەڭگى ئۆزگىرىش

تَغْيِرُ رَئْجِ دَنْدَانٍ (ف)

تەغىرە ئىپپۇرى رەڭگى

دەندان

牙齿危碎

چىش ئۇۋۇۋلۇش

تَقَطُّ الْأَسْنَانِ (ع)

تەقەتە تەۋلەكە سىنانى

完整形受损 (疾病)

ئەزا يۇتۇنلۇكى يۈزۈلغان (كېسەللەك)

تَقْوُقُ الْأَيْصَالِ (ع)

تەقەررۇقۇلۇكسىمالى

嘴唇脱皮

كالبۇك قاسراقلشىش

تَقَرُّ الشَّفَتِ (ع)

تەقە شىتۇرۇششەقەتى

舌皮剥脱

تىل سويۇلۇش

تَقَرُّ اللِّسَانِ (ع)

تەقە شىتۇرۇللىسانى

嘴唇剥脱

ئېمىز سويۇلۇش

تَقَرُّ الشَّفَتِ (ع)

تەقە شىتۇرۇلغەمى

嘴唇肿大

كالبۇك دورىدىش

تَقَلُّ الشَّفَتِ (ع)

تەقەلۇسۇششەقەتى

药粉湿敷 (法)

نەم دورىلارنى بەدەنگە قويۇش

تَمْرِيحٌ (ع)

تەمىرىخ

(ئۇسۇلى)

清理, 清除 (法)

تازىلاش (ئۇسۇلى)

تَهْفِيَه (ع)

تەنقىيە

耳鸣

قۇلاق غوغۇلداش

طِينِن (ع)

تەننىن

眼睑风肿

قاپاقلار يەللىك ئىششىقى

تَوْبِيحُ الْاَجْفَانِ (ع)

تەھە بۇجۇڭگە چىقانى

远视眼

يىراقتىن كۆرۈش

طَوِيلُ الْبَصَرِ (ع)

تەۋىلۇبە سەرى

调节, 调整 (法)

تەڭشەش (ئۇسۇلى)

تَعْدِيلُ (ع)

تەئدىل

眼睑软瘤

قاپاقلار يۇمشاق ئۆسۈمىسى

تَوَثَالَا جَفَانِ (ع)

تۇۋسە تۇڭگە چىقانى

眼睑桑状瘤

كۆز ئەستەر پەردىسىگە نېپىز كۆش بەيدا بولۇش

تَوَثَةٌ مَلْحَمَةٌ عَيْنِيَه (ع)

تۇۋسە ئى مۇلتەھەھە ئى

بەيدا بولۇش

ئەيىنىيە

药汁涂抹 (法)

دورا تېتىقنى سۈرۈش (ئۇسۇلى)

طَلَا (ع)

تلا

ج

细菌

مىكروب، باكتېرىيە

جَرَائِمُ (ع)

جەراسىم

沙眼, 结膜结石

كۆز قوتۇرى، تراخوما

جَرَبُ الْعَيْنِ (ع)

جەرەبۇڭگە يىنى

外科医生	تاشقى كېسەللىكلەر تېخىمى	جراح (ع)	جەراھ
手术者	ئوپېراتسىيەچى		
外科学	تاشقى كېسەللەر ئىلمى	جراحىيە (ع)	جەراھىيە
手术学	ئوپېراتسىيە ئىلمى		
嘴唇发干	كالىپۇك قۇرۇش	جفافُ الشَّفَتِ (ع)	جە قانۇقشەنە قەتى
鼻干, 鼻子发干	بۇرۇن قۇرۇش	جفافُ الأنفِ (ع)	جە قانۇقشە نىفى
舌干, 舌头发干	تىل قۇرۇش	جفافُ اللِّسَانِ (ع)	جە قانۇقشە لىسانى
眼脸	قاپاق	جفن (ع)	جە فن
宝石, 钻石, 珠宝	ياقۇت، ئالماس، ئۈنچە - مارجان	جواهرُ (ف)	جە ۋاھەر
宝石, 钻石, 珠宝 (复)	ياقۇت، ئالماس، ئۈنچە - مارجان قاتارلىق ئېسىل تاشلار	جواهرَاتُ (ف)	جە ۋاھەرات
鼻腔	بۇرۇن بوشلۇقى، بۇرۇن غارى	جوفُ الأنفِ (ع)	جە ۋۇقۇشە نىفى

麻瘋

ماخاۋ، جوزام

جُذَامُ (ع)

جوزام

高血压

يۇقىرى قان بېسىمى

جُوشَانِي خُونُ (ف)

جوشانى خون

牙齿松动

چىش سىدىرلاپ قېلىش

چىيىدِي دىندانُ (ف)

چۈنسىدەنى دەندان

چ

眼，眼睛

كۆز

چىشمُ (ف)

چەشم

上下嘴唇四脉

كالىبۇكلاردىكى تۆت تومۇز

جھارزىكى (ف)

چەھاررەك

خ

鼻痒，鼻子瘙痒

بۇرۇن قىچىشىش

خارشِ يېنى (ف)

خارشى يېنى

耳痒，耳朵瘙痒

قۇلاق قىچىشىش

خارشِ كۈشى (ف)

خارشى كۈشى

嗅觉虚弱  
或嗅觉损亡

بۇزراشنىڭ ئاجىزلىقى ياكى  
يۇقۇلۇشى

خشمُ (ع)

خەشم

视力避光

كۆزنىڭ يورۇقلۇقلاردىن قېچىشى

خشقُ (ع)

خەقەش

心悸，心慌

يۈرەك گېمىش

خفقان (ف)

خەفەقان

鼻音

ئاۋاز نوحۇلداپ قېلىش

خنان (ع)

خەنان

眼睑发育

قاپاق كۆكۈرۈش

خضرت العَيْن (ع)

خۇزۇرەتۇلجەفەنى

眼黑发干

كۆز قارىسى قۇرغاقلىشىش

خشوبت قورنیه (ع)

خۇشۇنەنى قەرنىيە

角膜干燥

بوغضا

خناق (ع)

خۇناق

白喉

传染性白喉

يۇقۇتملۇق بوغضا

خناق الوبائي (ع)

خۇناقۇتۇلۇبائى

体液，人体四种液质

بەدەندەكى سۇيۇقلۇقلار

جِلط (ع)

خىلت

眼前飞蚊症

كۆزگە پاشا-كۆمۈنە كۆرۈنۈش

جِيَلَات (ع)

خىيالات

玻璃体混浊

شىشمان سۇيۇقلۇق بۇلغۇنۇش

د

耳内入水

تۇلاققا سۇ كىرىپ كېتىش

دَرَامَدِن آب دَرَكُوش (ف)

دەرگامسەدەنى ئاق دەر

كۇش



耳内入虫	تۇلاققا ھاشارلار كىرىپ كېتىش	دِرَامِدِي حَشْرِدِرْ كُوش (ف)	دەرقامە دەنى ھەشردەر	كۆش
牙痛, 牙齿疼痛	چىش ئاغرىش	دَرْدِ دَنْدَان (ف)	دەردى دەندان	
耳痛	قۇلاق ئاغرىش	دَرْدِ كُوش (ف)	دەردى كۆش	
手工, 手术	قول ئەمەلىيىتى، ئوپېراتسىيە	دَسْتِكَاَر (ف)	دەستكار	
耳响	قۇلاق گۈكۈرەش	دَوِي (ع)	دەۋۋەي	
流泪	كۆز ياشاڭغۇزاش	دَمَعَة (ع)	دەمەتە	
耳内入水	قۇلاققا سۇ كىرىپ كېتىش	دُخُولِ مَاءٍ فِي الْأَذْنِ (ع)	دۇخۇلى ماۋ فىلئۇزنى	
耳内入虫	قۇلاققا ھاشارلار كىرىپ كېتىش	دُخُولِ هَوَامٍ فِي الْأَذْنِ (ع)	دۇخۇلى ھەۋام فىلئۇزنى	
抑制剂, 控制剂	تورمۇزلىغۇچى، قاپتۇرغۇچى،			
诱导剂, 诱导药	تەپتۇرتۇپ، ماڭدۇرغۇچى	رَادِعَات (ع)	رادىئات	
	دورۇتلار			

非体液性湿	ماددىسىز ھۆللۈك	رَطْبُ سَاذَجٍ (ع)	رەتىب سازەج
鼻子压伤	بۇرۇن ئېزىلىش	رَضُّ الْأَنْفِ (ع)	رەزىزۈلئەنفى
耳朵压伤	قۇلاق ئېزىلىش	رَضُّ الْأُذُنِ (ع)	رەزىزۈلئىزنى
火眼，红眼病	كۆز ئەستىمەر بەردە ياللۇغى	رَمَدٌ (ع)	رەمەد
急性结膜炎	كۆز قىزىرىش		
贵要正中静脉	يەتتە تومۇر، ئۆكەل تومۇر	رَكِي هَقَّتِ أُنْدَامُ (ف)	رەكى ھەقى ئەندام
抑制，消炎剂 (复)	تورمۇزلىمىغۇچى ، قاپتۇرغۇچى دەررلار	رَوَادِعَاتُ (ع)	رەۋادىئات
油剂，油膏	ياغ ، ياغ مەلھەم	رَوغَنُ (ف)	رەۋغەن
癫痫	ئىترەش	رَعْنَةٌ (ع)	رەئىئە
鼻血，鼻出血 (专)	بۇرۇن قاناش	رُعَاقُ (ع)	رۇئاق
药汁，果汁	دورا سۇيى ، مېۋە سۇيى	رُبٌّ (ع)	رۇببە

蛋白状液体	تۇخۇم ئىقىمان سۇيۇقلۇق	(ع)	رَطَوِيَّتٌ بَيْضِيَّةٌ	رۇتۇبەتتى بەيزىيە
晶状体	قوروسمان سۇيۇقلۇق قوروسمان تەنچە	(ع)	رَطَوِيَّتٌ جَلْدِيَّةٌ	رۇتۇبەتتى جەلىدىيە
玻璃体	شىشمان سۇيۇقلۇق	(ع)	رَطَوِيَّتٌ زُجَاجِيَّةٌ	رۇتۇبەتتى زۇجاجىيە
白盲，白日不视症	كۈندۈزى كۆرمەسلىك	(ع)	رُوزْكَوْرِيٌّ (ع)	رۇزكورىي
视力	كۆرۈشكە ئاقىت كۈچلەر كۆزگە كېلىدىغان روللار	(ع)	رُوحٌ بَاصِرَةٌ (ع)	رۇھى باسرىە
酒精	ئىسپىرت، ھاراق جەۋھىرى	(ع)	رُوحٌ شَرَابٌ (ع)	رۇھى شەراب
下韧带	تۆۋەنكى چاندەر	(ع)	رِبَاطٌ مُؤَخَّرٌ (ع)	رىباتى مۇئەخخەر
悬挂韧带	ئېسىلىپ تۇرغۇچى چاندەر	(ع)	رِبَاطٌ مُعَلَّقٌ (ع)	رىباتى مۇئەللەق
圆状韧带	بۇمۇلاق چاندەر	(ع)	رِبَاطٌ مُسْتَدِيرٌ (ع)	رىباتى مۇستەدىر
前韧带	ئالدىنقى چاندەر	(ع)	رِبَاطٌ مُقَدِّمٌ (ع)	رىباتى مۇقەددەم

ز

肺炎	تۆپكە ئىسقى	ذَاتُ الرِّئَةِ (ع)	زاتسورپە
舌, 舌头, 语言	تىل	زَبَانُ (ف)	زەبان
眼外伤	كۆز زەخىملىنىش	صَرْبَةُ الْعَيْنِ (ع)	زەربە تۆلەكە يىنى
耳外伤	قۇلاق زەخىملىنىش	صَرْبَةُ الْأُذُنِ (ع)	زەربە تۆلەتۈزنى
眼外伤	كۆز زەخىملىنىش	صَرْبَةُ عَيْنِ (ع)	زەربە ئى چە شىم
耳外伤	قۇلاق زەخىملىنىش	صَرْبَةُ أُذُنِ (ع)	زەربە ئى گۆش
磕牙, 牙齿酸倒	چىش قاماش	صَرْسُ الْأَسْنَانِ (ع)	زەردە سۇلۇكە سىنانى
蔚蓝色眼睛	كۆك كۆزلۈك	زُرْقَاءُ (ع)	زەرقاڭ
碧眼 (专)			
吹扑疮伤的药粉	جاراھە تىلەرگە پۇر كىلدىغان تالغان دورا	ذَرُورُ (ع)	زەرور

牙液干涸	چىش سۈيى يۇقلۇش	ذَهَابِ مَاءِ الْأَسْنَانِ (ع)	زەھابى ماگۇلئە سنانى
睫状体	كەرىپكەسەن ئۆسۈمچۈكلەر	زَوَائِدِ هَدِيئِيَّةٍ (ع)	زەۋائىدى ھۆدىيىيە
视力虚弱	كۆز ئاجىزلىقى	ضَعْفُ الْبَصَرِ (ع)	زەئفىۋىيە سەرى
瞳孔缩小	كۆز قارىچۇقىنىڭ تارىيىشى	ضَيْقُ نَقَبِيَّةٍ عَيْنِيَّةٍ (ع)	زەئفى سۇقەئى ئىنەيىيە
眼皮发青	قاپاق كۆكۈرۈش	زُرْقَتٌ (ع)	زۇرقەت
眼睑青肿	كۆك كۆزلۈك كېسىلى	زُرْقَةُ الْعَيْنِ (ع)	زۇرقە لىتۈلئە يىنى
蓝色眼睛	كۆز يۇرچىكىگە تىرناقچە كۆلۈش	ظَلْفَةٌ (ع)	زۇلفرە
碧眼 (专)	ئۆسۈش كېسىلى		
眼翼状胬肉	تارقىلىشچان زۇكام	زُكَامُ الْوَبَائِي (ع)	زۇكامۇلۈبەئىي
流行性感昌	تىل ئاستىغا قۇمچاقسەن	ضَيْعُ اللَّيْآنِ (ع)	زىغدە ئوللىسانى
舌下胎状瘤	ئۆسۈمچۈكچە پەيدا بولۇش		
敷剂或方法	چايدىغان دورا ۋە ئۆسۈل	ضِيَادٌ (ع)	زىئاد

糖尿病	قەنت سېشى كېسلى	دِيَابِيتُ (ع)	زىيائىت
非体液	ماددىسىز، خىلىتىز	سَادَجُ (ع)	سازەج
险疣	قاپاق سۆڭىكى	قَائِلُ الْحَقَنِ (ع)	سالىيولۇبجە فەنى
眼黑云膜	كۆزگە پەردە چۈشۈش	سَبَلُ (ع)	سەيەل
表面，平面	بۆزى	سَطْحُ (ع)	سەتھى
癌症，毒瘤，螃蟹	راك كېسلى، قىستۇچ باقا	سَرَطَانُ (ع)	سەرتان
鼻咽	بۇرۇن راکى	سَرَطَانُ الْأَنْفِ (ع)	سەرتانئۆلئەنقى
鼻咽	بۇرۇن راکى	سَرَطَانُ بَيْنِي (ع ف)	سەرتانى بېنى
脑膜炎	مېگە قېيى ياللۇغى	سَرَسَامُ (ع)	سەرسام
癩，癩病，羊痫疯	توتتاق كېسەل	صَرَعُ (ع)	سەرىقى

磨牙	چىش غۇچپۇرلىتىش	صَوِّرُ الْأَسْنَانِ فِي النَّوْمِ (ع)	سەدىرۈۈلگەن سىنانى قىنىنەۋم
白内障	كۆزگە ئاق چۈشۈش	سَقِيدِ جَهْمِ (ف)	سەقىدى چەشم
白唇, 嘴唇发白	كالبۇك ئاقىرىش	سَقِيدِ لَبِّ (ع)	سەقىدى لەب
脑溢血	مېڭگە قان چۈشۈش	سَكَّتِهْ (ع)	سەكتە
睑内红肿增厚	قاپاق ئىچى قىزىرىپ قېلىشىش	صَلَاةُ الْعَيْنِ (ع)	سەلاپە تۇلچەقە قەنى
研磨	ياغىش	صَلَاةُ (ع)	سەلاپە
睑瘤	قاپاق گۈسسەسى	سَلْمَةُ الْعَيْنِ (ع)	سەلمە تۇلچەقە قەنى
眼黑萎缩, 角膜萎缩	كۆز قارسىنىڭ يىگىلىشى	سَلَخِ قَرْنِيَّةِ (ع)	سەلخى قەرنىيە
鼻吸 (药粉或方法), 打喷嚏	بۇزۇلغا تارتىپ چۈشكۈر تۈش (ئۇسۇلى) دورىلىرى	سَعُوْطُ (ع)	سەئۇت
鼻烟, 催嚏剂	قاپاق كېپە كلەشش	سَقَّةُ الْعَيْنِ (ع)	سەققە تۇلچەقە قەنى
眼脸掉眉	قاپاق تەمرەتكەسى		
睑癬			
流泪	كۆز ياشاڭغۇزۇش	سَيْلَانِ آسَاكِ (ف)	سەيلانى گەشاك

淋病	سىزلام، سۆزىنەك	سۈزۈنگ (ف)	سۆزىنەك
鼻阻，鼻腔障碍物	بۇرۇن يولىغا توسالغۇ بەيدا بولۇش	سەدەۋە الخيشوم (ع)	سۇددە ئۇلغە يېتىۋىسى
粉剂，散剂， 药粉，冲剂 筛板	تالغان دورىلار تۇشۇكلۇك سۈپكەك	سۇف (ع) ئۇي مەققات (ع)	سۇقۇق سۇقۇقى مەققات
睑缘炎	قاياق كىرۋەكلىرى ئىستىقى	سۇلاق (ع)	سۇلاق
吹敷牙根药粉	چىشتا ئىستىلىدىغان تالغان دورا	سۇن (ع)	سۇنۇن
气质失调	مىراجىنىك بۇزۇلۇشى	سۇە المىراج (ع)	سۇۇلمىراجى
失调气质，异常气质	بۇزۇلغان مىراج، نورمالسىز مىراج	سۇە مىراج (ع)	سۇۋى مىراج
恶性气质失调	يامان خاراكىرلىك مىراج بۇزۇلۇش	سۇە مىراج دى (ع)	سۇۋى مىراج رەددىسى



ش

夜盲 (症)	ناماز شام قارمۇسى	شَبَّ كُورَى (ف)	شەب كورەيى
瘰癧性眼臉炎	قاياق قىچىشىش خاراكتېرلىك ئىشقى	شَرَى (ع)	شەرا
糖浆, 合剂	شەربەت	شَرِبْتْ (ع)	شەربەت
动脉	قىزىل قان تومۇرى ھەرىكەتلىك تومۇر	شَرَّانْ (ع)	شەريان
颈内动脉	ئۆيىقۇ ئارتىرىيىسى	شَرَّانْ سَئانْ (ع)	شەرياننى سۆيىات
翻眼皮	قاياقنىڭ تېشىما كۆرۈلۈپ قېلىشى	شَرَّو (ع)	شەتوھ
嘴唇	كالىپزىك	شَقَّتْ (ع)	شەفەت
上下嘴唇	كالىپزىكلار	شَقَّتَيْن (ع)	شەفەتقەين

偏头痛

باشنىماڭ يېرىدى ئاغرىش ، شەققە (ع) شەققە شەققە

芳香药

بۇزراقلىق دورا ، بۇزۇتۇش (ئۇسۇلى) (ع) شومۇم شەمۇم

闻吸 (法)

倒睫

تەتۈر كرىپك (ع) شەر مقلب شەئ مۇنقىلىپ

麦粒肿

يىڭناسقۇ (ع) شەئىرە شەئىرە

眼睑脂肪瘤

قاپاق ياغسىمان ئۆسۈمى (ع) شىراق شىراق

舌头干裂

تىل يېرىلىش (ع) شىقائى اللسانى شىقائۇللسانى

耳后裂疮

قۇلاق كەينى يېرىلىش (ع) شىقائى أصل الأذن شىقائى ئەسلۇلتۇزنى

眼黑干裂, 角膜干裂

كۆز قارىسى يېرىلىش (ع) شىقائى قۇزىئە شىقائى قەرزىئە

栓剂, 条状药剂

شامچە دورا (ع) شىقائى شىقائى

舌重, 发音笨重

تىل ئېغىرلىقى (ع) ئىقل اللسانى سقۇللسانى

发音困难

粗，稠，浓	بىرىك، قوپۇق	غَلِيظٌ (ع)	غەلىز
眼白云翳	كۆزگە چۈشكەن نېپىز ئاق	غَنَامٌ (ع)	غەمام
唾液腺	شۈلگەي بېزى	غُدَّةٌ عَرَوِيَّةٌ (ع)	غۇددەئى ئەرقىيىيە
泪腺	باش بېزى	غُدَّةُ الدَّمْعِ (ع)	غۇددەتۇد دەمئى
眼内眦腺瘤	كۆز ئىچكى بۇرجىكى بەز گۈسسسى	غُدَّةٌ كَوْنُوسِيَّةٌ (ع بى)	غۇددەئى گۈشەئى چەشى
小翼软骨	بۇقۇرقى يان كۆمۈرچەك	غُضْرُوفُ جَانِبِيَّةٍ أَعْلَى (ع)	غۇزۇرۇفى جانىبەئى ئەلا
大翼软骨	تۆۋەنكى يان كۆمۈرچەك	غُضْرُوفُ جَانِبِيَّةٍ سَفْلَى (ع)	غۇزۇرۇفى جانىبەئى سۇفلا
鼻侧软骨，翼状软骨	قاناسان كۆمۈرچەك	غُضْرُوفُ جَانِبِيَّةٍ (ع)	غۇزۇرۇفى جەناھىيە
分隔软骨	بۆلگۈچى كۆمۈرچەك پاسل	غُضْرُوفُ قَاصِلٌ (ع)	غۇزۇرۇ فى فاسل
鼻中隔软骨			

软骨膜

كۆمۈرچەك بەردە

غِشَاءُ خُضْرَوُفِي (ع)

غىشائى غۆزۈرۈفەي

粘膜

ئىشلىق بەردە

غِشَاءُ مَخَاطِي (ع)

غىشائى مۇخاتىي

晶状体壳

قوروسمان سۇيۇقلۇق قېنى

عِلَاقِي رُطَبَاتِ جَلْدِيَّةِ (ع)

غىلافي رۇتۇبەتى جەلىدىيە

ف

瘫痪，半身不遂

بالەج

فَالَج (ع)

فالەج

嗅觉力失调

بۇزاش قۇۋۋىتىنىڭ بۇزۇلۇشى

فَسَادُ السَّمِّ (ع)

فەسادۇ شىئەممى

觉力失调

تېتىش قۇۋۋىتىنىڭ بۇزۇلۇشى

فَسَادُ الزُّوقِ (ع)

فەسادۇ زۇزۇقۇ

口，口腔

گېنىز

فَمِّ (ع)

فەم

ق

涩(味)的，抓住的，  
能止泻的

قورغۇچى ، تۇتقۇچى  
ئىمچىنى توختاتقۇچى

قَابِضُ (ع)

قابىز

滴，药水滴法

تامچە ، دورا تامغۇزۇش

قَطْر (ع)

قەتر

滴剂	تېتىلما، تېتىلما	قَلَرُ (ع)	قەتۇر
玻璃杯	گەينەك رومكا	قَدَحُ (ع)	قەدەھ
眼科手术(专)	كۆز ئوپېراتسىيىسى		
眼外科医生	كۆز ئوپېراتسىيىسى تېۋىبى	قَدَاحُ (ع)	قەدداھ
眼内异物	كۆزگە يات جىسىملار كىرىپ كېتىشى	قَدَا (ع)	قەزا
牙垢，齿锈(专)	چىش تۈۋرۈگە گەجىسمان قېتىشىلار پەيدا بولۇش	قَلَحُ (ع)	قەلەھ
牙垢，齿锈(专)	چىش تۈۋرۈگە گەجىسمان قېتىشىلار پەيدا بولۇش	قَلَحُ الأَسْنَانِ (ع)	قەلەھەۋلەكە سىنانى
饼状药片	توقچىاق، توقچىاق دورا	قُرصُ (ع)	قۇرۇس
药片	تابلىت دورا		
眼底黄斑圈	كۆز توقچىقى	قُرصُ العَمْرُ (ع)	قۇر سۇلبە سەرى

嘴唇浓疮	كالبوك يىرىكلىق چاقىسى	فُرُوحُ السَّقْتِ (ع)	قۇرۇھۇششە فەتى
鼻脓疮	بۇرۇن جاراھىتى	فُرُوحُ الْأَنْفِ (ع)	قۇرۇھولئە نغى
牙根脓疮	چىش مولۇكى يىرىكلىق جاراھىتى	فُرُوحُ اللَّيْثِ (ع)	قۇرۇھوللسە ئى
耳浓疮	قۇلاق يىرىكلىق چاقىسى	فُرُوحُ الْأَذْنِ (ع)	قۇرۇھولئۇزنى
鹅口疮	ئېغىز پىتلاقسماڭ يارىسى	فَلَاغُ (ع)	قۇلاھ
口腔炎	ئېغىز ۋەرسى		
眼花	نۇردىن كۆز تورلىشىش	قُمُورُ (ع)	قۇمۇر
营养力 (复)	ئۇزۇقلاندۇرغۇچى كۈچلەر	قَوَايُ غَايِيَّةٍ (ع)	قۇۋايى غازىيە
使动力 (复)	ھەرىكەتلىنىدۇرغۇچى كۈچلەر	قَوَايُ مَحْرَكَةٍ (ع)	قۇۋايى مۇھەررىكە
视力, 视觉力	كۆرۈش كۈچى، كۆرۈش قۇۋۋىتى	قُوَّةُ بَاصِرَةٍ (ع)	قۇۋۋە ئى باسەرە
味觉力	تېتىش قۇۋۋىتى	قُوَّةُ ذَائِقَةٍ (ع)	قۇۋۋە ئى زائىقە
体内味觉力	ئىچكى تەم سېزىش كۈچى	قُوَّةُ ذَائِقَةٍ بَاطِنِيَّةٍ (ع)	قۇۋۋە ئى زائىقە ئى بائىنىيە

听力	ئاڭلاش كۈچى	قُوَّةِ سَمْعِهِ (ع)	قۇۋۋەتى سامىئە
嗅觉力	بۇرۇش كۈچى	قُوَّةِ شَمِّهِ (ع)	قۇۋۋەتى شامىئە
体内嗅觉力	ئىچكى بۇرۇش كۈچى	قُوَّةِ شَمِّهِ بَاطِنِيهِ (ع)	قۇۋۋەتى شامىئە ئى بانىنىيە
触觉力	سېزىش كۈچى	قُوَّةِ لَامِسِهِ (ع)	قۇۋۋەتى لامىئە
捏住力, 住留力	تۇتۇپ تۇرغۇچى كۈچ	قُوَّةِ مَاسِكِهِ (ع)	قۇۋۋەتى ماسكىئە
肘窝头静脉	قىيىال نومۇر	قَيْيَالُ (ع)	قىيىال
ك			
腔内硬粒	قاپاق ئىچى قاتتىق قاپارتىچۇقى	كَدْدَمَلُ (ع)	كەدودۇمىمۇل
流口水	شۇلاگەي ئېقىش	كَثْرَةُ السَّلَابِ (ع)	كەسەرەتوللۇقانى
乳糜	شۇمۇرۇلۇشكىگە لايىقلاشقان ئۇزۇقلۇقلار	كَيْلُوسُ (ع)	كەيلىۇس

食糜      ھىسسىقلىقىنىڭ ئايىقلاشقان      كىيىمۇس (ع)      كەيىمۇس  
ئوزۇقلۇقلار

风性睑内炎      كۆزگە قۇم تىقماقاندەك بولۇش      كىمىئە العىن (ع)      كۆمىنە تۇلجىچە فەنى

风性睑内炎      كۆزگە قۇم تىقماقاندەك بولۇش      كىمىئە بىلك (ع ف)      كۆمىنە ئى بەلەك

眼药粉      كۆزگە ئىسلىتىلدىغان تالقان      كۆزگە      كۆمىل (ع)      كۆھل

دورا

热敷 (法)      ئىسقىيۇپ كۆزگە قويۇش (ئۇسۇلى)      ئىسقى      كىماد (ع)      كىماد

泪腺      ياش خالىسى      ياش خالىسى      كىمىئە الدمىع (ع)      كىيە تۇد دەمى

گ

碧眼 (专), 蔚蓝色眼睛      كۆك كۆزلۈك      كۆرپە چىم (ف)      كۆزبە ئى چە شىم

耳, 耳朵      قۇلاق      كۆش (ف)      كۆش

眼翼状胬肉      كۆزگە قاناتچە كۆش ئۆسۈش      كۆزگە      كىل چىم (ف)      كىل چە شىم



ل

眼球凹陷	كۆز ئولتۇرۇشۇش	لاغرچىم (ف)	لاغەرى چەشم
嘴唇	كالىپاك	لَب (ف)	لەب
娇嫩, 易消化	يۇمشاق، ئاسان سىگىدىغان	لَطِيف (ع)	لەتپى
鼻闻法 (专)	پۇرۇتۇش (ئۇسۇل)	لَخْلَخَة (ع)	لەخلەخە
口吃	كېكەچلىك	لَكْنَةُ اللِّسَانِ (ع)	لەكنە تۇللسانى
面瘫, 面神经瘫痪	يۈز پارچى	لَقْمَة (ع)	لەقۇە
巴旦木状腺 扁桃腺	بادامسان بەزلىرى	اللوزتين (ع)	لەۋزەتەين
药汁, 药	شەرى دورىلار	لَسَاب (ع)	لۇساب
口吃结巴	كېكەچلىك	لَقْمَةُ اللِّسَانِ (ع)	لۇسقىمە تۇللسانى
咬舌发音	تىلىنى چاپىناپ سۆزلەش		

舌, 舌頭

تىل

لِسَانٌ (ع)

لسان

齿齦出血

چىش تۆۋى قاناش

إِثْمَاءٌ دَامِيَةٌ (ع)

لىسەئى دامىيە

م

眼部两侧

كۆز ئىككى يېنى

مَاقِنٌ (ع)

ماقەين

眼部两侧静脉

كۆز ئىككى يېنىدىكى تومۇز

果汁

مېۋە سۈيى

مَاءُ الْفَوَاكِهَةِ (ع)

مائۇلەمەۋاكە

汤剂

قايناتما

مَطْبُوعٌ (ع)

مەتبۇخ

鼻泪管

بۇرۇن ياش كانالىسى

مَجْرَاءُ الْأَنْفِ (ع)

مەجرا ئۇلگە نىقى

上呼吸道

ئاماق يۇقىرى كانلى

مَجْرَاءُ حَنَاقٍ مَقْدَمٌ (ع)

مەجرا ئى ھەنەكى

مۇقەددەم

泪管

ياش كانالىسى

مَجْرَى الدَّمْعِ (ع)

مەجرا دەمەئى

病, 疾病, 症

كېسەللەك

مَرَضٌ (ع)

مەرەز

原发性疾病	ئەسلىي كېسەللىك بىرلەمچى كېسەللىك	مورفېن أَصْلِيَّ (ع)	مەرەزى ئەسلىي
形变性疾病 变态性疾病	ئەزا شەكىلى ئۆزگەرگەن كېسەللىكلەر تەركىب كېسەللىكلىرى	مورفېن تَرْكِيْبِيَّ (ع)	مەرەزى تەركىب
并发症疾病	ئىككىلەمچى كېسەللىك	مورفېن شَرِكْ (ع)	مەرەزى شىرىك
同发性疾病 合并性疾病 混合性疾病	ئورتاق كېسەللىك بىرلەشمە كېسەللىك ئارىلاشما كېسەللىك	مورفېن مَشْتَرَكْ (ع)	مەرەزى مۇشتەرىك
软膏, 油膏	مەلھەم	مورھەم (ع)	مەرھەم
汗孔	تەرتۇشتۈكلۈرى	مَامَّام (ع)	مەسام
关节炎	مۇناسىل، رېماتىزىم	مَقَاصِلْ (ع)	مەفاسىل
通道, 管道	يول، كانالچە	مَسْطَقْ (ع)	مەنقىز

先天性嗅觉虚弱	تۇغما بۇرۇش سېزىمىنىڭ ئاجىزلىقى	مولود الخشم (ع)	مەۋلۇدۇلخەشمى
蜜膏剂	ھەسەللىك خېمىر دورا	محبون (ع)	مەھبۇن
糖膏剂	شېكەرلىك خېمىر دورا	محللات (ع)	مۇئەددىلەت
调节剂 (复)	تەڭشەلگۈچى دورىلار	محللات (ع)	مۇئەددىلەت
改变气质剂 (复)	مىزاج ئۆزگەرتكۈچى دورىلار	محللات (ع)	مۇئەددىلەت
眼睛附属器	كۆز قوشۇمچە ئەزالىرى	متعلقات چشم (ع ف)	مۇئەئەللقاتى چەشم
麻醉剂 (复)	مەس قىلىۋېتىدىغان دورىلار	مخدرات (ع)	مۇخەددىرات
失觉剂 (复)	سېزىمىنى يوقىتىۋېتىدىغان دورىلار	مخدرات (ع)	مۇخەددىرات
排泄剂 (复)	سۈرۈپ چىقارغۇچى دورىلار	مخرج (ع)	مۇخرىج
催泪剂	ياش ئاقتۇرغۇچى دورىلار	مديمات (ع)	مۇدەممەت
果酱，蜜饯	مۇزىيا	مرى (ع)	مۇرەببا
松解剂 (复)	بوشتاشتۇرغۇچى دورىلار	موجيات (ع)	مۇرخىيات

松解剂	بوشا شتۇرغۇچى دورا	مرجئيه (ع)	مۇرخىيە
眼黑突出	كۆز قارىسىنىڭ بولنىپ چىقىشى	مورسوج (ع)	مۇرسەسوج
泻泄剂, 泻药 (复)	تازىلىغۇچى دورىلار	مىهلات (ع)	مۇسھلات
泻泄剂, 泻药	تازىلىغۇچى دورا	مىهل (ع)	مۇسھل
粘液质泻泄剂	بەلغەم سۇرگىسى	مىهل بلىغم (ع)	مۇسھلى بەلغەم
胆汁质泻泄剂	سەپرا سۇرگىسى	مىهل صفراً (ع)	مۇسھلى سەفرا
软, 缓和, 温和	يۇمىناق, بوش, مۇلايىم	ملىن (ع)	مۇلەيىن
缓和剂 (复)	يۇمىناقچى دورىلار	ملىنات (ع)	مۇلەيىنات
眼结膜	كۆز گەستەر پەردىسى	ملىجمە ۋە عىنيە (ع)	مۇلئەھەمەتى گەيىنيە
睑结膜 (复)	قاپاق گەستەر پەردىسى	ملىجمە ۋە جىنيە (ع)	مۇلئەھەمەتى جەفەنيە
润滑剂 (复)	سلىقلاشتۇرغۇچى دورىلار	مىجريات (ع)	مۇنجىرىيات

致病液体成熟剂

بىسۈرغۇچى دورا

مَنْفِجٌ (ع)

مۆزىنج

成熟剂

眼球, 眼珠

كۆز يۇمىلىقى، كۆز ئالمىسى

مَقْلَةٌ (ع)

مۇقلە

软化剂, 溶化剂

يۇمشاتقۇچى، ئېرىتىگۈچى دورا

مَحْلَلٌ (ع)

مۇھەلل

软化剂, 溶化剂 (复)

يۇمشاتقۇچى، ئېرىتىگۈچى دورىلار

مَحْلَلَاتٌ (ع)

مۇھەلللەت

气质, 资质, 天资

مزاج

مِزَاجٌ (ع)

مىزاج

声门, 咽喉

يۇتقۇنۇنچاق

مِزْمَارٌ (ف)

مىزمار

ن

眼癍

瞖癍

化脓性泪囊癍

كۆز ئاقىسى  
كۆز ئىچكى بۇرجىكى ئاقىسى  
ياش خاكا يىرىخلىق ئاقىسى

نَاصُورُ الْعَيْنِ (ع)

ناسۈرۈلگەينى

牙龈癍

جىش مۇلۇكى ئاقىسى

نَاصُورُ الْإِلْتِمَاءِ (ع)

ناسۈرۈللەسەئى

耳癍

قۇلاق ئاقىسى

نَاصُورُ الْأَذْنِ (ع)

ناسۈرۈلئەزنى

耳燥燥音	قۇلاقنىڭ ئاۋازدىن قېچىشى	تَرَاكَّتْ كُوشُ (ف)	نەزەكتە كۈتۈش
感冒，伤风	زۇكام، نومۇ	تَرَلَم (ع)	نەزەلە
热感冒	ئىسسىق زۇكام	تَرَلَمَ حَازَر (ع)	نەزەلە ئى ھار
吸鼻药，鼻烟	يۇرۇنغا تارتىدىغان دورا	تَشْوَق (ع)	نە شوق
产后血，分娩血 恶露	چىللە خۇنى	تَفَّاس (ع)	نە فاس
吹，吹入	پۇر كۈش	تَفْوُخ (ع)	نە فۇخ
眼睑粒状疮	قاپاق ئۇششاق جاراھىتى	تَبَلَّةُ الْعَيْنِ (ع)	نە مە تۇلجە فەنى
草药浸剂 (外用)	قۇيۇلىدىغان سۇيۇق دورا	نَطْوُل (ع)	نۇتۇل
眼球突出	كۆز يولتىشىش	تَبْوُ الْعَيْنِ (ع)	نۇتۇتۇلگە يىنى
青光眼	كۆزگە سۇ چۈشۈش	تَزْوُلُ الْمَاءِ (ع)	نۇزۇلۇلما
吹扑药 (粉剂)	پۇر كۈلىدىغان دورا	تَفْوُخ (ع)	نۇفۇخ

黄斑

سېرىق نۇقتا  
سېرىق داغ

نُقَطَةُ زَرَدٍ (ع ف)

نۇقتەنى زەر

药浸

چىلانىما

نُوعٌ (ع)

نۇتۇق

۵

眉毛

قاش

حَاجِبٌ (ع)

ھاجىب

眉毛 (复)

قاشلار

حَاجِبِينَ (ع)

ھاجىبەين

非体液性热

ماددىسىز ئىسسىق  
خىلىتىز ئىسسىق

حَارَسَائِدٌ (ع)

ھارر سارەج

小丸药, 颗粒药

ھەب دورا، كىچىك پىلۇل  
دورا

حَبٌّ (ع)

ھەبە

肘静脉

بىلەك كوك قانتومۇزى

حَيْلُ الذَّرَائِعِ (ع)

ھەبىلۇزۇر براكى

耳避燥音

قۇلاقنىڭ ئاۋازدىن قېچىشى

هَرَبُ الْأُذُنِ (ع)

ھەربۇلئۇزۇنى



牙垢, 齿锈 (专)	چىش تۈۈنگە گەجىسمان قېتىمىلار بەيدا بولۇش	حَقْرُ (ع)	ھەقەر
咽喉	حال	حَلَقٌ (ع)	ھەلق
腭	تاغلاي	حَنَكٌ (ف)	ھەنەك
体外五种感觉	تاشقى بەش سەزگۈ	حَوَاسُ خَمْسَةٍ ظَاهِرِيٍّ (ع)	ھەۋاسى خەمسە زاھىرىي
新鲜空气, 清洁空气 氧气	ساپ ھاۋا، تازا ھاۋا ئوكسىگىن، كىسلارۇد	هَوَائِيٌّ نَسِيْبِيٍّ (ع)	ھەۋايى نەسىبىي
斜眼	ئالغايلىق	حَوَلٌ (ع)	ھەۋەل
后房	ئارقا ھوجرا	حِجْرَةٌ مُؤَخَّرَةٌ (ع)	ھۇجرە ئى مؤئخخەرە
前房	ئالدى ھوجرا	حِجْرَةٌ مُقَدَّمَةٌ (ع)	ھۇجرە ئى مؤقەددەمە
睫毛	كىرىپەك	هَدَبٌ (ع)	ھۇدەب
眼球凹陷	كۆزنىڭ ئولتۇرۇشۇپ كېتىشى	هَضَالُ الْعَيْنِ (ع)	ھۇزالاۋىلئەكىنى
灌肠 (法)	كلرما قىلىش (ئۇسۇلى)	حَقْنَةٌ (ع)	ھۇقنە

线状乳头	بېسىمان ئۆسۈكۈچە	حَلِيْمَاتٌ خَيْطِيَّةٌ (ع)	ھۆلە يېماتى خەيتىيە
蘑菇状乳头	موگوسمان ئۆسۈكۈچە	حَلِيْمَاتٌ فُفْرِيَّةٌ (ع)	ھۆلە يېماتى فوترىيە
糠状乳头	خەندەكسان ئۆسۈكۈچە	حَلِيْمَاتٌ مَغْدَقِيَّةٌ (ع)	ھۆلە يېماتى مۇخەندەقە
鼻子烧酸	بۇرۇن ئېچىش	حِرْقَةٌ الْأَنْفِ (ع)	ھىرقە تۇلكە نىقى
舌子烧酸	تىل ئېچىش	حِرْقَةٌ اللِّسَانِ (ع)	ھىرقە تۇلكە نىقى
鼻子发痒	بۇرۇن قىچىش	حِكَّةُ الْأَنْفِ (ع)	ھىككە تۇلكە نىقى
眼睑痒	قاپاق قىچىش	حِكَّةُ الْعَيْنِ (ع)	ھىككە تۇلكە نىقى
舌头发痒	تىل قىچىش	حِكَّةُ اللِّسَانِ (ع)	ھىككە تۇلكە نىقى
咽喉发痒	ھال قىچىش	حِكَّةُ الْحَنَاقِ (ع)	ھىككە تۇلكە نىقى
耳朵发痒	قۇلاق قىچىش	حِكَّةُ الْأُذُنِ (ع)	ھىككە تۇلكە نىقى
眼结膜发痒	كۆز ئەستەر بەردىسى قىچىش	حِكَّةُ مَلْتَمَعَةٍ عَيْنِيَّةٍ (ع)	ھىككە نىقى مۇلتەھەمە نىقى ئە يىنىيە

挨罐放血 (法)	لوڭقا قويۇپ قان چىقىرىش (ئۇسۇلى)	جِيَامَتْ (ع)	ھىجامەت
共同感觉, 综合感觉	ئورتاق ھېس قىلىش	جِي مَشْتَرَكْ (ع)	ھىسى مۇشتەرىك
ئۆ			
颞颥打喷嚏	كۆپ چۈشكۈرۈش	عَطَّاسْ (ع)	ئۇناس
耳, 耳朵	تۇلاق	الْأذن (ع)	ئۇزن
掉牙	چىش چۈشۈش	أَقْتَادَنِي دَنْدَانْ (ف)	ئۇقتادەنى دەندان
腐败, 腐烂	چىرىش, سېسىش	عَفْوَنَتْ (ع)	ئۇفۇنەت
感染	يۇتۇلمىشى		
眼睑长粒	قاپاققا تۈگۈنچەك پەيدا بولۇش	عَقْدَةُ الْعَيْنِ (ع)	ئۇقدەتولچەكەنى
贵要正中静脉	ئۈكەمەل تومۇز, يەتتە تومۇز, قىقال ۋە باسلىق تومۇزدىن ھاسىل بولغان تومۇز	أَكْثَلْ (ع)	ئۈكەمەل

牙痛	جش ئاغرىش	وَجَعُ الْأَسْنَانِ (ع)	ۋەجئۇئاڭئە سىنانى
舌痛	تىل ئاغرىش	وَجَعُ اللِّسَانِ (ع)	ۋەجئۇلىسانى
耳痛	تۇلاق ئاغرىش	وَجَعُ الْأَذْنِ (ع)	ۋەجئۇئىئۇزىنى
硬泡性眼结膜炎 眼白硬粒	كۆز ئېقىمى قاتتىق مۇلدۇر بەيدا بولۇش	وَدَقَّةُ (ع)	ۋەدەقە
鼻炎	بۇرۇن ياللۇغى	وَرَمُ الْأَنْفِ (ع)	ۋەرەمۇئاڭئە نىفى
眼睑炎	قاپاق ياللۇغى	وَرَمُ الْعَيْنِ (ع)	ۋەرەمۇئاڭجە قەنى
口腔炎	ئېغىز ياللۇغى	وَرَمُ الْقَمَرِ (ع)	ۋەرەمۇئاڭقە مىنى
舌炎	تىل ياللۇغى	وَرَمُ اللِّسَانِ (ع)	ۋەرەمۇئاڭلىسانى
腮炎	ئاڭخلاي ياللۇغى	وَرَمُ الْخَتَلَعِ (ع)	ۋەرەمۇئاڭلە نەكى
耳炎	تۇلاق ياللۇغى	وَرَمُ الْأَذْنِ (ع)	ۋەرەمۇئاڭئۇزىنى

鼻炎	بۇرۇن ياللۇغى	ورم يېنى (ف)	ۋەرمى بىنى
慢性鼻炎	سوزۇلما بۇرۇن ياللۇغى	ورم يېنى مۇزىن (ف)	ۋەرمى بىنى مۇزىن
牙龈炎	چىش مۇلۇكى ياللۇغى	ورم اللتە (ع)	ۋەرمۇللىسەنى
静脉	كۆك قان تومۇرى	وريد (ع)	ۋەرىد
耳聋	كاس، ياك	وقر (ع)	ۋەقەر
نى			
瞳孔散大	كۆز قارىچۇقىنىڭ كېڭىيىشى	اتساع المچوفە (ع)	ئىتسە تۇلۇمۇجە ۋەفە
嘴唇抽紧	كالبۇك تارتىشىش	اختلاج الشفت (ع)	ئىختىلا جۇششە فەنى
眼皮跳	قاپاق لىكىلداتىش قاپاق تارتىش	اختلاج العفن (ع) قاپاق تارتىش	ئىختىلا جولىجە فەنى
眼睑下垂	قاپاق ساڭگىلاش	استرخاء العفن (ع)	ئىستىرخا ئۇلجە فەنى

排泄，排出	چىقىرىش، سۈرۈپ چىقىرىش	إِسْتِغْرَاحٌ (ع)	ئىستىغراغ
纯肉汤	كۆشىنىلا قىلىنغان شورپا	إِسْفِيدِيَابُجٌ (ع)	ئىسفيدىياج
睫毛粘连	كۆپەك چاپلىشىش	إِلْتِصَاقُ الْأَهْدَابِ (ع)	ئىلتىساقولغەھىدائى
炎症，炎肿	ۋەرەم، يالغۇخ، ئىشىق	إِلْتِهَابٌ (ع)	ئىلتىھاب
嘴唇炎	كالبۇك ۋەرسى	إِلْتِهَابُ الشَّفَتِ (ع)	ئىلتىھابۇشەفەتى
鼻炎	بۇرۇن ۋەرسى	إِلْتِهَابُ الْأَنْفِ (ع)	ئىلتىھابۇئانەنفى
扁桃腺炎	بادامسىمان بەزىلەر ياللۇغى	إِلْتِهَابُ اللُّوزَتَيْنِ (ع)	ئىلتىھابۇلۇزەتەينى
悬雍垂炎	كىچىك تىل ۋەرسى	إِلْتِهَابُ الْأَلْهَاتِ (ع)	ئىلتىھابۇللەھات
小舌炎	تىل ۋەرسى	إِلْتِهَابُ اللِّسَانِ (ع)	ئىلتىھابۇللىسانى
舌炎 咽喉炎	ھال ئىشىقى	إِلْتِهَابُ الْحَلَقِ (ع)	ئىلتىھابۇلھەلقى
耳炎，中耳炎	قۇلاق ۋەرسى	إِلْتِهَابُ الْأُذُنِ (ع)	ئىلتىھابۇئۇزۇتى

眼结膜炎	كۆز ئەستىر بەردىسى پاللوئى	الْهَابِ مَلْتَمَهٍ وَعَيْنِيَه (ع)	ئىلتىھابى مولتەھەمەكى	ئەينىيە
外科学	تاشقى كېسەللەر ئىلمى	عِلْمِ جَوَاحِيَه (ع)	ئىلمى جەدراھىيە	
手术学	ئوپېراتسىيە ئىلمى			
散光眼	كۆزنىڭ نۇر يىغالماسلىقى	اِنْتِشَارُ الْبَصَرِ (ع)	ئىنتىشارۇلبەسەرى	
睫毛脱落	كۆپىك چۈشۈش	اِنْتِشَارُ الْاَهْدَابِ (ع)	ئىنتىشارۇلكەھدەبى	
风肿	بەللىك ئىشتىق	اِنْتِشَاقُ (ع)	ئىنتىشاق	
眼睑风肿 (复)	قاپاقلار يەللىك ئىشتىقى	اِنْتِشَاقُ الْاَجْفَانِ (ع)	ئىنتىشاقخۇلكەجفانى	
风湿性睑肿 (复)	بۇرۇن كۆپۈشۈپ قېلىش	اِنْتِشَاقُ الْاَنْفِ (ع)	ئىنتىشاقخۇلكەنفى	
鼻子风肿	بۇرۇن يەللىك ئىشتىقى			
风湿性鼻肿	كۆز ئەستىر بەردە يەللىك ئىشتىقى	اِنْتِشَاقُ مَلْتَمَهٍ وَعَيْنِيَه (ع)	ئىنتىشاقخى مولتەھەمەكى	ئەينىيە
眼结膜风肿				
风湿性眼结膜肿				
耳疮出血	قۇلاق چارھەتلىنىپ قاناش	اِنْفِجَارُ الْاَذْنِ (ع)	ئىنتىفجارۇلتۇزنى	

鼻子萎缩

بۇرۇن قورۇلۇش

إِنْقِصَابُ الْأَنْفِ (ع)

ئىنقىسازۋانگە نىقى

药蒸发汗 (法)

ھورلاندىۇرۇپ تەزلىتىش (ئۇسۇلى)

إِنْكَبَابٌ (ع)

ئىنكىباب

充, 充胀

توشۇق، توشۇپ قېلىش، كۆيۈش

إِمْتِلَاءٌ (ع)

ئىمتىلاۋ

充血

قانغا توشقان، قانغا تولغان

إِمْتِلَاءُ الدَّمِّ (ع)

ئىمتىلا تۇتۇدەمى

鼻中异物

بۇرۇندا غەيرىي نەرسىلەر تۇرۇپ قېلىش

إِحْتِباسُ الشَّيْءِ فِي الْأَنْفِ (ع)

ئېھتىباسۇششەئى فىلگە نىقى

适度, 平衡  
均衡

مۇۋاپىق دەرىجىدە، تەڭپۇڭ  
ھالەت، تەكشى

إِعْتِدَالٌ (ع)

ئىعتىدال

تىراھات: ① مەزكۇر لۇغەتنى تۈزۈشتە ۋە بەھرىۋانچە ۋاھىرى « ۋ مۇۋاپىقلىق كەبرى » ، « مۇۋاپىقلىقلىغى » ، « مۇۋاپىقلىقى » ، « فىروزۇل لۇغەت » ، « جەدد ئوردۇلۇغان » ، « گەرەبچە - خەنزۇچە لۇغەت » ، « ئارسچە - خەنزۇچە لۇغەت » ، « خەنزۇچە - گەرەبچە تۈرلەرگە ئايرىلغان سۆزلۈكلەر قوللىنىشى » قاتارلىقلاردىن پايدىلىنىلدى.

② ئابدۇلھىمىد يۈسۈفى، ئىسائىل قادىر، ھەبىيۇلا ئېلى ئەرەب - فارىسچە ئاتالغۇلارنى ئۇستىدىن كۆرۈپ بەردى، ئىخەتەتجان ئىسائىل ئەرەبچە - فارىسچە ئاتالغۇلارنى ئۆزۈش ۋە رەتلىشىگە كۆپ ياردەملەشتى. بۇ يولدا ئىشلارغا كۆپ رەھمەت ئېيتىدىغانلىقىنى بىلدۈرمىدى.

③ ئاتالغۇلار ئامال بار سايلاشتۇرۇشقا تىرىشلىدى، ئەرەبچە ئاتالغۇلارغا (ع)، فارىسچە ئاتالغۇلارغا (ف)، فارىلارغا ئەرەبچىدىن قوبۇل قىلىنىپ كۆرۈلگەن ئەرەب - فارىسچە بىرىكمە ئاتالغۇلارغا (ع ف) ياكى (ف ع) دېگەن بەلگىلەر قويۇلدى.

④ كېيىن توپلام قىلىشتا مۇكەممەلەرەك بولۇشى ئۈچۈن، جاننا چاپلىرىغا ئۇستاز ۋە كەسىپدا ئىشلارنىڭ ئۆزۈش بىرىشى ئۈمىد قىلىندى.

- ئابدۇرەھىم قادىر



كوررېكتورلار: ئېھسان ئىمىنجان  
ئەخمەتجان ئىسمائىل  
تۈل بەت ۋە نەقىشلەرنى تۈرسۈن غازى ئىشلىگەن  
ھۈسن خېتىنى نىياز كېرەم شەرقى يازغان  
قىستۇرما رەسىملەرنى لى چىشىن، ئەنۋەر توختى تەقلىت قىلىپ سىزغان

## ئۇيغۇر تىبابەت قامۇسى

### ئىككىنچى جلد

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە نازارىتى «ئۇيغۇر تىبابەت قامۇسى»  
ئىشخانىسى باشچىلىقىدا تۈزۈلدى، شىنجاڭ ئۇيغۇر تىبابەت  
تەتقىقات ئىشخانىسى تەرىپىدىن نەشرىگە تەييارلاندى  
شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى نەشر قىلدى  
شىنجاڭ ئىنخۇا كىتابخانىسى تارقىتىدۇ  
شىنجاڭ ئىنخۇا باسما زاۋۇتىدا بېسىلدى  
787 × 1092 مىللىمېتر 16 فورمات 30.25 باسما تاۋاق  
1990-يىلى 9-ئاي 1-نەشر 1-قېتىم بېسىلدى  
تراژى: 5000 — 1

ISBN 7-5372-0069-6 / R · 70

باھاسى: 5.00 يۈەن

校对：伊河山·依明江

艾合买提江·司马义

扉页，花边设计：吐尔存·哈孜

美术字：尼亚孜·克力木

插图重作：李齐新，艾尼瓦尔·吐呼提

中国医学百科全书  
维吾尔医学分卷  
第二册

---

《中国医学百科全书》维吾尔医学分卷办公室

新疆维吾尔医研究室组织编写

新疆人民卫生出版社出版

新疆新华书店发行

新疆新华印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开 30.25 印张

1990 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

印数：1—5000

ISBN 7—5372—0069—6

---

R·70 (民文) 定价：5·00 元